







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/0/2









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/D/2





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1764/D/2






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1784/0/2




1784<sup>(2)</sup>



































EX LIBRIS  
Dr. ERNST DARMSTAEDTER



# PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MATERIA LIBRI SEX, IOANNE RVELLIO SVESSIO-

nensi interprete. Singulis cum stirpium, tum animantium historijs, ad naturæ æmulationem expressis imaginibus, seu uiuis picturis, ultra millecarium numerum adiectis: non sine multiplici peregrinatione, sumptu maximo, studio atque diligentia singulari, ex diuersis regionibus conquisitis. Additis etiam Annotationibus siue Scholijs bre-

uissimis quidem, quæ tamen de medicinali materia omnem controuersiam facile tollant. Per GVALTHE

RVM H. RYFF, Argentinum,  
Medicum, & Chirurgum,

Omnia ex doctissimorum uirorum lucubrationibus iamprimum concinnata, & in lucem ædita.

Cum Indice quintuplici, copiosissimo: quorum primus omnium fere simplicium, quibus passim utuntur Medici, nomenclaturas Græcas: alter Latinas: tertius Officinis, Herbarijs, & Arabum familiaria uulgares: quartus Germanicas: quintus Gallicas, miro ordine complectitur.

ACCESSERE IN EVNDEM AVTOREM  
Scholia noua, cum nomenclaturis Græcis, Latinis, Hebraicis & Germanicis, IOANNE LONICERO autore.



Cum Gratia & Priuilegio Imperiali.

FRANC. Apud Chr. Egenolphum.

*L. J. G. Schaefer*



# REDA NII DIOSCO

DE ANAZARBI DE MEDICIS

MA MATERIA LIBRI SEX. JOSEPH KELLIO EDITIONE

1784. Singulis cum inscriptione annotationum historicarum

et medicarum ex rebus imaginibus, seu tabulis

illustratum. Non solum in hunc modum per se, sed etiam

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se

in hunc modum per se, sed etiam in hunc modum per se



Commissarius Publicus

1784



# CLARISSIMO AC PRVDEN-

TISSIMO SENATVI FRANCOFVRDIANO, GVAL-

therus H. Ryff, Argentinus, Medicus, & Chi-  
rurgus, S. D. P.



VVM SVMMVS RERV M OPIFEX DEVS, HOMI-  
ni nihil præstabilius mente, ratione atq; intelligentia dede-  
rit, mirum uideri non debet, si nonnulli & ij quidem sapi-  
entissimi uiri, tantum studij, laboris ac uigiliarũ contulerint  
ad eam partem excolendam & informandam, qua sola et re-  
liquis animãtibus & ipsis hominibus antecellerent. Quan-  
Pitagoricus Epicharmus tantopere est admiratus, ut hanc  
unam dominam atq; reginam, lucem lumensq; uitæ diceret,  
ac huius olius nobis demandatã curam, quum alia tum stupida tum ceca cēseret:  
Nōs, inquit, ὁρῶμεν ὅτι οὐκ ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν θηρίων ἡ φύσις: in hac tamen ipsa ratioe uel  
animo expoliendo, non eandem uidentur pleriq; propositam habuisse uiam, aut  
ad eundem tendisse finem, Nam fuerunt apud priscos philosophos, atq; etiam-  
num sunt, qui cognitionem contemplationemq; naturæ ita consecrati sunt, ut e-  
tiam in a consensescere & iucundum & pulchrum existimauerint, quorum ego  
institutum, Clarissimi atq; Amplissimi uiri, etsi improbandum non suscepi (q̃  
hoc interim agere quàm turpi ocio sese dedere maluerint) nunquam tamen tanti  
feci, ut non potius mancum quodammodo, atq; uix dum inchoatum iudicauerim  
si nullarum actio adiuncta consequutaq; fuisset, & quũ sapientiam (nimirum  
qua diuinarum humanarumq; continetur scientia) ut rem maximam admirari so-  
leo, tunc eam partem quæ nobis à communitate dicta, profert officia, longè præ-  
stantissimam putauĩ. Eam, inquam, quæ in hac generis humani domestica consu-  
etudine, societati ac hominũ tuendis commodis illustrior apparere solet, qua uel  
sola agioscamus necesse est, nos nobis ipsis non tantũ natos, sed patriæ, sed a-  
micis, Summoq; conatu enitendum nobis, ut è nostris studijs ad primum q̃  
uberrimis redundet fructus. Id cũ ita sit, facile in animum induco meũ, equiores  
rerũ aut maiores maximi facere mecum præclarissimum tum artium tum faculta-  
tum oĩm, quibus mens atq; ipsa ratio expoliuntur, Medicinẽ studiũ, atque id sa-  
lutarissimè per necessariumq; præ cæteris humanæ salutis iudicare, maximè cũ  
cogitaerint, qua parte rerum humanarum medica facultas existat, & quæ neces-  
sitas eis disciplinæ sit, atque utilitas, quæ propè id uinculum te net quo homo  
qua celestis, & qua terrenus est, copulatur. Item qua in usum & commercium  
rerum extra se positarũ utiliter et salubriter exit. Nec enim (ut corporea taceam)  
diutius coelestis hic spiritus & consuetudinem sui præbere nobis potest, postq̃  
à molulo naturæ discessit corpus, nec afferre præsidij quæ extrã sunt ope Me-  
dici salutifera destitutus quicquam potest. Credo igitur si uel mens rectè sese re-  
putet, uel quæ mente carent consilijs humanis uti possent, nihil tam enixè flagi-  
tetur: quàm eius rei domesticam facultatem, usum atque conditionem, cuius be-  
neficiũ frui omnibus istis naturæ muneribus licet. Quid enim admirabilius q̃  
cũ morborum & sanitatis uis penitissimè intra ipsa corporis uiscera peragatur:  
Medicum ingressum mente dispicere, decernere, ueniẽtem morbum prælagire,  
ingruentem auertere: superantem mitigare, reprimere, tollere: eum qui animam  
agebit, quem desperabant amici, uelut ab orco, breui spacio reuocare? Vt mihi  
præcarissimè dixisse uidetur sapientissimus Poeta τὰς τοὺς ἀνὴρ πολλὰν ἀντὶ τοῦ σώματος ἀλ-  
λασιν. Et uox diuina unũ artium omnium clarissimum testimonium, non abs re ex-  
hibuisse uidetur: Honorandum medicum, necessitati hominũ creatum. Sed iam  
ueran spectemus utilitatem. Primum enim quæ disciplina uel animi tenebras,



## EPISTOLA

uel incommoda eius corporis omnia, uel mentis nebulas discutere melius potest. Denique, quod uere præclarum est, quæ disciplina ad mentis incommoda, quæ omnia à corpore sunt extirpanda, propius unquam penetrauit. Quæ eius domicilij, in quo animus noster residet, unde sese comparat, unde nores induit, per quod ueluti portas, omnis notitiarum lux uenit, tanquam aedilicium quidam curandi potestatem habet summam. Certe iucundissima sanitati si corpus uniuersum, eadem & nitidissima reginæ menti, & ad omnem usum accommodatissima ueluti aulam inhabitandam parabit: aut si id mauis, instructam adesse genus negotiorum officinam menti suppetet, quæ quidem res quos post se fructus trahat, difficile explicatu. Videre hic mihi uideor uirtutum & philosophiæ totius partem. Certe enim compositum pulchre ad naturæ fragilitatem corporis (cuius rei facultas uel nusquam, uel penes medicum est) mentis tranquillitas consequatur oportet. Quæ quid aliud est, quam ille quem omnium uirtutum congressu que rimus, scilicet mentis status. Cæterum quæ corpus magis spectare uidetur Medicina uitæ & rerum omnium condimentum præbet, sine quo nihil iucundum, nec preciosum, nec admirabile, nihil denique gratum esse in uita quicquam potest. Quid magnifica te domus iuuat, quid splendida suppellex, quid aureæ uelut, quid aurum ipsum congestum? si inopem te, egenum miserabiliter destituat. Immo nihil obstat prorsus, quin ista omnia quibus, cum abunde suppetant, frui non potes, supplicia sint & cruciatus. Quid potentia? quid amplitudo? etiam si subiciant, uenerentur omnes? si te morbus sic lecto affixum tenet, sic omnem potentiam impotentiam reddit, ut istam autoritatem tuam uniuersam commutare cum uno sanitatis momento ardentissime cupias. Quid animus ipse uirtutibus licet pulcherrimis & innumerabilibus præditus intra foedum, morbidum, & pestilens domicilium conclusus, uel sublime conari, uel solatij cæterarum spectaculo halere potest? Ergo ueluti nox quædam, & caligo densissima morbus, optima hominis bona obscurat, contegit, & apparere non sinit. quæ reddita sanitas, uelut è magna tempestate iucundissimus solis aspectus, inenarrabili affectu omnia reducit. Ut recte uox illa & sapienter iudicet, ut quæ nullo precio æstimabilem esse sanitatem dicit, quam tum mortales intelligunt esse ueram cum morbos experiuntur, discuntque in illius sinu bonarum rerum omnium usum & fructum & gratiam constare. Hæc autem omnino se ita habere, nemo est, arbitror, tam planè nullius iudicij, qui non uideat & agnoscat, & merito artis huius præstantiam tum miracula necessario admiretur, uel summa eius beneficia erga mortales unice commendet, ac inde conatum illorum optimum, studium atque sedulitatem, qui artem hanc præclarissimam primo diuinitus acceptam ratione atque ingenio excoluerunt, nobisque quoquo modo absoluendam tradiderunt, magnificat: atque hos denique diis similes summis laudibus efferendos, & per maximis honoribus dignos esse censet, qui hanc diuinam artem illustrando, prouehendo, ornando, atque ab omni iniuria uindicando, omnem, quod aiunt, lapidem mouere tentent. Ceterum cum præclarissimam hanc artem, quam solam libero ingenio excolendo dignam iudicamus esse, duarum rerum cognitione potissimum constare in confesso sit, subiecti scilicet, atque eorum quibus ueluti instrumentis utitur, quorum cognitionem tam necessariam esse scimus. Medico, ut sine hac dextere medicari, aut medicinæ fructibus uberrimis frui nemo queat. Sunt autem ea quæ simplicia medicamenta uocamus, uerbi gratia, quæ terra rerum benigna parens ædit, stirpe, animalia & metallica, harumque uariarum partes. Cum uero harum rerum exactam atque rectam cognitionem Medico adeo necessariam hæcenus turbarint tan miserè quorundam tam pertinaces lites, perpetuæque discordiæ, atque contendendi libido (barbarorum errores crassissimos tacere lubet) ut hinc ipsam demum præclaram medendi artem de incertitudine atque inconstantia non parum notandam, an

san alio



## DEDICATORIA.

fam aliquem haud leuē, imprudentiores accipere possent. Hanc fortunā miseri nos, huic tam intolerabili malo, cū latius indies serpere uideremus, resistendū putauimus, atq; Medicinæ nobilissimæ alūnæ nostræ chariss, cui hac parte maxime fuit iniuriæ, suppetias ferre, atq; dignis copijs succurrere cū omnino statuisset, Pedanij Dioscoridis Anazarbei tanq; Coryphei palmāq; ferentis, qui u nicē huic malo, tanq; alter Aesculapius siue Apollo mederi posset, de Medicina li materia libros sex in manus sumpsimus; hoc enim foelicius medicam materiā nemo tractauit, ut Medicorum princeps Galenus testatur. Quis em̄ de simplicibus medicamentis ab antiquis tum Græcis tum Latinis uaria scripta extent, non infœliciter exarata, tamen *ἡ τῶν ἀπλῶν φάρμακων ἀνέκδοτος*. Quare hunc tanquam limpidissimum fontem, ex quo harum rerum cognitionem ueram rectamq; unicē petendam hauriedamq; esse censent uno ore omnes docti Medici, præ cæteris omnibus puriorē, magisq; fide dignū delegimus in hunc commentariolum siue scholia aut annotationes breuissimas quidem, quibus tamen omnis de simplici medicina siue medicinali materia, controuersia facile tollitur, ut hæc Medicinæ pars pristino suo candori restitueretur, cudere instituiamus, ac locos aliquot repurgare, et quod summē necessarium putauimus, hætenus uero nulli tentatum, cū stirpium tum animalium, quorum hic autor meminit, aut alioqui in re Medica usus increbuit, uiuas imagines singulis capitibus adijcere curauimus ad naturæ æmulationē quā artificiosissimē expressas, quibus clarior dilucidiorq; fieret Dioscoridis lectio, ut quæ iamdiu caligine obducta fuerat, iamdiuq; obcurata aliquid lucis reciperet, atq; adeo altius infigeret aīo ea quæ nudis uerbis exponit historia, artificiosa pictura. Hanc uerō prouinciā, si rem attentius exactiusq; perpendimus, non satis scio an humeris nostris parem assumpserimus, id tamen audendum censuimus, ubi hoc animaduertimus futurum gratum plerisque studiosorum, persuasum enim habebam si quid lucis huic auctori accederet hoc nostro labore, atque hac parte scilicet in re herbaria, rectaque atq; exacta Medicinalis materiæ cognitione, Medicinæ præclarissimum studium aliquid subsidij caperet, id enim ab omnibus naturæ rerum studiosis expeti. Quamuis me non lateret uiros cū singulari tum exactissima doctrina in hac re summum studium impendisse, in quorum albo Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius, Leoniceus, Manardus, Ruellius, Jac. Syluius, Anth. Musa, & ex nostris his nullo modo inferiores Cornarius, Cordus uterque, pater & filius, Brunfelsius, mihi olim præceptor charissimus, plurimumq; obseruandus, & Hieronimus Tragus homo in dijudicandis, explorandis, examinandisque simplicium maximē stirpium differentijs extra omnem (quod de Cicerone dictum est) ingenij aliam positus, post quorum luculentas conceptiones rem paulo auctiorem facere institui, nec id fore citra communem utilitatem putans. Quamuis sciam non de futuros, qui uel argumentum, uel me hominem naris (ut sic dixerō) obesse incessent. Hi profecto sunt qui in omnes sibi iudiciū sumunt, qui lingua pruriētes nimis quam licenter in alienam irruere famam nulla non hora permittunt sibi, etiam si sæpe uelut albaprehenduntur linea. Qui uelut scorpionis ictu, optimum quenque lancinarunt, ac fistulato uulnere (ut Hieronimi utar uerbis) uia aperuerint, mox latius ueneni pestiferā uim fundūt. Atra, ut Plinius inquit, ceu serpentum eorum lingua, uenenum uibrat, rabesq; animi contrectata omnia adurit, culpantium omnia, ac dirarum alitu mmodō tenebris quoque & ipsarum noctiū quieti inuidentes, gemitu, quæ sola uox eorum est, ut inauspicatorum animantiū uice obui quoque uetent agere aut prodesse uitæ, nec ullum tamen abominati spiritus precium nouere, q̄ odisse, culpāre atque carpere omnia. Quorum ego uirulentiam, dum pestilenti spiritu optimum quenque afflatum uolunt, impudentiorem putauī, quā ut eis respondendum haberem. Bonorum tantum

ego



ego iudicium reformido, quibus utinam ipsis ita libeat exporrecta fronte hunc  
nostrum laborem excipere, ut nullius odio aut offensione adducti ad scribendum  
accessimus. Quod uero nostram lucubrationem uestro nomini dicendam,  
nuncupandamque percensui, Clarissimi Prudentissimique uiri, in causa fuit incre-  
dibilis uestra uirtus, uitae integritas, & eruditio singularis, summa denique om-  
nibus in rebus prudentia, unde uestra Respub. uirtute honesta, religione acpi-  
etate integra, iure ac legibus aequa, opibus firma, copijs locuples, & gloria sem-  
per ampla fuerit, nec me parum denique commouit, aduersus bonos, studiosos  
atque eruditos uiros cum amorum beneuolentia singularis ut uestri nominis fa-  
maeque atque dignitatis splendoribus hic labor noster illustratus, uestris auspici-  
is semper tutus, meae quoque erga uos obseruantiae perenne monumentum, non  
longis tantum seculorum spatijs, uerum omnino si fieri possit, in uersis naturae  
legibus sempiterni & continentis aui diuturnitate donatus uiuat, floreat eluces-  
cat. Vos igitur amplissimi prudentissimique uiri pro uestra humanitate  
munusculum huiusmodi benignè (ut soletis) suscipiatis, putetis-  
que omnem meam operam, studium, industriam, quicquid  
est in me uel ingenij uel uirium, uestrae am-  
plitudini esse paratissimū. Fran-  
coforti ad Moenum,  
prid. Cal. Septem. Ann. Do.  
M.D.XL.III.



GRÆCORVM NO  
minum huius operis  
index.

A	
Αβρότονον	210
αγρικόν	195
αγνος	67
αγριελα	69
αγριοκαρδαμου	93
αγρουα	300
αδιδαντος	351
αγιλωπα	132
αγειρος	53
αγιλωφ	352
αγιόκερος	137
αϊσα	137
ακανθα	205
ακανθα λευκή	292
ακανθος	205
ακινος	210
ακονιτορ	325
ακορομ	2
ακτή	373
ακαλήφι	333
αλόη	207
αλυσορ	249
αμαρεάκορ	219
αμμι	232
αμοργι	70
αμπελος αγρία	381
αμπελος ημερομ	381
αμπελος λευκή	376
αμυγδαλή	86
αυναγallis	190
αυδράχην	151
αυδρόσαμμορ	285
αυηδορ	219
αυεμώνη	189
αυησορ	228
αυθεμεις	277
αυθύλλης	276
αυισορ	228
αυισορ	205
αωνων	205
αυτιζέινον	350
αυαρινη	249
απτιομ	81
αράχην	115
αρκτιορ	319
αργόγλοσος	155
αρεκευδος	50
αριστολογία	197
αρεκευδης	50
αρόμ	181
αρτεμισία	261

I N D E X.

αζαρόμ	8
ασκληπιάς	250
ασπυρόμ	285
ασηρ αηλικός	345
ατράκτυλις	151
ατράφαεις	148
αφάκη	169
αχιλλείος	303
ατίνθιομ	209
B	
Βαλανόςμυρεφική	383
Βαλάνοςμυρεφική	25
Βαλλοτή	255
Βαλσαμέλιον	16
Βάρυβρον	51
Βαρυπικρομ	209
Βατράχιομ	183
Βάτος	303.61
Βάτος ιδάος	704
Βατύπικρομ	209
Βολέλλιον	39
Βήχιερ	261
Βουγλοσος	348
Βουκερος	137
Βούνιομ	347
Βσφθαλμος	278
Βλίτορ	147
Βότρυς	263
Βουβώνιομ	345
Βονυορ	146
Βράβυς	51
Βρυορ	17
Βρύως θαλάσσιορ	336
Βρώμος	132
γαλέμ	105
γαλή	105
γάλλιορ	335
γεντιανή	197
γέρας όφείος	101
γυγίβερ	177
γυγίδιομ	164
γνσέντερά	116
γλεύκιομ	34
γλήχωρ	213
γλυκειά	198
γλυκυρόζην	198
γναφάλιομ	265
γογγύλις	241
λ	
λάφην	52
λαφνίς	52
λακτυλος	74
δίος Βάλανος	71
δικόκοκκος	130
δίψακος	202

71	ίρις	2
181	ισάτις	195
	ίξος	71.247
68	ίτια	68
K		
305	κάγκαμορ	18
165	κακαλία	346
29	κάλαμος	56
74	κάλαμος μυρεφικός	15
305	κάλαμος αροματικός	15
357	κάναβις	281
215	καπνός	341
21	κάππαρις	185
233	καρδαμαντική	93
312	καρδαμμορ	174
330	καρδαμμομ	6
305	καρορ	628
134	καρυορ βασιλικόρ	68
85	καρπωσις	355
57	κασία	11
175	κασανα	71
379	καυκαλίσ	133
280	κίγχορ	164
5	κίγχορ	133
219	κίερος	51
301	κίχρις	133
385	κίλτικηνάδος	8
	κίενταύριομ τό μέγα	199
130	κίενταύρις	300
	κίενταύριομ τό μικρόμ	200
273	κίερατίς	137
54	κίερασιορ	77
267	κίερατία	78
207	κίερατωνία	78
335	κίικίς	71
211	κίηρός σάκτος	127
	κίινναμωμορ	12
387	κίιχώριορ	158
336	κίισός	191
377	κίληματίς δαφνοίδης	192
101	κίλιντοπόδιομ	251
163	κίηκος	379
174	κίνίδη	333
213	κίόκκι orientis	193
218	κοκκυμνήα	84
	κοκκος βαβικη	308
307	κόλιφονία	45
314	κολοκύνθη	169
105	κολχικόρ	329
346	κόμαρος	85
238	κορωνόπτονος	157
308	κότινος	69
349	κοτύλληλορ	333
254	κραταίογονορ	269
365	κρανία	83



# I N D E X.

κράμβη	30	μαράθρον	237	ὄφαλις	146	σέσσει 226	σίδη 7
κρίνινον	32	μελάνθιον	243	ὄξυακανθ	60	σιδηρίτις	503
κρίνον ἐρυθρον	254	μελία	53	ὄξυμυρσίτη	355	σίκυον ἡμερον	162
κρίος	138	μυλίκρατον	386	ὄξυφοίνιξ	74	σίγητι	172
κρίθην	129	μυλίστοφυλλον	255	ὄχνη	81	σίσαρον	144
κρίθμον	256	μετώπιον	25			σίσημεριον	156
κροκός	29	μεσσίλη	82	παονία	279	σίσωμ	227
κρόμμυον	171	μέσσιλον	ibi.	παλίον	59	σμίλαξ κηπάα	168
κυάμος	135	μηδική πόα	169	πάνακτες	223	σμίλαξ	1327
κυκλάμινος	179	μηκων	318	πανκράτιον	185	σογχοσεδάδυμος	158
κυνόγλωστον	148	μήρον ἀδαμαντικόν	4	παρδαλιάνχες ἄκονι-		σογχοσετρεακός	ibi.
κυνόσεατος	61	μήκον κερατίτις	318	τον	325	σοσάνδις	164
κύπαρισσος	49	μήλι	223	πασσάλη	133	σκήλα	184
κύμινον	229	μήλον	89	πένυη	42	σκορόδιον	260
κυπείρος	5	μηκόνιον	318	πτελεκίν	273	σκορόδον	172
κύπτερος	5	μήκων κηπάα	317	πεντάφυλλον	306	σκοροδόπραστον	ibi.
κρότον	166	μήκων ἡρώας	316	πέντερι	376	σπαρτίον	362
κάνειον	327	μηλεα	80	πένωλις	370	σμήνα	37
κάνον	46	μήλινον	29	πένωλος	369	σπονδύλιον	241
		μορεα	89	πενδλίκιον	330	σάχυν	257
λαγώπους	298	μυός ὠτη	195	πενσική καρύα	68	συνέμιμος	89
λαμψάνη	146	μυκός	329	πενέδανον	241	συνή	91
λαπαδόμ ἄγριον	145	μυρίκη	57	πενικλυμενον	296	σύνφυτον	194
λάπαθρον κηπάα	145	μυρρά	37	πενισερώμ ὑψηλ	314	σαφίς ἄγρια	361
λαδυρίς	369	μυρρίνη	76	πενασίτα	340	σαφυλή	381
λάδυρος	138	μυρρίς	343	πένανον	222	σαφυλίνος 126	(338)
λαγχύω πόα	311	μυρρίνη	76	πένια βρύτα	47	σρατιώτης χιλιόφυλλος	
λευκάκανθα	205	μυρρίνη		πενιακία	86	σρεδιον	178
λευκάνθειον	277	νάρδ	7	πένισον	133	σραχύντις	337
λεύνκη	53	νυμφαία	274	πένιουσά	368	σραχύνος	322
λαγώπυρος	298	νύριον	318	πένις	42	σραχύνος	14
λευκόδιον	168			πλάτατος	52	σραχύνος	300
λεπτοκαρυον	68	ξανθιον	352	πολεμώνιον	293	σραχύνανθος	14
λίβανος	40	ξυλοκερατα	78	πολυγαλον	352	σραχύντοβότανη	336
λίβανωτισ σεφανωμα		ξύρις	299	ποταμογείτων	337	σραχύνος	211
τίκη	241	ξύριον	298	πολυγόνατον	292	σραχύνος	38
λίβύσιον	225			πολυπόδες	291	σραχύνος	411
λίγνυς	47	ὄα ὄη	84	πολυπόδιον	109		
λίγνυσιον	225	ὄα ὄη	81	πράσιον	378	τάξος	327
λιώνιον	297	ὄα ὄη	382	πρίνος	71	τέρμινθος	44
λίον	137	ὄα ὄη	266	πρίνεια	55	τέρμινθον	252
λίνοσπερμον	ibi.	ὄα ὄη	166	πρίνεις	377	τέρμινθον	151
λίνοζώσις	179	ὄα ὄη	234	πρίνεις	239	τέρμινθον	194
λίνοσπερμον	279	ὄα ὄη	383	πρίνεις	128	τέρμινθον	137
λόπιον	71	ὄα ὄη	109	πρίνεις		τέρμινθον	227
λυχνίς σεφανωματική	253	ὄα ὄη	109	πρίνεις	144	τέρμινθον	167
		ὄα ὄη	84	πρίνεις	63	τέρμινθον	1309
λωτὸν ῥίμα	82	ὄα ὄη	97	πρίνεις	75	τέρμινθον	119
λωτὸς	342	ὄα ὄη	205	πρίνεις	71	τέρμινθον	297
λωτὸς δένδρον	ibi.	ὄα ὄη	243	πρίνεις		τέρμινθον	259
		ὄα ὄη	273	πρίνεις	245	τέρμινθον	353
μαδονάις	274	ὄα ὄη	212	πρίνεις	219	τέρμινθον	265
μαδολιον	163	ὄα ὄη	8	πρίνεις	133		
μαλακροσπερμον	253	ὄα ὄη	166	πρίνεις	151	ύακινθος	315
μαλακὸν ἄγρια	148	ὄα ὄη	141	πρίνεις	159	ύακινθος	167
μαλακὸν κηπάα	148	ὄα ὄη		πρίνεις		ύακινθος	167



I N D E X.			
ἄλυσμα	216	Acorum	2
ἄλυσμα γυμνόν	366	Acutaspina	60
ἄλυσμα μελι	386	Adiantum	350
ἄλυσμα πεπεγνόν	177	Adeps	120
ἄλυσμα σέλινον	235	Adarces	415
ἄλυσμα κύμα	319	Adonium	50
ἄλυσμα κικόνιον	285	Aegilops	352
ἄλυσμα πορ	119	Aeris squama	399
		Acrugo	400
φακός ἐσιόμενος	140	Aethiopica olea	69
φκγός	71	Aethiopsis	339
φίλνυς	61	Aes ustum	397
φλόμα	339	Agaricum	194
φόνιξ	74	Agcratum	313
φύλνυς	61	Agallochum	17
φού	9	Aiuga	286
φύκος θαλασσίον	337	Aizoon	332
φύλλον	10	Alaude	112
φύλλον ἰνδικόν	ibidem	Albucum	182
φύλλον μελαγχρόνον	ibidem	Alba spina	206
		Alcea	282
χαμαίεκτη	372	Alcionium	415
χαμαίερος	252	Alec	107
χαμαίερος	347	Alica	135
χαμαίερος δ μέλας	201	Allium	171
χαμαίερος	277	Allium sylvestre	ibidem
χαμαίερος	237	Alypum	374
χελιδόνιον μέγα	191	Aloe	207
χελιδόνιον μικρόν	192	Alisma	284
χόνδρος	128	Alyssum	249
χρυσόγονον	312	Alfinc	330
χρυσάνθεμον	277	Altercus	319
		Alibea	281
ψύλλον	320	Alumen	410
		Alus	294
LATINORVM NOMENCLATIONUM INDEX.			
A			
Abrothoum	31	Amaracus	277
Abinthium	208	Amaracus	219
Abinthium marinum	109	Amaracium	34
Acacalis	58	Ambrosia	262
Acanos	221	Amaratus lutea & pur.	312
Acantha	205	purca	85
Acanthium	204	Amygdale	85
Acanthus	205	Amylum	135
Acatia	66	Anmi	231
Acetum	387	Anomum	13
Acetum mulfum	388	Ammomacum	246
Achillea	303	Ampeloprasen	170
Acidamuria	389	Amurca	69
Acinos	220	Anagallis	189
Aconitum	425, 325	Anagallis aquatica	189
Acorus palustris	2	Anagyris	283
		Anchusa	299
		Androsaces	274
		Androsenum	286
		Anemone	188
		Anethum	239
		Anisum	227
		Anthemis	276
		Anonis	205
		Anthera	65
		Anthyllis	276
		Antirrhinum	350
		Aparine	248
		Aphace	169
		Aphrodisia	2
		Apiastrum	255
		Apium palustre	233
		Apium hortense	333
		Apium rusticum	235
		Apium vulgare	233
		Apios	373
		Apocynum	328
		Apollinaris	319
		Aqua	986
		Aqua malsa	386
		Arabis	175
		Araneus	115
		Arbutus	64
		Arctium	339
		Arcturus	340
		Areni	107
		Argemifluma	406, 428
		Argenti recrementum	406
		Argemini uini	406, 429
		Aris	181
		Arisarum	181
		Aristolochia	197
		Arnoglossa	154
		Arthemisia	261
		Armum	181
		Arundo	56
		Asarum	8
		Asclepias	250
		Ascyron	285
		Aselli	109
		Asini ungula	111
		Asinum iecur	110
		Asius lapis	417
		Asphaltos	47
		Asphaltus	16
		Asplenium	274
		Asiria mala	80
		Astragalus	314
		Astrodolus	182
		Asparag	153
		Athera	131
		Atramentum librar.	421
		Atramentum futorii	407
		Atramentum rubrum	409
		Atracilis	250
		Atriplex	148
		Aucua	131
		Auricula muris	192
		Auripigmentum	109, 429
		B	
		Bacca Syriaca	82
		Bacharis	221
		Balaustium	75
		Ballote	254
		Balsamum	15
		Barbula hirci	167
		Barbus	104
		Batus	61
		Bechium	268
		Bellium	39
		Beta	151
		Betonica	288
		Bitumen	47
		Blatta pistrinaria	109
		Blitum	ibidem
		Boleti	319
		Boopes	197
		Botrys	263
		Brabyla	203
		Brassica Crispa	149
		Brassica marina	151
		Brassica scabris	149
		Brassica sylvestris	150
		Britannica	289
		Bromos	132
		Bryon	16, 311
		Bucurmon	350
		Bufo	106
		Buglossum	248
		Bulbus uomitorius	283
		Buccina	95
		Bunium	347
		Bunium	148
		Buphthalmum	287
		Buprestes	114, 425
		Butyrum	118
		Butyri fuligo	ibidem
		C	
		Cacalia	348
		Cachrys	240
		Cadmia	396
		Calaminiha	217
		Calamus aromaticus	2
		Calamus odoratus	14
		Calcifraga	375
		Callitriche	351
		Calx	425, 414
		Cancanum	18
		Cancer marinus	99
		Cancris	ibidem
		Cande	



I N D E X.			
Candelaria	339	Charta	56
Candelaregis	ibidem	Chelidonium	191
Cannabis	282	Chelidonium minus	191
Cantharides	114.424	Chamaedaphne	556
Capnos	341	Chamelea	372
Capnos chelidonia	198	Chameleo niger	201
Capnos phragmitis	198	Chiliophyllum	335
Capus	112	Chamaepitys	286
Cardamantica	93	Chironium Panaces	224
Capparis	185	Chrysanthemon	314
Capra ungula	111	Chr socolla	404
Cardamir	156	Chrysocome	311
Cardamomum	5	Chrysogonum	312
Cardamomum nigrum	6	Chrysolachanon	148
Carduus	202	Cyanus	405
Carduus suarius	201	Cicada	112
Ceries	55	Cicer	138
Cannabum	228	Cicerbita	158
Carota	238	Cici	366
Carpasif succus	426	Cichorea sylvestris	159
Carpesium Galeni	355	Cichoreum	158
Carpobalsamum	16	Cyclaminus	178
Carum	218	Cicuta	126.425
Casus	118	Cydnea	79
Casia	10	Ciborium	139
Castanea	71	Cimices lectularij	107
Castoris testes	164	Cinara	202
Catanance	550	Cinnabaris	406
Caucalis	164	Cinamomum	11
Cedrus	51	Cynocrambe	328.380
Celtis	82	Cynoglossum	348
Ceneaurium magnum	198	Cynosbatus	61
Ceneaurium minus	199	Cynosorchis	269
Cepage thium	171	Cynosrhoda	61
Cepa	170	Cyperus Babylonius	5
Cepes	283	Cyphi	13
Cera	127	Cyperus Indicus	5
Cerasia	77	Cypyrus	ibidem
Cerasum	ibidem	Cyprum	61
Cerasus	ibidem	Circea	265
Ceruinum cornu	113	Cirsium	344
Cerix	96	Cistus	62
Cerusa	404.428	Cytinus	75
Chalcanthum	407	Cytisus	342
Chalcis	115	Citraria	255
Chalcitis	408	Citra	80
Chama	96	Citromala	ibidem
Chamaecyparissus	49	Clematis	292
Chamecissus	347	Clymenum	295
Chamaedrys	252	Clinopodium	251
Chameleuce	343	Cnicus	378
Chameleon albus	200	Coagulum	119.102
Chamefice	570	Coccum gnidium	371
Chamomilla sativa	276	Coccus baphica	308
Chamomilla vulgaris ibi.		Coccum infectarium ibid.	
		Cochlea marina	97
		Coeruleus	405
		Colchicum	329
		Colocasia	139
		Colocynthis	373
		Colophonia	45
		Concha 95. Cochlea	97
		Concha margaritifera	98
		Cochlea terrestres	97
		Comarus	85
		Condrylla	159
		Conyza	266
		Coccum	46
		Corallium	416
		Coriandrum	231.426
		Coria ueterament.	121
		Coris	286
		Cornicis pes	157
		Cornus	83
		Cornus sylvestris ibidem	
		Coronopus	157
		Cortex thuris	41
		Costus 15. Cotonea	78
		Cothona	107
		Crambe	144.149
		Cretanus	156
		Crimmon	130
		Criihum	156
		Crocodilium	201
		Crocodilus terrestris	115
		Crocum	19
		Cratogeomum	268
		Creticum seseli	126
		Crocognagma	33
		Cucurbita	160
		Cucurbita sylvestris	373
		Cucumer satinus	161
		Cucumis marinus	161
		Cuminu Alexandrinu	331
		Cuminum sylvestre	230
		Cuminum satinum	229
		Cuniculus	102
		Cunila	218
		Cupressus	48
		Cupressi fructus	49
		Curmi	130
		Curatio comunis in omnes	
		ictus uirulentos	437
		Cutiones	109
		D	
		Daphnides	356
		Daucum	238
		Delphinium	238
		Dicoccon	130
		Distamnium	213
		Diphryges	489
		Dipsacum	202
		Diptarmice	178
		Domestica nobis	430
		Doricium	322.425
		Draba	175
		Draco marinus	100
		Dracunculus	179.101
		Dracunculus palust.	179
		Dulcis radix	198
		E	
		Ebenus	63
		Ebur 113. Echinus	94
		Echion sylvestre & dome	
		sticum	300
		Elaphoboscum	236
		Elatinum	29.304
		Elaterium	360
		Elenium	22
		Eleomeli	224
		Eleoselinum	34
		Elichrysium	312
		Empetrum	375
		Ephemerum	350.425
		Epimedium	298
		Epimelis	82.95
		Epimetron	298
		Epipactis	342
		Epithymum	574.218
		Equisetum	308
		Equorum lichenes,	112
		Erica	57
		Ericinum	95
		Erimaccus	94
		Erinus	392
		Eryngum	206
		Erysimon	175
		Erysisceptu	4
		Eritrodanum	280
		Eruca	165.114
		Euphorbium	245
		Eupatorium	34
		Eruca pinorum	114
		Eruum	140
		F	
		Faba	138
		Faba Aegyptia	139
		Faba Græca	82
		Faba Syria	ibidem
		Fax	414
		Fagus	70
		Far	133
		Farrago	132
		Farina crasior	130
		Ferula	241
		Festiu-	



I N D E X			
Festuca	352	Goace	107
Fiber	104	Gobius	107
Fici.	90	Gordylion	227
Fidicula	351	Gramen	302
Filicula	377	Gramen parnassi	302
Filix	367	Gramen gnidium	371
Flos aris	399	Großi	91
Flos salis.	413	Gummi Iuniperi	50
Foeniculum	237	Gypsum.	415.428
Foeniculum erraticū	238	H.	
Foenogracum	36	Hematites	417
Foliatum	36	Halica	13
Folium Indici.	10	Halicacabus	321
Folium Malobathri	10	Halicastrum	133
Fontalis	337	Halimus	59
Fraxinus	52	Halme	107
Fucus marinus	336	Hammoniacum	246
Fuligo	47	Harmala.	222
Fuligo pictoria	421	Harundo	55
Fuligo liquidae picis	46	Hastula regia	181
Fumaria	341	Hedera	190
Fungus	29.428	Hedicecum	34
Finum	124	Hediosmus	216
G.		Hedipnois	232
Gagates	418	Hedysaron	273
Galbanum	245	Helenium	31
Gale	105	Heliotropium	380
Galiopsis	334	Helix	191
Galerita	112	Helxine	330
Galion	335	Helxine maius et mi.	304
Galla	71	Hemionitis	276
Gallina	112	Hepatitis	306
Gallus	112	Hepatorium	306
Garum	107	Heptaphyllon	306
Geminalis	273	Herba muralis	330
Genista	362	Herba sacra	314
Genitale Cerui.	109	Hemerocallis	267
Gentiana	296	Hemodactylus	319
Geranium	263	Hyacinthus	315
Gethium	171	Hyberis	186.93
Gingiberis	177	Hydropiper	177
Gingidium	163	Hieracum	232
Gith	242	Hyotianus	319
Githago	243	Hypocoum	319
Gladiolus	298	Hypericum	285
Glans	70.352	Hippo	95
Glans Sardiāna	71	Hippocampus	104.95
Glans unguentaria	193	Hypocistis	62
Glastum	133	Hippoglossum	549
Glastum sylvestre	193	Hippophaes	365
Glaucium.	247	Hippophæstum	365
Gleucium	34	Hippomarathrum	237
Glutinium	247	Hippolapathum	146
Glutinium piscium	24	Hippopotamus	104
Gnaphalium	264	Hippocelinum	235
		Hyppuris	291.
		Hirudo	419
		Hirundinaria	19.
		Hirundo	113
		Hissopum	110
		Histrix	94
		Holostium	295
		Hordeum	129
		Hordeum Cantherinū	129
		Horminum satium et syl	272
		uest.	4.6
		Hyoscyamus	4.6
		I.	
		Iasminum	36
		Iberis	93
		Ildeæ Radix	907
		Iecicera	111
		Ilex	70
		Indicum	405
		Intestina terræ	116
		Inula	21
		Itybus	169
		Intybum olus	159
		Intibus	168
		Inturis	185
		Iouis glans	71
		Ipio	175
		Iris	fol.1
		Iris Africana	2
		Iris illirica	eodem
		Iris Macedonica	2
		Irinum spissamentum	33
		Isatis	193
		Isopyrum	345
		Iuglandes	87
		Iuncus	350
		Iuncus odoratus	14
		Iuncus quadrangulus	5
		Iuncus rotundus	14
		Iuncus triangularis	5
		Iuniperus	50
		Iunonia rosa.	254
		Ius Galli ueteris	107
		Ius piscium	107
		Ixia	427
		L.	
		Labrusca	381
		Labrum Veneris	202
		Lac. 117. Lac coagu.	418
		Lactuca	162
		Lactuca excaulis siue	162
		sefalis	162
		Lactuca laticaulis	163
		Lactuca sylvestris	163
		Lada	62
		Ladanum	62
		Lagopyros	298
		Lagopus	297
		Lampsana	146
		Lanaria	339
		Lanaria herba	178
		Lanarum medicina	118
		Lana succida	118
		Lapathum	145
		Lapis Armen.	405
		Lappa	351
		Larix	45
		Laser	243
		Laserpitium.	245
		Lathyrus	369
		Laurus	52
		Laurus Alexandrina	355
		349.354	
		Ledon	62
		Lemniaterra	407
		Lens	139
		Lens palustris	331
		Lenticula	140
		Lentiscus	43
		Leontopetalum	251
		Leontopodium	349
		Lepidium	93.186
		Lepidium minus	95
		Leporina herba	298
		Lepus marinus	102.429
		Leucacantha.	206
		Leucas	253
		Leucoium album	268
		Leucoium luteum	267
		Leucoium purpureū	267
		Leucoium Theophr.	268
		Leucomenides	107
		Libanotis	240
		Libanotis coronaria	241
		Libysticum	225
		Lichen	310
		Lichenes equorum	111
		Lychnis	353
		Lycium	65
		Lycostomum	325
		Lycopsis	300
		Lygos	67
		Ligusticum	224
		Lingua bubula	348
		Lingua canina	348
		Lignum Indicum	63
		Lignorum marcor	55
		Lignum Sanctum	63
		Ligustrum	61
		Lilium album	254
		L.	
		Lilium	



I N D E X.			
<i>Lilium rubens</i>	254	<i>Melilotus</i>	219
<i>Lilium sylvestre</i>	267	<i>Melopepo</i>	262
<i>Limnæon</i>	199	<i>Memecylon</i>	85
<i>Limonium</i>	297	<i>Mendesium</i>	35
<i>Linoxosus</i>	379	<i>Mentha</i>	215
<i>Lysimachia purpurea et lutea</i>	290	<i>Meon</i>	4
<i>Lithargyros</i>	403	<i>Mercurialis</i>	379
<i>Lithospermou</i>	279	<i>Mespilus</i>	82
<i>Lecuste</i>	113	<i>Metopium</i>	35
<i>Locusta marina</i>	99	<i>Meum</i>	4
<i>Lolium</i>	135	<i>Meum Athamanticū ibi.</i>	4
<i>Lonchitis aspera</i>	280	<i>Metallica omnia</i>	396
<i>Lotus arbor</i>	82	<i>Myes</i>	96
<i>Lotus Aegyptia</i>	343	<i>Myagrū</i>	344
<i>Lotus sylvestris</i>	342	<i>Milium</i>	133
<i>Lotus urbana</i>	341	<i>Milium Indicum</i>	134
<i>Lucernula</i>	257	<i>Millefoliū Stratiotes</i>	337
<i>Lupinecur</i>	111	<i>Millepeda</i>	109
<i>Lupini</i>	140	<i>Mylocion</i>	109
<i>Lutra</i>	104	<i>Myrrha</i>	37
M			
<i>Macer</i>	54	<i>Myrrhis</i>	347
<i>Mala</i>	78	<i>Myrica</i>	56
<i>Malabathrinum</i>	36	<i>Myrobalanus</i>	363
<i>Malabathrum</i>	10	<i>Mirtus</i>	76
<i>Mala Cydonia</i>	78	<i>Misy</i>	408
<i>Mala Epirotica</i>	78	<i>Mituli</i>	96
<i>Malope</i>	148	<i>Mixa</i>	243
<i>Malua</i>	147	<i>Moly</i>	223
<i>Malua agrestis</i>	281	<i>Molybdena</i>	402
<i>Malum punicum</i>	75	<i>Morion Theophrasti</i>	321
<i>Meconium</i>	427	<i>Morum</i>	89
<i>Melheraclia</i>	426	<i>Morus</i>	88
<i>Mene</i>	107	<i>Mullus</i>	103
<i>Mandragoras</i>	323.427	<i>Mulsū</i>	385
<i>Manna thuris</i>	41	<i>Murex</i>	96
<i>Marathrum</i>	237	<i>Muria</i>	413
<i>Marasit aris</i>	417	<i>Mus</i>	116
<i>Marina</i>	390	<i>Mus araneus</i>	116
<i>Marinus cehinus</i>	94	<i>Muscus</i>	16
<i>Marinus muscus</i>	336	<i>Muscus arborum</i>	17
<i>Marubiastrum</i>	255	<i>Mustela</i>	105
<i>Marrubium</i>	256	<i>Musteum</i>	34
<i>Marum</i>	220	<i>Mustum</i>	385
<i>Mastiche</i>	44	N	
<i>Medica</i>	168.80	<i>Naphtha</i>	48
<i>Medium</i>	298	<i>Napus bunia</i>	143
<i>Megalinum</i>	34	<i>Narcapitum</i>	17
<i>Mel</i>	126	<i>Narcissus</i>	357
<i>Melampyrum</i>	344	<i>Nardinum</i>	34
<i>Melanteria</i>	418.409	<i>Nardum</i>	6
<i>Melanthium</i>	242	<i>Nardum Celticum</i>	6
<i>Melimecla</i>	76	<i>Nardum Gallicum</i>	7
<i>Melissa</i>	355	<i>Nardus Germanica</i>	211
		<i>Nardum Indicum</i>	6
		<i>Nardum montanum</i>	8
		<i>Nardum Syriacum</i>	6
		<i>Nasturtium</i>	173
		<i>Nasturtium agreste</i>	93
		<i>Nastur. babylonici</i>	175
		<i>Nasturtiū orientale</i>	175
		<i>Nasturtiū sylvestre</i>	174
		<i>Nepetha</i>	217
		<i>Nerium</i>	318
		<i>Nitrum</i>	43
		<i>Nymphaea</i>	273
		<i>Notæ eorum qui à uenens nat is demorsifunt</i>	435
		<i>Nuces auellanae</i>	301.221
		<i>Nux iuglans</i>	87
		<i>Nux picea</i>	42
		<i>Nux pinea</i>	46
		<i>Nux pini</i>	42
		<i>Ocimasrum</i>	301.221
		<i>Ocimoides</i>	31
		<i>Ocimum</i>	166
		<i>Odoratus iuncus</i>	14
		<i>Oenanthe</i>	266
		<i>Oenochora</i>	344
		<i>Oenomeli</i>	385
		<i>Oesipum</i>	119
		<i>Oleaster</i>	86.22
		<i>Olcomel</i>	24
		<i>Oleum</i>	21
		<i>Oleum album</i>	22
		<i>Oleum Anethinum</i>	31
		<i>Oleum Amygdalinum</i>	24
		<i>Oleum Balamomum</i>	25
		<i>Oleum Cinaminum</i>	35
		<i>Oleum Cicinum oleū</i>	24
		<i>Oleum Cydoniorum</i>	29
		<i>Oleum Cyprinum</i>	33
		<i>Oleum Cnicinum</i>	25
		<i>Oleum Crocinum</i>	32
		<i>Oleum cenanthinum</i>	29
		<i>Oleum Hyosciaminū</i>	25
		<i>Oleum Laurinum</i>	26
		<i>Oleum Lentiscinum</i>	27
		<i>Oleum lilinum</i>	31
		<i>Oleum Mastichinum</i>	27
		<i>Oleum melanth.</i>	25
		<i>Oleum Melinum</i>	29
		<i>Oleum metopium</i>	24
		<i>Oleum Myrteum</i>	26
		<i>Oleum narcissinum</i>	32
		<i>Oleum in nucibus</i>	25
		<i>Oleum Ociminum</i>	30
		<i>Oleum picatum</i>	46
		<i>Oleum Raphanicum</i>	25
		<i>Oleum Sampsuchinū</i>	30
		<i>Oleum Sesaminum</i>	25
		<i>Oleum sylvestris oliue</i>	228
		<i>Oleum Sinapis</i>	250
		<i>Oleum Suisinum</i>	32
		<i>Oleum Telinum</i>	30
		<i>Olyra</i>	131
		<i>Omphacium</i>	382
		<i>Omphacinum oleum</i>	28
		<i>Onagra</i>	344
		<i>Onyx</i>	96
		<i>Ononide</i>	205
		<i>Onosma</i>	273
		<i>Opium</i>	317
		<i>Opobalsamum</i>	16
		<i>Opos Cyrenaicus</i>	244
		<i>Opos Medicus</i>	244
		<i>Oreoselinon</i>	215
		<i>Orchis</i>	169
		<i>Oriza</i>	132
		<i>Origanum</i>	112
		<i>Ornithogalum</i>	167
		<i>Orobancha</i>	166
		<i>Orobrychis</i>	284
		<i>Osiris</i>	353
		<i>Ossifragus</i>	112
		<i>Othonna</i>	192
		<i>Ouorū natura</i>	112
		<i>Oxalis</i>	145
		<i>Oxalme</i>	389
		<i>Oxiacantha</i>	60
		<i>Opylapathon</i>	145
		<i>Oxymeli</i>	388
		<i>Oxys</i>	259
		<i>Oxytriphyllon</i>	259
		P	
		<i>Peonia form. et mat.</i>	278
		<i>Palimpissa</i>	47
		<i>Paliurus</i>	59
		<i>Palma</i>	73
		<i>Palma elate</i>	74
		<i>Paludapium</i>	233
		<i>Palustris rana</i>	429
		<i>Panaces</i>	223
		<i>Panaces Asclepij</i>	214
		<i>Pancration</i>	184
		<i>Panicum</i>	134
		<i>Papauer Ceratites</i>	318
		<i>Papa. Cornicula.</i>	327.318
		<i>Papauer erraticum</i>	316
		<i>Papauer satium</i>	316
		<i>Papyrus</i>	56
		<i>Pardalianches</i>	525
		<i>Paronichia</i>	318
		<i>Parthenium</i>	277
		<i>Pastinaca Gallica sativa</i>	225
		<i>Pasti</i>	



P		I		N		D		E		X	
Pastinaca Gallica sylvestris	221	Plantago minor	164	Rana	106	Sanguis taurinus	428				
Pastinaca marina	105	Platanus	52	Ranunculus	187	Sanguis	123				
Pastinaca vulgaris	225	Plumbago	402	Raphanus sylvestris	144	Sarcocolla	246				
Pentaphyllon	306	Plumbum elotum	401	Rapum	141	Sardonia herba	426				
Pelamides	107	Plumbum ustum	401	Rapum sylvestre	142	Satyrion	270				
Pelecinus	273	Polemonia	292	Remedia demorsorū à cō	434	Satyrion basilicum mas & foemina	270				
Pepo	161	Pollicarpon	269	ne rabioso	434	Satureia	218				
Peplis	369	Polycnemum	251	Remedia peculiaria uiru	438	Sauina	50				
Perdicia	330	Polycriton	269	lentorum ictuū	438	Scamonia	370				
Peristereon	303	Poligala	351	Resina abietina	44	Scandix	163				
Persea	92	Polygonatum	291	Resina Cyparissina	45	Schimides	43				
Pes leporis	298	Polygonum	290	Resina Laricea	44	Scilla	174				
Perfica	80	Polityrion Apulci	351	Resina lentiscina	ibid.	Scillinum acetum	389				
Petasites	340	Polipodium	377	Resina pinea	45	Scillinum unum	399				
Petroselinum	233	Polium	259	Resina Strobilina	45	Schistus lapis	490				
Picea	42	Polium montanum	287	Rhamnus	58	Scimus	115				
Picinum oleum	46	Pompholix	397	Rhaponticum	195	Scholopendra	101				
Pinorum cruce	242	Pompilus	107	Rhodia radix	307	Scordium	260				
Peucedanum	241	Ponica nux	88	Rhododaphne	328	Scorodoprason	172				
Pienocomum	373	Populus alba	53	Rhododendrum ibidem	365	Scorpena	100				
Pinguedo	120	Populus nigra	53	Rhus 71 Ricinus	128	Scorpiurus	380				
Pinus	42	Porphyrus	95	Robus	64	Scorpio marinus	100				
Piper	176	Porrum capitatum	169	Rosa	65	Scorpio terrestris ibidem	131				
Pyra	81	Porrum sectium	170	Rosarum flos	65	Secale	273				
Pirethrum	239	Portulaca	151	Rosei pastilli	28	Sedum	332				
Pyrethrum Sylvestre	239	Potamogeton	337	Rosa sylvestris	240	Seminalis	291				
Pissasphaltum	48	Poterium	202	Rosaceum	14	Semperuium	332				
Pissanthum	46	Prencestia nux	88	Rosmarinus	280	Senecio	335				
Pisselæon	ibid.	Propolis	127	Rosmarini coronat.	401	Senecta angustum	101				
Pistacia	86	Prosopion	340	Rotundus iuncus	405	Sepia 103	115				
Pistolochia	196	Protropum unum	385	Rubeta	439	Seriphium	210				
Pitynum	45	Pruna sylvestria	56	Rubigo ferri	407	Seris	159				
Pituisa	375	Prunus	243	Rubia	406	Serpillum	218				
Pituitaria	361	Pseudomclanthium	214	Rubrica fabrilis	303	Sertula Campana	219				
Pix arida	47	Pseudonardus	211	Rubrica Synopica	60	Sesama	155				
Pix liquida	49	Psyllium	319. 426	Rubus	304	Sesamoides	359				
Phalangium	257	Psittatia	86	Rubus canis	354	Seseli	226				
Phalaris	279	Vopa	295	Rubus idcus	321	Selane	107				
Phaselus	140	Ptarmica	178	Ruscus	50	Sitonyum	22				
Philyra	61	Pulegium	212	Ruta	372	Sycomorus	89				



# INDEX

<i>Sylvestris olea</i>	58	<i>Tbapla</i>	361	<i>Vina Tamariscina</i>	57	<i>Allium uersinum</i>	171
<i>Sylvestris ruta</i>	222	<i>Thymbra</i>	218	<i>Vini natura</i>	383	<i>Aloe Gallica</i>	197
<i>Sijer</i>	144	<i>Thymbrea</i>	156	<i>Viola alba</i>	167	<i>Altaraxacon</i>	232
<i>Sisymbrium</i>	155.215	<i>Thymelæa</i>	371	<i>Viola matronales</i>	268	<i>Ameos</i>	231
<i>Sisyrinchion.</i>	183	<i>Thymoxalme</i>	389	<i>Viola purpurea</i>	345	<i>Amidum</i>	136
<i>Sison</i>	227	<i>Thymum</i>	217	<i>Vipera</i>	101	<i>Amigdala dulces</i>	85
<i>Smarides</i>	106	<i>Thlaspi maius</i>	174	<i>Viscum</i>	247	<i>Amoni semen</i>	227
<i>Smilax aspera</i>	353.	<i>Thrixi</i>	107	<i>Vitex</i>	67	<i>Aneiham sylvestre</i>	4
<i>Smilax hortensis</i>	168	<i>Thus</i>	40	<i>Vitis alba</i>	376	<i>Angelica</i>	236
<i>Smilax levis</i>	353	<i>Thuris fuligo</i>	41	<i>Vitis nigra</i>	eodem	<i>Anthera</i>	65
<i>Smyrnum</i>	235	<i>Tilia</i>	61	<i>Vitis sylvestris</i>	373	<i>Anth. monium</i>	402
<i>Solanum hortense</i>	321	<i>Tipha</i>	134.205	<i>Vitis uinifera.</i>	381	<i>Apium risus</i>	188
<i>Solanum Marimum</i>	32	<i>Tubimali</i>	366	<i>Viueria</i>	105	<i>Archangelica</i>	354
<i>Solanum somniferum</i>	322	<i>Toxicum</i>	427	<i>Vlmus</i>	54	<i>Aristolochia rotunda</i>	198
<i>Sonchus</i>	157	<i>Tragacantha</i>	206	<i>Vmbilicus ueneris</i>	333	<i>Arthanica</i>	179
<i>Sorba</i>	83	<i>Tragocentrum</i>	308	<i>Vnedo</i>	85	<i>Alcluya</i>	259
<i>Sori</i>	408.409	<i>Tragoriganum</i>	2.12	<i>Vnguementorū cōpositio</i>	27	<i>Amygdala amara</i>	85
<i>Sparganium</i>	299	<i>Tragus cerealis</i>	131	<i>Vnguis odoratus</i>	96	<i>Arcocus</i>	203
<i>Spartium</i>	363	<i>Tribulus terrestris &amp; a-</i>		<i>Voluta</i>	95	<i>Aspergula</i>	249
<i>Spina alba</i>	202	<i>quaticus</i>	296	<i>Vrceolaris</i>	330	<i>Asphodelus</i>	267
<i>Spina Arabica</i>	202	<i>Trichomanes</i>	351	<i>Vrina</i>	125	<i>Astrantia</i>	234
<i>Spodium</i>	399	<i>Trifolium</i>	358	<i>Vrtica</i>	333		B.
<i>Spondylium</i>	241	<i>Trifolium album</i>	258	<i>Vua</i>	381	<i>Bacca lauri</i>	52
<i>Spongia</i>	4.6	<i>Trifolium luteum</i>	58	<i>Vua passa</i>	382	<i>Balsamine</i>	353
<i>Spuma maris</i>	415	<i>Trifolium purpureū</i>	258	<i>Vua Tamminia</i>	361	<i>Bardana</i>	340
<i>Spumeum papauer</i>	318	<i>Trimestre</i>	128		X.	<i>Benedicta</i>	312
<i>Stachys.</i>	257	<i>Tripolion</i>	350	<i>Xanthium</i>	361	<i>Been rubrum</i>	263
<i>Stacle</i>	35	<i>Trisago</i>	252	<i>Xylaloes</i>	17	<i>Behen album et rub.</i>	293
<i>Staphilodendros</i>	7	<i>Triticum</i>	128	<i>Xylobasamum</i>	16	<i>Berberis</i>	60
<i>Staphis agria</i>	360	<i>Triticum Gallicum</i>	228	<i>Xilocerata</i>	78	<i>Beta sylvestris</i>	193
<i>Stoebe</i>	295	<i>Trixago palustris</i>	160	<i>Xiris</i>	299	<i>Bismalua</i>	281
<i>Stoechas</i>	2.11	<i>Trogloditæ</i>	63		Z.	<i>Bistorta</i>	290
<i>Stibium</i>	402	<i>Tomentum</i>	265	<i>Zea simplex</i>	130	<i>Blatte bysantie</i>	97
<i>Stipmi</i>	402	<i>Tordylion</i>	217	<i>Zizipha</i>	248	<i>Borago</i>	348
<i>Styrax</i>	38	<i>Torpedo</i>	101	<i>Zythum</i>	130	<i>Branca ursina</i>	205
<i>Stratiotes</i>	337	<i>Tubera</i>	167	<i>Zomos</i>	107	<i>Bryonia</i>	376
<i>Strigmenta balnearum</i>	23	<i>Tusilago</i>	261	<i>Zopissa</i>	47	<i>Bruscus</i>	353
<i>Strobilus</i>	203		V.	<i>Appellationum quæ Offi-</i>		<i>Bugia</i>	60
<i>Sturio</i>	106	<i>Vaccinium</i>	315	<i>cinis &amp; herbarijs in</i>		<i>Buglossa</i>	301
<i>Succinum</i>	54	<i>Variagenera uinorū</i>	390	<i>usu sunt, Index.</i>		<i>Buglossa Italica</i>	345
<i>Suillus talus</i>	113		391.353. 394.395.		A.	<i>Buglossa rubea</i>	390
<i>Sulphur</i>	411	<i>Venerca</i>	2	<i>Acatia</i>	66	<i>Bulbus esculentus</i>	182
	T.	<i>Veratrum album</i>	356	<i>Accipitrina</i>	209	<i>Bursa pastoris</i>	309
<i>Thalicttrum</i>	336	<i>Veratrum nigrum</i>	358	<i>Acus muscata</i>	264		C.
<i>Tamarix</i>	56	<i>Verbasum</i>	333	<i>Acus pastoris</i>	264	<i>Cacalia Italica</i>	346
<i>Taxus</i>	327.426	<i>Verbasum sylvest.</i>	338	<i>Acutella</i>	205	<i>Calamus aromaticus</i>	215
<i>Telephium</i>	193	<i>Verbenaca</i>	313	<i>Affodillus</i>	182	<i>Calcatrippa</i>	297
<i>Tellina</i>	96	<i>Verbenaca supina</i>	314	<i>Agnus castus</i>	67	<i>Camedreos</i>	252
<i>Terebinthus</i>	44	<i>Venenata</i>	430	<i>Agresta</i>	387	<i>Camomilla</i>	277
<i>Terra</i>	420	<i>Vermes terreni</i>	116	<i>Agrimonia</i>	305	<i>Caprifolium</i>	206
<i>Terrestris crocodilus</i>	15	<i>Vescaria</i>	312	<i>Alquaquengi</i>	322	<i>Caput Monachi</i>	332
<i>Terrestris echinus</i>	94	<i>Vetonica</i>	289	<i>Alcea</i>	82	<i>Cardamomum maius</i>	6
<i>Testiculus</i>	269	<i>Vetonica altilis siue Coro</i>		<i>Alhermes</i>	508	<i>Cardamomum minus</i>	6
<i>Teucrion</i>	251	<i>aria</i>	289	<i>Allecaria</i>	260	<i>Carpopatum</i>	201
<i>Thalassomeli.</i>	387	<i>Vidus rat. immorsu ca.</i>	435	<i>Allium porrum</i>	178	<i>Carduus benedictus</i>	251

Carpo



I N D E X.							
Carpobalsamum	236	Enula campana	23	Iris florentina	36	Mirtus officinarum	99
Carui	228	Epithimum	218.3 4	Iris Germanica	I	Mumia	47
Carthamus	279	Esula rotunda	369	Iua arthetica	287	Muscus	17
Castia lignea	11	Euisus	258	Iua non muscata	276	N	
Castoreum	104	F		Iuube	248	Nasturtiū aquaticum	167
Castrangula	335	Fabalupina	278	Iusquamum	319	Nenuphar	374
Cataputia maior	369	Farfara	261	K		Nigella Damascena	243
Cataputia minor	369	Febrifuga	300.277	Karabe 34 Keyri	268	Nigella Romana	248
Cauda Equina	308	Fel terre	200	Kermes 308 Kerua	366	Nihil	399
Caulis	150	Feniculum Romanum	228	L		Nux cypressi	49
Celidonia	191	Foenum Burgundienfe	169	Lactuca leporina	193	Nux indica	87
Centum capita	307	Foenumgræcum	137	Lapatium acutum	145	Nuxuomica	366
Cetuncularis herba	269	Ficaria	335	Lapis Armenus	405	O	
Centum nodia	291	Filipendula	266	Lapis Calaminaris	397	Oculi populi	52
Centunculum	265	Filius antepatrem	239	Lapis lazuli	405	Oleander	318
Cerefolium	264	Fistici	86	Lapis stellatus	405	Oleum ex scorpionibus	100
Cervi boleti	167	Fistula pistoris	202	Lanceola	154	Oleum de Alcanna	33
Ceruisia	130	Flammula	186	Lappa	340	Oleum ranarum	106
Ceterach	275	Folium Indum	10	Lappa minor	352	Oliuella	371
Christi manus	366	Fru mentum Saraceni	133	Lauandula	211	Orobium	248
Christi palma	366	cum	341	Laudanum	62	Ostrucium	244.248
Cicutaria	343	Fumus terræ	G	Laureola	333	P	
Cyclamen	179	Galanga	3	Leetipes	251	Palma Christi	278
Cymbalaria	333	Gallitrichum	278	Lens aquatica	331	Panis cuculi	259
Cinamomum	11	Gariophyllata	312	Leo terræ	371	Papauer cornutū	318
Citrargo	255	Genistella	362	Leporis pallatium	158	Papauer rubrum	317
Citrullus	161	Grana myrti	76	Leuisticum	225	Parietaria	330
Claretum	286	Grana tinctorum	308	Lignum aloes	17	Pastulæ	382
Creta marina	156	Granatum	75	Lingua Ceruina	275	Pedicularis	362
Colophonia	407	Granum paradisi	6	Lignum sanctum	63	Perforata	389
Coloquintida	373	Guaiacum	63	Ililium cōuallium	347	Persicaria	369
Colubrina	289	H		Linaria	353	Pes corui	186
Condisi	178	Halicacabus peregrinus	223	Linum syluestre	371	Pes uituli	181
Consolida maior	294	Hamel	223	Liquiritia	148	Pimpinella	314
Consolida media	314	Hederalis	250	Lumbrici	116	Pimpinellahirsuta	354
Consolida regal.	231	Hedera terrestris	347.305	Lunaria Italica	312	Pineæ	42
Corago	348	Hepatica	311	M		Pyrethru syluestre	178
Corallina	336	Herba fullonū	178	Macis	34	Pyrola	297
Corrigiola	291	Herba Roberti	264	Magistrantia	234.241	Pistacia Germanica	86
Costus amarus	14	Herba Symeonis	282	Maiorana	219	Phaseoli	168
Costus dulcis	14	Herba tunica	253	Maiorana Anglica	217	Phrodillorum	182
Cotula fetida	278.336	Herbauenti	188	Mala insana	325	Poma amurum	325
Cotula non fetida	178	Herba ungarica	282	Maluauiscus	281	Pomum spinosum	323
Crocus	29	Hermodaetilus	329	Marrubium album	256	Popul-go	261
Crocus hortensis	379	Hydropiper	188	Marrubium nigrū	255	Prallium album	256
Cucumer anguinus	336	Hippocraucum uiuum	188	Mastichina herba	212	Primula ueris	333
Cucumer asininus	360	386		Mastix	44	Protentilla	188
Cucumeres	162	Hirundinaria	250	Materfylvia	249.296	Prunella	294
Curcuma	5	Hordeuin mundatum	129	Matticaria	277	Pruna Damascena	84
D		I		Memithe	247	Pulegium montanum	251
Daucus Creticus	235	Iarus	181	Menta Romana	216	Pulmonaria	312
Dens Leonis	232	Iecur lupi	111	Menta rubra	156	Pulmo uulpis	109
Dentale	96	Illecebra minor	194	Menta Saracenicā	216	Q	
Digitalis	333	Imperatoria	236	Mezereon	371	Quinq; folium	106
Diptamus	213.279	Indicum	293	Milium solis	279	Quinq; neruia	254
Draco hortensis	178			Mille morbia	335	R	
E				Millefolium	378	Raphanus	142
Eburustum	299			Millefolium maius	303		
Ele ni	69			Myrabolani	363		
Enduia	163			Mirobalanum	59		
Entale	96			Miralli	76		



Rafurae boris	113	Sutmach	72	GALLICARVM	Bruyere	57
Remora aratri	205	Tamarindi	74	nomenclatum	Bugraues	206
Restabouis	205	Tamariscus	57	Index	Bugrundes	ibidem
Rha Germanicum	195	Tanacetum	262	A	Burgaspina	58
Rhabarbarum mona-		Tapfus barbatus	339	Absince	Buyre	118
chorum	146	Taraxicon	232	Agripalma		
Rhaponticum	199	Tembulum	10	Agaric		
Rhodium lignum	16	Tragatum	206	Auron		
Ribes 60 Ribes	246	Tribuli marini	296	Alenois		
Robertiana	263	Trifolium odoratum		Alifler		
Rosa Hierichundis	143	942		Aluyne		
Ros marinus	241	Trocisti diarrhodon		Amandes		
Rosaceum lignum	308	65		Ambre		
Rubea minor	249	Trocisti cocion	19	Amydum		
Rubea tinctorum	288	Tunica herba	289	Anete		
Ruella	249	Turbith	875	Arbouces		
S		Thus masculum	40	Argentine		
Sacerdotis uirile	188	Turpethum	875	Armoysc		
Saluina	7			Arrocches		
Saluia mollis	357	V		Apergoute menue		
S. spiritus radix	236	Valeriana	9	Aspic		
Sanguis draconis	406	Valeriana maior	9	Aspic de oultre mer		
Sanguis hirci	125	Vermicularis	309	Artichault		
Sandaracha	40	Vermicularis minor		Aigremoine		
Saponaria	128			Aubespine		
Saxifraga maior	256	Vernix	195	Aulx		
Saxifraga rubra	266	Veronica	252	Aurone		
Scabiosa	295	Vinca peruinca	292			
Scelerata	186	Vincetoxicum	350	B		
Scrophularia maior	335	Vinosa herba	263	Bachar		
Scrophularia minor	192	Virgapastoris	202	Bacille		
Sigillum marie	179	Viscum quercinum	70	Bacins		
Scutum coeli	336	Virriolum Romanum		Bayes de laurier		
Sebeste	248	408		Bardane		
Secacul	207	Vlceraria	186	Barbotine		
Semē lumbricorum	210	Vmbilicus marinus	98	Basilicque menue		
S. p. inerua	154	Vnguentum populei	54	Bastona		
Serapinum	245			Berium		
Serpentaria maior	181	Volubilis	305	Betoesne		
Serpentaria minor	181	Vnifolium	303	Bij corneti		
Sesamum	135	Vngula caballina	261	Biure		
Sigillum Salomonis	292	Vrtica alba	334	Blanceputta		
Siler montanum	222	Vrtica mortua	334	Ble		
Solarum	372	Vsnea	17	Ble turquet		
Soldanella	150.390	Vua crispa	58	Blit		
Spatula foetida	269	Vua uersa	25	Boga		
Spica celtica	218	Vua uulpina	321	Boys gentil		
Spica Germanica	11	Vnularia	4	Bonnes dames		
Spica nardi	7			Bonifacia		
Spodium	399	X		Borache		
Squilla	184	Xylocaracta	78	Bouillon		
Squilla minor	185			Branze ursine		
Squinantum	14	Z		Breton		
Staphisagria	361			Brodon		
Stichas Citrina	312	Zambac	37	Buglose sauuaige		
Stinci officinarum	116	Zinziber	177			
Storax calaminta	38	Zizanion	136			
Storax liquida	35	Zuccarum	227			
Stramonia	323					



# I N D E X.

<i>Ciuita</i>	171	Encens	40	<i>Gigembre</i>	177	<i>Iue artetique</i>	287
<i>Citron</i>	80	Ers	141	<i>Gerres</i>	107	<i>Ioubarbe</i>	332
<i>Colla</i>	247	Efcargotz	98	<i>Gentienne</i>	197	<i>Iofmarin</i>	59
<i>Colla buccæ</i>	247	Efelere	191	<i>Gynft</i>	362	<i>Iunc marin</i>	95
<i>Colla Moruæ</i>	376	Efgrunperfil	233	<i>Gyrasole</i>	366	<i>Iugioline</i>	135
<i>Couleure</i>	376	Efpeltbra	130	<i>Gyroffles</i>	289		
<i>Coloquinte</i>	373	Efpurge	369	<i>Gyroffles fauluaiges</i>	253	<b>L</b>	
<i>Colubrine</i>	376	Eruca geratina	175	<i>Glaicul</i>	2	<i>Lactucini</i>	159
<i>Couinim</i>	102			<i>Glaiz</i>	ibid.	<i>Lactue</i>	163
<i>Comin</i>	220			<i>Glaizou glaiel</i>	299	<i>Lamæ goutte du uin</i>	
<i>Concret</i>	322	<b>F</b>		<i>Glatterons</i>	340		
<i>Confole</i>	314	<i>Faufs</i>	71	<i>Glocinus</i>	103	<i>Lampe</i>	145
<i>Coperofe</i>	407	<i>Feniculus tortuofus</i>	4	<i>Glotton</i>	352	<i>Lampreda</i>	105
<i>Coques delenant</i>	198	<i>Fœingrec</i>	137	<i>Goaca</i>	207	<i>Lauande</i>	211
<i>Coquelourdes</i>	315, 188	<i>Febue</i>	139	<i>Grains de paradis</i>	6	<i>Laurier</i>	52
<i>Coraline</i>	336	<i>Febues painctes</i>	168	<i>Grain de meurte</i>		<i>Lentile</i>	140
<i>Corne</i>	83	<i>Fenoil</i>	237	<i>Grappe de uigne fauluaige</i>	382	<i>Lentile de mer</i>	931
<i>Cocombre fauluaiges</i>	357	<i>Fennoil baftard</i>	238			<i>Lentisque</i>	43
		<i>Fenoil marin</i>	156	<i>Graterons</i>	249	<i>Le herbe de la Trinite</i>	
<i>Coq</i>	112	<i>Feuchier</i>	377	<i>Gratia Dei</i>	236		
<i>Corix</i>	42	<i>Feuillet de Inde</i>	10	<i>Graua</i>	273	<i>Le feau noftre Dame</i>	
<i>Corrigiole</i>	291	<i>Feuillet de Malabathre</i>	10	<i>Grenouille</i>	106		
<i>Corler</i>	183			<i>Grefte</i>	122	<i>Leuiflic</i>	225
<i>Cornes</i>	84	<i>Feuillet de mer</i>	337	<i>Groffelles</i>	58	<i>Limons</i>	81
<i>Cornier</i>	83	<i>Fenacia</i>	169	<i>Guatac</i>	93	<i>Lin</i>	137
<i>Corne de cerf</i>	114	<i>Ferrafa</i>	103	<i>Guefde</i>	71 293	<i>Lingua pagana</i>	349
<i>Corneti</i>	96	<i>Fiel de terre</i>	200	<i>Guy</i>	248	<i>Lierre</i>	191
<i>Cornuetta</i>	231	<i>Figues de marseylle</i>	91	<i>Guinauues</i>	281	<i>Lyerre terrestre</i>	347
<i>Coronaregia</i>	220	<i>Figues royales</i>	74			<i>Lieure</i>	102
<i>Concombre</i>	162	<i>Figuier</i>	91	<b>H</b>		<i>Lys</i>	254
<i>Couillon de chien</i>	270	<i>Flambes</i>	2	<i>Hane bane</i>	319	<i>Litharge</i>	404
<i>Couillons ds prebftre</i>	192	<i>Fleurs de lys</i>	354	<i>Hardea</i>	376 292		
		<i>Foin de bourgoigne</i>	169	<i>Hepaticq</i>	311	<b>M</b>	
<i>Courge</i>	160	<i>Follette</i>	143	<i>Herbe au chancre</i>	264	<i>Maraffus</i>	101
<i>Courge fauluaige</i>	373	<i>Fouini</i>	105	<i>Herbe au charpentier</i>	146	<i>Mache</i>	265
<i>Cuminum fylueftre</i>	175	<i>Fourment</i>	128			<i>Macors</i>	297
<i>Croffon</i>	174, 155	<i>Framboifier</i>	304	<i>Herbe au chat</i>	217	<i>Maluc</i>	148
<i>Croiffer</i>	105	<i>Fraife</i>	53	<i>Herbe au chien</i>	348	<i>Mandegloire</i>	315
<i>Coraige</i>	269	<i>Frette</i>	105	<i>Herbe au foulon</i>	228	<i>Manteca</i>	118
<i>Curme</i>	85	<i>Fugera</i>	377	<i>Herbe maflic</i>	220	<i>Marina crifta</i>	375
<i>Curmuer</i>	83	<i>Fume terre</i>	341	<i>Herba coparia</i>	236	<i>Mariolaine de angleterre</i>	
		<i>Furones</i>	105	<i>Herbe au paulx</i>	361		
		<b>G</b>		<i>Herbe au pulces</i>	320	<i>Maron</i>	78
<b>D.</b>		<i>Galange</i>	5	<i>Herbe au tigneux</i>	145	<i>Marrubium</i>	256
<i>Dattes</i>	74	<i>Galange groffe</i>	5	<i>Hermes</i>	105	<i>Marturelli</i>	105
<i>Dragees aux cheual</i>	166	<i>Galanga fauluaige</i>	5	<i>Hyeble</i>	372	<i>Mafic</i>	265
		<i>Garantie</i>	353	<i>Hyerofolimitanū pomum</i>	333	<i>Maflic</i>	44
<i>Dyonifia</i>	191	<i>Garanze</i>	280			<i>Maflichina</i>	203
<i>Drauc</i>	175	<i>Gaffe</i>	136	<i>Hysope</i>	211	<i>Medola</i>	107
<i>Duftege</i>	295	<i>Gelimandri</i>	252	<i>Hous</i>	71	<i>Melifse</i>	256
		<i>Geline</i>	112	<i>Houffon</i>	ibidem	<i>Mellegette</i>	6
		<i>Gelphano</i>	274	<i>Huyle de oliue</i>	21		
<b>E</b>		<i>Genecure</i>	50	<b>I</b>		<i>Menthe</i>	215
<i>Efglantier odoriferāt</i>	161	<i>Geniculiere</i>	292	<i>Iefse</i>	133	<i>Meflier</i>	82
<i>Efglantier fans odeur ibi.</i>		<i>Gengeure</i>	177	<i>Ionc</i>	310	<i>Meure</i>	89
		<i>Gingiberis hortenfis</i>	213	<i>Iue non mufcee</i>	276	<i>Meurier</i>	ibidem



Miguel	126	Panis	134	Raine	106	Vermillon	429
Migraine	75	Parietoire	330	Rascafa	100	Viraire noir	358
Mille feule	338	Pasiflores	188	Rassel	269	Viratre blanc	356
Millefeule grande	303	Pas d'afne	261	Rau de lymofin	143	Violette girofflees	268
Millepertuis	285	Pastel de languedoc	193	Rau de fauoye	144	Veriust	362
Millet	133	Pate de Lyon	251	Reclisse	198	Verbene	33
Mirabile pomum	313	Patellum	220	Refort	144	Vertentroyt.	9
Miraine	263	Pauott	317	Regaliffe	198	Vervaine	9
Mira sole	366	Penoesne	279	Restringe	34	Vineale reculium	366
Myrrhe	37	Perce pierre	375	Reupontie	199	Viroire	24
Moelle	123	Peret	197	Ris	151	Violetta	348
Morgelina	190	Perroquet	208	Roisin	382		
Mariolaine	219	Persil	233	Roisins en cabatz	382	Xff.abre	327.426
Moron uiolat	350	Persil	343	Rouce	156	Germanicarum uocum	
Mostarde	373	Peruence	292	Roquette	165	Index.	
Mouron	331	Petit lyseron	eodem	Rosagine	328	A.	
Moufferon	329	Petit muguet	335	Roseau	56	Aberknobloch	172
Muguet	346	Petit chesne	252	Roses	65	Abrahams baum	67
Muscali	96	Peuplier.	53	Roses doultre mer	148	Acher wurzel	3
		Pied de lieure	298	Rosmarin	241	Affolter	248.71
N.		Pilolet	219	Rosmarinum aculeatum		Agest	383
Naveau	142	Pymen	263	57		Agrimonten	305
Nenuphar iaulne et blanc	274	Pin abre	42	Rouge lif.	254	Ahorn	52
Neprun	58	Pinus aquatica	291	Ruilleure de fer	401	Allant wurzel	21
Nefflier	82	Pisa cerra	138	Ruefauage	223	Alberbaum	53
Nigelle poiurette	243	Plaine	52	Rumpe pierre	375	Alepatic	208
Nisculi	109	Plantain	155	S.		Alaesholz	17
Nobilis cruca	175	Poire	82	Saffran	20	Allraun	325
Noysette	88	Poirier	82	Saffran bastard	379	Anmel Pom	129
Noy de cypres	49	Pois Ciches	138	salunca	8	Anlung	136
Noix de galle	72	Poiurette	243	sauterelles	112	Anmcy samen	231
		Polypode	378	sannas blanche		Ancken	138
O.		Poma amorum	325	saponalis	295	Andorn	256
Orchanete	300	Pome	80	Sarrieta	218	Angelic	216
Oculus cattii	350	Pomes de pin	42	Sarrae	218	Anifs	228
Oycelles	289	Pomier	80	Sauier	51	Apfelbaum	80
Oignon	171	Pomier de granade	75	Saulge	215.68	Arben	42
Oygnon marin	184	Poniccade	258	Sauiniere	51	Arlesbet	83
Oliuier sauvage	69	Porcelles	152	Sceurgeon	129	Aeschbaum	53
Ornylle dasne	294	Porrette rouge	147	Scorpens	100	Aeschlauch	171
Orenge	81	Porreta	171	Securgeon	129	Aesch roslin	83
Orge	129	Potiron	329	Semen	130	Atrich	372
Origan	212	Pouliot	213	Senecon	137	Arnica	200
Orme	55	Pourcourean	311	Senegrene	137		
Ortie griesche au piequa		Pouliot sauvage	217	Sencue	173	R.	
te	334	Pourpier	152	T.		Bachmunz	216
Ortiesmortes	334	Prune	84	Tora	25.325	Bachpungen	190
Oruale	273	Prunier	eodem	Tamaris	57	Balsamkraut	215.156
		Pudis	44	Teste de artichault	203	Balsam munz	216
		Punaifes	107	Truffla	167	Bapp	247
P.				V.		Bappen	131
Pain de porceau	179	Q.		Vid de chien	181	Bauch weiffen	166
Pailure de chameaux	14	Quinte seule	306	Vigne	381	Baum ephew	192
Pampalus	117	R.		Vigne blanche	376	Baum ol	21
Papauerulum	351	Raffle	174	Vigne sauvage	375	Bauren episch	235
						Bauren senff	174



Register.			
Beytweel	294	brennender hanen füß	187
Benedicten rosen	279	brennend nessel	334
Benedicten wurzel	312	breyde bletterte wolffs	368
Benningen rosen	279	breyde saur ampfer	145
Beer wurz	4	breyde wegrich	155
Beyfuß	261	bromber stud	303
Beren milch	368	brusch	355
Beren rappen	205	brust wurz	236
Berg blae	405	buch ampfer	259
Berg geel	405	büchs baum	71
Berg minz	216	bucholter	340
Bertram	239	buckhart	148
Besam kraut	174	burgundisch gras	169
Beronien	289	burgundisch hew	169
Bett	127	burgel kraut	151
Bertlers leug	352	burgelen	152
Bibenel	234		
Biber	104	Calmus wurzel	15
Biber hddlin	192	Caminals hew	14
Bier	230	Camillen	277
Bilsen kraut	319	Capaunen	112
Bympernuslin	87	Cardamömlin	6
Bengel kraut	380	Carden benedicten	231
Bynsang	334	Castani	71
Bunten	310	Ceder baum	51
Byrbaum	82	Chustian wurz	314
Bitter aloes	208	Chust wurz	357
Bitter wurz	197	Curaun	80
Blater holz	19	Consolon	314
Bley	401	Cornelbaum	83
Bley weyß	404	Costenz	212
Blicken	130	Creugbaum	366
Blaer augentrost	349	Creug wurz	336
Blae violen	346	Cucumeren	162
Blumle von der lieb	312	Cypressen	49
Blüts tröpste	253	Cypressen nuß	49
Blüt wurz	264	Cypressen wolffs milch	368
Boborellen	322		
Bocks bare	167		
Büchbaum	137		
Bollen	171		
Bonen	139	Dann hartz	45
borres	405	Dannen schwam	195
borreisch	348	Dattel baum	74
brachen dystel	207	Dauben tropff	293
brandt schlang	101	Dech	402
brandt lartich	261	Deymant	215
braun beronien	289	Den gras	291
braun fleischblumē	259	Denmarck	9
brun kressig	156	Dyll	229
brun leber kraut	311	Dyrtel Eolben	265
brunnellen	294	Doll kraut	324
brauner Wyfen klee	259	Döberneglin	253
braun violen	263	Dör	46
braun weydrich	290	Drachen wenzel	3
bren stein	54	Drüse wurz	335
brun wurz	335	Dür wurz	267
		Eber wurz	201
		Entian	197
		Eren preys	252.289
		Eyden baum	327
		Eychbaum	71
		Eichfarren	378
		Eydechs	115
		Eysen hart	313
		Eysen heuttel	326
		Eysen kraut	313
		Eysen rost	401
		Elz	209
		Endich	209
		Endimen	163
		Engel sueß	378
		Eniß	228
		Esch	233
		Ephew	191
		Ephew on fencht	191
		Eppen	233
		Erbfelen ber	60
		Erdapfel	139
		Erduß	167.373
		Erdepfeimmen	362
		Erd moren	314
		Erdrauch	341
		Erd gallen	200
		Esel	109
		Esels hüb	261
		Farren	377
		Felrys	282
		Fendel	237
		Fenigreck	137
		Ferb beer	58
		Ferb köner	58
		Feygen	91
		Feygen baum	91
		Onzeyreig feygen	92
		Feygwargen kraut	192
		Feyst	122
		Ferber rott	280
		Fertigfeyt	122
		Fidre dannen	42
		Finger hüt	319
		Fisch minz	216
		Fisch köner	197
		Flachs	137
		Flachs kraut	353
		Flader	372
		Fliegen schwamm	329
		Floch kraut	269
		Flor	379
		Floramor	312
		Fochen	42
		Frangosen holz	20
		Frauen dystel	283
		Frauen har	351
		Frauen münz	215
		Frauen röplin	336
		Frembde heydelber	76
		Frembder peterfilien	106
		Frosch	188
		Froschpfeffer	134
		Fuchs schwanz	306
		Funff finger kraut	129
		Fütter gerst	129
		Galgant wurzel	15
		Gall dypfel	72
		galmey	397
		gamander	251
		garben	339
		garten hyfop	218
		gans blüm	93
		gauch brott	167.269
		gaucheyl	190
		Gauch klee	256
		Gefulten hanen füß	283
		Gefultre violen	346
		Gehösiere ghlayßblü	188
		men	399
		Gebrant ärg	54
		Gelb aggsteyn	318
		gelb magfamen	267
		geel Camillen	3
		geel Schwertel	5
		geel wasser liliē	259
		geel weyßen klee	47
		geygen bartz	147
		geirlin	226
		gelb moren	318
		gelb dlungen	226
		gelb violen	263
		gelb wald henle	188
		gelb wyderich	290
		gemoss von baumen	17
		groß ampfer	290
		gens bappel	148
		gens distel	158
		genserich	189
		gerolte gerstien	129
		grint wurz	210
		gerwel	338.303
		gerstien	129
		gesotten hartz	47



# Register.

Gesotten most	385	Hart haw	235	Hundts zung	348	Klein bathengel/weib	
Grackel güt	408	Hartriegel	67	Huff latick	361	le	303
Gichtwurz	279	Hase	102			Klein bibinel	353
Gilgen	254	Hasen pfötlin	298	J.		Klein blaue schwer	
Gilgen Confort		Hatstrang	242			tel	299
	296	Hawwurz	274	Je lenger te lieber		Klein demmarck	9
Gyrgelen	144	Hatz vomn sichten			287 129	Klein epphew	191
Glasz frant	330		45	Je lenger selieber/		Kleiner hanen füß	
Glasen	316	Hatz von forhen	ibid.	weible	359		188
Gleit	404	Hatz von lorch dan		Jgel	95	Klein gest	129
Gleyßblümen	186	nen	ibid.	Jbisch	281	Klein hauf wurz	
Glidfrant	303	Hatz vomn dirlin		Jüen	55		332
Glozier	44	baum	ibid.	Jltis	105	Klein hanfwurz weib	
Goltblüm	277	Hartfrant	353	Indianisch Korn		le	309
Golt grundt	247	Hasen ampffer	350		134	Klein meer oder meuß	
Goltwurz	267	Hafel nuß	88	Indich	193	zwibel	185
Gorcken	162	Hafel wurz	9	Indich blaue	405	Klein meger frant	
Gors gnad	264	Haw hechel	206	Jugber	177		345
Gors vergess	256	Hanc blat	356	Jugrün	292	Klein streich blümen	
Granaten spßel		Haus	247	Italianisch steyn			362
Graz neglin	299	Hausen blasen	247	Flee	210	Klein vergiß mein	
Grawer augsteyn		Hauswurz	332	Juden apfel	80	nit	349
	397	hechel	95	Juden dacklin	322	Kletten	340
Griechisch bech	47	heyd	57	Juden kirschen	322	Kloster hyfop	211
Grieff	132	heydelbeer	76	Juncfheren gräfle	303	Knößler	114
Grillen	109	heyden Korn	166			Anobloch	172
Größt wolff milch	368	heyderich	144	A.		Anoblochs frant	260
Gronfel	152	heydnisch lilien	267	Käß lupp	102 180	Kockel Fern	167 373
Groß Baldrian	9	heßfiant beyn	113	Kapperen	185	Köl	150
Groß Bathengel		heyligen Geysts	336	Klapperen rosen	316	Korn rosen	316
	252	heylig Creutz holz		Kanten frant	291	Kraen füß	157 264
Groß epph	235		17	Karten distel	202	Krafft meel	136
Groß fygwarzen		heymichen	109	Kappes frant	150	Krauff balsam	216
frant	335	herbst blüm	330	Kay	106	Krummet beer	50
Groß galgant wur		herbst rosen	148	Kagen Flee	298	Kranck hals	264
gel	3	herz frant	216	Kagen frant	9	Krauffdeiment	215
Groß garben frant	303	herz poley	213	Kagen münz	217	Kressen	174
Groß Haterwurz		heuschreck	112	Kagen sper	206	Kreusbeer	59
	181	himel brot	132	Kagen treublin	209	Kreuzwurz	197
Gröz	166	himel schwertel	2	Kagen wadel	291	Kriechen	84
Gundelrebe	305	hyntperen	304	Kelber kernen	192	Krieff	131
Gün heynrich	149	kirschen	133	Kellers halß	371	Kron englin	368
Grundtheyl	289	kirs brust	167	Kerbel frant	164	Krott	106
Grundt reben	437	kirs horn	114	Kerfel	164	Krotten del	336
	305	kobe steinbrech	375	Kerngert	61	Krotten flachs	353
Guldin gunfel	314	kochleuchten	282	Kessen frant	339	Krotten frant	263
Guldin widertodt		kobe farzen	377	Kesten	71	Kuw aug	278
	351	Kolder	372	Kensch baum	67	Kuw dill	ibid.
		Kolz trauben	382	Kicherzen	138	Kien radt	285
Haber biez	132	Kolz wurm	114	Kicher erbes	138	Kiw weysfen	136
Haber müß	132	Konig	136	Kym	120	Kürbiß	160
Habich frant	232	Konig wasser	386	Kinder bapp	131	Küniglin	102
Habich samen	210	Kündisch frant	179	Kirch hyfop	211	Kuchen schell	188
Hacker frant	188	Küner darm	331	Kirschen	77	Kupffer schlag	398
Hamel Korn	131	Küner föl	219	Kirschbaum	ibid.	Kupfferstein	399
Hamer schlag	399	Küner ferb	331	Kleb frant	249	Kupffer wasser	407
Hammen	112	Kundts hoden	330	Klein Baldrian	9	Kurberbaum	89
Hanff	282	Kundts färbslin	360	Klein basilien	220		21
Han	112			Klein bathengel	353		
Hanbutten	61						







Register:

Saur Klee	259	Spanisch grün	ibid.	Türkisch köm	134	Wegweyß	ibid.
Sau wurg	335	Specklilien	296	Turia	397	Wecher beer	58
Schaffs müle	67	Speyerling	83	V.		Wecholter	50
Schaffthaw	308	Spicant	181	Vebedistel	203	Weyd	193
Schaffrip	388	Spicken narden	7	Veel wurg	200.	Weyd blaue	405
Scharbachs kraut	303	Spiegel hartz	47	Veld saffran	937	Winden	305 68
Scharlach	273	Spieß ampffer	146	Veld kircher galgant	5	Wein beer	382
Scharlach beer	308	Spieß glas	402	Veld moren	238	Wein leglin	60
Scharlach blumen	277	Spinn	115	Veld neglin	255	Wein rauten	163 222
Scharret kraut	264. 277	Spiz kletten	152	Venedische Rosen	279	Wein reben	381
Scheltwurz	191	Spiz münz	516	Venedischer Terpens		Weintraub	182
Schiff bech	46	Spiz wegerich	155	tin	45	Weinrauch	40
Schifer grien	405	Spör biren	83	Verbräue kühlin	342	Weinstock	381
Scheiß kraut	380	Sply spertel	293	Vitriol	407	Weyssen	128
Schiff malter	148	Springende körbs		Ulmer baum	55	Weyssen byer	130
Scheiß milten	380	lin	360	Unck	101	Weyssen korb	129
Schlacken	401	Spring kömer	369	Ungwaschen wolle	119	Weiß agsteyn	57
Scaphoni	369	Stall kraut	260	Unholden kerg	339	Weiß buck	261
Schlaff beerlin	322	Staphis kömer	361	Vorschutz	385	Weiß dipran	279
Schlaff kraut	324	Stechende günnst	362	Vorstos	127	Weiß fleyß blumen	
Schlangen balck	101	Stechede palme	355 71	Vns. frauen berstro	335	Weiß haber	259
Schlehe dorn	204	Steinfarn	181	Vns. frauen hendt	22	Weiß beyderich	132
Schlotten	322	Steinkressen	93	schuch	221	Weiß seynerich	149
Schoßwurz	210	Stein leber kraut	311	Vns. frauwe müntz	216	Weißer senff	165
Schmalz	122	Stendel kraut	270	Vns. frauen trähen	270	Weiß heyderich	146
Schmalz blüm	313	Streck kraut	350	Vogels kraut	331	Weiß hirtz wurg	236
Schmerwurz	294. 376	Stern kraut	345	Vogel leim	248	Weiß lilien	354
Schmurg wullen	119	Stein kraut	351	Vogels nestier	216 238	Weiß nessel	334
Schnecken	98	Stinckend camille	336	Vogels wicken	169	Weiß pfeffer	176
Schwaden	132	Sedz	06	W.		Weiß niesz wurg	557
Schwalb	113	Streich kraut	150	Wachs	127	Weiß steynbrech	375
Schwalben wurg	251	Storck schnabel	264	Wald knobloch	172	Weisse violen	346 268
Schwam	329	Strassburger negle	268	Walhen distel	207	Weiß wald henle	180
Schwarz andorn	235	Strauch	61	Wald lilien	296	Weiß wurg	293
Schwarzbrüst berle		Streich blumen	277	Wald mangolt	297	Welsch beer klaw	105
	243	Streyt	292	Wald mangolt mit		Welsch himper nüss	
Schwarz haber	132	Strobild dorn	203	blaen blümlin	193	lin	86
Schwarz hirtz wurg	240	Süßholz	198	Wald lerb	112	Welsche bonent	168
Schwarz kappen	281	Summer gerst	129	Wald meyster	249	Welscher silb samē	120
Schwarz pfeffer	176	T.		Wald menle	ibid.	Welsch heydel beer	76
Schwarz kömisch	02	Tag vnd nacht	330	Wald reben	292	Welsch kirsē	32
ander	243	Tamarinden	74	Walwurtz	294	Welsch nessel	334
Schwarz wurg	394	Tamariscen	57	Wand leuf kraut	299	Welsch schlotten	323
Schweins brot	373 179	Tamariscen wein	ibi.	Wangen	108	Welscher steynbrech	
Seckel kraut	309	Tauben süß	188	Wangē kraut	256 216		35
Seeb lumen gelb vnd		Tawb korn	307	Wasser bateng	260	Welsch steyn Klee	220
weiß	274	Tawb nessel	334	Wasser eppich	235	Welscher weyssen	129
Seehalden	337	Tawb pfeffer	176	Wasser banen süß	186	Wellstro	339
Seyffen kraut	178	Tausent guldin		Wasser kressen	156	Wermut	209
Senff	172	krant	200	Wasser linsen	331	Wergstein kraut	206
Sesel	226	Tausent schön	312	Wasser merck	235	Wick dorn	61
Seuen baum	51	Terpentin	44	Wasser nüsslin	297	Widerstos	293
Seuen palmen	ibid.	Teschel kraut	309	Wasser pfeffer	177	Wild Calmus	6
Sewbrot	378 179	Thierlin baum	83	Wasser pungen	190	Wilder ölbaum	69
Siben gezezt	259 342	Tiriaks kraut	9	Weber karten	202	Wilder fenchel	218
Sigmars wurg	282	Todten violen	292	Weg distel	200	Wild burck hart	148
Simons wurtzel	ibi.	Tormentil	306	Weg dritt	291	Wild galgant	5
Sonnen wendende wolf		Trauben kraut	262	Weg dorn	297	Wilder hanff	282
mild	368	Treib kömer	369	Weg gras	291	Wilder hasen köl	158
Spangrün	401	Tüncel	130	Weg wart	159	Wilder kerfel	342
						Wild	



Register.					
wild fßl	146	wild mints	216	wild salbey	27
wild fuchslin	360	wild neglin	253	wild senff Kraut	146
wild Eressen	93	wild pasteney	226	wild vnzgepflantztes	
wild moen	316	wilder poley	217	ben	381
wild moeren	164	wilde raut	332	wild wicken	169
wilde mylten	380	wild saffran	379	wilder zitwen	376
				wintergrün	297
				wibel doli	251
				wisel	109
				wisen kumel	228
				wisen wollen	265
				wolffe bon	326

## PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE

MEDICINALI MATERIA LIBRI PRIMI PRAEFATIO, IO-  
anne Ruellio Suesfionensi interprete.



VANQVAM amicissimè Aree, complures non ueterum modò, sed recentiorum quoq; de medicamentorum compositione, uiribus atque probatione commentati sunt: nobis tamen nec uanum, nec à ratione abhorrentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostendere tentabimus: quòd eorum nonnulli absolutum nihil ædiderunt, aliq; quàm plurima, quæ auditu percunctando didicerant, scriptis tradiderunt. Siquidem Bithynus Iolas & Heraclides Tarentinus, omissa prorsus herbarum tractatione, rem sane quàm paucis perstrinxerunt. Neq; uerò omnes illi de metallicis quicquàm rebus aut odoramentis memoriæ prodiderunt. Crateus autem herbarius, & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte uersati uidentur, radices multas apprime uti-  
leis, herbasq; haudquaquam adnotatas, reliquerunt. Verumtamen priscorum subscribe re oportet sententijs: quos, etsi pauca ipsis referantur accepta, magnam tamen impendisse diligentiam constat. Iunioribus minus assentiendum: è quibus Iulius Cassus, & Nicera-  
tus, & Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiadæ omnes, medicinalem materiam uerna-  
culam cognitamq; uulgo, dignam censuerunt quæ ab ipsis literis exactè mandaretur: & medicamentorum uires probatiosq; cursim complexi, sic nullo experimento eorum effe-  
ctus colligentes, inani uerò reddendarum causarum studio uerba fundentes, alia pro alijs  
scriptitando, rem in acruum congeriemq; controuersiarum extulerunt. Siquidem qui in-  
ter eos egregius habetur Niger, euphorbium, nascentis in Italia, chamelææ succum esse cõ-  
tendit: androsæmonq; eandem herbam cum hyperico esse. quinetiam aloën in Iudæa fos-  
silem nasci, & pleraq; his similia exponit, reclamante euidentia, quæ prorsus ueritati re-  
frangantur. Quibus coniectura colligi potest, ea, non oculata fide, sed narratione potius  
ab alijs accepisse. In ordine iidem ipsi aberrarunt, partim eorum discrepantibus nullaq; co-  
gnatione coniunctas uireis collidentes: partim per elementa literarum scripta in ordi-  
nem digerentes, quòd facilius memoriæ mandarentur, genera & eorum effectus à sua cog-  
nitione diiungentes. Nos uerò ab ineunte, ut ita dicam, iuuenta, iugè desiderio cognoscen-  
dæ materiæ allecti, permultis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem ui-  
tam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros contulimus. quod opus tibi dica-  
mus, Aree, animi gratitudine obsequentes, ob eum quonos prosequeris affectum. Etenim  
natura cum in omnis eruditione excultos, tum uerò in eos quibus cum tibi eiusdem artis  
necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles: in nos etiam aliquanto peculiaris.  
Enimuero non paruum præbet tuæ probitatis argumentum, optimi uiri Licinii Bassi sin-  
gularis erga te amicitia: quam unà nobiscum degentes nouimus, cum mutuam inter uos be-  
neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te uelim, eosq; qui in  
hocce commentarios incidunt, ne in uerbis facultatem nostram æstimeris, sed potius adhi-  
bitam rebus cum periticia curam. Etenim plurima uisu ipsi exactissimè cognouimus: qua-  
dam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, historia, percunctationeq; rerum apud sin-  
gulos uernaculorum diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, ut differenti ab alijs  
ordine tradito, genera medicinarum uiresq; describantur. Quòd autem necessaria sit me-  
dicamentorum ratio, nemo est fermè qui ignoret. quòd ea & toti coniuncta sit, uniuersisq;  
cuis



P R A E F A T I O.

eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones atq; misturas, & facta in morbis pericula extendi, & incrementum capessere potest, quam plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam uernaculam familiaremq; materiam complectemur, ut perfecta sit quæ à nobis relinquetur doctrina. Verum imprimis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recodantur. certè pro horum ratione aut ualent uiribus, aut euahido nulloq; munere funguntur. Serena igitur cœli constitutione demetenda sunt. Magni siquidē refert inter colligendum, si uel squalores uel imbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeunt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia: in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerumque degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si non suo tempore nec oportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neq; ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria ui, hyeme florent & folia pariunt: quædam bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus, adesse. Nam qui pullulanti herba duntaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest. neq; qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quo fit, ut propter mutuatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia, gramen, quinaque folium, & tussilaginem emittere florem, fructum & caulem, negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosa sunt, si cutitice chas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. flores quoq; antea, quam sponte sua decendant: fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est: & semina, ubi siccare cœperint, priusquam defluant. Herbarum succus & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticesue ut recondantur, eximere conuenit cum herbe suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debent. Flores & omnia qua iucundum odorem efflant, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argentea, uitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim è buxo: sed ænea uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibusijs quæ a ceto, piceliquida, aut cedria componuntur. Adipem autem & medullas stagneis uasis recondi conuenit,



# PEDANII DIOSCO-

RIDIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA-

TERIA LIBER PRIMVS, IOANNE RVELLIO SVESSEIONENSI IN-  
terprete. Singulis styrgium historijs, uiuis & ad naturæ æmulationem expressis  
imaginibus seu picturis adiectis: ut ea quæ nudis uerbis exponit historia,  
rectius exprimeret, atq; adeò altius animo infigeret artificiosa pictura.

Additis etiam annotationibus breuissimis quidem, quæ tamen  
omnem controuersiam de medicinali materia faciliè tol-  
lunt. Ex doctissimorum uiroꝝ lucubrationibus  
summo studio concinnatæ.

IRIS.

CAPVT I.

Iris Florentina.

Iris Germanica.



**I**RIS à cœlestis arcus similitudine nomen accepit. Folia fert gladio-  
li, sed maiora, latiora, & pinguiora. \*Flores à caule æqualibus inter  
se spacijs distant uarij: siquidem candidi, pallentes, lutei, purpurei, Flores altera  
aut cœrulei conspiciuntur. qua diuersi coloris specie, quædam cœle-  
stis arcus imago representari uidetur. Radices subiacent genicula-  
tæ, duræ, odoratæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & traiectæ lino res-  
conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica: & inter has latissima, quæ pumila  
flexi.

A



## DIOSCORIDIS

\* alijs fernido

ferè & densa cōstat radice, frangenti contumax, subrufo colore, gustu amaro\*, odore perquàm sincero, ita ut nullum prorsus situm redoleat. quæ dum tunditur, sternutamenta mouet. Secundum locū habet Africana, candida, gustuq; amara. Teredines in uetustate sentiunt, tunc tamē odoratiores reddi solent. Vis om̃ibus excafactoria, extenuans, contra tussim efficax. humorum qui agrè reijciuntur crassitiem digerunt. bilem crassamq; pituitam ex hydromelite drachmis septem epotæ purgant. somnum conciliant. lachrymas ciunt. torminibus medentur. Eodem potæ ex aceto auxiliantur serpentium ictibus, lienosis, conuulsis, perfrictio- nibus, horroribus, & qbus genitura effluit. menses ex uino potæ pellunt. Deco- ctum earū, scēminarum fotibus utiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxan- daq; in eis uenarum spiracula. ischiadicis infunditur. fistulas acinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ, partus extrahunt. quin etiam coctæ & il- litæ, strumas, ueteresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; ulcera replent, & cum mel- le purgant. nudata ossa corpore operiunt. doloribus capitis, cum aceto et rosaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cum albo ueratro & duabus mellis partibus, lentigines & uitia cutis in facie à sole contracta emaculat. pessis, malagmatis, & acopis inseruntur. In uniuersum, magni ad omnia usus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

ΙΡΙΣ Græcis. Latinis Iris. Germanis himelschwertel & Violwurtz. Gallis des flambe, à folio- rum similitudine, quæ flamma linguas referunt, dicta. Quinetiam nonnulli gladiolum appellauere ead- dem ratione: unde in quibusdam Galliæ partibus nomen adhuc retinet: uocant enim du glaiz. Officinis proprium nomen retinuit.

Galen. lib. 1. Iridis radix laudatior parua, densa, frangi contumax, subruffa, amara, sternutamenta dum tundi-  
Antidotorū. tur ciens, odorata qualis ex illiride mediterranea Dioscoridi, Galeno, ceteris omnibus prædicatur: ob id eam illiridem uocare consuevit Andromachus. Elige autem in illiricæ genere odoratiorem: nam Gal. lib. 6. et unumquodq; est præstantissimum, quod generis sui odorem habet ualentissimum. Iris autem quæ ex 9. cap. ph. p. Libya magna Romam affertur, tantum ab illirica differt quantum corpus mortuum à uiuo. Quæ au- Gal. lib. 1. an tem in alijs regionibus crescit, non ita multum deficit: unde Iris Gallica alba purgat a usurpatur lib. 3. tidotorum. comp. phar. part. & hodie passim pro illirica, Florentina nobis obtruditur.  
Lib. 9. cap. Iris coquit, tenuat, calfacit, pituitam crassam & bilem purgat, humorem ex pulmone crassum ph. p. expectorat.

## Acorum.

## Caput II.

**A**corum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non dissimiles, com- plicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geni- culis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratis. Optimum est den- sum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Radici uis calfactoria. Decoctum potu uri- nam cit. prodest lateris doloribus, & iccinoris atq; thoracis: item torminibus, uul- sis, ruptis. lienem absument. urinæ stillicidio & serpentum ictibus auxiliatur, insi- dentibus ad muliebres affectus iridis modo utiliter imponitur. oculorum caligi- nes succo discutit. antidotis radix magno usu commiscetur.


### NOMINA ET EXPLICATIO.

ΑΚΟΡΟΝ & Aphrodisiam Græci uocant. Aphrodisiam uerò à Venere, quam Αφροδιττω uo- cant, & hos Latini etiam imitati Veneream appellauerunt, & radicem nauticam eò quod plurimum secus amnes & in aquosis natales suos habeat, licet etiam in alijs locis nascatur: sed prima habetur, suntq; in prima bonitatis æstimatione acori radices, quæ in aquosis nascuntur, auctore Plinio lib. 25.  
Acorus gustu acris, & modicè amaro, odore iucundo, tenui consistencia, calidus, siccus ordine ter- tio. Is nunc esse uidetur quibusdam Calamus aromaticus, alijs potius Galanga. Quibus repugnât Actuarius



Acorum.

Acorum quo hodie Officina falso utuntur.  
Germanis Ackerwurtzel. Geel schwer-  
tel. Drachen wurzel. Geel  
wasser lilien.



Actuarius in antidoto aurea Alexandri, in qua  $\gamma\alpha\lambda\alpha\nu\gamma\epsilon\epsilon\pi$  (sic enim cum Arabibus uocat) & mul-  
tis interiectis, acorum, eodem pondere ad finem uero calamum aromaticum diuerso ponde-  
re misceri scribit.

Acorus omnino uerus magnitudine ireos, Galanga maior hodie Officinis. Gallis Galange grösse,  
ou grande Galange, Germanis Groß Galgant Wurtzel dictus. Ignotus tamen quibus ad-  
huc est, eius loco galangam minorem magno successu miscuerint, interdum calamum odor-  
raturum. Qui uero nobis frequens ostenditur, palustris acorus est, & aliqua saltem  
acori species, insipidus, inodorus, substantia crassa, frigidus, siccus, à xiri  
planta aceri diuersissimus: quadripartito tamen sectus, & sole siccatus,  
triennio seruatur: non utendus hic, nisi medicus imperauerit. Ves-  
ti autem prouentus nunc uberrimus, ubique conuehitur ex  
India, Lusitanorum (ut audio) nauigationibus.



Meum.

Caput III.

\*Alij aniso.



Gall. i. anti.

Gale. lib. 9. c.  
p. d. p. & lib.  
7. simp.

Cyperus.



**M**eon, quod Athamanticum uocant, in Macedonia & Hispania plurimū gignitur, anetho\* folijs & caule simile, sed eo crassius binum fermē cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, lōgis, tenuibus, odoratis, linguā ex calfacientibus. Quæ feruefactæ ex aqua, uel tritæ citra coctionem, præcluserum renum uesicæq; fardæ uitia potu leniunt, urinæ difficultati medentur, stomachi inflationes discutunt. Torminibus, affectæ uulvæ, articulorum doloribus, atque fluxionibus pectoris, tritæ cum melle in eclegmate auxiliantur. sanguinem per menstrua pellunt, defensionibus feruefactæ. infantibus autem illitæ imo uentri, urinas mouent. quod si plus quàm debeat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μεον ἀθαμαντικόν.

Meu seu Meon Latinis.

Officinis anethum siluestre hodie uocant.

Germanis Eberwurç.

Gallis uulgo feniculus tortuosus dicitur. apud Allobroges montanos, Cûrach.

MEUM nobis frequens, Dioscoridis picturam explet, tamen præstantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athamanticum laudat Andromachus minor in sua Theriace.

Calidum est ordine tertio, sic cum secundo, urinas & menses mouet, ut asarum, sed largo usu cephalalgicum est.

Marcellus Vergilius Florentinus hic perperam & falso legit tum apud Plinium tum apud Dioscoridem: caule folijsq; aniso similibus: cum hæc herba quam hic meon ille meu uocat, caule & folijs anetho similis sit. Et sic etiam meon interpretantur medici recentiores, dicentes id esse agreste anethum.

Cyperus. Cap. III.

**C**yperus, quem aliqui erysisceptrum, ut Cypalathum appellant, folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem aut maiorem, angulosum, in cuius acumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est usus, cohærentes inter se, oleis oblongis similes, aut rotundæ, nigro colore, suauī odore, amaro gustu. In lacunosis, palustribus & cultis enascitur.

Optima



# LIBER PRIMVS.

Optima est grauissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quada acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Huic calida uis inest. Venarum spiracula laxat, urinam ciet, ad calculos, a quamq; subter cutem utilissimè bibitur, aduersus scorpionum ictus remedio est. perfrictionibus uulvæ, & præclusionibus, fotu prodest pellit menses. Contra ulcera oris, etiam si depascent uorentq; farina eius efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguentorum spissamentis bene adijci solet. Aliud cyperi genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci uim reddit, gustu amaro sentitur, & illitum præsentem pfilothri uim exhibet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

GRÆCIS κύπερος ἢ κύπερος ἢ δὲ ἐρυσισκηνόρος.  
Cyperus & Cypirus Latinis dicitur.

Officinæ Latinum nomen adhuc retinent.

Germani uocāt Wilde galgen. Veldkircher Galgant, ubi magna copia provenit, etiā locis incultis. Gallis sonchet & galange sauvage.

Erysiceptri nomen etiam peculiare & commune est aspalato & uerbenacæ, à calathis & uirgis. Nam Græci ἐρυσὶ καλῶν uocant, & sportam, σκῆπτρον uerò sceptrum & uirgam. Sicq; dicta sunt, eo quod caules & uirgæ ipsorum uirides lentore suo in calathos, sportas, tegetes, & id genus alia texi, & in nexu circumagi possint.

Cyperis seu radix cyperi calefacit, siccit sine morfu, substringit, incidit, ulcera præhumida cicatrice claudit, calculos frangit, urinam & menses mouet, oris halitum commendat, ut lignum aloës uerum.

Cyperus Indicus inter zingbris radices inuentus, Curcuma Venetijs, in Gallia uulgo terra meri, Galen. libr. 1. comp. ph. p. ta dicitur.

Curcuma.



Ad odoris gratiam cypirus additur tenuantibus capillos. A figura caulis, iuncus triangularis Plinio: quæ dratus Celso. licet rarò hic quadrangulus: angulosus Dioscoridi, non definito angulorum numero.

Cyperus Babilonicus galanga quibusdam dicitur, uulgaris scilicet ac minor, nam maior acorus esse dicta prius est. Est autem Astuario, Barbaros in multis imitato, radix subrubra, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo linguam admodum uellicante, calida, sicciter tio gradu, odore & figura quadam cyperi. Coctionem iuuat, flatu dissipat, oris halitum commendat, uenerem excitat etiam ore retenta, cerebrum roborat naribus indita, cordis palpitatiōi prodest. Germanis Galgant wurzel. Gallis galange dicitur.

Cyperus Babilonicus.



Scrapio.

## Cardamomum.

## Caput V.

Cardamomum optimum est quod ex Comagene, Armenia, Bosphoroq; deuchitur. In India quoq; & Arabia provenit. Eligi debet plenum, frangenti cōtumax, occlusum, farctumq; quod enim huiusmodi non est, exoletū iudicatur.



## DIOSCORIDIS

Cardamomum.



& gustu acre, subamarum, & odore caput tentans. Excalfactoriam uim habet, potumq; ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tusses, nervorum resolutionem: item ad rupta, uulsa, tormina, latus uentris tineas excutit. Ex uino autem potum, renibus, difficultati urinæ, à scorpione ictis, neque non omnibus uenenum uibrantibus, auxilio est. Cum cortice radice lauri epota drachma calculos comminuit, partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitum adimit. Et ad unguentorum spissamenta additur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis καρδάμωμον. Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Germanicè Cardamomlin, Cardamomum maius, minus uerò Paris & Berner nuncupant, quemadmodum & officinæ distinguere solent.

Galli mellegette, grains de paradis. Cardamomum minus, maius uerò Latino nomine & officinis usitato nominant.

Iacobus Siluius nostra tempestate doctissimus medicus contendit Cardamomum Serapionis utrumque tam maius, quod Granum paradisi & mellegetam uocatum putant plerique, quam minus, nihil habere commune cum uero, id est Dioscoridis & Galeni Cardamomo. Sed Valerius Cordus, eximie eruditiois iuuenis, paternis uestigijs insistens incredibili restauradæ medicinæ studio amoreq; flagrans, cōtrariū asserit, scilicet nos utrū cardamomū hodie nō desiderare, cum Dioscorides fructū frangenti

contumacem non semen intellexerit. Habet enim semē quasi in capsulis, unde Græcis capsicon nuncupatur. Vnde apud Galenum legitur: καρδάμωμον ὅθεν τῆς γαστρὸς, non quod ab internis purgatum est, & interiore sua parte euacuatur, albo uidelicet eiecto, sed cui exterior cortex capsulæ deitatus est, durus & frangenti contumax.

Cardamomum nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & antid. & in theriac ad Pisonem.

Manardus Ferrariensis inter tria Cardamomi genera solam amaritudinem desiderat.

Nardum.



## Nardum. Cap. VI.

Vo nardi genera: unum Indicum, alterum Syriacum appellatur, non quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largam gerens comam, flauum colore, perquam odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore linguam siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autem nardum quoddam Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente, quod genus ob multum loci,



# LIBER PRIMVS.

tam loci, in quo prodit, uliginem, uiribus infirmius est, atq; procerius adolescit, plures ferens spicas ab unica radice comosas, unaq; conuolutas, ac grauiter oleres. Montanum autē odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero uicino. ceteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen loci indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorū uirus supra modum redolente, quod improbat. Madefactū uendi solet, quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, & squalida, nulloq; puluere obsita. Adulteratur stibio cum aqua aut palmeo uino, in spissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si lutum radicibus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Vim habent ex calfactoriam & exiccantem. Vrinam mouent: aluum potu sistunt, uulua profluua, sanientq; apposita supprimunt. Nausea ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi rofionibus, inflationi, iecinori, regio morbo, renum uitij. Aquę autem in coctæ foru ad infessum, uulua inflammationibus medentur. ad glabras oculorum genas ualent: si quidem eas ad densiorem pilum reducant. perfusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis, & in fistili non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum uino in pastillos coacta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nāpōl & Gracē. Spica nardi, & nardus Latine nominatur. Officinæ Latino nomine uocant. Germanis Edel frembd woltriehende spicken nardi, Latino serē nomine. Gallicē aspic doultre mer. Nardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secundo: astringit, subacris, & leuiter amara, ico Gale, lib. 8. simpl. cur et stomachū roborat, sumpta et admoda, urinā ciēt, fluxiones intestinorū, capitis, thoracis siccat. Nardus igitur est mista substantiæ et facultatis tū digerentis, tū repellentis, & roborantis. Nardus L. 6. & 8. c. ph. p. præterea uim habet non exigua coquendi omnes frigidas dispositiones. Ea est multiplex, præstantis ph. p.

Nardum Celticum, sima est Indica, secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos moneta ex Cilicia, & nardina herba potius quàm nardus uocatur. Radix nardi indica, & apud nos montana modicè astringit. Nardus indica L. 9. c. ph. p. quanquàm radix est, tamen etiam vāpōlou & xys, seu cum Actuario & L. 6. c. ph. p. Hera, lib. 6. compo. pharm. part. in diabesosa vāpōlou & xys, id est spica nardi, a similitudine formæ cum spica. Tamen Philo in sua antidoto Creticam nardum, uel ut alij eius ænigma interpretantur, Indicam, radicis falsi sonomine dici autumat, quoniam spica nardi nuncupatur. Nardus etiam L. 9. c. ph. p. Syriaca usurpatur in arteriace. 12. Andro. sed imbecillior est q̃ Indica. Gale. libr. 7: phar. p. Fugienda nardus quæ ἐκ λυτ & id est, elota dicitur, & eligenda Lib. 1. Anti. quæ quæpæc lingua Barbarorum dicitur.

Spica uulgaris, odoris & saporis gratiam illam non habet, imò intercoquendum odoris est grauissimi, & agros ledit: estq; uerius pseudonardus, quàm uera nardus. I. Syl.

## Nardum Celticum. Caput VII.

Celticum nardum nascitur in Liguria Alpibus, salicunca patrio nomine appellatum, prouenitque in Istria. Exiguè frutificat, & cum radicibus in manuales fasciculos cōponitur. Folia habet oblonga, colore in flauū languido, florem luteum. Cauliculorum & radicum durat us us est, & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra pauito solo atque humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. siquidem utile, cum aceroso alienoque propter humoris uim non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanque herba candidior est, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neque odorata, uti uerum nardum est. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti discernuntur, uino





## D I O S C O R I D I S

exciuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, afferuari debent. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerosa coherēs, plenum, nec fragile. Ad eadem quę Syria cum pollet: sed uehementius urinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iecinoris, & felle suffusus auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: itē aduersus lienem, renum & uesicę uitia, & uenenatos ictus, ex uino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia unguenta.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis κελτικὸν νάρδον.

Latinis, qui græcam appellationem imitantur, celticum nardum. Officinis Spica celtica, & nardum Gallicum.

Germanis Marien magdalenen blümlin.

Gallis patrio nomine, ut Dioscor. destradit, Saliunca nominatur.

Gal. lib. cōp. Nardi Gallicę cum radicibus & terra circumdata fasciculum unum cum alijs ad columellas laxas  
ph. tas adhibet Archigenes: astringit enim & digerit nardus Gallica, ambo mediocriter. Nardi Celticę  
lib. 6. c. ph. flores usurpantur apud Galenum in tertio Andromachi medicamento. Nardus autem Gallica seu Ga-  
lib. idem. latica, seu Celtica dicitur: nam gentem eandem Gallos, Galatas, & familiarius Celtas appellant.  
lib. 1. antid. In Ligurię Alpibus ea nascitur Dioscoridi. Radice igitur utilior apparet ex initio lib. 8. simpl. spica  
tamen non inutilis. Laudatur enim recens, leuis, larga coma, spica breui, flaua, odoratissima, cyperum  
redolente, diuq; in sua odoris gratia permanens, amara, linguam mordens.

### Montanum Nardum. Caput VIII.

**M**ontanum nardum, quod ab aliquibus thylacitis & niris appellatur, in Cilicia & Syria nascitur, furculo & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamen spinosis asperisq;. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulę regię, sed longè gracilioribus, & longè minoribus. Neq; caulem, neque fructum, neq; florem profert. Ad eadem ad quę Celticum efficax.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὄρνις νάρδον.

Latinis montanum nardum dicitur.

Hodie hoc omnino caremus.

### Asarum.

### Caput IX.

**A**sarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardum appellant, hedera folijs, minoribus\* multò, rotundioribusq;, floribus cytini, hyoscyami, purpureis. inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis, in quibus semen acinosum. \*Cauliculos habet angulosos, asperos & molles, radices numerosas, geniculas, tenues, obliquas, gramine non dissimiles, longè tamen graciliores, odoratas, ex calfacientes, & quę linguam uehementer mordent. Ex calfactoriam uim habet. urinam cit. hydropicis & uetusto coxendicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua multipota, menses trahunt, & ueratri albi modo purgāt. sin unguenta additur. Umbrosis montibus prouenit, sed plurimum in Ponto, Phrygia, Illirico, & Italię Iustinienfi\* agro.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

ΑΣΑΡΟΝ Græcis. Asarum Latinis.

Officinę genuinum nomen retinuerunt.

Germanis



\* Alij densioribus.

\* abundat hæc clausula.

\* Iustinienfi, uidetur abundare, cū hic autor longè ante Iustinū Cæs. scripserit.



LIBER PRIMVS:

Serm. hasel wurz. Gallis du cabaret appellatur. syllabarū methatesi. Bachar enim uocabāt olim. Asarum ualeat folijs, flore, semine, sed efficacissimū ē si radice, ellebori albi modo purgatoria, Diosc. Iac. Syl. Galenus tamen in hierapicra etiam asarum recipiente solam aloē purgatoriam uim habere scribit, asarum uerō humores malos ad urinas deducere, uires habere radices acori, sed ualentiores. Fodienda est cū folia mittere incipit, et in sole sicanda (nisi recens utenda sit) quia in umbra si- Gal. lib. 8. comp. ph. p. et lib. 6. simp. eum celeriter trahit et senescit, præcipuē ex locis riguis: ex macris autem et sitientibus (quæ impri- mis amat) minus est putredini obnoxia.

Phu.

Caput

X.

Valeriana.



**P**HU, quod & aliqui syluestre nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olu-  
fatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpurā  
uergente, geniculis inter cepto, florib. nar cisso proximis, maioribus\*, teneris, &  
ex albicāte purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinē, ex obliquo  
uilloso in nigri ueratri aut iunci odorati modū: capillamentis inuicē cōtextis, fla-  
uescentibus, odoratis, cū quadā odoris grauitate nardū æmulātibus. Excalfa cit,  
urinā mouet, si sicca potui def. Decoctū eadem præstare potest, ad lateris etiā dolo-  
rē efficax. mēses cit. antidotis inserit. Adultera radice rusci ammixta: sed malefi-  
ciū deprehēdit: quoniā hæc dura est, & frāgenti cōtumax, sine ulla odoris gratia.

Græci φού, Latini Phu, & Nardum syluestrem uocant. Officina illius loco Valeriana utuntur.  
Germani Wild Calmus / Groß Baldrian / & Tircacs Kraut appellant. Valerianam autem  
Kagenkraut / Klein Deßmarck, & Klein Baldrian.

PHV Dioscoridis, & caterorū Græcorū, nostra Valeriana quā Germani ut diximus Deßmarck  
& Baldrian appellant, plurimū exprimit, nisi florū qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desidero-  
tur, quare aliā herbā, priorē scilicet, quā Galli simul & Germani maiorem Valerianam nominant ue-  
rum esse Dioscoridis Phu, nemo sane mentis negabit, cū descriptioni per omnia respondeat. Ma-



## Malabathrum. Caput XI.

Folium Indi, quo hodie utitur officina,  
Mauritanis Tembulum appellatum.



**M**alabathrum arbitrantur aliqui esse Indici nardifoliū, falsi quadam odoris cognatione, permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, neris, secus autē res se habet. Nanq; malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignūt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transuitur, & siccatum recōditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi nō euenerit, ne amplius quidē renasci. Laudatur recens, ex cādidō nigricās, integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in suaui odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo falsi gustu. Infirmum uerō & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uisiosum est. Eadem nardo fortitur uires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam uehementius ciet ac stomacho magis prodest malabathri uis. Lippitudinibus inflammationibusq; tritum & in uino feruefactum commodē illinitur, subditum linguæ, oris halitum & suauitatem commendat. Vestium quoq; odorem interpositū seruat, & ab erosionē tuetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Φύλλον Ἰνδικόν, καὶ φύλλον μαλαβάθρου, & simpliciter φύλλον Græce.

Latinus folium indum, & folium Malabathri.

Officina amissa & deperdita re nomen genuinum retinuerunt, Germanis negel bletter.

Galli Latinum nomen quemadmodum & Germani uerbum uerbo reddentes, feulet de inde, & feulet de Malabathre appellant.

Malabathrum sui generis folium, Indicæ nardo, ut odore & sapore, sic uiribus simillimum, sed nardo efficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, conumax frangi, integrum, odore uergeto nares feriente, & qui folio semoto persistat. Id nunc desijt, à quo tamen unguemum foliatum diuitibus Romanis mulieribus frequens, eū dictum. Desijt & folium Syriacæ arboris Plinio celebratum. In horum locum Mauri muererum folium laurino proximum, sed maius, & neruis tribus folium intercurfantebus distinctum, odore iucundo. Prīmū illud folium indum dicitur Serapioni: tamē Aſuarius in hedichroo magnate. φύλλον Ἰνδικόν, & φύλλον μαλαβάθρου ceu diuersa miscet: φύλλον ab his diuersissimū Dioscoridi describitur, uulgo italis folium syluestre dictum. Hermol.

## Casia.

## Caput XII.

\*al. asyphes-  
mum.

**C**asia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiā gignitur, crassif corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est fuluescēs, pulchri coloris, corallij amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gustu mordens, et cum aliquanto feruore adstringēs, aromatica, uinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis achy appellatur, ab Alexādrīæ negociatoribus daphnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina usus. Secundum locum tenet antedicta. Tertia, cui Muselatico blasio, id est, germi cognoen est. Reliquæ uiles, & quæ aphemum\* dicitur, nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca & citto uocatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocasia, quam ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis, surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, urinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi.



gendi. Conuenit ad medicamenta oculorum, quæ præstandæ claritatis gratia cōcinnantur, & ad malagmata. Lentigines tollit cū melle illita, menses trahit, cōtra uiperarum ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflammationes omneis, & renum uitia, pota proficit. Fœminis in folio defidentibus, aut suffimētis, prodest ad dilatationē uulvæ. Ea duplo pondere medicamētis mixta, cinamomi uicē supplet, si ipsum defuit: nam eosdem effectus præbet, ad plurima perquam utilis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Κασία Græcè.

Cassia lignea & aromatica Latine (est autem nostra canella) Officina nomē legitimū retinuerūt.

Cassia uerò genere proxima cinamomo est quā ipsa nōnunquam ex emulacione euadit cinamomū, ut totum quidem ueluti exacta arbor, Cassia uideatur: surculi autem in ea quidem cinamomi, ramis cassiæ proximi reperiuntur. Optima cassia in cinamomum degenerat. Vidit enim sepe Galenus cassiæ sublimis & ramosæ ac fruticis æmulæ in magnitudine surculos cinamomi surculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis cinamomi notis in odore & gustu deprehensis.

Cassia sepe imponit, nisi sis in diiudicando expertus: pseudocassia enim ueræ est persimilis, sed odore minus est grato, & corticē medullæ adherentem habet. Optima autem laudatissimaq; est Κασία ποδὶ Ζουζου, διὸ Ζουζου, id est, rufa, rosam expirans, & uinum olens, gustum dulcem præferens, fistulosa, & aromatatum modo uehementer odora. Cassiæ cortex Actuarius etiam dicitur σὺν γὰρ τῆς Κασίας idem, Cassia Aegyptia idem, in asyneritico Cassia cathartica, id est purgatrix quibusdam dicitur. ἡ σὺν γὰρ τῆς Κασίας, lib. 1. Antidotorum in compositione theriaces. Cassia σὺν γὰρ, id est, fistula, & Κασία, id est, rufa dicitur in arteriacis Andromachi: τὸ γὰρ uero bis lib. 6. eiusdem. μελαίνωα autem in fine lib. 7. bis, & lib. 8. eiusdem. ποδὶ Ζουζου demq; id est, rosam spirans, lib. 8. Εὐλοκάσια eadem Actuarius, & Arabum alumnis cassia lignea, Cassiam fistulam cum Andromacho minore ad Galeni atatem omnes theriacæ miscbant: hæc autem omnibus nota est, & comparatu facillima. Corticem uerò exteriorem (quem & fistulam dicunt) odoratu & gustatu ualentem habet: quod autem intus est, maxime imbecillum, ob id inutile. Aduersus putria, deleteria, uenena, proxima post cinamomum cassia, quæ optima est, atq; illi cognata ualeat: aromataq; cætera, nardus, iūcus odoratus, calamus, aspalathus, myrrha, crocus, eandem habent facultatem: sed Cinamomum digerit, Cassia uerò & malabathri foliū, & amomum astrictionem participant, Cassia, crocus, costus, amomus, nardus astringūt quidem, sed magis digerunt, præsertim costus.

Lib. 1. antid.

Gal in theria

cæ ad Pisonē.

Lib. 4. et 7.

c. ph. p. lœa

στία δὲ ἀσπ

τῆς.

Lib. 9. c. ph.

p.

Lib. 1. antid.

Lib. 3. c. ph.

p.

Lib. 4. c. ph.

p.

## Cinamomum

## Caput XIII.

Cinamomi genera plura, patriū sibi nomen uendi cantia. Præfertur tamē Mosyliticum, quod cassiæ, cui Mosyliti, nomen est, aliquam cōferat effigiem. Sed in eo genere recens, nigrum, ex uiuoso in cinereum uergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perquam iucundè olens. Optimi ferè indicii, iucundi odoris proprietate cōstat. Inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, (\*odor rutæ aut cardamomo proximus). Insuper acre, mordēs, & cū calfactione quadantenus falsum, quod non citò confricanti asperum, aut frianti lanuginosum, leuibus tamen internodijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice surculum, facilis est huiusmodi probatio namq; fragmenta miscellanea quædam esse uidentur. Quæ autem melius spirant, suo halitu cum nares primum consuluntur, olfactum ex plentia, deterioris dignotionem impediunt. Est etiam num montanum, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mosylitico, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentib. geniculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ cassiam planè repræsentat. Quintū genus, odore nares feriens, subrufum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangenti firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis quæ thuris, cassiæ, myrti, aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum: at læue, & lignosum circa radicē, ut inutile, rei citò. Est etiam nū simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, uile, inualidi odoris, solutarumq; uirium. Vocatur etiā Zingiber, cū tamen sit xylo cinnamomū, præbens quandā cinnamomi faciē. Est autē lignosum cinna

\* Additum uideatur Galeno.



\* Alij parua, cinnamomū, sarmenta longa\* robustaq; ferens, odore lōgē cinamomo inferiore. Sunt qui xylo cinnamomū, à cinamomo genere differre dicant, quòd à natura eius abhorreat. Cinamomū omne exalfacit, emollit, & cōcoquit, urinā ciet, tā mēses quā partus portū aut ex myrrha impositū pellit, cōtra bestias quā uirus eia culātur, uenenaq; conuenit. caliginē pupillis oculorū obuersantē discutit, crassitiem extenuat. Ictigines & uitia cutis in facie ex melle illitū detergit. cōtra tusses, defluxiones, aquam subtercutem fusam, renum uitia, & urinā difficultatem efficax est. unguentis preciosis inferi solet. & in summa, magni ad omnia usus. Tritum uino excipitur, umbraq; ficcum, quò diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinnamomum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant, perquā densum atq; crasso sarmento, longē tamen inualidius cinamomo, & odore & gustu.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## KINNAMOMON Græcis.

Cinamomum Latinis & officinis (est autem uera Græcorum Casia)

Germanice Zimenterlin. Gallice de la Canelle, appellatur.

Ludouicus

Cinamomum arbor lauro folijs & baccis similis, & eius ramorum, non trunci, tertio quoque anno Romanus Pa delibratorum cortex.

tricius.

Cinamomum calidum tertio ordine, siccatur autem & digerit super omnia æquē calida, propter Gal 7. simp. summam essentia partium tenuitatem: propter hæc dispositionibus scirrhoris mederi solet. Idem cum Lib 6 c. ph. As corrigat putidas & uenenatas uires ichorum, & humorum, & leibaliū pharmacorum, & ueneni uirulentarum bestiarum. Idem sua facilitate alteratrice & digerente, & odoris gratia, præstidum est non paruum aduersus omnes prauas dispositiones, et casia, & pleraq; alia aromatum materia.

L. 7. c. ph. p.

Cinamomum quia tenuissimum est partium, uenericuli meatus aperit, quia humores crassi & len

Li. 8. c. ph. p.

ti inhaeserunt, tenuat & terget, ob id commode hyere miscetur. Cinamoni autem facultas qualis initio adest, integra seruari nequit ad annos triginta, multo minus ad centum, uel etiā ducentos, ut quibusdā uisum est, Cinamomū senij expertus putantibus. Nā id seruatum uasculis ligneis ab Imperatoribus uarijs, Traiano, Hadriano, Antonino, Commodo, Seuero, imbecillius tanto est expertius Galenus Seucro theriacen componens, quanto uetustius: contra tanto ualentius, quanto recentius. Nam Seucro Imperatori theriacam parare iussus, qualem Antonino Imperatori parauerat, coactus Cinamomum capere ex Traiani & Hadriani temporibus relictum, cum nondum triginta anni præterissent, multo inualidius expertus est. Arborem enim totam primi generis cinamomi ex Barbaria in scrinio cubitos quatuor & semissem longo ad Antoninum allatam uidit Romæ Galenus, ex eaq; theriacen paratam alijs longē præstantiorē expertus est, ut ea etiam ante duos menses Antonino uti licuerit, non expectata medicamenti coctione.

Gal. li. 1. ant.

Cinamomum optimum, ijs qui id crebro uiderunt omnium facillimē dignoscitur: & cum principum cinamomorū sex sine differentia generales, optimi tamen supra deterrimum insignis est excessus, ut in Casijs, quarum tamen optima parum à prauissimo Cinamomo abest. Id autem Cinamomum est odoratissimum, ac indicibilem quandam odoris gratiam super alia omnia refert, gustatu admodum calidum est, non tamen adeo, ut molestē rodat: color illi est lacteus, cū phlegmā, id est, glutino et cū cyaneo mistus.

Gal. li. 5. ph.

Cinamomum quanto Casia sit præstantius, docet Galenus lib. 5. comp. ph. part. in dentifricio: quod

Lib. 1. antid.

si odorum facere uis, misce casie aut amoni drachmas duas: si regi paras, Cinamomi drachmam unam, ubi non solum casie pondus duplat, sed etiam mediocribus dicat Cinamomum regibus. Ob id penuria Cinamomi duplum casie miscendum omnes propemodum ueteres scripserunt, uti quod pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo absente ferant duo imbecilli. Quintus autem penuria Cinamomi multum, uti duplem, carpesij miscebat. Cinamomo miscet casiam duplicatam Actu. in pastillo ad ileosos. Pseudocinamomum uero est simile, ob id facile nobis imponit, sed gustu & odore longē est inferius. Xilocinamomum lignosum est, ualida habet uirgulta, nec similem habet suaueolentiam. Cinamomum omnium præstantissimum est cineritium colore, uirgultis gracilibus, non dis frequentibus, odoratum uehementer: idq; odore longē optimo & suauissimo, gustu acri, & admodum mordaci, & quod mansum, πικρὸν, id est, rutam olere uideatur, læue, confringi facile: Addit ibidem uerū cinamomi genera aliquot. Vero igitur Cinamomo nos caremus, nostra autem canella, quā uulgo Zimenterlin, & officina Cinamomum appellant, aut Casia est, aut pseudocinamomi species.

λεπτοκιννάμωμον Ἀστυνario pro optimo usurpatur.

Amomum




## Amomum.

## Caput XIII.

**A**momum exigue fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modum, flore ceu candida uiole, paruo. folijs uitis albae similibus. Laudatur quamaxime Armeniacum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmius esse constat. Est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uero subrufum, paruū, fragile, racemōsum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, candidum uel subrubrū, quod nec astrictum cohaereat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur, seminis plenti, uuis paruis simile, graue odoratum, modò cariem non contraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante Vim habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illiū frōnti, doloris sensum aufert, inflammationes & meliceridas concoquit, discutitq; iuuat quos scorpius percussit, ex ocimo illitum, & podagricis confert,

Rosa Hierichuntis.



inflammationes oculorum uiscerumq; lenit ex uia passa. ad uuluarum uitia in pessis, aut in fessionibus utile est, decoctum iecinori, renibus podagræ, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & preciosissimis unguentis. Adulteratur herba amomo simili, quæ amomis uocatur, sed sine odore, sine fructu, nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab una radice integros surculos emittunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amomum uia sepe Galeno & Acluario ob id dicitur, quod race. Li. 8. c. ph. p. matim uelut in uia cohereat. Laudatur Amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse uerò rosam Hierichuntis, Hierosolymitanam uel dictam (aut hic depictam) aperit conuincit utriusq; huius floris. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinae, inodorum est. Iacobus Syluius scribit se habere fuluum, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur iucundissimi.

## Costus.

## Caput XV.

**P**racellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris suauitate. Secundum Iohannem cum sibi uendicat Indicus, leuis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non erofus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei ex calfactoria urinam ciet, menses pellit, uitij quæ uulnam malè habent, tam impōitu quàm fotu & suffitu auxiliatur. Contra uiperarum morsus sextantem \* bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflatio, nesq; ex uino & absinthio, uenerem ex mulso stimulat, latas uentris tineas ex aqua pellit, horribus ex oleo, ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur, uitia cutis in facie, cum aqua uel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata Sunt qui admittis helenij Comageni præduris radicibus, adulterent, quod deprehensu facile est, siquidem neq; gustu feruet heleniū, neq; ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit.

\* Sextantem, quibusdam abundat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Costus subamarus, modicè astringit, acer adeo & calidus ut ulceret. D. Iac. Syl. Lugduno missus & Carolo Paludano (eius urbis iure medico primario, si Hieronymum Brometum nulli eruditione secus)



dum exceperis.) Costus præcellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris gratia, recens, abunde plenus, densus, siccus a teredimibus non erosus. Secundus est Indicus, uber, levis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore buxeus, odore feriens.

Costus Arabum dulcis, et amarus, Grecis indicus, sed *λός* & *γλύνος* Arabas passim imitanti Actuario dicitur in secundo Dialachan, et paulo post in diaromato. Costus autem hortenensis, herba quaquam amara est, fuerit magis piperitis aut Siliquastrum Plinij.

### Odoratus iuncus.

### Caput XVI.

#### Odoratus iuncus.



Gal. lib. 1. an  
tidotorum.

Lib. 8. simp.  
et lib. 6. cōs  
pos. ph. p.

Lib. 1. antid.

**O**doratus iuncus, in Africa, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refer tus, tenuis, rubentibus fragmētis, qui manibus confrican do rosæ odorem emittit igneque mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicesque est usus. Vim urinæ ciundæ ha bet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit: ac uenarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iecinis, & renū, mis cetur antidotis. Radix astringentior est, ideo fastidijs sto machi, hydropicis, conuulsis, drachma una cum pari pon dere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum uulua in flammationibus, ad desidentium fots, utile est.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

*Σχοιν* & Grecis dicitur, quamuis omnem iunci speciem hoc nomine si gnificet: at absolute positum, hunc per excellentiam significat.

iuncus odoratus & rotundus Latinis, ad differentiam palustris.

Camelschew Germanis.

Gallis pasture de chameaulx, hoc est, pastum Camelorum nomina tur.

Officinis nomine deprauato Squinantum dicitur.

Hippocrates Schoenon hedysimon, ut Galenus libello quem uocabulis Hippocratis dicauit, id est, suauem iuncum nominat.

*Σχοιν* & id est, iuncus absolute scriptus, iuncus odoratus, Arabicus, Libycus, seu cum Celsorotundus, à triangulari cypero eum separante. Nescio autem qua causa uulgo *σχοιν* dicitur, cum rari flos eius ad nos deferatur, sed herba sæpe, eius parte superiore à camelis erosa. Eam enim in Arabia uis copiosissimè crescentem, ob id parui pretij, libentissimè cameli pascuntur. *σχοιν* & *σχοιν* Actuarii, uulgius Scenanne diocriter repellit: radix astringentior, flos calidior, urinas ac menses ciet, sumptum & fots adhibi tum, iecoris, stomachi, uentriculi phlegmonas iuuat, hæmoptoicis, id est, sanguinem screantibus cum alijs prodest. solo odoratus uigore deligitur: nam odoris illius gratia celeriter uanescit.

### Calamus odoratus.

### Caput XVII.

**C**alamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in manden do, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus\*. Vrinam potu ciet, quare cum graminis aut apij semine coctus, in aqua subtercutem fusæ morbo, renum uir tjs, stillicidio urinæ, ruptisq, commodè bibitur, menses & potu & appositu pellit

\* Hæcuox  
lij deest.



Calamus odoratus.



pellit, tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina, hausto per arundinem fumo, ad muliebres infusus decoquitur, & clysteribus imponitur. Suffitionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Κάλαμος ὀρωματικός Græcis, Dioscor. & Gal. μυρσινός, id est, unguentarius Hippocrati, Arabicus Plutarcho, Alexandrinus Celso.

Officina omnes Calamum aromaticum nominant.

Germanis Calmus wurzel appellatur.

Galli Latinum nomen retinuerunt.

Calidus, siccus, ordine secundo, leuiter astringit, minimum acer est, partium nonnihil tenuium, remedijs uentriculi & hepatis calidis misceri potest, ac menses mouentibus. Gal. lib. 7. Simpl.

## Balsamum. Cap. XVIII.

**B**alsamum, arbor alba uiolæ, lycij, siue pyracanthæ magnitudine cōspicitur. Folium rutæ proximum, longè candidius, perpetuò uirens. In Iudæa solum quadam ualle & Aegypto nascens: his differens modis, scabritia, proceritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma est, theristum\* uocant, quasi demessile, fortassis quoniam ob gracilitatem facile demetur. Aestiuus sub ortu Canis ardoribus, arbor unguibus ferreis inciditur, manatq; è plaga succus, quem opobalsamum uocant: sed tam exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quàm feni septemue congi cogantur, inibiq; pondus duplo rependitur argento. Succus

Balsamum.



probatio est, ut sit recēs, ualidi odoris, syncerus, non ad acorem uergens, dilui facilis\*, leuis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitiat, multo ab alijs terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item fusino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida, quod maleficium facile deprehenditur. Namq; merus in lancam uestem fusus, neq; maculam facit, neq; si eluatur, notam relinquit: uitiatu autem inhæret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: uitiatu uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum\* pessum ire, & ad

ima fidere arbitrantur, postea dissipatum\* supernatare. Eligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens farmento tenui, fuluum, odoratum, quadam tenuis opobalsamum spirans. Necessarius etiam feminis erumpit usus, quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico, simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Efficacissima uis inest succo, & quammaximè calfaciens, abstergit quæ tenebras oculorum pupillis offundunt, medetur perfrictionibus uulua, cum rosaceo cerato appositus, menses quoq; secundas, & partus extrahit, horrores illi tu discutit, ulcera fordida expurgat, & cruda concoquit, urinam potu ciet, ægrè



spirantibus prodest, datur in lacte contra aconitū haustum, aut serpētium ictus. miscetur acopis, malagmatis, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potui datur doloribus lateris, pulmonum uitij, tussi, ischiadicis, comitialibus, uertiginosis, orthopnoicis, urinae difficultati, torminibus ac serpentum moribus, ad muliebres suffitus perquam utile est, uuluum aperit in deflectionibus balnearum decoctum, & humorem euocat. Lignum easdem habet uires, aliquanto minores, ex aqua potum cruditaribus, torminosis, uulsi, uenenatorum ictibus opitulatur, urinam cit, ad capitis uulnera cum sicca Iri conuenit, squammas ossium extrahit, & ad unguentorum spissamenta additur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

- Gal. lib. 7. Balsamo planta secundo excessu calida sicca, tenuium partium: & carpobalsamo & xylobalsamo liquor est tenuior, minus tamen calidus quam quidam existimant, tenuitate partium decepti. Sæpe enim expertus sum, non inuisse dispositionem calfactione egentem. Opobalsamo igitur (quod & βαλ. Gal. lib. 2. c. σκευ. uocari dicit Simeon) syncero, dilui facili, leui, astringenti, non acido, linguam modicè mordenti, est præcipua inter has plantæ huius autoritas, & uis efficacissima. Laudatissimum autem Lib. 1. anti. est Syriacum siue Iudaicum, siue ex Syria palestina, ac præcipue Sigadinum, à loco Palestinae, in quo copiosissimum & optimum gignitur. Opobalsamum sit Syriacum, tenue, perspicuum, substantia non crassum, quale in fundum uasis subdere solet, quale item sit uetustate. Opobalsamum uarijs adulteratur modis, ut egre possit, etià ab exercitatisimis cognosci: alias uero Opobalsami notas ex Dioscoride requiras. hodie propemodum desijt uideri.
- Lib. 1. anti. Carpobalsamum adulterari non potest, si Galeno credimus.

## Aspalathus.

## Caput XIX.

**A**spalathus, alijs erysiceptron, frutex est furculosus, multis spinis horrens, nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula, quo ad unguentorum spissamenta pigmentarij utuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram uergens, densus odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cum attritione obtinet: unde decoctum cum uino ad tetra oris ulcera colluenda conuenit: ad nomas genitalium, & fordida ulcera\* infunditur. subiectum in pecto, partum extrahit, aluum fistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet, urinae difficultatem inflationesq; discutit.



\* Alij addunt, ozénas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

- Ioan. Rucl. Asportatur ad nos aspalathus è Rhodiorū insulis, inde Rhodij ligni appellatione declinauit. Quin Sucf. & de flore fruticeq; toto ad Rhodios negociatores retulimus, qui florem ei rose tribuebant, prædicabantq; humilem arbusculā, fruticēue lignosum, crebris spinis aculeatū. Ea igitur quæ fidei narratione accepimus, & ipsius ligni pericula quæ unusquisq; facere potest, in hanc traxerunt opinionem, ut Rhodium hoc lignum sit idem, quod à ueteribus aspalathus diceretur. Accedunt etià nostræ nimirum sententiæ, qui diligenter hæc scrutari, & singulas notas disquirere uoluerunt.
- Galenus gustu acrem aspalathū astringentemq; deprehendit, cuius iudicio lingua satis subscribit, uide plura in historia Agalochi.

## Musculus.

## Caput XX.

**B**Ryon, id est, musculus, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro arbore, populo alba, & quercu inuenitur. Optimum est cedrinum: proximum populeum; in quo genere candidum & odoratius præstat, nigricans improbatum.

Astrin



Muscus.



Astringendi uim habet. Decoctum infidentium uuluis utile: unguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inferitur: thymiamatum, acoporumq; compositionibus conueniens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

BRYON Græcis.

Muscus arborum, eam scilicet uilli, quales in senescentia quercu maximè uidemus, Latinis. Officinis & Arabum familie Vinea nominatur.

Germani gemß von baumen/uocant.

Muscus arboreus, non splachnon & bryon tantum, sed etiam hypnon ac sphagnon appellatur ab Idn. Cor. Aetio serm. 12. cap. 4. 4. in oleo gleucino. Item serm. 13. cap. 117. sphagnum siue hypnum habet, ac rur-  
sus cap. 118. eiusdem sermonis quid sit hypnon exponit. ὑπνον, inquit, ὅ ἐστι σπλῆγνον ἢ κινδύον το  
ῖς ἄνθρωποις ἐκ τῆς δαμάσκηνης ἢ ῥοδάκινης ὁδῶν ἀνὰ τὰς ὄψεις. hoc est hypni, quæ canalicula est parua,  
ex arbore Damascena & Rhodacinea exorta, bessem. Quare apparet muscum hunc non tantum su-  
pradictis arboribus innasci, sed etiam alijs, uelut hic Aetius Damascenæ & Rhodacineæ dicit, de qui-  
bus arboribus suo loco dicitur.

Plinius canos arborum uillos sphagnon appellat.

Hodie aliud genus Musci pharmacopolijs in usu est, qui animalis potius sanguis aut sanies esse à Se-  
rapione traditur: uehementer odorifera res, qui tamè tempore Dioscoridis, Galeni, et cæterorum Græ-  
corum incognitus fuit. Aetium tamen eum nouisse putandum est, qui quum alibi, tum serm. 12. cap. 46.  
in medicamento purgatio ex hermodactylis, ἡμῶν λεγόμενον. α. habet, id est, musci siliquam unam,  
id quod de nullo alio musco intelligi potest.

Est autem et tertium adhuc musci genus, quod item bryon Græcis appellatur, itemq; lichen, sed hic  
in petris roscidis nascitur in mari, de quo suo loco plura, &c. Vim habet astringentem, inuolidam Nec Gal. lib. 6. de  
eum multum est frigidum, sed proximè ferme medijs, qui uidelicet & digerendi & emolliendi facultas - simpl.

## Agallochum.

## Caput XXI.



**A** Gallochum, lignū est quod ex India atq; Arabia  
deportatur, thuyæ ligno simile, maculatum, odo-  
ratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine, cu-  
te uerius quàm cortice uestitur, aliquantulum uerficolo-  
re. Manditur, aut decocto os colluitur, commendan-  
di halitus gratia. Sudores arcet toto corpori inspar-  
sum: pro thure ad suffimenta substituitur: radix epota  
drachmæ unius pondere, humida stomachi uitia, & im-

becillitatem, feruoremq; mulcet, si lateris, iecinorisue dolor excruciat, si dysente-  
riæ, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Arborem huius triplicem scribit Ludouicus Rom. Patricius in tractu Indico uideri, Calampat per Iac. Syl.  
festissimam, Bochor uilissimam, luban mediam. Xylaloë Aëtio & Actuaria dicitur, id est, lignum a-  
loë arboris non herbæ. Rhodijs militibus est frequens in corollis precarijs. Quod uero ostendunt officii pat.  
næ, uerius est aspalathum acre, & austerum. Gal. lib. 6. simpl. quod aroma apud suos nasci idem Gal. Gal. lib. 6.  
scribit lib. 8. comp. ph. part. & in Syria & Rhodo Dioscorides: graue, detracto cortice, rubens aut simp.  
purpurascens, densum, odoratum, amarum, astringens: alterū deterius, cæcidum, lignosum, inodorum. Lib. 8. com.  
Verum Agallochum Germani des heyligen kreuzes holz, hoc est, lignum sanctæ crucis appellant: ph. p.  
Aspalathum uero Paradiß vnd Moes holz.

## Narcaphthum.

## Caput XXII.

**N** Arcaphthum ex India defertur, corticosum, simile sycomorì libro, quod in-  
cundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis, constri-  
ctionibus uulvæ suffitu prodest.



Narcaphthum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ioan. Rucl.  
Sueß.

Serapio Arabs Nabach uocat. quid sit nondum comperi. Narcaphthum, quod & ab alijs nascaphthum uocatur, olim ex india deportabatur, corticosum natura, & putaminibus arboris mori: Prætermisum à Plinio, ut arbitror consulto, quia incerta esset eius facies, ut aliorum quoq; plurimum, quæ noslro orbi tantum nominib. cognita sunt. Paulus lacaphthi meminit inter ea quæ in magno cyphi, quod cognominant beliacum, adijciuntur, & corticem Picæ, uel alterius arboris exilimat ego lacaphthi cum nascaphtho idem esse reor, & nostro seculo planè ignotum.

Cancamum.

Caput XXIII.

\*Alij, odori.

**C**ancamum Arabi ciligni lachryma est, myrrhæ quodammodo similis, uirosi gustus, quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo ex styrace & myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis, menses cum aqua mulsa pellit, oculorum cicatrices cōfestim emendat: uiuo madefactum medetur eorundem hebetudinibus: aduersus gingiuas humore prægnanteis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis λάρυνα. Cancamum Latini. Officinis Cacca nominatur.

Lachan sepe Aduario dicitur passim, ac præcipue in duplici descriptione dia lachan, ubi scribit λάρυνα λενάδαχο μύροιο purgatum.

Ioan. Rucl.  
Sueß.  
Dioscor.  
Paul.

Cancamum ex confinio casie cinamomi deuehitur, sed per Nabatheos & Trogloditas qui consedere ex Nabathæis. Paulus arboris Arabæ odoratam esse lachrymam tradit, myrrhæ non dissimilem, quæ suffimentis usurpetur. Addit uim obtinere extenuandi præpingues, & obesos. Cæterum non sum nescius, à Barbaris, qui Dioscoridis & Pauli citant testimonium, id lacca dici, quod Dioscorides & Paulus cancamum appellant, idemq; plurimis recentiorum Græcorum compositionibus hoc nomine dicatum. An tamen lacca sit Gummi illud quod hodie passim ostendunt Officinæ, de quo agitur. Cancamum, non satis habeo compertum. Quod si genus hoc myrrhæ referat speciem, tamen uacare mihi uidetur odore, qui possit ad suffimenta dari, sapore uiroso. Adicere Mauritanii rubram esse laccam, tinctoribus expeditam, roris modo supra surculos arborum insidentem, præsertim mespili, & coalescentem in gummi. Infestores floccorum purpureæ, eam macerant, ut colorem ebant lantæ, & quod remanserit, lacca esse dicitur, cum uetus inodorum & fecem potius canchami, quam canchamum aut lacca dei oporteret. Scito autem tria hoc nomine lacca nuncupari, Vnum est uerum Dioscoridis canchamum. Alterum grana quædam arte facta, quæ Venetijs uirgino parantur, aut cocco, & alijs nonnullis: hac pictores utuntur. Est & tertia lacca, ex qua ruber color fit, qui uulgo carmesinus appellatur, ex his omnis error detegitur &c.

Ant. Mus.  
Br.

Cyphi.

Caput XXIII.



**C**Yphi thymiamatis compositio est, dicata dijs, quæ abundè Aegyptij sacerdotes utuntur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dimidium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ modo: uuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas duodecim: resinæ repurgatæ minas quinque: calami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minā: myrrhæ duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum duabus mellis minis: uuam passam de tractis uinaceis tusam, cum uino & myrrha subigito: cætera tusa & cribrata adijcito: die uno humorem combibere finito, dein mel coquito, dum sibi glutinis ascescat crassitudinem: eliquatam resinam accuratè permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile uas recondito.

NOMI



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cypheos compositio à Democrate hæc describitur, *saxpid* ♂, id est, uia pisse pinguisime (à qua cortex & semen totum sint exempta) carnis leuigata probe, terebinthine usta, ana drachmæ Atticæ 24. Myrrha, schœnu anthus, seu uinci rotundi, ana drachmæ 12. Cinamomi drachmæ quatuor. Bdellij lachrymæ, spicæ nardi, castiæ bonæ & puræ, cyperî, baccarum iunperi grandium & pinguium, calami odorati ana drachmæ tres.

Aspalathi drachmæ duæ & dimidia. Croci drachma una Mellis & uini modus mediocris. Bdellium, myrrham, uinum in mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito unam cum alijs tere. Omnia ubi erunt leuia, fac cyclos paruos.

His Aegyptij sacerdotes dijs suis propitiandis suffitu utuntur. Sic Rufus uir optimus, & in arte exercitatus, parandum prodidit. Per multæ enim eius compositiones etiam Dioscoridi, quarum unam describit ab hac diuersissimam, tamen quam in antidotâ quoq; misceri ait. Paulus quoq; lib. 7. describit cyphi magnum *ἡλιαιον*, id est, solare dictum, ex rebus 36. confectum: & *σελλω ιαιον*, id est, lunare quod ex rebus 28. constat: utrumque ab hoc maxime differens: tamen etiam ad conciliandos Deos odore grato compositum, & uariis nostris adiuuandum, ut distillationes à capite in partes subiectas concoquat, & grauedine, obstructioneq; nos liberet, & cerebri uentriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad ea quæ pectori inherere coquenda, nec non ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipue epithematibus & antidotis, quæ inde Cyphoidea uocantur. Paulus lib. 7. Etiam officinis hodie in usu est cypheos compositio sub nomine trochiscorum kokion, à uera compositione nō longe diuersa, sed admodū deprauata, Paulus Aeg. neta. Paulus lib. 7

## Crocum.

## Caput XXV.



**C**ROCUM, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulum candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio è monte Olympo. dein x. Aegibus Aetoliæ. Cyrenaium & Centuripinum inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris uenustatem, tingendis mortarijs dicauerunt. quibus de causis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atq; etiam sapæ sublitu: contrita, quò pondus adiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. sed maleficium declarat infidens puluis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse uoluit. \* Alij, Thessali uolunt. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio uim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet. urinam cit. Elegantem colorem præstat. qui ex passo biberint, crapulam non sentient. oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet. additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur. ad uulnæ etiam sedisq; cataplasmata, ualiter inditur. uenerem stimulat. uergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet. auricularijs collectionibus utile. Quò facilius conteratur, in calido fictili sole siccari oportet, celeriterq; uersari. Urinam mouet radix ex passo pota. Fit etiam expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma uocant. Optimū est odoratū, modicè myrrhā olens, graue, nigrū, ligni expers, læue, subamarum. \* Alij, subrum. quod madefactum croci colorem reddit, guttatūq; uehementer dentes sum.



ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuerset, turinā cit, calfacit, coquit, & emollit. vires croci proportionem quadam tenus repræsentat, quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma uendicat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ΚΡΟΚΟΣ Græcis. Crocus Latinis appellatur.

Officina antiquum & genuinum nomen retinuerunt.

Germani Saffran / Ziment Saffran / ort Saffran / Zamer Saffran.

Galli du Saffran uocant.

Gal. lib. cop. ph. part. 4. 7.8. Lib. 1. antid. Crocus calidus ordine secundo, siccus primo, parum ac mediocriter astringit, quæ facultate cor & partes alias roborat, ut suo calore moderato coquit ac digerit, & siccando modicè dispositiones pectoris phibificas inuat, putredines corrigit.

Crocus Coryceus à Coryceo antro, in quo nascitur, ueteribus atq; adeò Poëtis præter ceteros celebratus: alijs sanè procerior, nō tamē alijs robore odoris aut diurnitate est præstantior. Eligendus uerò est non procerior, sed odoratissimus, & flauissimus, & longo tempore in suo uigore persistens. Præstantissimum igitur aliquem crocum apto quodam adium loco repositum obserua sepe, ut pernoscas: nam id colorem odoremq; pristinum diu seruabit: Adulterati uerò odor & color celeriter uanescit. Crocus Cilicius etiam laudatur. Nunc passim & in Germania feritur, uerum nullibi uegetior quàm in Viennensi agro.

## Helenium.



## Caput XXVI.

**H**eleniū folia habet uerbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, uegetam, magnā, ex qua agnatæ propagines liliorū aut ari modo feruntur. Mōtibz in umbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur estate radix, particulatimq; dissecta sic catur. Potū radice decoctum menses et urinas ciet, ipsaq; in eclegmate ex melle prodest tussī, orthopnœæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentium morfibz. In summa ex calfaciēs. Folia ex uino cocta utiliter ischiadicis illinuntur. Helenium stomacho utile in



passo conditum: siquidem salgamarij paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapā coniiciunt, & ad usus reconducunt. trita potaq; ad cruentas excretaiones efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni Cra

teuas tradit. herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus, folijs lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebrisq; radice pallida, digitū minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis



maritimis collibusq; Radix una in uino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

EAENION Græcis. Helenium, Elenium & inula Latinis.


Officinis Enula campana dicitur. Germani Mant wurzel.

Galli champagne uocant. ἐλένιον λευκόν, καὶ ἰσχυρὸν Ἀσuarus appellat.

Elenij radix odorata, subacris, amara, calfacit non primo statim occurſu, siccaturq; non exacte ob humorem in se recrementitium, tandem uero etiam rubrificat, ischiadas & affectus alios diuturnos ac frigidos: eclegmate cum melle, crassa & lenta ex pulmone & thorace expectorat, serpentium morſibus prodest. Ex montibus & sicco solo præstantior, legitur æstate, particulatimq; dissecta siccatur, uel melle aut saccharo condita seruatur.

## Omphacinum, oleumq;.

## Caput XXVII.



Oleum quod ex immaturis oliuiſ exprimitur, ad multos usus recte ualentibus accommodatissimum. omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho utile est, quod astringat. gingiuas contrahit, dentes firmat, si cõtineatur in ore. sudores cohibet. & quo uetustius ac pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et, ut reliqua in commune dicantur, omne oleum calfacit. emollit uentrem. à perfrictiõibus corpus tuetur, ipsumq; promptius ad obeunda munera reddit. aluum emollit, ulcerantium uenenorum uires permittum hebetat. contra uenena datur, assidue potum redditumq; uomitionibus. sola uir aluum hemina mensura cum paritisanæ succo aut aqua potum. ad tormina, calidum simul decocta ruta tribus sextarijs in potu datur. uentris animalia pellit. idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. uetus magis calfacit & uehementias discutit. oculorum claritati sublitum confert. Si uetusti non sit occasio, in uase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut uetustatem repræsentet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Oleum proprijsimo nomine appellatur, quod ex oliuiſ exprimitur. Germanis Baumöl.

Gallis uero huyle d'oliue appellatum: maturis quidem dulcissimum, calidum, moderate humidum, uel dum est recens, frigidum humidum. ex crudis autem & immaturis omotribes & omphacinam quantum astringit, tantum refrigerat: illud ueteratũ calidius fit, & potentius digerit: hoc autem si dulcescit uetustate, dulcis uires induit, quas sapore explorabis. Tenuis est purum, translucidum, & cuti affusum eius modicum, latissimè per eã extenditur, continuum sibi manens, & cito à cute combibitur: idemq; optimum æstimatur, quale in Italia Sabinum


Oleum habet vim mitigandi & laxandi.

Oleum



## Oleum sylvestris oliuæ.

## Caput XXVIII.



**O**leum quod sylvestres oliuæ fundunt, uehementer adstringit, & ad sanorum usus secundum sibi locum uendicat. In doloribus capitis utiliter pro rosaceo substituitur. sudores arcet. defluentes capillos inhibet. furfures, ulcera capitis manantia, scabiem, leprasque abstergit. tardius canitiem sentiunt, qui eo quotidie perunguntur.

Candidum oleum fit hoc modo: Album colore, nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum heminarum mensura, & sub solem media quaque die concha refunditur, ex altoque demittitur, ut assidua deuolutione, ictuque agitata respumet: octaua die scenum græcum mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactum donec emollescat, in supradictum oleum deijcitur, ita ne extillet aqua. postea tede præpinguis piceæ, assulati mæstæ æquale pondus adijcitur, & transactis octo diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino affusum recondi debet, substratis fertulæ Campanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere: sin minus, rursus soli mandandum, & idem munus obeundum, usque dum inalbefcat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Olea fere Græcis catmōs, dicitur sylvestris olea, fecundior satius, quod fere sylvestres habent, seu cura fertilitatem minuente. Oleum tamen acrius atque magis astringens etc.

Oleum album siue elotum morfu omni caret. Lauandi modum docet Galenus in lib. de comp. ph. gen.

## Sicyonium.

## Caput XXIX.

**S**icyonii componendi ratio hæc est: In lebetem oris lati stanno inductum, funditur olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius unus, aquæ semicongius. leui id igne cogitur, leniter mouendo. at ubi bis effebuit, & subtracto igne refrixit, innatans oleum cōcha decapulatur, & adiecta noua aqua conferuelcit. & reliquis ut diximus peractis, reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyonii inde accepto cognomine. Calfactoriā ad quendam usque modum uim habet. Ferebri ac neruorum uitijis prodest. fœmineque ad cōmendandum faciei nitorē eo utuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Idi Cor.  
Zuic.

Paul. lib. 3.  
cap. 77.

Aëtius serm.  
9. cap. 27.

Paulus li. 7.  
cap. 20.


Sicyonium oleum maxime in Sicyonia parari scribit Dioscorides, ut patriam appellationē inde habeat, docetque eius faciendi modum ex oleo albo, ita ut dimidium eius aquæ affundatur, cum qua bis effervescat, nulla mentione facta cucumeris, ex quo in octo fiat, & unde alij Sicyonium appellatum putant, ἀπὸ σικύου uidelicet, hoc est à cucumer appellatione ducta. Paulus namque lib. ca. 3. 77. sic ait αἶμα δὲ κενὸν καὶ ἐλαττωδὲς ἀπὸ τοῦ ἐνέμενον, καὶ ὁ χυλὸς τοῦ ἐλαττωδίου. ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἐνέμενον σικκῶνιν ἐλαίου. Quibus uerbis Sicyonium oleum ex elaterio, ipso uidelicet cucumeris sylvestris succo, aut eiusdem radicibus componi tradit. Aëtius autem serm. 9. cap. 27. non quidem Sicyonii mentionem facit, sed alias olei in quo sylvestris cucumeris radix sit in octa, καὶ κρητταί, inquit, προεργασθῶμεν κερασθεῖσα δὲ ἐλαίω, ἐν ᾧ σικκῶν ἀγρίου ῥίζα ἐναρξάται. Indicauit itaque Aëtius his uerbis Sicyonium simplex, quod ex incōcto oleo radicibus cucumeris sylvestris fiebat, Paulus uero tum compositum Sicyonium, oleum tum quod ex elaterij succo tum quod ex elaterij radicibus componitur, significat, quorum omnium descriptiones Paulus lib. 1. cap. 20. habet. Sicyonium oleum & cicinum, raphaninum, sesaminum, amygdalinum, car. yinum, sinapinum & alia plurima ex fructibus & seminibus expressa & parata rerum, ex quibus extrahuntur & composita Gale. de tuen nuntur naturam sequuntur. Quo pacto aut olea medica et factitia fiant, rerumque uirtutibus insciantur, da sani. li. 4. nō abs re fuerit adposuisse ex Galeni de sanitate tuenda lib. quarto. Sunt enim qui per infusionem illa tantum



tantum conficiant, sunt & qui per coctionem. Vbi uero per infusionem sunt, res quæ infunduntur, con-  
tundi prius debent antequam in oleum iniiciantur, sic enim qualitate & ui sua oleum citius inficiunt,  
quæ postquam macerate fuerint, quod quadraginta & plurium dierum spacio fiet, abijciuntur, humis-  
dum uero linteis percolatur & usui seruat. Qui uero diutinam macerationem illam rerum ferre  
non possunt, eos partim in oleo percoquere coguntur, igni certe lenio, qualis prunarum est, quæ tas-  
men nec ipsæ multæ esse debent, partim aqua uiniue tantulum injicere quantum coquendo totum ua-  
nescet. Is modus erit, si quadruplum eius aut quinquuplum oleum sit. Vinum autem ad affectus podas-  
gricos & articulares, aqua uero ad alios utilior est. Et sic cautiore operantur, quo nec iniecta tor-  
teantur, nec oleum uestionem odore referat. Verum qui his magis sunt curiosi, in duplicibus usis co-  
quunt: quod fit cum inlebet in quo sit aqua feruens, inseritur exiguum uasculum, in quod fundi oleum  
debet. Ethic commodior coquendi est modus.

## Strigmenta balnearum.

## Caput XXX.



nem perducuntur, dissipant, desquamatis & ulceribus senum profunt.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molli-  
sunt, discutiunt ad sedis rimas & condy-  
lomata illinuntur. Illa uero quæ ex palæstris  
puluerem sibi ascuerunt, in sordis speciem  
redacta, articulorum nodos imposita adiu-  
uant, ischiadicis in fotus aut malagmatis lo-  
cum, calida commodè sufficiuntur. derafæ  
gymnasiorum parietibus simulacrisq; for-  
des calfaciunt, tubercula, quæ ægrè ad coctio-

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Strigmenta Archigenes γλοιον dixit Dioscorid. & Gale. & alij medici Græci etiam γύπιον appel Archigenes  
lare solent. Sunt autem trium generum strigmenta, balnearum, palæstræ, & parietum atque statuarum  
gymnasiorum. Balnearum ex sudore, oleo, & sordibus in balneo defictis ab hominibus constane. Ian. Cor.  
Palæstræ ex eisdem rebus componuntur, accedente insuper puluere, qui partim ab olei illitione lucta zuic.  
turi inspergebatur ac affricabatur, partim à luctantibus in arena mutuo manibus ingestus, itemque  
ex lucta excitatus, corporibus inherbat. Prior sanè pulvis πέρτος, & Atticis κοίταλος uocabat Gal. lib. 2. &  
tur, autore Galeno: cuiusq; affricus aliquando solus, aliquando præmissa olei illitione, densandi ac 7. de tuenda  
coroborandi corporis per oleum emolli gratia fiebat, uelut secundo & tertio γύπιδυ Galenus tra- san.  
dit. Quanquam & ob emendandam gracilitatem, crura puluere conspergere eiusdem operis libro. li. 5. eiusdem  
5. doceat. & affuso oleo confricare, sed ita ut is plus tenuis & pinguis sit, κοίτη λιπαράν appellat, in operis.  
quo uidelicet nihil asperi, neq; acris insit. Extenuant enim magis quam incarnant, qui pumicosa as-  
peritudine, aut nitrosa acredine participant. Quin & refrigerandi & sudoris reprimendi causa  
idem pulvis adhibebatur, qui uim habeat obducendi meatus, refrigerandiq; ac repellendi, uelut 8. Lib. 3. simp.  
simp. ph. Galenus testatur. At uero tertium genus Strigmentorum est parietum atque statuarum in ph.  
Gymnasis, quæ sordes sunt ex oleo magna sui parte constantes, quæ ex materia cui inherent aliquid  
assumunt, uelut eruginem ex statuis æreis. His enim itemq; parietibus oleum quo se oblinebant pale-  
strite, inter illinendum inspergebatur, quanquā etiam statuas quasdam fuisse in gymnasis, itemq;  
uasa ærea quæ oleum ipsum, quo se lustrari obtinerent, continerent, ex Pauli ac Gale-  
ni uerbis apparet. Ait enim Paulus lib. 7. ἑύτως ἀπὸ τῶν χαλκῶν ἀνολοιόντων  
ἢ σκευῶν, ἐν οἷς ἀφθονοῦν ἄλλαν ἐναπομένει, ἔχει τὴν καὶ τοῦ διαφα-  
νήντος ἐστὶ καὶ εὐγενέως μελέως καὶ μαλακτικὸς. ἀπεπλη-  
ροῦν φυματὰ διαφθορῆς, hoc est: sordes ex æreis statuis ac ua-  
sis, in quibus largum oleum remanet, quod & eruginis  
quippiam contrahit, discussorie sunt, & resiccantes  
moderate ac mollientes, quare tubercula  
la cruda discutiunt.

Paulus lib. 7.

Elaomeli



## Elæomeli.

## Caput XXXI.

**I**N Palmyris Syriæ, quod elæomeli uocant, ex quodam caudice manat oleum, melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sextario cum una aquæ hemina dato. sed qui sumpserit, torpescunt, & uiribus deficiuntur. quod minime uereri oportet, uerum crebro excitare, ne ueterno pressi somnos caprent. Fit & oleum è pinguitudine surculorum oleæ. optimum uetus, crassum, pingue, non turbidum, calfacit. Priuatim caliginibus oculorum illinitur, lepras, neruorumq; dolores illitum emendat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Elæomeli uel oleomeli nostro seculo incognitum.

Magno implicamur errore, qui mannâ putant elæomeli ueteribus fuisse, quorum error facile exploditur. Nam elæomeli constat resinæ genus quoddam esse, Palmyris familiare, quod è caudicibus profluebat, perinde quasi apud nos ex annosis Betulis liquor, qui linctus ualde turbat uentrem, sapore dulci.

## Cicinum oleum.

## Caput XXXII.

**C**icinum oleum hoc modo temperatur: Maturi ricini quauoles quâtitate torrido sole flaccescunt, & uarum more instrati tantisper insolantur, dū uestiens cortex fractus decidat. caro colligitur, & coniecta in pilam diligenter tunditur. postea in lebetem stanno illitum, qui aquam habeat, demittitur, subiectione igni feruescunt. & ubi insitum prorsus humorem reddiderunt, sublato ab igni uase, innarans oleum concha tollitur & reconditur. Sed in Aegypto, ubi largior increbuit usus, longè secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos molæ mandant, & accurate molitos per sportulam torculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt ricini, cum continentibus orbiculis exuuntur. Ad psoras, & ulcera capitis manantia ualet, prodest sedis inflammationibus. uuluis conuersis atq; præclusis: item indecoris cicatricibus, & aurium doloribus. emplastra efficaciora reddit ad ditum. potu aquam aluo extrahit, uentris animalia pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicinum oleum, est quod ex fructu Ricini, quem Græci κίχνη uocant conficitur, quid autem sit Cicî seu Ricinus, & quæ eius forma, facultas & temperamentum libro. 4. cap. 145. luculenter demonstrabimus. Hoc oleum ut hic Dioscorides tradit, aliter Aegyptij, aliter alij conficiebant. Poterit hodie isdem plane rationibus parari, quamuis eius nullus sit in officinis usus, cum passim nunc in hortis proueniat. Est hoc oleum admodum tenue, ob id ad discutiendum potens.

## Amygdalinum.

## Caput XXXIII.

\* hoc est, Sex  
tarij tres.

**A**mygdalinum oleum, quod aliqui metopium uocant, hoc fit modo: Semodius \* ex amaris nucibus repurgatis siccatisq; in pila ligneo pistillo leniter tunditur in offas, aquæ quæ ferbuerit sextarius adijcitur, & ubi dimidia hora humorem hauserit, uementius quàm antea tunditur, mox tabellis premittitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursum hemina aquæ inspergitur, & postquam ebib erint, idem opus prosequendum. Singulas heminas reddunt singuli modij. Contra uuluum dolores, strangulatus, conuersiones, & eorundem locorum inflammationes efficax est, uitijs renum, calculosis, difficili urinæ, suspiriosis, lienosisq; proficit. dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit. maculas & uitia cutis tollit è facie, & eam erugat cum melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo





rosaceo cerato. & oculorum hebetudines emendat. ulcera capitis manantia & furfures cum uino abstergit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amygdali summariam considerationem quere infra cap. 139. Μετ' ὀπίον dicitur oleum amygdalinum propter Galbanum, quod recipit. Vocatur & μετ' ὀπίον patrio nomine Aegyptiacum quodam unguentum, propter Galbanum mixtionem. Nam lignum in quo Galbanum aut ut alijs placet Ammoniacum nascitur, Metopion quoque uocatur. Habet prædominatricem amaritudinem, adiuncta quadam uis densandi & uirtute stipica.

## Balaninum.

## Caput XXXIII.

Simili modo fit balaninū oleū, qd repurgat maculas, lentigines, uaros, & cicatrices nigras. aluum soluit. stomacho aduersatur. contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe infillatum. Similis sesamini ratio. Fit etiam ē nuce iuglande oleum, quod carynum uocant. Eandem uim habet quam balaninum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Βαλάνιον, id est, glans unguetaria, Myrobalanus quoque Plinio dicta, ex Barbaria regione allata. Ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma una est uomitoria: cum oxirato autem iecur & lienē purgat, cū aceto item (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, psoras, lenties, uirilgines, pruritus extergit: lienē & hepatis indurato illis nitur cum farina aliqua siccante, ut erui, lolij: lienē etiam prodesse scribit Galenus. Carnis huius succo calido utuntur aromatarij: id enim in odorem cum sit, omnibus suscipiendis odoribus est aptissimum, Gal. in ther. ut inspidum saporibus, & coloris expers coloribus. id oleum Balaninum hic Dioscoridi dicitur. ad Pisonem. Oleo expresso quod reliquum est magna terream & amarū, incidit, terget, contrahit, stipat, ad prædicta etiam efficax, sed minus. id autem uidetur esse μύρο βαλάνιον τριεσμία, id est, expressum, quod cataplasmatibus miscet Galenus.



Sesaminum oleum fit ex semine sesami, de quo lib. 2. cap. 91. Sesa Lib. 11. & li. non non parum in se continet uiscosum & pingue: quare emplasticum 13. metho. & est & emolliens ac modice calidum. Eiusmodi facultatis est quod cō bis li. 9. cōp. fitur oleum: & herba quoque decoctum similem uim habet. In nuce ph. part. iuglande id quod edendo est, oleosum est, & tenue, itaque etiam facile exprimitur: & quo diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Gal. 1. s. simp. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanē ad modum fit per halitum euaporatoriū. Itaque, quidā eo gangrenas & carbunculos, & agilopas sanant, Gal. 1. 7. simp. ac nonnulli ad neurotrota, hoc est neruorum uulnera utuntur. Ceterū si recens sit, astringens nonnihil qualitatis etiam obtinet.

## Hyoscyaminum.

## Caput XXXV.

Hyoscyaminum sic fit: Semen candidum, recens ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, ut in amygdalino diximus. dumq; insolatur, siccatur, quæ sub manu sunt, partes, cū reliqua massa permisceantur. hoc autem fieri oportet dum nigrescat & grauiter oleat. mox pressum atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est, pestis miscetur. ad emolliendum utile. Fir & grano gnidio purgato & tufo. Vis ei aluum soluere potu. Non secus cnicinum oleū temperatur, cui facultas eadē est quæ facta ē gnidio grano, uerū inualidior. Raphaninū ē raphani semine fieri solet, ceterorum more. Phthiriasis mala ualitudine cōtractas tollit. scabrities cutis in facie emendat. Ad obsonia utuntur Aegyptij. Melanthinum idem quod raphaninum potest. Tritum sinapis semen, & calida aqua madefactum, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. transfert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hoc oleum a semine Apollinaris herbae denominatur, quam & hyoscyaminum, id est, fabam porcinam appellant, eius historiam & picturam quere lib. 4. cap. 59. Vnus seminis & per se, & semine expresso stuporem gignit, atq; adeo insaniam.



Falluntur qui granū gnidium ē chamelæa nasci autumant, similitudine foliorum decepti ut fistiū dī-  
cemus cum tractabitur eius historia lib. 4. cap. 154.

Oleum ex gnidio grano strictum eandem uim habere quam cicinum Plinius affirmat. Habet hoc o-  
leum magnam uim præter ea quæ à Dioscoride dicuntur, in aluo lenienda, si umbilico admoveatur.

Gal. 1. 2. simp.

cap. 5. & li.

5. sanita. tu.

Gal. 1. 6. sim.

Cicini semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam. Officinæ semen carthami appellant. Oleum  
seminis lac cogit & astrictam aluum soluit, in historia plantæ certius lib. 4. cap. 168. de eo agitur.

Rhaphaninum oleum Galenus ait cicino oleo calidius esse, alias  
simile.

Melanthium unde melanchinum oleum, est Gith, & officinarum  
Nigella.

Sinapinum oleum fit ex semine madefacto in oleo expressoq; quo  
utuntur ad neruorum rigores, lumborumque & coxendicium perfri-  
ctiones.



### Myrteum. Caput XXXVI.

**M**yrtei faciendi ratio est: E myrto nigra syluestri,  
aut satiuā, foliorum mollissima quæq; tusa præ-  
muntur. succo pares omphacini olei portiones adijciuntur, subiectisq; carboni-  
bus inferuescunt donec concoquantur. innatans oleum deraditur. Sed longè fa-  
cilior hæc compositio: Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod  
innatat eximitur. Priuatim alij deiecta oleum folia in sole macerant: alij prius  
oleum inspissant malicorio, cupresso, & iunco odorato. Efficacius est  
amarum gustu, & oleosum, uiride, translucens, & olens myrtum. Astringit &  
indurat. ideo medicamentis miscetur quæ cicatricem obducunt. prodest ulceri-  
bus in capite manantibus, ambugis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad  
attrita & furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos. corporis sudo-  
res compescit, & omnia quæ adstrictionem inspissationemq; desiderant.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie utimur oleo myrtino in uentris fluxibus: uehementer enim exiccat. Myrti picturam &  
summariam considerationem quere cap. 128.

### Laurinum.

### Caput XXXVII.

**L**auringum fit hoc modo: Lauri baccæ cum maturæ sunt, in aqua coquuntur:  
liquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ mani-  
bus subacta concha excipitur. Alij omphacinum prius oleum cypero, iunco o-  
dorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia concoquant. alij etiam bac-  
cas, donec oleum odorem contraxerit. alij styracem & myrtum\* addunt. Optima  
laurus ad id latifolia & montana. Oleum laurinum utilius quò recentius, quò-  
que uiridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei excafactoria, emolliens. uena-  
rum spiracula aperit. lassitudines discutit. omnibus neruorum uitijis, alboribus,  
destillationibus, aurium doloribus, malis renum frigore contractis, illitum, non  
aliud iuuantius, attamen potum nauseam parit.

\* Alij, myr-  
rham.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Laurinum oleum quidam è baccis exprimunt tantum: alij folijs modo: alij folia & corticem nec  
non styracem addunt aliosq; odores. Excafacit uehementer, & emollit: ita ut ij, qui scabie sca-  
tent, & asperis impetiginibus obfidentur, illiti in balneo, persanentur. Sed eo conuenit abstinere, li-  
chenibus & psoris, inflammationem minantibus: in calidis quoq; temperaturis & biliosis: siquidem  
frigidis corporibus, humidis & pituitosis congruit: item ijs, quorum articuli alboribus, aut perfri-  
ctione affliguntur: ischiadicis subsidio est: uermes & pediculos enecat, furfures capitis emendat: alo-  
pecias & ophiases corrigit, usus eius in lauachro nitri: postea detergere oportet uino & melle, & fœni  
græci farina: sed cauendum est, ne capiti dolorem sentienti, laurinum hoc oleum admoveatur.

Lentiscinum



## Lentiscinum.

## Caput XXXVIII.

**S**imilis lentiscini ratio. Nam è maturo fructu temperatur, factis prius spissamentis, ut in laurino diximus, hoc scabiem iumentorum canumq; sanat. utilissimum pectus, acopis, & leprarum medicamentis. sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet. quod refrigerat & astringit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ginguis ex inflammatione laborantibus optimum pharmacum est oleum lentiscinum caliditate temperatum ore retentum; sit autem recens, nam uetustius tanto recentiore peius est, quanto atate antecellit. Imponatur autem uasculum in quo calsit lentiscinum, in aliud maius uas quod aquam calidam multam complectatur. Maxime opere itaq; inflammationi gingivarum hoc conducit. Nec uero minus etiam si iuxta aliam quandam partem, tum pellicula linguam ambiens cum succingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oriatur, dolorem sedat lentiscinum. Repellit enim citra molestiam & absq; asperitate, quam plerq; austerorum habent, discutitq; citra mordacitatem, cuius rei inflammationis præcipuus usus existit.

## Mastichinum.

## Caput XXXIX.



**M**astichinum è trita sit mastiche. quod contra omnia uulnæ mala efficax est. mediocriter calfacit, astringit, & emollit. aduersus prominētes stomachi duritias, cœliacorum, dysentericorumq; cruciatus utile. faciem emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Resinarum iure præstantissimum est Lentiscina, id est, Mastiche, huius oleum confortat stomachum, nervos, hepar & iuncturas, lenit apostemata dura, & sedat dolores.

Mastix ὀψις ἐν ἄλσασσας & ὠκεῖον τρεῖς παύσαι Paulus, simplicissimum scilicet & magis usum. Paulus ego. Vltimum accipit olei sext. 50. libras elenij 5. xylobalsami lib. 10. schoenanthos lib. 5. cardamomi lib. 7. mastiches lib. 5. xylo mastiches lib. 8. terebinthina lib. 3. comæ absinthij libram unam, uini odorati sext. quinq; aque sextarios decem. Res sicce in uino madesiant per tres dies, misceantur oleo & aqua, & coquantur horas sex, & tunc mastiche & terebinthina additur, & exacte commixta & in frigidatâ depurantur. In simplicissimo, pro oleo sesamino Paulus accipit omphacinum, & non nisi untiâ unam mastiches: dicitq; aliquos addere absinthij & styracis ana unciam unam.

## Vnguentorum compositio.

## Cap. XL.



**D**E ratione unguentorum consequenter tractandum existimauimus, quandoquidem ea in nonnullis corporum uitijs, aut medicamentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimum prosunt. in quorum probationibus consulerenares oportet, an ea oleant ex quibus temperantur: optimum huicmodi iudicium, quod in quibusdam planè obseruari non potest, propter ea quæ admiscuntur odore cæteris præualentia: ut in amaracino & crocino, telino, & pleriq; alijs, quæ crebra circa hæc meditatione experiri conueniet.



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Vnguenta quandoq; sunt ex floribus, ut Rosaceum, Leucoum, Susinum. Aut ex folijs, ut Myrthum: aut ex radicibus, ut nardinum, &c. Vnguentis porrò ueteres multis modis usi sunt. Ad salubritatem, ut natantes, & lauantes. Ad necessitatem, ut certantes Ceromate ungebantur. Ad luxuriam, ut delicati causa Veneris & mensarum. Greci mixtum unguento uinum bibere non erubescabant, quod dicebatur Myrites. Bathilli populi unguentis madent. Huius luxurie inuentum Persis refertur acceptum. Vnde Horatius: Persicos odi puer apparatus. Eius rei fidem facit scriptum unguentorum laudatissimorum, quod expugnatis Darij castris repperit Alexander. Cyprij quoq; Cyziceni, & Corinthij eadem mollitie effeminati sunt. Constat usum unguentorū aliarumq; rerū ad delicias repertarum usque ad Iulij Caesaris tempora Belgis fuisse ignotum. Imperator Belgas fortissimos dicit, quod ad eos non commens, qui quæ ad effeminandos animos pertinent, illuc comportent. Inuasit hic luxus totam paulatim Italiam, adeo ut M. Otho Neroni monstrauerit uestigia pedum unguentis tingi, hisq; balnearum parietes quandoque aspersi sunt. Caium quoque principem ferunt unguento solitum lauari. Anno post urbem conditam, 565. P. Lucinius Crassus & Iulius Caesar censors edixerunt, ne quis uenderet unguenta exotica. L. Plotius, Plotij bis Consulis frater proscriptus à Triumuiris, in Salernitana latebra unguenti odore proditus est. In confesso est Helioabalum imperatorem triclinia quandoq; lectos & porticus omni florum genere strauisse, ut lilij, uiolis, hyacinthis, & narcissis, ac per eos ambulasse, seq; unguentis omnium fragrantissimis nudū se penumero perunxisse. Quæ secuti Imperatores propè nullā mollitiem sibi non permisierunt. Quod ego in Romanis principibus, quamuis damnum plurimum, non tamen admodū miror, quum etiam apud eos abiectissimi homunculi, idem sibi indulserint.

Vnguenta hæc ad uoluptatem tantum & suauolentiam inuenta & ad delicias: ad curam uerò corporis non adeo, planè interierunt: etiamsi hodie unguentorum nomine ueniant alia medicamina, quorum usus est ad ulcera & tumores corporis consummandos &c.

Rosaceum.

Caput XLI.

\* Alias, sensim



**R**osaceū sic fit: Iunci odorati quinq; libras & bessentū dīto, & subactas aqua in uiginti olei libris & quincuncis subinde mouendo, cogto. dūq; percolaueris, in olei libras iuginti, & quincuncē, adijcito rosas nō madefactas numero melle, & manibus melle perunctis identidem moueto: interdī\* premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito, & ubi recrementum pessum ierit, mutato uase, in craterē melle illitum recondito. Cæterū rosas quæ antea pressæ fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadran te spissati olei, iterum premito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias usque, quartasq; perfusiones infundens exprimere uoles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium unguentum. Sed quoties id feceris, uasa melle oblini debent. Si uerò secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum, numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas iniijcto, manibus melle præmadefactis, agitans premito. & iterum, tertio & quarto, simili modo exprimens facito. totiesq; recentis rosas detractis unguibus immittito. fiet enim ita oleum multo ualidius. nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. præluin melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet, nam si minimum quid relinquatur, unguentum corrumpet. Alij autem detractis unguibus, rosas tantum oleo macerant in sole, hoc modo: Rosæ quæ sili- bram pondere æquant, in sextario olei diebus octo madescunt, & usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salem, quo minus oleat\*. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus utile. Porum soluit aluum, stomachi ardorem refringit, ulcera caua replet, & mulcet, quæ cacothe uocantur. ulceribus

\* Alij, corrumpatur.



ceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur. caput dolens eo perfunditur. dentes inter initia doloris collui prodest. ad genarum duritias illitum efficax est. ad laessitā interanea & concitatas uulvas utilissimē subijciatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Paulus Rosaceum sic construit: Rosarum rubearum exungularum per diem unam naturalem exsiccatarum unc. 3. olei omphacini sextarium unum: obstrue diligenter uas ne expiret, expone soli per quadraginta dies: reponetque non super pavimento, sed tabula. Alij non soli exponunt, sed in puteo ponunt: alij fodiunt sub terra quadraginta dies. Arabum modus in butis olei compositione hoc die officinis usitatus mihi melior uidetur. Habet uirtutem frigidam & stipticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimus est.

## Elatinum.

## Cap. XLIII.

**F**racta elate tusa & scarificata, in labellum deijciatur. omphacinum oleum tri duo infunditur, mox per sportulam exprimitur. uerū pares esse debent utriusq; portiones. dein mundo uase ad usus reconditur. Viribus rosaceo proportionē respondet. aluum tamen non mollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ελάτη, tencellum palme germen secundum Galenum, iuxta Dioscorid. ipsum fructus tegumentum, πῶδι κέλυμα καὶ ἡγερωτ. Secundum Hirschium, prima palme germinatio. de eo longius & certius in historia palme paulo post.

## Melinum.

## Caput XLIII.



**M**elinum hoc modo temperatur: Olei congius, decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijciatur elatæ palmarū fractæ quadrans, & iunci odorati uncia, quæ die uno macerata coquantur, mox in uas oris patuli oleum excolatur, & indita arundina cea crate, aut uetusta tegete, cotonea mala superponuntur, & uestimentis operta tantisper inhibi resident, dum malorum uires ad se oleum alliciat. Aliqui cotonea, decem dierum spa-

cio operimentis inuoluunt, ut cōtineatur odoris suauitas, nec euanescat. postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleūq; reconditur. Id uim refrigeratoriā & astringentē habet. Contra scabiosa ulcera & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectū prabet. exulceratis uuluis infunditur. citatam urinam sistit infusum. sudores cohibet. contra cantharidas, buprestim, pinorū erucas, bibitur. Laudatur maximē quod cotonea mala olet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Magnus est hoc in uentris fluxibus. Paulus μελιτρον uocat, & hunc modum componit: Cydoniorum bene deterforum & cum suis corticibus incisorum accipit unc. tres, olei omphacini sextarium unum, exponit soli diebus quadraginta.

## Oenanthini compositio. Cap. XLV.



**O**enanthe ē labrusca, optimē olens postquam emarcuit, deiecta in omphacinum oleum mouetur, uoluiturq; & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore oenanthen refert.



*Oenanthe vitium sylvestrium germen una cum floribus Galeno appellatur, ex quo succedentibus diebus uua fit: plura in ipsius Oenanthæ historia et pictura.*

## Teleni componendi ratio.

## Caput XLVI.



**F**Oenigræci libræ quinq; calami libra una, cypiri libræ duæ, olei libris nouem, septenis diebus macerantur, quotidie termouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro calamo cardamomum substitunt, & cypiri loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato scenumgræcum macerantes exprimunt. Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit. omnibus uuluarum duritijs magnopere conuenit. sceminis difficile parientibus subijcitur, ubi præcretis humoribus loci siccitatem contraxerunt. sedis inflammationes lenit. tenesmo subditum prodest. ulcera capitis manantia furfuresq; expurgat, ambustis & pernionibus addita cera proficit. uitia cutis in facie emendat. pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recens, quod non uehementer scenigræci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum iudicatur.

## EXPLICATIO.

*Hoc unguentum à Silicula, id est, scenugræco nomen habet, in Telo insula etiam Menandri temporibus celeberrimum.*

## Sampsuchini compositio.

## Caput XLVII.

**S**Erpylli, casia, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro uiribus ipsorum coniectione, unâ tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium uires non euincat. hæc post quadriduum exprimuntur. denuò noua alia, similimensura & æquali tempore macerata premuntur, ita enim ualidius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro uiridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfactoriam, extenuantem, aduersus uuluarum præclusiones, conuersionesq; efficax est. menses & secundas & partus extrahit. uuluarum strangulatus recreat. lumborum inguinumq; dolores lenit. sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem uehementi astrictione locos indurât. lassitudines illitum discutit, in opisthotonicorum, uulsoforumq; cataplasmata utilissimè additur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Maiorana, Amarakus, Sampsychus. Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen antarcinum à Sampsuchino cur diuersum sit Dioscoridi, doctè mihi Musa coniectare uidetur, ex plantæ huius appellatione consuetæ utriq; regioni, in qua utrumq; id unguentum fiebat laudatissimum.*

## Ocimini compositio.

## Cap. XLVIII.

**O**Cimum oleum fit ut cyprinum: Ocimi folia decerpta librarum undecim & bessis pondo, die noctuq; uiginti olei libris macerato, premito, colato, cumq; exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium, nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spacio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici, sed illo modo melius. Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

NOMI



## LIBER PRIMVS.

31

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ocimum oleum fit ex ocimo aut oximo si manus ab *ὄξω*, quod redolere significat, herba odora, quæ nunc Basilicon dicitur. Germanice Basilien.

## Abrotonini compositio. Caput XLIX.

**O**lei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito, quod si in longum tempus oleum uelis asseruari, eiectis prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit, ad uulua duritias, præclusionesq; efficax est, menstrua & secundas pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Abrotoninū oleum corpori infricatum, rigores circuitu remeantes per sanat. Abrotani historiam & picturam quere lib. 3. cap. 25.

## Anethini compositio. Caput L.

**O**lei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, maceratas in oleo die una, manibus premito, & recodito: quod si iterum perfundere uelis, recentes anethi flores consimiliter madefacito. Vuluarum duritias emollit, uenarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur. calfacit enim, & lassitudines discutit, prodest articuloꝝ doloribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hic Dioscorides pro lib. 8. & unc. 9. olei, ponit florum lib. 11. unc. 8. exponit soli diem unum, dein de exprimit & reponit. Ego tamen non uideo quo pacto olei illa mensura tot florum sit capax. Presertim cum Paulus accipiat comedisse per unum diem unc. 1. pro Sextario,

## Suisinum. Caput LI.

**S**uisinum, quod alij liliū appellant, sic temperatur: Olei libras nouem cum quincunce, calami libri quinque & quadrās, myrrhæ uncia quinque, permixto odorifero uino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & celesti aqua madefacti libras tres & semis macerantur, premunturq; tres libras cum semisse spissati olei assumuntur, mille lilia decerptis folijs, in latum, non tamen profundum, labellum demittitur: iniectum oleū, manibus melle perunctis agitur: die noctuq; coquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo incerni oportet, non enim, ut rosaceum, moram tolerat, nam concalfactum feruet & computrescit: quare sapius decapulandum, uasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes uasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quafillo in labellum transfusis, rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur: tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo & sale, & manibus melle madefactis. Longè optimum erit quod prius exprimitur, secundum quod sequitur: tertium locum sibi uendicat quod nouissimum prodit, denuò in mille lilia euulsis folijs expressum primò oleum infunditur: tum eadem ratione prosequendum, idemq; faciendum ut prius, addito cardamomo, dein expresso: & quo frequētius recentia lilia maceraueris, eò ualidius unguentū efficies. Deniq; cū factum abudè uidebitur, singulis cōpositionibus miscere cōuenit myrrhæ quā optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta: croci uerò & cinnamomi partes portiones tunduntur, & cribratæ in lutram cum aqua demittuntur, expressumq; primò unguentum infunditur, & paulò post excipiuntur uasculis siccis, myrrha aut gummi antea perfusis, & croco, melle & aqua madefactis. eadem sunt in altera aut tertia expressione: aliqui simplex ex balanino, alioue oleo, & lilijs componunt. Optimum esse constat in Phœnice, mox Aegypto factum. Sed cum pri-

C 4



mis laudatur quod lilia redolet. Excalfacit, emollit, uulua præclusiones, & collēctiōnes aperit, utilissimum ad muliebria mala, ulcera in capite manātia, feruidas eruptiones, uaros, furfuresq; emendat, uibices cicatricesq; celerrimē ad colorem reducit, ita ut sæpe fallant in summa extenuat, potum bilem per aluum extrahit, urinam ciet, sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Susinum quod σῶσινον & λεπίτιον Græci uocant, diuersum ab eo est quod lilinum officine nominant, quum præter lilia & oleum multa alia eius compositionem constituent. Σῶσινον σῶσινος, hoc est compositum, sic conficit Paulus: Olei sex. 3. Calami aromatici lib. quinq; myrrhæ unc. 1. Cardamomi lib. 3. σῶσινος lilij exungulorum & diem unum expansorum, lib. 10. Cinamomi unc. 3. croci semine. Primo infunde in uino myrrham & calamum per dies quinq; mouendo ter in die: post coque cum oleo donec uinum ferè consumptum sit. Secundo cardamomum aqua infunditur, & ter in die mouetur, & similiter coquitur per horam unā cum oleo. Postea auferentes cardamomū, oleo puro imponimus tertiam partem liliorū, & post tres dies, priore ablata, addatur alia tertia liliorū pars, & interim post tres dies hac amota, additur ultima tertia pars cū croco resoluta, & post tres dies oleo puro addimus cinamomū contusum, et reponitur. Idem Paulus in cōpositione simplicis Susini accipit unc. 2. foliorum, & sextarii olei, ut in Rhodino, & exacte obturat ut non respiret, perq; tres dies exponit soli: abieclis dehinc folijs alias unc. duas apponit, & iterum exponit soli per alias tres dies.

## Narcissinum.

## Caput LII.

**N**arcissini olei spissamenta ita fiunt: Sex libræ asphalathi cum sextante tuni duntur, olei eloti libræ septuaginta cum uncijs quinq; assumuntur. Asphalathus aquæ inadefactus in tertia olei parte coquitur: quo exempto, calamus quinquæ libris & besse adijcitur, cum myrrhæ gleba contunditur, cribrataq; ac uino ueteri odorato immista decoquitur, simulac autem cumijs efferbuerit, eximitur, refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quamplurimi conijciuntur, qui bidui spacio, ut in susino dictum est, permoti exprimuntur. Oleū subinde decapulandum, siquidē celerrimē putredinem sentit. Valet hoc ad emolliēdas uulua duritias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius lib. 21. cap. 5. & 19. item Dioscorides lib. 4. cap. 142. narcissi duo genera faciunt, licet à Theophrasto & Apuleio non nisi unum genus constituatur: nisi ex floribus diuersitate duplex eius genus facere uoluerint. Est autē planta narcissus, cōgener aut saltem similis lilio. quare quidā ipsum nō minus quā liliū lirion uocant, ut tradit Dioscorides lib. 4. cap. 142. ubi de narcisso plura.

## Crocinum.

## Caput LIII.

**C**um crocinum componere uoles, prius olei, ut in susino diximus, spissamenta facies, eisdem ponderibus & mēsuris, cuius olei libras treis & semissem, croci unciam unam assumes, identidem quotidie moueto, & sexta die quā hoc assiduū peregeris, oleum à croco colis incernito: eidem croco parem olei modum adijcito, moue triduo\*, dein contusæ myrrhæ atq; cribratæ drachmas quadraginta permisceto, & in pilo agitatum recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinum imbuto in crocini compositione utuntur. Optimum est quod abundē crocum spirat, in medendi usu expetitur. Proximum quod myrrhā refert. Calfacit, somnum allicit: quare persæpe phrenitici subuenit, perfusum, aut naribus admotum, aut illitum, pus mouet, ulcera purgat, contra uulua duritias atq; præclusiones, & ulcera quæ cacoethe uocantur, prodest, cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: concoquit enim, emollit, humectat, & permulcet, ad oculorum glauцитates ex aqua illinitur. Huic autem proportionē respondent butyrum, onychinum & styracinum, quæ etsi nominibus distant, uiribus & compositione cognata sunt.

\* Alij, dieb.  
tredecim cō-  
tinuis.



## EXPLICATIO.

Crocini oleum hodie neglectum quamuis ab authore Luminis inter uulgata & commoda olea recensetur, diuersum tamen ab hoc, quia alia arte utitur quam hic.

Ex unguento crocino fit crocomagma, expressis aromatibus & in massam coactis, quare uiribus inter se non multum distant.

## Cyprini spissamentum.

## Caput LIII.

**O**lei omphacini elori pars una, aquæ celestis tantundem cum semisse, cuius una parte oleum diluitur, altera adijciendis odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra una, cardamomi libris tribus & dodrâte, olei libris nouem, & uncis quinque. Asphalatus tufus & aqua affusus decoquitur in oleo, donec conferuescat. myrrhæ autem uino uetere odorifero subacta, contususque simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto asphalatho immittuntur, & ubi efferbuerint, sublato ahenò, oleum percolatur. Cardamomum tufum reliqua aqua aspersum infunditur, spatula agitatur, nulla, dum refrigerit, interpellatione. Post hæc colato oleo, in uigintiocto libras olei, floris ligustri, quod cyprum uocant, sex & quadraginta libras cum besse instillantur, quæ sufficienter madefactæ per sportulam exprimuntur, quod si copiosius desideretur, idem recentium florum pòdus iniectum simili modo prematur. & iterum aut tertio, si quis uelit, madefacere poterit, & ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomum addunt. Calfacit, emollit, ora uenarum adaperit, uulua neruorumque uitis conuenit: pleuriticis, fractisque per se uel cerato immistum. malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantibus, inflammationibusque inguinum opitulatur. item in a copā adijcitur.

## EXPLICATIO.

Cyprinum oleum Arabes oleum de Alcanna uocant, quod enim Græcis Cyprus, Arabibus Alcanna est, ut Manardo placet, hodie non conficitur. Possidonius alio modo parabat, ut tradit Paulus Aegineta.

## Irii spissamentum.

## Caput LV.

**S**pathæ quamminutissimè contusæ sex libras cum besse, in tribus & septuaginta libris & quincunce olei, aereo uase, additis decem aquæ heminis incoquito, quoad odorem acceperit. postea in capulam melle oblitam colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primo temperatur, iride ex oleo inspissato macerata, ut scripsimus. Sed alia est componendi ratio: In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami, ut dictum est, contusi, libras quinque & sextantem excoquito. postea detracto xylobalsamo nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhæ glebam uetere uino adorato perfusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidem tufæ iridis, binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè & uehemèter adstringito. quod si uis ualidius fieri, par pòdus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est quod solam irin olet, quale est in Perga Pamphiliæ, & Elide Achaia natum. Vim habet calfactoriam atque emollientem, crustas adimit, sordida ulcera & putrida purgat. confert fœminis uulua caufariis, item inflammationibus eiusdem atque præclusionibus. partus eijcit, hamorrhoidas recludit, contra aurium sonitus ex aceto, ruta & amaris nucibus, prodest. diuturnis destillationibus, naribus illitum, & contra graueolentia earum ulcerum, quas ozanas uocant, auxiliatur, aluum purgat cyathus epotus. facit ad ilei cruciatum. urinam mouet. difficileis uomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immissis, uel his quæ ad uomitum ciendum induntur. angina etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur. item contra arteriæ scabritiam datur his, qui cicutam, coriandrum, aut uenena fungorum hauserunt.

EX.



Alio modo nunc parant officina: esset nunc magnarum uirium si bene pararetur, ut Dioscorides tradit.

## Gleucinum.

## Caput LVI.

**G**leucinum absolute constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celti ca nardo, spatho, aspalato, fertula campana, costo, & musto, circumdatis interim uina eis uasi, quod aromata, uinum & oleum conceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit, horrorib. & neruorum uuluaq; uitij auxiliatur, omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

## EXPLICATIO.

Γλεῦκινον Latini sonat musteum, hodie exoletum, eius constructionem monstrat Galenus lib. 7. comp. medic. γλ' γέν. Calfacit & quouis acopo ad emolliendum utilius. Galenus proprium Gleucinum, quo usus est, habuit, cuius descriptionem uide loco iam citato.

## Amaracinum.

## Caput LVII.

**A**maracinum longè optimum in Cyzico fieri solet ex omphacino & balani no, spissamentis ex ylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, cōditisq; amara ci, costi, amomi, nardi, casia, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quod preciosius fiat, cinnamomum addunt. Mel autem & uinum assumuntur, hoc in uasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinū calfacit, soporem mouet, uenarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit, putrilaginibus ac fistulis perquam utile: nec non humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quæ theriomata uocant, rumpit: difficili urinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, uulua subditū menstrosus cursus euocat, duritias, ac uulua tumores discutit, uulneratis neruis, musculis confert, laneo centunculo modicè madefactum & impositum.

## EXPLICATIO.

Ex hoc loco quidam probare uolūt amaracū & Sumpsychem diuersas esse herbas quandoquidem de Sampsuchino & Amaracino unguento seorsum scribit Diosc. sed falluntur, Dioscorides enim, distincta fecit capita, quod non sit eadem compositio, sed diuersa.

## Megalinum.

## Caput LVIII.

**F**actitabatur olim Megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est: cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed refina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Refina unguentis, neq; tutelæ neq; uoluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum desinat olei re: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de refina disseremus.

## EXPLICATIO.

Megalinum oleum etiam Dioscoridis tempore exoleuerat, ut ipse inquit, ante sua tempora alioqui amantissimū. Galenus scribit Mendesiū quoq; Megalinū appellari, ut plura in explicatione Mendesi.

## Hedychroum.

## Caput LIX

**Q**uod hedychroon uocant, in Co fieri solet, eisdem præditum uiribus & misturis, quibus amaracinum, sed suauius spirat.

## EXPLICATIO.

Hedichroi descriptionem quam Dioscorides hic reliquit, inquit eandem eius uim ac præparatio nē esse, quæ amaracini est unguenti. Galenus habet tū lib. 1. de Anidosis ex Andromachi uer sibus, tum ad Pijonem ex Magni traditione. Habet autem & eā Aëtius. 13. cap. 89. & Paulus 7. cap. 11. uariantibus



tibus tamen paululum inter se descriptionibus. Apparet itaq; hedichroi usum nō solum in Theriaca quondam fuisse, sed etiam unguem loco usurpatum esse, & oxenī odorī gratia illitum à Galeno, Sicut etiam pulmonis per odorem resiccandi gratia, cuiusdam se idem exhibuisse refert locorum affectorum. 4. sine. Quia gratia etiam medicamentis ad sumum comparatis inditum fuit.

## Metopium.

## Caput LX.

**F**It in Aegypto unguentum, quod metopion patrio nomine appellatur, propter galbani missionem: nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion uocant: constat amaris nucibus, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, uino, myrrha, balsami femine, galbano & resina: probat pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham, quàm galbanum respiciat: Calfacit uehementer, & adurit, atq; extrahit, ora uenarum aperit, ulcera purgat, extrahitq; ad præcisos neruos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est, ceratis & malagmatis inseritur: horribus, conuulsisq; præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, utile habetur. sudores ciet, uulnū spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat, in summa, moliendi naturam habet.

## EXPLICATIO.

Metopium ex Galbano unguentum, ut Dioscorides ipse testatur, sic dictum ab ligno ex quo defudat. de lacryma metopij uide plura lib. 3. cap. 79.

## Mendesium.

## Caput LXI.

**M**endesium constat balanino oleo, myrrha, casia & resina. Aliqui tamē post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compēdio, nam quæ simul ex cocta non fuere, uim nullam exhibent. Similem metopio uim obtinet, sed inferiorem multo.

## EXPLICATIO.

Mendesium unguentum quo modo fieret docet hic Dioscorides & Paulus lib. 7. cap. 18. meminere eius etiam Plinius. Mendesium dictum est, quod in præfectura Mendesium in Aegypto inuentū esset, & laudatissimum fieret, atq; hoc est quod Paulus lib. 7. cap. 18. ait: ἀπὸ τῆς πόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῇ πόλει τῇ καλεομένη Μένδεσι. Id est, dictum est Mendesium, propterea quod in Aegypto inuentum sit ubi etiam Mendes nutritur. Quamquam ego pro τῆς πόλεως legendum putem οὐκ ἔστι, id est, colitur. Est autem Mendes hircus, itemq; Pan deus, Aegyptia uoce ac lingua uocatus, quem hirci effigie Mendesium uenerabatur, ut etiam ipsi inde appellationem inuenerint, uelut apparet. Hypocrates porro rōuinum Mēdeum sepe probat, quod non à Mēdesijs in Aegypto, sed Thraciæ urbe Mendæ appellata nomen inuenit. At uero Galenus lib. 2. cap. 2. de comp. pharm. part. Mendesium etiam Megaleum uocari dicit, utroq; cognomine à Megalo accepto, qui scilicet Mendesium patria fuerit. Sed & Aegyptiū idē à tota regione appellatum est. Dioscorides Megaleum suo tempore defecisse suprā dixit & aliud à Mendesium fecit.

## Staete.

## Caput LXII.

**S**Taete uocatur pinguitudo recentis myrrhæ, cum exigua aqua tusa, & origano expressa. Ea per quàm odorata, ac preciosa est: atq; unguentum per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur quæ nullam olei missionem admittit, cuius minima portio compos est uirium plurimarum. Vim calfacētoriam myrrhæ & calidis unguentis respondentem habet.

## EXPLICATIO.

Officina styracem liquidam uocant. Huius sex styrax rubra dicitur Arabum familia.

## Cinnamominum.

## Caput LXIII.

**C**innamominum confit è balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate conditur, quæ



quadruplaq; myrrha ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adhi-  
tur. Laudatur non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odora-  
tum, gustu perquam amaro. Id non à resina, sed myrrha, crassitudinem obtinuit.  
resina enim neq; amaritudinem præbet, neq; ullam odoris gratiã adijcit: uim ha-  
bet admodum acrem, amaram, & calfacientem. Itaq; ora uenarum aperit, calfa-  
cit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, contra uul-  
uæ uitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est: ita enim terè multum a crimo-  
niã exolefcit, & quãdam emolliendi uis contrahitur, alioqui adurit, & præ omni-  
bus crassis unguentis indurat, facit mirum in modum ad fistulas & ulcera, quæ pu-  
tredinis uitium senserunt: item ad hernias humidiores, carbūculos, febrium hor-  
rores, tremores, gangrenasq; cum cardamomo: aduersus serpentium morsus illi-  
nitur, scorpionum & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

*Cinamomi unguenti Dioscorides hic sanè elegantiè præparationem ostēdit: quam tamen facere non possumus, quum uero cinamomo careamus. Sed si etiam cum uulgari paretur, erit satis utile.*

## Nardinum.

## Caput

## LXIII.

**R**atio nardini faciendi uariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq; autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamen-  
ti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum,  
myrrha, balsamum. Laudatur tenue, non acre, nardi aridæ aut amomi odorē re-  
ferens. Vis ei extenuans, acris: expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit.  
Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit  
etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo & nardo.

## EXPLICATIO.

Foliatum unguentum ex malabathri folio, quod ipsum etiam peculiariter folium appellatur, com-  
positum fuisse atq; appellatum satis cōstat ex Dioscoride, qui diuersa capita facit, quanquã Plinius lib.  
13. cap. Nardinum & foliatum appellet. Cuius rei causa ex hoc loco Dioscoridis elici potest, ex eo sci-  
licet quod nardinum unguentum tum cum folio tum citra folium malabathri apparari scribit, & mox  
capite sequenti de malabathrino unguento prodit eadem esse eius spissamentum quæ nardini, nisi quod  
plus myrrhæ in ipsum additur. Porro spicatum, à spica nardi quoq; nominatum, ex eaq; compositum  
fuisse nemo dubitat. Fuerant itaq; diuersa unguenta, Nardinum ex optima nardo, spicatum ex nardi  
spica, & foliatum ex Malabathro, quorum ingenia precia Romæ tempore Galeni fuerunt, sicut etiam  
apud Plinium uidere est indicatum. Ceterum Galenus unguentum nardinum lib. 1. cap. 2. de comp. ph.  
part. 1. ter simpliciter nardum uocat, atq; id etiam genere foeminino. habet enim, *μῆλα ναρδου τῆς ἀ-  
γῆς*, id est, cum optimo nardo, & mox *τῆς δὲ ναρδου μῆλα* & *μῆλα ναρδου*, id est, liquefacto cum nardino. &  
rursus, *ἡ γὰρ ἡ ναρδὸς καὶ ἡ μῆλα ναρδου*, id est, cum myrrho aut nardino uti: quæ modum  
loquendi etiã hic Dioscorides usurpauit de nardino unguento, ita loquēs: *ἀνθρακὸς δὲ αὐτῆς λεπτῆς  
τῆς δὲ μῆλας*, & cæt. Et mox *ἡ γὰρ δὲ ἐστὶ ναρδὸς γλοιώδης*, id est, liquidum est, & non strigmento-  
sum. Nam de ipso nardo hoc intelligi non potest, & Tibullus poëta,

*Iamdudum Syrio madefactus tempora nardo,*

*Hoc est nardino unguento. & Horat.*

*Nardo uina merebere. Nardi paruus onyx elucet cadum.*

## Malabathrinum.

## Caput

## LXV.

**M**alabathrinum spissamenta nardini habet: insuper myrrhæ plusculum ad-  
ditur, qua de causa calfacit, crocino, aut amaricino uiribus respondens.

*Malabathrinum siue foliatum dictum à Malabathro. uel potius nardus piscifera illa, cuius Euangelis-  
tae meminerunt, si Barbaro credimus, hodie peregrinum & exoletum.*

## Iasminum.

## Caput

## LXVI.

*Hoc caput  
non putatur  
esse Dioscor.*

**A**pud Persas fit, quod Iasminū cognominatur, ex albis floribus uiolæ: quo-  
rum sextans, in Italicum sextarium sesamini olei demittitur, uiolis, ut in  
lilino diximus, uicissim permutatis, Apud Persas inter epulandum usurpatur  
odoris



odoris causa. Nam toti corpori conuenit, præsertim cum in balneas descensum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, laxationemq; desiderant, grauius enim spirat, quam ut libenter à plerisq; recipiatur.

## EXPLICATIO.

*lasminum, iasme, uel iosma, frutex topiarius in Gallia hortis colitur. Græcum nomen subolet, licet ueterib; ignotū fuisse uideatur, ut Ambonio Musæ placet quia Serapion in cap. de Zambac, siue Sam bac, siue lasmin, authores Græcos non citat, quod argumenti genus tamē ualidū non est, quū quandoq; ille idem auctor de aliquo simplici medicamento commemorat, de quo antiquiores quidem Græci mentionē habuerunt, tamen eos ut illius rei ignaros præteru: quandoq; uerò illos citat, cum tamen nulla sit in eorum, quæ apud uos sunt, cōmentarijs, memoria. cuius igitur æstimandum est laseminū uiolam Dioscoridi innotuisse, cum hic Iesminum siue lasminum unguentum describat, ab ea uiola sic cognominatum, quemadmodum etiam Hermolaus annotauit: tamen si nonnullas esse sciam antiquorum compositio nes, quæ ab aliquo simplici medicamento cognominari uidentur, in quas tamē nullum huiusmodi immutatur, de hac re plura in sequentibus.*

## Myrrha.

## Caput LXVII.



**M**Yrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis, è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes: alia circum caudicem concre scit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis, qua expressa, stacte emittitur: alia gabi rea, pinguis sima, lato & pingui solo nascens, ea copiosam sudat stacten. Omnium prima est quæ trogloditica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. quinetiam le gitur tenuis\* quædam, quæ à trogloditica secunda est, bdellij modo mollis, uerum odore grauiuscula, apicis nascens. Alia caucalis cognominatur, præter modum exolet, nigra, & retorrída. Omnium deterrima quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummis imaginē uergens, & uiribus eius proxima, improbatur aminea cognomine, ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguib; pingues, & odoratiss; siccioribus haudquaquā pingues, & inodorati minus odore\* quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squalore obfusa, leuis, undique concolor, quæ contracta uenas unguium modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs, superuacua & inutilis est ponderosa, coloris piceo. Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccat, astringit, uulnam emollit, & præclusam aperit, menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorum cremore, uel succo rutæ admota, tuberculo fabæ deuoratur in uetere tussi, orthopneæ, in laterū pectorisq; dolorib; in alui pro fluuiio, & dysenteria. horrores discutit, duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua, subdita linguæ liquataq; scabritiem arteriæ expollit, obtusam uocem expedit, uentris tineas enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus alarum tedia, cum liquido alumine illinitur, gingiuas & dentes stabilis, colluto cum uino & oleo ore, uulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carni bus, item purulentis auribus inflammatisq; cum meconio, castorio, & glaucio: ad uaros aurem cum casia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluen tes capillos cum ladano & uino myrteo illita, firmat, diurnas destillationes le uit, illitis pinna naribus, oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem læuigat, fit è myrrha, perinde atq; thure, fuligo, & ut postea ostēdemus, ad eadem conueniens Bœotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Bœotia nascentis. Melior est quæ myrrham odore repræsentat: uis ei calfactoria inest, emollit, discutitq; suffimentis commodissime inseritur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *συγγα, μύρρα*.

Latine Myrrha appellatur.

Officinis nomen retinet.

Germani Myrrhen.

Galli Myrrhe uocant.



- Lib. 5 simp.** Myrrha est arboris Arabice lachryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentie, multa amaritudine, terget potenter, tamen sine exasperatione, imò lenit: digerit non ignauiter, sed extra rofionem.
- Lib. 1. 6. cō.** siccatur ualde, tamen sine astrictione: coquit modice etiam prauos humores, & præter naturam habentes:
- ph. part. &** qua ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitas medicamentose
- 1. c. ph. gen.** absurditas odoriferis superetur, tamen ea tutius auferri potest. Myrrha rubra Acluario, ομύρρα ῥοῦ
- Lib. 1. ius-** ἀνδρῶν, Myrrha uerax eidem. Eligenda recens, squalore & situ obducta, leuis, tota cōcolor, & quæ
- dem.** confracta candidas unguum modo uenas, & leues ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata,
- Lib. 9. cōp.** ut Dioscoridi placet. Quapropter colice Paccij Antiuchi pauca myrrha miscetur, quæ odorem tan-
- ph. part.** tummodo præstet. improbatum ἄμιννα nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur Troglotyris, quæ
- Lib. 6. cōp.** & Minea dicitur à regione ubi præstantissima gigni affirmant. Ea gratissimi sit odoris, et nulli uicia
- ph. part. &** taliquore (ubi Minea, uelut bis lib. 9. comp. ph. part. legitur, ἄμιννα, uidetur eadem quæ Dioscoridi
- lib. 1. Amid.** Aminea improbatum) adulteratur enim gummi macerato aqua, in qua myrrha maduerit, ut Dioscorides tradit. Vera enim est rara inuentu, præcipue sincera: nam in optima myrrha opocalpason inuenitur ab optima myrrha diuersum, ut in Galbano sagapenū, in casta cinamomum, & horum aliquid medium, quæ à se inuicem discernere is solus potest, qui sepe ea obseruat, adeo ut ex una sepe solanota internoscatur. Nam Sagapenum ex Galbano odoris hircini speciem retinet: non habet autem propria tcm odoris cuiusdam, ut propriè dictum Sagapenū. Tamen in hoc Sagapeno & congeneri Galbano parua est differentia ad medicamenti compositionem. Ambo enim cōueniunt, qui aduersantur uirulentis & deleterijs: sed Galbanum minus Sagapeno. At opocalpason lethale est intra corpus sumptum: ob id sua etate multos periisse scribit Galenus usu myrrhæ, quæ opocalpason habebat, à nonnullis de indusia mistam myrrhæ, ut eam redderent laudatissimam. Nam sic mista, collirijsq; indita, pus citra rofionem discutit, ac interdum suffusionem incipientem substantia tenuem, siue ceratum, siue emplastrū, siue aliud medicamentum myrrham opocalpaso mistam recipiens oculo iniicitur. Myrrha igitur officinarum omnino adulterata parum tutus est usus in sumendis.

Styrax.

Caput LXVIII.

**S**tyrax lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur fordescens, flavus, resinofus, albicantibus grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens: qui dum mollitur, melleum liquorē reddit, qualis è Catabalis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, furfurosus, friabilis, canoq; situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummi similitudine, perlucida, & myrrhæ emula, uerum per pauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam uermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, flagrantissimis solibus cum styraçe subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua uermiculos exprimunt, uenundantq;. Styraçe hūc, quoniam in uermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognominat, quem tanquam syncerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem acer admodum est, qui adulterationis uitio caret. Styraçe calfacit, emollit, & concoquit, medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ uoci, uulnæ præclusæ duritiæ laboranti conuenit, citius menses potu appositūq;, aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur, miscetur utiliter discutientibus malagmatis, acopisq;. adoletur autem & igni torretur, ut fiat ex eo, uelut ex thure, fuligo, ad eadem conueniens ad quæ thuris fuligo, ex eo etiam in Syria styraçinū oleum contponitur, quod calfacit uehementer, & emollit, uerum caput dolore afficit adgruatq;, & soporem adfert.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Στόραξ. Latini Græcum nomen retinuerunt.

Officina perperam uocant storacem calamitam.

- Lib. 8. simp.** Styraçe lachryma est arboris Syriacæ, calfacit, mollit, coquit, tusses, catharros, coryzas, brachomenses autem mouet sumptos & adnotus. Styraçis drach. unam misceat Andromachus arteriacæ 13. lib. 7. comp. pharm. part.

- Lib. 1. Ant.** Adulteratur multis modis Dioscoridi: sed ab eo præscriptis notis dolus deprehenditur.
- Styrax cala-** Styraçe iniiciendus theriacæ, qui ex Pamphilia in arundinibus affertur, hic autem paucissimus est, mites. Et tanto discrimine à copioso hac Styraçe variat, quantum salernum nimum ab eo, quod in tabernis



uenditur. Tamen illius penuria. huius accipe quod calidissimum & odore & gustu ualidissimum est. Lib. 5. simp.

Styrax, ut crocus, myrrha, quantitate sunt deleteria: nam largus pota quædam dementant, quædam cap. 18. mentem auferunt, sed mensura apta alijs mista iuuant.

Στυράξ αρώσιον, id est, Hispanum cognominatur Aëuario in Trochisco Neapolite.

## Bdellium.

## Caput LXIX.

**B**dellium, alij bolchon appellant, alij madelcon, lachryma est saracenica\* arboris. Probatum gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, in tus pingue, liquescens facile, ligni ac fordis experts, suffitu odoratum, ungui simili. Est etiam nigrum bdellij genus iordidum, nigrum, uberioribus glebulis in offas conuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi: sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem representat, nec usque adeo suffitionibus odoratum, calfacit & emollit duritias, & turgentia guttura, humidasque hernias discutit, cum ieiuna salua diluta, uulua spiracula laxat appositum & suffitu. & partus humiditatesque omnes extrahit, calculos potu cominuit, urinam mouet, tussientibus, à serpente percussis, utilissimè datur, ualet ad rupta, uulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus, malagmatis inferitur, quæ contra duritias & neruorum nodos profunt, contusum resoluitur affuso uino aut aqua calida.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Βδέλλιον. Latini bdellum arborem & ipsius lachrymam uocant Græca appellatione, quo nomine & Germanis & Gallis cognita lachryma.

Bdellium lachryma est arboris Saracenica, calfacit, mollit et coquit, discutit mediocriter. Scythicum est acrius, resinosius ad emolliendum efficacius. Arabicum autem è petra delatum resinosum, liuescens, dilucidius, magis siccans quam emolliens, nisi recens et humidum sit, et quod tundendo facile mollescat, id enim idem pollet quod Scythicum. Tertium Indicum addit Dioscor. sordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum. Optimum uero est, ligno, cortice, sordibus carens, ut taurinum glutem translucens, ob id bdellium clarum dicitur lib. 8. comp. pharm. part. quo libro Damocrates, in quarto malagmate Bdellium onycha appellat optimum bdellium, & quod incensum ac suffitum onychis Indicis eochilij teste odorem referat. tale hic Dioscorides optimum esse dicit: Nimirum ut ipse inquit, ἐν δὲ τῷ ὄνυχῳ τὸ δυνάμιος ὡς δὲ οὐχὺς, hoc est, odoratum in suffitu similitudine onychis. Atque sic sanè lib. 2. de antidotis in Charmidis amido, ex eodem Damocrate, à Galeno citatur, hoc uidelicet uersu. Βδέλλιον ὄνυχον τὸ δὲ δυνάμιος ὡς δὲ οὐχὺς, id est, Onychasque bdellij cape drachmā lucidi. Et paulo post lib. 10. de comp. pharm. part. cap. 2. in Fabulla malagmate, Βδέλλιον ὄνυχον ἔστι. B. habentur, hoc est bdellij onychis lib. 2. ut onychis uox quasi appositio sit, declarans optimi bdellij speciem. Poscit tamen fortassis æquè rectè Damocratis uersus sic legi: Βδέλλιον ὄνυχας τὸ δὲ τὸς συνήγας, id est, Onychasque bdellij partes aluminum. Sed in Græco exemplari ita expressum habetur: Βδέλλιον ὄνυχας τὸ δὲ τὸς συνήγας, ut genus tantum uocis ὄνυχον sit mutatum, τὰς ἰσες enim, ὄνυχας dictum est, quasi ἢ ὄνυχον æquè ut ὄνυχον dicatur, quod tamen uelut ad Βδέλλιον foeminiuum genus relatum, accipiendum uidetur. Verum utro horum posteriorum modorum legas, ambiguitas & suspicio oboritur, ἐν ὄνυχας uocem non ad hanc quam ex Dioscoride ostendi, odoris similitudinem referendam esse, sed ad similitudinem ὄνυχας unguis, ut uidelicet unguis bdellij indicari accipiamus, atque sic sanè Marcellus Dioscorid. locum hunc interpretatus est, nempe ἐν ὄνυχας ὄνυχας, humano ungui colore simile uertendo, fortassis ex Plinio inductus qui lib. 12. cap. 9. Baetiano inquit, nidor siccus, multiq; candidi unguis, quasi ex Græco reddidisset, τὸ δὲ βακτηριανὸς λεῖος ἔχει καὶ αὐτοὶ λεῖοι ὄνυχας, quod tamen minime credo aliquem Græcum scriptorem sic prodidisse. In hodierno certè pharmacopolorum bdellio nulla similitudo ad unguem cōspicitur, ad onychem uero aromaticam Indici conchilij testam, bdellium accensum odoris similitudinem habere libentius crediderim, & eius rei periculum etiam facere possumus, si onychem aromaticum haberemus. Nam quæ Blattæ Bytantia uulgo appellantur, ut infra audies, dubium apud me est an ueri onyches existant, qui apud Dioscorid. libro sequenti describuntur: sicut possibile est etiam bdellium officinarum non esse sincerum, ut certum ex suffitu utriusque experimentum facere non queamus. Sed tamen ego penitus nullam aliam sententiam Dioscoridis uerborum esse opinor, quam eam quam à principio dixi, atque ita etiam Galeni locos à me citatos accipiendos.



Thus.

Caput LXX.



**T**hus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagnias appellatum, suapte natura rotundum. tale autem indiuiduum est, candidum cū frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicū uero fuluescit, & colore liuet, sed rotundum industria factitant: nam in quadrangulares formas dissectum fictilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. uerum huiusmodi thus tempore flauescit, quod aram aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multo & fuluius. Est & genus aliud, cui ammittæ cognomen est, alioqui candidum: quod dum molliuit, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi: quod faciliè deprehendi potest, siquidem suffitum gummi flammam non eiaculatur, & resina in fumum euanescit, thus uero statim ardet, idem maleficium odor prodit. Ad calfaciendum & astringendum pollet. oculorum caliginem discutit, caua ulcera complet, & ad cicatricem perducit. cruenta uulnera glutinat, infrenatq; cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cerebri membranis effluat, ulcera quæ cacoethe uocantur, & sedis & reliquarum partium permulcet tritum cum eo & lacte linamentum, formicantes uerrucas inter initia, impetiginēsq; ex aceto & pice illitum, tollit, ambusta igni, pernionesq; cum suillo adipe aut anserino, & ulcera in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat. paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice, medetur. ad reliquos aurium dolores cum dulci uino infunditur. inflammata à partu mamma cum cimolia & rosa cœo magna utilitate perungitur. additur ad arteriæ uiscerumq; medicamenta. prodest sanguinis excreationi potum. sed in secunda ualitudine haustum insaniam mouet, & largius cum uino potum interficit. In fictili mundo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur, post perfectam uestionem operire oportet usq; dum restinguatur, sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mentione mox ostendemus. alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguedinem uaporemue emittat: faciliè enim comminuitur quod perustum non est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λίβαρος.

Latine thus arbor lachrymam sibi cognominem fundens. In Officiis Latinam appellationem seruauit.

Germanis Weyrauch.

Gallis Encens &amp; labre dencens, dicitur.

Thus est lachryma Arabice arboris, calidum ordine secundo, sic ut primo, modicè astringit, tergit imbecilliter, coquit phlegmonas, acrodyon est & sarcoticum, cicatricem remouet, emplastrum temperaturam iuuat, acris mistum uehementiam illorum obtundit, pus mouet, quia calidum emolasticum, nullam eminentem astringendi uim sortitum, præcipuè pinguius & albus. Nam flauius siccat magis.

Primatum tenet in thuris genere masculum, quod λίβαρος ἀρρεπ Αἰθuario dicitur, suapte natura rotundum, indiuiduum, candidum, cum frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens. Dicit autem Dioscorides naturaliter rotundum, quod Galenus lib. 8. cap. 10, comp. pharm. ἀσφοδίου uocat in quodam Aristarchi medicamento, nam sectum de industria rotundum fit, nimirum cum quadrangulæ figura sectum ac in figulinum coniectum, tandiu obuoluitur, donec rotundum fiat atque hoc ὀψιμοῦ appellatur, illo deterius, ut contrariæ appellationis. Dicuntur hæc genera etiam θυμῶν & ἄλκυων.

Thuris



## Thuris cortex.

## Caput

## LXXI.

**P**Ræfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lauis, minimè scaber, sine membranis. Adulteratur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant. thuris uerò cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporemeiaculatur. thuris modo uritur, & uis eadem quæ thuri, sed ualidior astringentioreque. Quare potu cruentis ex creationibus, uuluis fluxione laborantibus, in pello confert. ad cicatrices oculorum, & caua fordesque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

## EXPLICATIO.

Cortex thuris insigniter astringit, siccatur ordine secundo, crassiorum est partium quam thus, minimam habet acrimoniā, ardet igni cum odoris fragrantia.

## Manna thuris.

## Caput LXXII.

**M**anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini refina ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquè suffitu aërium uaporem, sed fuliginolū & impurū expuit, & permistum sua uolentia halitus uirus habet.

## EXPLICATIO.

Mannam, seu mannum thuris (ut lib. 9. comp. ph. part. bis leges) propriè uocant micas thuris ex magnis fasciculis concussis elisas, à thure leuigato diuersas. Nam fragmenta quædam exigua corticis thuris et manna inhereant, à quibus exiguum quiddam astrictionis assumptis, qua differt à thure, quippe quo magis astringit, amen etiam coquit, ut Galenus lib. 1. comp. pharm. part. & lib. 13. Meth. Dioscorides hic mannā albam puram et granulosa probat, ita enim ἐχον δὲ οὐδὲν accipio. Verum uim eius remissiorem thure facit, cuius contrarium ex Galeno ostendi. Gal. lib. 3. cephalicum medicamentum aridam recenset. Sed lectio corrupta est in Græco exemplari, legitur enim ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, quæ res fecit ut interpretis uerterit. Componitur ex iride, & aristolochia, & eruo, & thure et manna, id est, cortice thuris: gemino errore, propter unicam syllabicam tantum particulam admissa. pro manna enim thuris primum thus per se uertit, & mox etiam eius mannā adicit, cui cum apponeret, corticem thuris per eam significari, errorem alterum incidit, Mannam corticem thuris interpretando, cum micas aut grana oportuit, aut mannā simpliciter ut Græci, dicere, sed ita interpretatus est ut corticem tantum à thure diuersum aliquid, in medicamentū addi indicaret, quum intra ipsū thuris eiusque micas nihil differre putaret. At uero ipsum thuris solum, aut eius adeo mannā in hoc medicamentum coniijci debere ex præcedentibus & sequentibus apparet. Quod autem alterum pro altero interdum insurpet, ex lib. Meth. 5. patet, ubi ait, καὶ μάννην δὲ αὐτὴν ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, est δὲ συγχεῖται καὶ ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος. Quod uero ad carnem gignendam illo loco thuris mannā potius quam ipsam thuris indicari ex 5. Meth. ad finem hæc uerba indicant. καὶ τὸ ἐξ ὧν αὐτὴν τὸν μάννην αὐτοῖς τοσοῦτον καὶ ὁ δὲ ἄλλος δὲ ἄλλος, Sorbonius porro Largus mannā thuris sepe numero pollinem thuris appellat. Paulus uerò lib. 3. cap. 22. de cicatribus & albuginibus oculorum μάννην appellat etiam μάννην, atque ita etiam Aetius uocat serm. 12. cap. 44. in fine.

## Thuris fuligo.

## Caput LXXIII.

**F**uliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in nouam fictilem ollam concauam imponito, & aëreo uase in medio perforato, deterfa diligenter forde, obtegito. alteram admoueto, ex altera eius parte aut utraq; subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat. si urantur, & qua locus capax fuerit, glebularum alias supponito, & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficiens fuliginem uidearis coëgisse. Continuo tamen externæ æramēti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cineribus admisce-



# DIOSCORIDIS

tur. Derasa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. idem opus, quoad satisfactum tibi uidebitur, obeundum. Oculorum inflammatione mitigat fluxiones suspendit, ulcera purgat, caua explex, carcinomata fistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

## EXPLICATIO.

Alium modum querendi thuris fuliginem, uide apud Vitruium de architectura, nescio tamen an aliquibus hodie in usum sit, plura in annotationibus nostris in cap. 80. huius libri de fuligine liquida picis.


### Picea & Pinus.

Nux pini.

### Caput

Nux pini.

### LXXIII.



**P**INUS & PICEA generi eidem ascribuntur, sed quendam flagrant specierum distinctione. arbores uulgo cognita, quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, ulceribus summum corpus occupantibus, am bustisq; cum spuma argenti & manna, ulcera delicatulorum acrimoniam recusantium, cera to myrtino exceptus, ad cicatricem perducit.

tritum cum sutorio atramento serpentina cohibet. suffitu partus & secundas enicit. potus aluum fistit, urinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt uulnera ab inflammatione uindicant, trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent, hepaticis utilia sunt, drachmae pondere in aqua aut mulsapota. Pineae nucis cortex & folia potu idem praestant. Teda earum particulatim secta si in aceto coquantur, & decocto deus colluatur, dolores leuat, ex his etiam fit spatia acoporum pessorumq; compositionibus idonea, quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur, ea circumlitionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mentiuntur, calliblephara Graeci uocant, arrosis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pinnorum picearum fructus, qui in conis inueniuntur. Vini astrictoriam habent, & aliquid quantum excafacientem, tussi & pectoris utrius auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Noces pineae cum repurgatae maduntur, aut cum passo aut cucumeris semine bibuntur, urinam cient, acrimonias in renibus & uesica heberant, stomachi rofiones leniunt, data cum portulacae succo, uirium infirmitatem roborant, coruptorum quoq; humorum labem obtundunt. Pineae noces integre receter arboribus decerpae in passo franguntur, & decoctae, uetusti tussi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pinus Graece πεύκη. Germanice Lyn forchen/ arben/ bringt sencht zweffen/ so man pineen Fennen nennet. Gallice ung pin uocatur. Piceam Graeci πύκνυ. Germani Rott dannen ut quibusdam uidetur, alijs eyn Sicht dannen. Galli ung abre du genre du pin appellant. Pinus arbor uulgo nota, non nisi à uertice ramosa, folio pectinum modo dissecto promissoq; acmulo aculeato, conis lignosis frequenti nucamento in turbinata effigem copatilibus, in quibus nuclei singulis cameratis toris incluse. Officinae pineas, Germani pincen Fennen. Galli corix au pomes de pin appellant, sunt magni usus in Officinis.

Pice



LIBER PRIMVS.

Picea uero larici simillima est, folio breui, sete proximo, crassiore tamen duroq; ut cupressis, immortali uiret: ad laricis uero comam colliso, rariore, sicciore, tenuiori; ac magis argenti: rami statim a radice modici, uelut brachia lateribus inherere, materia abieti proxima, freques in Alpibus. Cocti; uisitur, fundens resnam thuri; q; eo similem, ut pro eo sepe fallat, & odor ad est non ingratus. Galli du garipot uocant. Nucces pineis similes sed minores, ut & arbor tota pinu humilior graciliorq; Pinus et picea, ut scribit Dioscorides, eide adscribuntur generi: sed quandā flagitant specierū distindione: sic aut differt a pinu picea, quod pinguior ac tenuior folio est, quodq; minus alta, minusq; recta quā pinus adsurgit: præterea & conū minorē ac magis argenti, nucleos quoq; resina persusos obinet. Viriq; folium capellamenti modo prætenue, ac breui seta uillosum, crassiore, durāq; seu cupressis. materia candida & abieti similior. Pinus uilis radicibus non repullulat. Picea repullulat, ut in Lesbo uideisse Theophrastum scribit, incenso Pyrrhei montis nemore, quod pinis seatebat.

Lentiscus.



Cap. LXXV.  
**L**entiscus nota arbor est, cui uis inest astringendi. semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatae infunt uires. Liquamentum autem ita fieri solet: Folia, cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abunde cocta refrigerataque sunt, folia abijciuntur. aqua denud coquitur. donec mellis habeat crassitudinem. Lentiscus sua adstringendi dote, ualet aduersus sanguinis reiectiones, aut ui profluuia, & dysenterias in potu. item contra eruptionem sanguinis e uulua, & eiusdem aut sedis proidentia. In totū acaciae & hypocistidis uicem representat. idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fortitaua explet, & fracta ossa ferruminat. uuluarum fluxiones sistit. nomias arceat. urinam pellit. motus dentium collutione stabilizat. Virentes surculi calamulorum uice dentibus repurgandis affricantur. Fit e semine oleū, quod prodest cum quid astringi opus est. Lentiscus resnam gignit, quae lentiscina cognominatur, & ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguinem reiicientibus, & tussi ueteri. stomacho auxilia tur, sed ructum mouet. additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. palpebras oculis incommodas replicat. manducata halitus oris commendat. gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio provenit: Praefertur nitedulae modo resplendescens, & candore Tyrrenicae cerae similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stridorem ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris, resinaq; pineae nucis mistura.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè Ξύον. Latine Lentiscus. Officinis incognita. In Germania non provenit.

Galli Lentisc; & Resringe Monspeuli uocant.

Arbor est roboris magnitudine, forbi folio, terebinthi odore, acinis syluestris punicea rubentibus ubi maturuerint nigris, tamen per dum coquuntur rufis. Fertur & alia iunipero similo.

Lentisci baccas schinides appellant Hippocrates.



Resinam lentiscus ubiq; sudat, mastichem uero dictam in Chio tantum insula ferè, Officiu Græco & Latino nomine cognita, Germanis & Gallis mastix appellata. Parum astringit, siccatur sine morfu, calida & sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maxime partium, stomachi intesti-  
norum, hepatis imbecillitati & phlegmone prodest. Laudatissima & copiosissima est Chio insula (unde Galeno Mastiche Chia passim dicitur) affertur.

## Terebinthus.



## Cap. LXXVI.

**T**erebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadē ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus eius aptus est, sed stomacho aduersatur. ex calfacit. urinā mouet. uenerem excitat. contra phalangiorum morsus conuenienter in uino bibitur. Resina eius ex Arabia petræa defertur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Aphrica & Cycladibus insulis. sed praualet candida, perlucida, uitreo colore, & in cæruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete. has sequitur è picea & pineis nucibus resina. Natura omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. tussi ac tibi conueniunt per se, aut in eglemate ex melle. uitia pectoris expurgant. urinam cient. cruda concoquunt. uentrē emol-

nunt. palpebras commodissime replicant lepras tollunt. cum ærugine ac futorio atramento, nitroq; auribus saniem emanantibus cum melle & oleo. item in pruritu genitalium utiles. malagmatis, a copisq; admiscuntur. laterum doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Τέρευνθος. Latine Terebinthus.

Officina ueram Terebinthinam non habent, nam ea qua hodie passim utuntur, resina est piceæ ac Teda.

Germanis quoque & Gallis hodie incognita, uulgarem Terpentini & Gloriet, Galli Termentini appellant.

Terebinthus arbor cuius picturam damus, iuxta Monspe sulum nascitur. Pudis appellata.

Terminthos arbor circa idam Macedoniamq; breuis, fructuosa & contorta: in Syria uero magna et copiosa decoraq; materia lenta, nigra, lauri penè folio, oleæ flore, sed puniceo, baccis primū herbaceis, mox rubris, & tandem maturitate nigrantibus, magnitudine fabæ, resinosis, sulphureosis, et ra dice ualida in profundum acta. Fert & folliculos emittentes quædam animalia ceu culices, lentoremq; resinofum, qui ex cortice erumpit, Pulvis Τέρευνθος Græcis dicta, hoc est, Terebinthi resina, cetera rum præstantissima, astringit manifestè, sed minus quàm mastiche: emollit autem magis, coquit, digerit. qualitate subamarâ, & partium tenuitate terget angustos meatus uasorum, & in eis osculorum obstructions liberat, ob id putredinem prohibet, aut finit: et hepaticis probè miscetur, è profundo potentius trahit quàm cetera resine. Hæc aluum citra noxam soluit & uiscera omnia, iccur, lienem, reas, pulmonem abstergit. Terebinthina Resina omnis ex Chio insula est præstantiss. & odore & gustu ceteris præcellit. Chia igitur semper atenda, si haberi potest. Huius penuria Libyca, Pontica, & ex alijs regionibus optima est miscenda theriacæ & alijs medicamentis: non autem libyca, tanquàm omnium præstantissima cum Andromacho. Præstantior est alba, uel cærulea, uel colore uiri, perlucida, odorata & Terebinthum plus referens, qualis quæ ex insulis Cycladibus affertur: ob id Chiam quoq; Terebinthinam laudat Galenus. Minus laudata Cypria, Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica, Libyca tamen ut dixi laudat Andromachus. Nunc Cypria Venetijs commendatur. Quæ autē pro Terebinthina resina uenditur, aut Lauricæ est, aut Abietina, ut supra monuimus.

Resinæ



## Resinæ alia.

## Caput LXXVII.

Larix.



**L**iquida resina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet: atque olim à Colophonie petebatur, hinc Colophonie sibi cognomentum uendicauit. A Gallia quoq; subalpina, quam uernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi ueteri. Colore inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, ut larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem potest. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neq; diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea & abiete resinæ cæteras antecedunt: odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ e picea, nucibus pineis & cupressu manarunt, nihil ad illas, nec tantis uiribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quo,

si & ille sumi solent. Lentiscina terebinthine respōdet. Vritur resina omnis liquida in uase quadruplæ capacitatis ad humore qui infunditur. itaq; resinæ cōgius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis: resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat: ceterum ubi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum uocant, id est, non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoleatur, quò faculenta sordes exernatur. Vrantur quoq; sine aqua, primum lento igne, & ubi coire cœperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox ut dictum est, reponuntur. Aridas unius diei spacio decoxisse satis est. Vtæ odoratis malagmatibus, & acopis, & unguentorum colorationibus magnopere utiles sunt. E resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur, prodest glabris genis, collachrymationibus, erosisque oculorum angulis, ex ea fit atramentū scriptorium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Resinæ inferiores Terebinthina in digerendo & attrahendo sicut pinea, Hartz von forhen, Strobilina, hartz von Stelin baum, picea, von rot donnè oder fichten, abietina dennhartz, laricea von lerch donnè, Cyparissina von Cypress baum.

Resinarum mitissime sunt Terebinthina / Venedischer terpentin (nostra Laricina & Abietina officinis, sed insipitis partibus præstantior) Larix vnser gemeiner terpentin / oder hartz vom lerch donnem.

Resine Terebinthine larix propemodum similis, est ob id illius penuria hac usendum, illa autem per omnia est melior quàm Colophonia, & quæ Phrygie dicitur.

Resine siue larix siue Terebinthina uocata aduersus ulcera maligniora magis ualent.

Koloponia κλω τωσλω in emplastro epulotico duæ uocatur, paulò post peritula appellatur.

Strobilina resinarum longè calidissima, & celerrimè siccans omnium moderatissima est, utraque qualitate Terebinthina.

Pitynon, Phrygema priuatim dictum, genere etiam resina est, multò minus calida & sicca quàm strobilina.



strobilina, media harum calore Abietina, liquida tamen diu durat, ut Colophonia, thus redolens, odore suavi ut abietina medietate, quæ à nonnullis sola dicitur Colophonia, nascitur admodum medica, ob id est preciosa.

Resinæ siccatae pinguis experte sunt: ob id emplastra bene adherere non possunt, ut in scorse & liquida.

Humidissima est Larix altera: est enim Resina Larix dicta duplex, una Terebinthina omnino similis, altera calidior, liquidior, odoratu grauior & ingrator, gustu amarior, acrior, mordacior.

Quare satis est terebinthinum omnibus medicamentis ulcera recte curaturis miscere, in quibus curandis præcipuus est scopus non mordere.

Τερμινθίνη τερεβινθίνη, retorrída Lib. 8. comp. ph. part.

Arborum partibus præsertim truncis à germinatu incisæ & scarificatis resinas elicimus.

### Pix liquida.

### Caput LXXVIII.

**P**ix liquida, quam alij conum uocant, è pinguiissimis pini piceæq; lignis congregatur. Optima est splendens, syncera, læuis. Contra uenena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. tonsillarum & uulæ inflammationes, anginæq; utiliter perunguntur. purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium moribus. adiecta uerò pariter cera scabrosos ungues extricat, impetiginesq; emendat. uulæ duritias ac sedis tubercula disecurit: cum farinaq; hordeacea & pueri impubis urina decocta, strumas rumpit. cohibet ulcera quæ serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. ceterum cum thuris manna & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat. rimis sedis & pedum magno auxilio illinitur, ulcera replet, & cum melle purgat. quin & cum uua passa & melle carbunculos, & putrida ulcera emarginat, disrumpitq; erodentibus medicamentis, quas septas uocant, probè immiscetur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Κόνυμ Gaza Conum transfert. Marcellus uerò nucē pineā interpretatur, ut accipit Dioscorides, alijq; ueteres greci. Galenus autem Conon arborem appellat, fructu eius, hoc est nucem κοκκαλον, & σπόβιον. atq; hoc pasto apud Paulum accipi debet.

Accensis arboribus resinosis, ut pina, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit pix liquida, cui post supernatat pissanthum tenui consistentia, & facultate est astringente, ob id caniciem sine ulla noxa tardat. Vt pissaleon, id est, pix liquida cum oleo mista.

Germanicè Schiffbech, dōrr.

### Picinum oleum.

### Caput LXXIX.

**P**ice fit quod pissaleon appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates, alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitum: quibus pix medetur. iumentorum ulcera scabiemq; emendat.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Pissaleon, hoc est, oleum picatum, Galenus uocari in Asia dicit oleum cum liquida pice permixtum, quod ipsum neq; hic Dioscorides, neq; Paulus neq; Plinius, ubi depissaleo agunt, uolunt: sed pissaleon seu oleum picinum uocant id quod in pice liquida serosum superstat, & quod dum pix coquitur, pura supra tensa Luna excipitur ex sublato uapore. Verum hoc ipsum Galenus ad superioris differentiam, non pissaleon uocari dicit, sed pissanthos, hoc est pici florē. & Paulus lib. 3. ca. 74. ὀπποπίσας idem appellat, hoc est pici serum. Scribonius autem largus cap. 40. ait: pici florem, quod pissaleon appellant. Sic etiam Marcellus cap. 9. Galenus cap. 6. libri primi de comp. ph. r. part. extra compositionem, πίκας ὀππας ὀππας dixit. Sic etiam Aëtius 6. cap. 69. ὀππας inquit, ἀπὸ πικρῆς σαρκὸς Ἰσθμίου καὶ λευκῆς καὶ πίκας ὀππας μίξας ἐπιχρεῖ, id est, sulphur, unum & staphidem silues stem terito, & pici sero permixta illinito.

### Fuligo



## Fuligo liquida picis.

## Caput LXXX.

**F**it hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernâq; fictili uase in clibani specîe conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent: operito, & adoleri finito, consumptoque liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginē collegeris. Vis ei astringens, a crisq; usui est ad pigmēta quibus palpebras liniūt & uenustāt, & ad circūlitiones, item ubi glabris pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymososq; oculos: insuper ad eorundē ulcera nō inutilis est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Λυγρός*. Latine fuligo. Officinæ latinum nomen usurpant. Germanicè *Rissa*.

Fuligo omnis excicatoria est, ac prinde terrestris est essentia, habens quisdā etiā ignis quæ materiā cōbūsit, reliquias, sed id pusillū est. Porro tota natura terrena est, tenuiū partium. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, ea pro ista materia eueniunt: ex acriore & calidiorē, tali etiā proueniente fuligine, ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine proueniente. Primum enim thuris fuliginē utuntur in oculi larias medicinas mista, eas uidelicet quæ ad oculos etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atq; etiā cum fluxione uexantur, & ulcera habent: nā & illa expurgat, & carne implet. Ad hec usurpant quoq; eā ad facultates quas uocant ealliblepharas. Præterea Terebinthina myrrhæq; fuligo molestia caret nō aliter quam thuris: sed Syriacis quodāmodo uiolentior est: magis etiā picis liquida, quæ etiā magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad uitia superciliorū uocata ptula, & erosos oculorū angulos humidosq; circa phlegmonē. At mollioribus mitioribusq; tum ad hec, tum ad ea ad quæ competere possunt superius diximus, thuris fuliginem.

## Pix arida.

## Cap: LXXXI.

**L**iquida pix decocta in spissam coit, quā uocāt aliq palimpissam, q̄n genere quodā uisci modo lentescit, boscas cognominata, altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturā habentes. Calfactoriā uim habet. dura emollit. pus mouet. tubercula panosq; discutit. ulcera replet. uulnerarijs medicaminib. cōmodè permiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur ueteribus Græcis, sicca adeo, ut puluerizari possit: qualis est græca, etiā Colophonîa, & Hispana, & Gallica dicta *πικρα* *Sp̄ra* lib. 8. comp. par. p. & hic Dioscoridi probatur et Lycia. Est etiā Dioscoridi ex ijsdē arboribus resina liquida & sicca. Pix arida Germanicè *Gricktschbedy* / *Spiegelhartz* / *Geigenhartz* / *gesottē hartz* / uulgo dicitur.

## Zopissa.

## Caput LXXXII.

**Z**opissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam aliq apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet. quoniam marino sale macerata fit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Zopissa uocatur, ut Dioscorides quoq; testatur, derasa nauibus maritimis pix, efficacior omni pice & resina traditur, ad omnia quibus ille profunt: uidelicet adiecto salis callo. Optima à tyrociniā nauū eraditur cera nauibus, marino sale macerata. Additur in malagmata ad discutiedas collectiones.

## Bitumen.

## Caput LXXXIII.

**B**itumen Iudai cum cæteris anteponitur. Cuius probatio est, ut purpuræ mordospendeat, sitq; ponderosum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & sordidum, uitiosum est. adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus innatans, quo utuntur ad lucernatum lumina, olei uice: Hallucinantur qui id Sicili cum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Asphaltos hic aut hæc, lib. 1. antidorum Galeni, id est, bitumen, uerum est nigrū & splendens: cum aquis innatat, molle: cum siccatum est, pice sicca durius efficitur. calfacit, siccatur ordine secundo. Optimum est ex mari mortui, stagno salso in Celosyria.

Vero asphalto, id est, bitumine in officinis caremus. Possumus autem ipsa mumia loco ipsius uti.

Nam in



Nam in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturq; postea. Diuites aut Mirrhæ, aloë, croco, balsamo, alijsq; id genus conduntur. Sed cum propter illam hominum partem quæ secum admiscetur, inualidius necessario, ac deterius multo reddatur, longè melius nobis fuerit, eo omisso, aut picæ sicca uti, cū eisdem fere polleant facultatibus, aut petroleo, quod ex agro Siculo ad nos importatur, hoc ex inter Bituminis genera hic quoq; connumerat Dioscorides, quam Arabum Mumia, quæ licet ex bitumine, & alijs rebus conficta sit: credendum tamen est uitium potius attraxisse ab humi corporis situ, & putrefactione, et proprias uires, aut omnino, aut multum earum perdidisse, quam nouas ex eo & ad medicinam præstantiores acquisuisse, neque ita potente esse ut antea, in excando.

## Pissasphaltum.

## Caput LXXXIII.

**N**ascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunijs montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstusq; in littus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Pissasphaltus est Mumia Serapionis.

## Naphtha.

## Caput LXXXV.

**N**aphtham uocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spacio protinus in eam transiliant. Ad suffusiones oculorum, & abugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur. uuluarum prociencia, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu emendat. comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatæ lapidis more. purgationes mulierum cum uino & castorio potum elicit. tussim ueterem, & anhelitum adiuuat. serpentium moribus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur. datur celiacis in catapotio deuorandum. cum acetato potum, discutit sanguinem concretum. dysentericis cum ptisana liquatum infunditur. destillationibus suffitione medetur. mitigat dentium dolores oblitum. cæterum pilos in commodos siccum replicat, specillo impositum. concalfactum autem & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagris, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest, Pissasphaltos eadem quæ pix & bitumen, si misceantur, potest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plutarchus in gestis Alexandri Magni scribit. Peragrata uicta q; omni Babylone quæ armis & imperio eius sine labore subito cesserat, nihil e quæ eum regem admiratum fuisse, quàm in Ecbatanis, sic enim regionis eius pars quædam uocatur, ubi scaturit naphtha, sic enim scribit, τὸ τῆς χάσματος τοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐν τῇ βαβυλωνίᾳ ὅπου περὶ ἐκ τῆς οὐλῆς αὐτῆς ἀναφύεται, καὶ τὸ ὄνομα τῆς ἀφῆλης ἐστὶν ἡ χάσμα. Quorum sensum si querat aliquis, hic est. In Ecbatanis autem admiratus præcipue est ignis ueluti ex fonte contineuë emergentis hiatus, & Naphthæ ex eo fluxum, qui non procul ab hiatu illo tanta eructatur copia, ut paludem faciat, cuius adeo ad trahendos ad se ignes tam facilis natura sit, ut ex interuallo &c. De naphtha Strabo libro 15. meminit, cuius uerba adijciam. Liquidum bitumen quod uocant naphthā, admirabilem habet naturam. Nam adiunctam ignem illi corripit, & si corpus eo illitum igni admo-ueris, deflagrat, nec aqua ullo pacto extingui potest, sed magis ardet, nisi ualde multam superinfuderis ceno, & aceto, & alumine, & uisco oppressum extinguitur. Vnde Alexandrum tradunt, experientie gratia, puero cuidam, balneo Naphtham inspersisse, ac lucernam admouisse, ut puer totus deflagrasset, nisi circumstantes multa aqua flammam euicissent.

## Cupressus.

## Caput LXXXVI.

**C**upressus refrigerat, & astringit. Cuius folia ex passlo & exiguo myrrhæ pota, uesicæ rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. pilulæ autem ex uino tuscæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibuntur. earū decoctum eosdem præbet effectus. tuscæ cum fico duritias emolliunt, nariumq; polypo medentur. in aceto coctæ & cum lupinis detritæ scabros ungues eijciunt. hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices



Cupressus.



culices abigere existimantur. folia trita & imposita, uulnera cōglutinant. sanguinem supprimunt. capillum ex aceto tingunt. illinuntur per se aut cum polenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis & oculorum inflammationibus. admota cum cerato stomachum corroborant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κύπρεος. Latine Cupressus.

Officinis Pila siue fructus cupressi, nomine nucis cupressi tantummodo cognitus. Germanicè Cy-pressen nuss.

Galli Cyprez appellant arborem, fructum uerò noyx de cyprez.

Didymus cupressos duplici nomine uocari solitas memorie prodidit, charitas, quod oblectamentum nobis sint, & cyparissos à partu parilium ramulorum & fructuum, & αὐτὸν πύργου, hoc est, quod ex aequo & ramos & fructum creat.

Cupressus proceræ arbor est caudice oblongo ac tereti, folio pini, sed carnosiore, amaro, nec ita pungenti. Fronde indecisa, odore uehementi. Semen conis innascitur prætenue, exile, & quasi laticis fructui proximum. quod pilula sua satiscite labitur. rara materie & macilentæ radice per summa cæspitem uagante.

Cupressi pilula quæ etiam Coni quibusdam dicuntur, unde Conifera Cyparissi, Verg. siccant ualenter sine insigni calore aut acrimonia: ob id hæ molles & recentes ulcera magna in duris corporibus glutinant, enterocelas iuuant.

B.



## DIOSCORIDIS

Resina è Cupressu manat, qua cum res sunt uncta, à carice uindicantur.

Est et coacta breuitatis si ut ex, quem chamæcyparissou, quasi pumilam cupressum uocant, horti familiarē, hunc ab odore formag; foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris Cupressen, uelgo nomenclamus, quod in genere sit pumilionum, et quasi Cupressi uideretur abortus, folio incano et peregrino. Sunt qui Chamæpytin, alij uerò qui adonium esse putent, quasi abrothoni speciem: tamen si Nasonis flos adonij purpureus est, huic uerò aureus. Pollet aduersum omnium serpentium scorpionumque uenena, ex uino potum, sed de ea alio loco in sequentibus per amplius.

### Iuniperus.

### Caput LXXXVII.



**I**uniperi genera duo, altera maior, altera minor. Utraque acris est, ex calfacit, & urinam mouet, ac censa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonnunquam grandescere, aliæ nucē Ponticam æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mādēdo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, baccæ iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt & astringunt, stomacho utiles, contra pectoris uitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur. urinam ciunt, unde ruptis, cōuulsis, & uulnæ strangulati subueniunt. folia acrimoniam habent, ideo tam ipsa quàm eorum succus ex uino contra uiperarum mor-

tus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit, ramensæ ligni deuorata interficiunt.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀρνέυδος, ἡ Ἀρνέυδης. Latine Iuniperus uocatur.

Officinæ Latinam appellationem retinuerunt.

Germanicè Wecholtz, Krametbeer, id est, turdorum grana uocantur, quod fructibus eius turdæ pinguescant.

Galli arborem Geneure, baccas uerò grain de geneure appellant.

Iuniperus latine dici uidetur, quod iuniores et nouellos fructus pariat: sola enim ferè arborū sætuo suos in biennium prorogat, qui ne mature scunt quidem, nouis superuenientibus.

Iuniperi fructus calidum ordine tertio, siue primo: sed folia calida sicca gradu tertio.

Iuniperi gummi nec Dioscorides nec Galenus memorant, fortè quod ad nihil sit utile, ut Actuarius, Plinius. Subit uerò mirari, cur medicis hodie Arabas secutis, Sandaracha uocetur, et suffitibus propè omnibus misceant fluxiones à capite prohibentibus, cum sit calidum, et plantæ ipsa etiam umbra, non solo uapore sit gravis.

Vernigo dicitur Hermolao, uernix uulgo, quod rore uerno magis concreseat. Scriptoribus in usu est multo et pictoribus.

### Herba Sabina.

### Cap. LXXXVIII.



**S**abina duorum generum est. Vna folijs cupressifolia similis, spinis horridior, grauiter olens, acris & feruens. arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. huius folijs nonnulli profuitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigant, & cum melle nigritas sordesq; repurgant. carbunculos cum uino pota rumpunt. sanguinem per urinam eliciunt, partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant, unguentis calfacientibus immiscetur, & priuatim gleucino.

NOMI.



LIBER PRIMVS.  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βεῦδος ἢ Βάγυδος.  
Latine Sabina, uel Sauina.  
Officinæ Latinum nomen seruant. Germanis Seuenbaum / palmbaum / Seuenpalmen.  
Gallis Sauinera & du sauiet, dicitur.  
Pasim in hortis nascitur. Tertij est ordinis excalescentium & desiccantium, & ex numero co-  
rum quæ uel maxime tenuium sunt partium.

Cedrus.

Cap. LXXXIX.

**C**edrus arbor magna est, ex qua picæ colligunt, quæ cedria uocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum magnitudine, rotundas. Cedria optima myrti est crassa, perlucida, grauis odoris, quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea uis inest ut defuncta corpora conseruet, & uiuentia corrumpat. quæ ex causa mortuorum uitam, aliqui appellauere. uestimenta quoque & pelles eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. magnâ ad ocularia medicamenta usus. quippe illita oculis claritatem affert. albugines cicatricesque detergit. instillata autem cum aceto, uermes aurium necat. cum hyssopi decocto infusa, sonitus sibilosque sedat. cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat. idem facit cum ex aceto colluitur. peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat. anginae ea perunguntur. tonsillarum inflammationibus auxilio est. lentes pediculosque illiti enecat. cerastæ moribus cum sale imposita subuenit. contra hausta leporis marini uenena, in passo sumpta. auxiliatur. in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit. pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, persanat. uermes & tineas subter indita necat. & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria separatum, dum coquitur, uelleribus supra halitum eius expansis, ut in pice, eiusdem ad omnia usus. priuatim uehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, hominumque persanat. inhaerentes ricinos enecat. ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus uocantur. Calfastoriam uim habent. stomacho aduersantur. auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ. menses ciunt, ex polline piperis poti. contra haustum leporem marinum in uino sumuntur. serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandem quam picea fuligo uim præbet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κέδρος. Latine Cedrus. Officinis incognita.  
Germanicè ein Zederbaum. omnino peregrina arbor.

Gallis Cedre.

Cedrus præterquam nomine, omnino ferè ignota est, ut pote alibi quam trans maria nasci solens. Optima classibus, nauigijs, & triremibus, neque non domorum tectis: quippe cum ipsi insit eternitas.

Plurima in Cylicia, Syriaque proficit: sed laudatissima in Creta, Aphrica, et Syria montibus, quæ inibi usque eo crassescit (si Theophrasto credimus) ut quinq; hominum complexu cingi nequeat. Dioscorides & Plinius Cedri usum damnant propter ancipitem naturam uiuentia corrumpendi, & defuncta conseruandi: cum uitam auferat spirantibus, defunctisque pro uita sit. ob hoc non censent interius sumendum. Huius tamen diuersitatis rationem perpulchre Galenus inniuit: quia tametsi aduerat, ita ut ordine quarto calfacientium censeretur meruerit, inter omnia tamen erodentia medicamenta, quæ Greci & septica & septas cognominant, infirmissimum esse constat. proinde uiuentibus admodum uitæ calore adiuncto, adsumit uires & quasi accenditur, atque ita iugulat: sed defunctis additum, putrilaginem exterit, & uitiosos humores depascit, quibus detractis corpora à labe corruptionis affert.

Laurus.

Caput XC.

**L**aurus quædam tenui folio constat: altera latiore. Vtraque excalfastoriam naturam habet, & emollientem. unde decoctum earum in muliebres infessus



## DIOSCORIDIS

*Laurus.*



additum, uulua & uescia uitij conuenit. uirentia folia sensim substringunt. illita quoque ac trita uesparij apiumque ictibus opitulatur. eadem cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant, sed pota stomachum effundunt, & uomitiones mouent. Lauri baccae magis quam folia calfaciunt. ergo in eclegmate trita cum melle uel passo profunt tibi, orthopnceæ, & omnibus thoracis rheumatismis. contra scorpionum ictus ex uino bibuntur. utiligines emaculant. succus baccarum utilissimè aurij dolori & grauitati instillatur, cum uino uetere, & rosaceo. in medicamenta autem adiunguntur quæ neruorum lassitudines reficiunt, acopa uocant: & ad unguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radices calculos rumpit. partus necat. hepaticis prodest, tribus obolis in uino odorato potus.

### NOMI. ET EXPLICAT.

*Laurus arbor, Græcè Δάφνη, Lauri bacca, Δάφνη.*

*Latine Laurus arbor, et Lauri bacca.*

*Officina latinum nomen retinuerunt.*

*Germanicè Lorbeerbaum / arbor, bacca uerò Lorbeer.*

*Gallis ung Laurier & le fruct d' ung laurier, dicitur.*

*Lauri folia & fructus calfaciunt, & siccant uehementer, sed hæc magis quam illa: leuiter astrimere hic addit Dioscorides, quam uim & amaritudinem soli radices cortici tribuit Galenus, quæ calculos confringit.*

## Platanus.

## Cap. XCI.

**T**Enerrima plani folia in uino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. uirides pilulæ in uino potæ, serpentium moribus auxiliantur. ex ceptæ autem adipe, igni ambusta sanant, incidens foliorum pilularumque lanugo, oculos & aures offendit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

*Græcè πλατάνος.*

*Latine Platanus à latitudine foliorum dicta.*

*Germanicè Ahorn.*

*Gallice Plaine, dicitur.*

*Officinis peregrina & incognita.*

*Platanus cum adoleuit cubitorum est sexdecim, cortice crasso, fronde uitiginea, longo rubroque pediculo, flosculo pallido, pilulis scabris, lanuginosis, minutis.*

## Fraxinus.

## Caput XCII.

**F**Raxinus arbor nota est, cuius foliorum succus & ipsa peruncta, aut ex uino pota, uiperarum ictibus auxiliantur. corticis cinis ex aqua illitus lepra seximit, ligni ramenta scobemque potu perniciem afferre tradunt.

### NOMI.



# LIBER PRIMVS

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Fraxinus.



Populus.



Græcè Μελέα. Latine fraxinus.  
Officinæ Latum nomen seruant.  
Germanicè etn hschbaum.  
Gallicè Fraissne, dicitur.

Fraxinus arbor est procera, caudice tereti, leuicortice, spisso, tenui, rubro, ramis utrinque pinnatis, folijs lauri, per ambitum leniter serratis, non sine quodam marginis uel cacuminis aculeato callo, porracei coloris, semine minuto folijs ipsi incluso, amaro: radice multa, crassa et sublimi.

Atu facillima fraxinus: semen reddit post uindemiam et arcturum.

Populus.

Caput XCIII.

Potus albæ populi cortex ancix unius pondere, ischiadicis ac urinæ stillicidiorum prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. folia quoque cum uino post purgationes pota, idem præstare produntur. repens foliorum succus utiliter aurium dolori instillatur. pilulæ quæ primo foliorum partu exiliunt, illitæ cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memorix prodiderunt corticem albæ populi & nigrae particulatim casum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos præferre. Populi nigrae folia cum aceto illita magna utilitate podagricis doloribus insinuantur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus utile est. Lachrymam populorum commemorant quæ in Padum amnem defluit, durari, ac coire in succinum, quod electrum uocant, alij chryso-phorum, id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. tritum potumq; stomachi uentrisq; fluxiones sistit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀβύς.

Latinis Populus alba.

Germanis Sarbachbaum / mitt weissen bletteren vnden  
Gallicè, ung Peuplier.

Populus nigra Græcè Ἀχάριος.

Germanicè / Sarbachs baum / poplen baum / Albee baum.

Gallicè, du tremble et peuplier, dicitur.

Populus, ut Dioscorides tradit, duplex, nigra, id est, alba,

et Ἀχάριος Galenus, Ἀχάριος Dioscorides, id est, nigra, ægy. Oculi populi

viā dō, id est, flores, seu σπᾶρτα, id est, pilula, primo foliorum partu exiliencia. Officinis oculi populi. Germanis Albee spross dicuntur, calida primo à temperatis recessu: nam in τῆς τῶς τῶς pulus florebat. Paulus et Marcellus in Galeno legunt: licet in τῆς τῶς τῶς pulus florebat. Neutra potest. beat codex Aldinus, et ita legitur in Arabibus, unde uertit uetus interpret: et Oribasius Græcus mola. medicus libro secundo ad Euenapium, et libro 15, ad Iulianum Cæsarem. Paulo sicciora, quam quod humidum et sicco est temperatum: tenuium partium potius quam crassarum. Folia floribus sunt



similia, sed imbecilliora: & Resina eius exigua floribus similem habet facultatem, sed calidior: semen floribus & resinae siccior, non multo calidius, sed partium est tenuium. Folia λευκός, id est, populi alba media sunt inter folia lauri calidissima, & folia ἀκίον herba refrigerantis Dioscoridi, sic enim libro secundo comp. ph. legendum censuerim potius quam ἀκίον, qui libro 6. simplic. dictus est calidus ordine tertio, etiā si uetus interpres ex Arabibus eo loco habet agni casti. λευκός καὶ ἁγρός, id est, populi alba fructus digerentis est facultatis, ibidem paulo ante.

Gustanti Manardo populum nigram & communem, uisa est modice adstringere, postea minimum, amara, odore non insuauis, sed languido. Ex eius igitur floribus Myracopi siue unguentū populē refrigerat, cum præter adipem & populi oculos modice calida, cætera habeat frigida, etiam magna parte ad supremos usque ordines.

Populus alba temperata ex aque tepida substantia, & terrea tenuata terget: eius flores multum acres nobis sunt, ex hisque uulgo fit unguentum populeum: licet acopum δι' αὐτοῦ apud Galenum & Paulum galeatur, non sicut λευκός.



Succinum seu succina gutta à succo dicta, Græcis ἡλεκτρον, esse lachryma populi albae, uel etiam nigrae quibusdam uidetur, ab eiusdem arboris resina Dioscoridi & Galeno dicta, differens & πυροφόρος, id est, paleas trabens, quoque uocatur, quam uim ei quæ Galenus tribuit lib. 1. facultat. natura. quid tamen esse censuerit, nondum in eo legi. Plinius uero li. 37. ca. 9. Succinū scribit à quibusdam pinei generis arboribus, ut gummi à cerasis excidere autumno, & largum mitti ex Germania septentrionali, & insulis maris Germanici. quod hodie nobis est compertissimum: ad hæc liquata igni ualentiore, quia à frigido intensiore concreuit. pineam aperte olet, calidum primo gradu, sic cum secundo, stomachū roborat, uomitum, nauisam arceat, cordis, palpi lationi prodest. prauorum humorum generationem prohibet.

Germani weiss vnd gelbagstein, & brenstein.

Galli ambra uocant: uulgo in corollis precarijs frequens.

### Macer.

### Caput XCIII.



**M**acer ex Barbaria aduehitur. cortex flauescens, crassus, gustu perquam astringens, qui contra cruentas excretaiones, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Macer hoc loco Dioscoridi est cortex flauescens, seu cum Plinio, rubens, radice magne, nomine sue arboris nobis incognita, crassus gustu, perquam astringens, ex Barbaria allatus.

Galeno autem est cortex gustu multum acerbo, cum leui quadam acrimonia, odorem iucundum redolens, ut pleraque aromata. siccatur ordine tertio, calore & frigore est temperatus. Tamen lib. 6. comp. phar. part. in compositione sicut ποσειδών ad finem scribit, καὶ τοῦ μύδρον μᾶλλον φασὶς τὴν ἀπομυρτίνην ἰσχυρὰς δεξιὰν ἔχειν καὶ σὺ φῶν: nisi causeris aduerbium ἰσχυρὰς transponendum, ut solum determinet σὺ φῶν. Ex Iudæa uero affertur. Macis autem Arabum, cuius picturam damus, membrana est extrema nucem Moschatam propè totam uestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigrescens, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & minimū amaro, tenuium partium, calida siccatur tertio gradu, uentriculum roborat, coctionem iuuat. Ex quibus liquet. Macis & Macer res planè diuersas, licet odore, colore quadantenus conueniant: at temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mendam esse, quod uix queas demonstrare. Quod si res sunt diuersæ, ut ex Plinio aperte patet Macer hodie est incognitum: tamen pro Nicolai Macis Actua rius Maceo reponit.

### Vlmus.

### Caput XCV.

**V**lmi & folia & cortex & rami, uim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. uulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia



Ulmus



tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nati in lori morē flecti potest. craſſior cortex in uino aut aqua frigida unciatim potus, pituitas trahit. fracta oſſa celerius ſolidescunt, ſi decocto foliorum corticis aut radicis foueantur. humor in folliculis enaſcens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemq; ſplēdidiorē præſtat. qui dum ſiccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. folia cum teneſcunt cocta olerum more ad obſonia uſurpantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Πτελίνα.

Latinis ulmus.

Germanis, Ulmerbaum / Rößbaum / Rypfenbaum / Almen / Lindbaſt.

Gallis Orme appellatur.

Proceræſt arbor, folio indiuiduo, lente cre-mato, ſcabro, oblongiore quàm pyro, ſemen racemoſum. in foliis & petiolis gummi producit, & quoddam beſtiolarum genus quod carpis dicunt, materia ſlaua, robuſta, neruata, deſormi, & quæ nihil præter cor habeat, uiridis, caſu ſacilis, ſicca difficilis, apud aquas facilis incremēti.

Lignorū marcor. Cap. XCVI.

**E**X caudicibus lignisq; ueteribus caries congeritur, quæ farinæ mo-


do illita, ulcera purgat, & ad cicatricem perducit. ſerpentia cohibet, ſi cum pari anifo & uino ſubacta, linteisq; impoſita, illinatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignorum caries præſertim ulmi, tumentia purgat ulcera, & explet, Germanicè Worm mel / ap pellatur.

Harundo.

Caput XCVII.



modata. alia craſſa, concava, apud amnes naſcens, quæ à quibuſdam cypria, ab alijs donax appellatur. alia phragmites ſeu uallatoria, gracilis, candicās, uulgo

E 4



## DIOSCORIDIS

cognita cuius tria radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit, luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. uirentia folia tu-  
sa & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. corticis ci-  
nere peruncta cum aceto alopecie sanantur. panicula lanugo si aures intraue-  
rit, exurdat. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis λάρδαυς.

Latinis harundo siue arundo appellatur.

Officinæ Latinum nomen seruarunt.

Germani Ror.

Galli ungroseau uocant.

Arundo principatum in aquaticis fruticibus tenet: Caule confurgit geniculato, tereti ac fistuloso qui mox senescens fissili inarescit ligno, in leue fastigium cacuminato, circa quod densius excreuit to-  
mentum ad faciendas cauponias culcitras nō inutile: folia ex articulis alterno laterum gradu emergen-  
tia, membranæ calamum uestiunt cortice usq; ad medium internodium: hinc enim à cauo alarum sinu  
resupinantur, procumbente languido promistore coma uel panicula ponduscule. Radix quoq; mul-  
tis geniculatur articulis, secunda stirpe, ut quæ etiam uel adusta uel recisa latius numerosiusq; re-  
uirescat.

### Papyrus.

### Caput XCV.

**P**apyrus qua chartæ fiunt, nulli non cognita, præcipuè in medicina utilita-  
tis, ad laxandas fistulas, madefacta lino inuoluitur, usq; dum inaruerit: con-  
stricta enim atq; immissa in hiatus, humore completur, & in tumescendo fistulas  
aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaq; Aegyptij eam mandunt, succum  
tantum deuorantes, & mansam expuunt. ipsis radicibus pro ligno utuntur. Cre-  
mata papyri cinis depascentia ulcera cum omnium partium, tum oris maxime,  
cohibet. uerum melius id combusta charta præstat.

### EXPLICATIO.

Papyrus nascitur in palustribus Aegypti, aut quiescentibus Nili aquis, ubi euagat & stagnum, duo em-  
bita non excedunt gurgitum altitudinem, brachiali radicis oblique crassitudine, triangulis lateribus,  
decem non amplius cubitorum longitudine, in gracilitatem fastigiatum thyrsi modo cacamen inclu-  
dens, &c. Plura de papyro uide apud Theophr. lib. 4. cap. 9.

Fiebat apud ueteres è papyro charta, cuius ut in Europa nunc euamit usus, ita nomen remansit. Ete-  
nim quam ex comitis hodie linteolis chartam passim ednficiunt, isdem quibus & illa commendata do-  
ribus, quippe tenuitate, candore, leuore, densitate Niloticæ nostra charta non cedit, quam etiam uula-  
gus illius imitatione papyrus uocat.

Non papyro hodie, qui nobis ignotus & peregrinus, sed sponsa utimur ad laxandas quæ præcluse  
sunt fistulas, & intumescendo ad introitum medicamentorum aperiendas.

### Myrica.

### Caput XCIX.

**M**yrica seu tamarix arbor uulgo cognita est, cum apud pigras & stagnantes  
aquas enascatur, fructum quasi florem ferens compage muscosum. Aegy-  
ptus Syriaq; alteram gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. fructum parit  
gallæ proximum, inæqualiter astringentem gustu, quo conuenienter utimur uis-  
ce gallæ in medicaminibus oculorum orisq; datur cruentæ excretionis in potu,  
& celiacis, & contra profluua fœminarum, regium morbum, & phalangiorum  
morsus. illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem usus adhibetur. Decoctum fo-  
liorum cum uino potum, lienem absumit. ad dolorem dentium in collutionibus  
salutare. & mulieribus fluxioni uulua opportunitis, in defensionibus. phthiriasi len-  
dibusq; circūfusus prodest. abūdantiā fœminarū sistit impositus arboris cinis.  
potorios calices è caudice lienosis molliuntur, quò datus in his potus proficiat.

NO-



LIBER PRIMVS.  
NOMINA ET EXPLICATIO.

57

Myrica.



Græcis Moping.  
Latinis Myrice & Tamarix.  
Officinis Tamariscus.  
Germanis & Gallis Tamarisc, nomis  
natur.

Tamarix seu Myrica, fructu, radice, folijs, extremis ramulis tergit, incidit sine manifesta siccatione, parū astringit, tenuium partium, lieni indurato cū aceto aut uino coctis prodest: fructus et cortex ualentiū astringunt. fructum tamen & succum & non radicem adhibet spleneticis remedijs Gal. lib. 9. com. ph. part. Quinetiam trunco in uascula uel potoria uel escaria cauto, lienem arcano quodam odio subis et hominibus longo usu absumit.

Plinius contra Dioscoridem & Galenum nullum fructum ferre dicit lib. 16. cap. 26. his uerbis. Fructum arborum solæ nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, tamarix scopis tantum nascens, populus, alnus, ulmus, &c. quod itaq; Dioscorides dixit: λεγόμενον αὐτῶν ἀνδρῶν φέρονται ἑσθλὰς λέγεται τὴν οὐρανίαν, idipsum Plin. tū semē, tū fructū esse aut dici posse non putauit. Porro calices fieri, ut suprà quoq; monuimus, ex trunco myrice arboris solitos, qui spleneticis essent in usu commodi Dioscorides prouidit. Sed ea gratia hodie uina ex tamarisci uirgulis concinnantur in superiori Germania cisrhenana, quæ spleneticis utiliter bibuntur, Tamariscina uulgo appellata. quod ut nouitium inueniū adscribere uolui, quum sacricij huius uini Dioscorides inter tot genera, nō meminerit. & Democritus apud Constantinum Cæsarem libro decimonono capite septi

mo, ad eandem rem uinum prunis Myrica superfusum, & sic potatum magis probet.

Erica.

Caput C.

**E**rica fruticosa arbor, myricæ similis, lōgè minor, cuius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quàm coma serpentinum ictibus illitu medetur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἔραρι:  
Latinis Erica.  
Officinis inusitata.  
Germanis Heyd/Gallis Brugere: quidam esse putant quam Galli rosmarinum aculeatum, uel potius iomarinum appellant.

Erica



## DIOSCORIDIS

Erica.

Erica digerentis plantæ flore potissimum ac folijs utendum: semen etiam adhibetur apud Galenum lib. 6. comp. pharm. part. Erica dictus sepe lib. 9. comp. pharm. part. in splenicis.



Acacalis.

Caput CI.

**A**cacalis fructus est nascentis in Aegypto fruticis, feminis myricæ quadam tenus similis. cuius aqua in qua maduerit, ad collyria additur, quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt.

EXPLICATIO.

Hodie planè incognita, nomen frutici à nympha datum crediderim Acacali.

Rhamnus.

Caput CII.

**R**hamnus fruticat in sæpibus, ramos ferens rectos, & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius, tertium nigrioribus latioribusq; folijs constat, & quadam tenus rubetibus, cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus minusq; rigentibus aculeis. Fructum ædit larum, candidum, tenuem, folliculari specie, uerticillo similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus ulceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius ualuis fenestris ut impositos, ueneficia depellere.

Rhamnus.

Vua crispæ.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rhamnus frutex spinosus apud ueteres tria habet sustigia. Ego Rhamni unum genus hoc puto quod Galli burgam spinam uel Neprum uocant, fructum myrti, foris nigro, intus uiridi, ob id ad calorem cum singentibus idoneo, Germani Reugnbeer, Wäpberbeer, serbberbeer, serbbbeer appellant. Cortex arbori



Arbori subniger, & nitidus quasi cerufo, intus uirens, post latus, lignum extra candidum, interio-  
re medulla rubet: eo ualidos arcus nostri fabricant. Audio etiam adhuc hodie Italici spinum ceruinum  
uocari, nam & ab iisdem Dioscoridis spinam ceruinam dici testatur.

Rhamni fastigijs genus aliud annumerandum in afflatu maris nascent, frutice nonnunquam arbore  
scente, per longas ramulis, qui rigidis armantur spinis aculei mucrone se uientibus, folijs tamen a mula  
facie ligustrum exprimentibus, ut pro illis fallant, bacca folliculari specie, uerticillata, primum candida,  
da, post maturitatem rubefacta foris flaccida, intus rimosa, quam pastores pecorū pabulo decutiunt.

Sunt qui primum Rhamni genus arbitrantur hoc, quod officina uiam crispam, Germani Brensel  
heet. Galli uerò grosselles uocant. fruticosi namq; generis est, ramuliculis, recte spinarum mucro-  
ne horridus, flore ex herbido candicante, in frutetis & sepibus nascent: folia tamen non respondent  
que circumate rotunditatis conspiciuntur, apij modo dissecta, frutice aculeato, acinis candidis, & a  
maturitate dulcibus, granosis, translucidis, ciborum condimentis expeditis.

## Halimus.

## Caput. CIII.

**H**alimus frutex est sepimentis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs o-  
leis, sed latioribus, nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur ci-  
borum gratia. radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachmæ pondere in  
aqua mulsa pota, eadem lactis ubertatem facit.

## EXPLICATIO.

Halimus in magno nominum ambitu est. Ruellius arbitratur fruticem eum qui in Gallia uitis septi-  
bus frequens blanciputa uulgo appellatur. Halimū esse, gustu subacero in balsilagnem tendente, qua-  
re mensis folia cum tenerescunt non essent ingrata, tamen non esse edendo, cum propè nimia habeant  
pur olera.

## Paliurus.

## Caput CIII.



**P**aliurus frutex cognoscitur aculeatus,  
durus, cuius semen pingue & fuliginos-  
um inuenitur, quod potum tussi opitu-  
latur, uellicæ calculos comminuit. serpen-  
tium ictibus aduersatur. Folia & radix asfri-  
etoriam uim habent. quorum decoctum po-  
tu aluum sistit, urinam trahit, contra uene-  
na & serpentium morsus auxiliatur. Radix  
recetia tubercula, tumoresq; omneis discus-  
sit, trita & imposita.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Παλιούργος. Latine Paliurus. Officia  
nis inusitata. Germanicè Weelberin.

Gallicè aubepin, appellatur, aut saltem paliuri spe-  
cies est.

Apud nos paucis antea annis frutex inuenitur, qui  
etiam arborescere possit, folio per ambitum laciniatim  
sinuato, rotundo, molli, ramis spini, quem altum cogno-  
minant, modo maculatis, bacis rotundis, rubris, myr-  
teis, longè maioribus, gustu iucundo, qui & uinum sua  
uitate sua commendat. Condiuntur & grato ori cibo.  
Cæpit mea memoria propagari insita, quantum reor,  
albo spino. Qui colunt in hortis uel alienigenam &  
aduenam arborem, Myribalanum appellant. Hanc  
esse putauerim, nullis ferè notis reclamantibus. Paliurum  
Africanam, eam præsertim quæ non siliquetur. Ruellius  
Paliuri genus esse conijcit fruticem aculeosum, uulgo  
Weelberin, Gallis Aubepinum. i. album spinum. Fer-  
tur enim farinæ è fructu olim in fame quæ sita unde Ger-  
manicum



manicum nomen habet, quod sancti etiam de Paliuro tradunt veteres. Item fruticem quandam rura  
Gallie iuncum marinam uel potius Iomarinum appellant, cui aliquantulum fauere delineatio uidetur,  
an tamen Paliurus sit, non ausim affirmare, quod ei spina pro folio sit.

## Acuta spina.

## Caput CV.

Ribes.

Acuta spina.



Rubus canis.



**A**cuta spina, quam pyram aut ptyanthen aliqui  
uocant, arbor est pyraisto similis, spinosa ualde, &  
minor. baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, &  
intus nucleum: radicem multitudine, alie descendente.  
Huius baccæ potu aut cibo, alui profuiuum, & abundan-  
tiam fœminarum sistunt. radix illita aculeos & spicula  
extrahit. abortum fieri tradunt, si ter radice uenter, aut  
sensim feriat, aut perungatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀξύανθος, ἢ ὀξύανθος. Latine acuta spina. Offi-  
cinis Berberis et Bugia. Germanice Eibelen / Gaurand / wein-  
leglin / uocatur. Galli, quod huius acinis uinum exprimitur, spinui  
metam appellant, aliqui acrem spinam. Oxiantha uel oxianthi  
racemosa baccula, dum maturuerunt rubentes, astringunt: uis eadem so-  
lipsis sed languidior. E baccis uinum exprimitur eodem fere usu, quo  
uinum ex malo punico. Conduntur etiam uel melle uel saccharo ad re-  
stringenda sitim, depellendaque febricitantium maliciam, quorum mo-  
rosus nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit. Elanguescens ap-  
petentia grato huius acore recreatur. Frutex Arabibus Ribes di-  
ctus huic plane congener, racemosus, acidus, acerbus, frigidus siccus se-  
cundo gradu, sitim extinguit, uomitum et fluorem alui biliosum sistit,  
morbillis et uariolis, quas uocant, saluber: frutex a nobis poterit rui-  
bra dicitur. Quid sit, frutex an herba, et quæ, ambigit Serapio in suis  
testimonijs. Succus ex his expressus, cum saccharo cydoniati modo co-  
ctus, est delicatissimus. Ribes Damascenus Muse additur, solijs ro-  
tundis, et magnis iisdem.


## Rubus canis. Caput CVI.

**F**rutex est arboris instar, rubo longe maior. folia  
multo latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flo-  
re candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per  
maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus  
exemptis interioribus floccis arfactus, aluum sistit: fer-  
uefacti enim in uino, mox poti, arteriam infestant.

NO.



Græcè κυνόςβατος. Latine rubus canis. Officina cum sylvestri Rosa confundunt.

*Ligustrum.*  
  
sed *Cynofebatos* spinis hamatis horridior, rectior, & altior assurgit, odore  
eare, quem *Cynorhoda* tota habet præstanti-  
simum: rosa uero frutex flore  
solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc  
amborum medio (incarnatum Galli, Germaniq;  
Leibfarb uocant) nunc etiam muschbatum.



**L**iguſtrum arbor eſt oliuæ folijs circum ramos, latiori-  
bus, mollioribus, & uirentioribus: flore candido, mu-  
ſcoſo, odorato: ſemine ſambuci, nigro. Optimum naſcitur  
in Canope & Aſcalone. Folia aſtrictoria uim habent: qua-  
re commanducata ulceribus oris medentur. illita ſeuidis  
inflammationibus, carbonculisq; profunt. de cocto eorundem  
igni ambuſta ſouentur. capillum ruſant trita folia, quæ in ra-  
diculæ ſucco maduerint ſſes ex aceto frõti illitus capitis do-  
lorem ſedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, ex-  
calſcificat, emollit neruos, ſi quæ ſeruenti natura prædita ſint.  
aſſumat.

**Ligustrum** Plinij aliorumq; Latinarum, cuius picturam damus, omnes se-  
re hæcenus Dioscoridis *Cyprum* interpretati sunt, sed  
illos nuper redarguit doctissimus uir Franciscus Mas-  
sarij Venetus. *Φιλυρα* quidem tiliam esse demon-  
strans, *ligustrum* autem *φυλυρα*, non *cyprum*, ut  
sequenti capite fusus.



**P**hilyrea arbor est ligustri magnitudi-  
ne, folijs oleæ, nigrioribus & latiori-  
bus, fructu lentis cinigro, subdulo, ra-  
cematim coherente, asperis nascitur. Huius  
folia astringunt, ad eadem utilia ad quæ o-  
leaster, cum astrictione est opus: maximè ad  
oris ulcera, commanducata, aut si decocto  
colluantur. pota urinam ac menses cient.

Græcis φιλύρεα.  
Plinio alijsq; Latinis Ligustrum.  
officinis saltem Germanico nomine cognita.  
Germanis Beynheßlin / Mädhols / Borttelgel /  
Reyn weiden / Kerngert:  
Gallia Durofne dicitur.  
φιλύρε Græcis, Tilia Latinis & officinis. Germanis  
Linden / appellatur, ulia ab hac est arbor quæ hie



# DIOSCORIDIS

Philyra.



Dioscoridi *φιλύρα* uocatur, quod non animaduertentes uiri etiam nonnulli doctissimi, utraque arboris magno errore confundunt, quod forma admodum discrepent, ut è Dioscoride & Theophrasto lib. 3. de plantarum historia cap. 10. inuicem collatis abunde constabit. Differunt itaque inter se Philyra, quæ Tilia est, et Philyrea, de qua in præsentis capite Dioscorides agit, neque una uoce utraque arbor significatur, sed diuersæ, quemadmodum ostendit nuper doctissimus uir Franciscus Massariu, ut supra meminimus.

## Cistus. Caput CIX.

\* Alij, roboranthron.

Cistus, quem aliqui citharon, aut citharon uocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, folijs rotundis, acerbis, hirsutis, flos masculo ut mali puniceæ, foeminæ albet. Vis astringens, unde flores in uino austero bis in die poti. profunt dysentericis. & nomas per se illiti cohibent. uetustati ulcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis, erythron\*, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine, quædam flaua, altera uirens, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Alij qui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquant, reliquaque ut in Lycio prosequuntur. uires acaciæ habet, uerum aliquanto magis siccatur, & astringit. prodest dysentericis, celiacis, sanguinem excreantibus, foeminarum profluuium, & pota & indita.

## EXPLICATIO.

Cistus frutex Germanis peregrinus. In quibusdam Gallie montibus, (ut aiunt) Patuinis hypocistis uideri licet, & fruticem sub qua nascitur, ocymifolio, flore candido, quasi syluestris rose, radice lignosa, prædura, è cuius fere medio hypocistis uelut infixæ pullulat, cuius officinis succus est notior, quam ut explicari mereatur.

Hypocistis succus, & Hypocistidis succus passim dicitur in lib. comp. part. pharm. Hypocistidis succo addita γλυσκός, id est, passæ parte, maceratur, gummi, tragacantham, myrrham, ibi, lib. 7. comp. pharm. part.

## Caput CX.

### Ladanum.

Est & alterum cisti genus, ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascens, longioribus folijs & nigrioribus, quæ uerno tempore quiddam cōtrahunt pingue foliorum uis astringens, atque effectus cisti præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ, hircique, pinguitudinem conspicuè barba carpunt, & suo lentore uillosis cruribus adhærescentè reperiunt: quam depeccantes incolæ, colantesque, cogunt in ossas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantque in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, facile mollesces, pingue, quod arenas non collegit nec squalore oblitum est, resinofum, quale in Cypro gignitur. Arabicum uero Libycumque uilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi, ora uenarum patefacit. capillum fluentem continet, addito uino, myrrha, & myrteo oleo. cicatricibus decorem reddit, cum uino illitum, medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum. suffitu secundas eiecit. pessis immistum, uulnæ duritiem sanat, in medicamenta quæ dolorem tussimque finiunt. & malagmata utiliter inseritur. aluum sistit cum uino uetere potum. & urina mictet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cisthos quæ alio nomine Lada & Ledon appellatur, frutex est unde capræ & hirci folia decerpentes, barbas ac uillos laterum succo eorum imbuunt, unde postea homines depeccant, quod Ladanum uocatur.



uocatur, officinis optime notum. Verum Plinius haud in paruum errorem delapsus est, qui ob no-  
cuisse & cistibi uicinitatem, cistibum hunc hedere specie existimauit. At uero Ladanum non tantum ex  
barbis hircorum depetit, ut ueteres tradiderunt, sed alijs etiam modis inde colligi aperte ostendit Ga-  
lenus lib. 1. cap. 1. de comp. pharm. part. quum dicit non manifestum esse, an hoc solum Ladanum quo-  
ex hircorum barbis depectitur, in illud medicamentum quod tradit adhiberi ueligi, & possibile esse per  
hanc speciem totum Ladani genus designari: Sed tamen nullum certum modum neq; hic, neq; alibi quod  
sciam, eius colligendi prodiit. Dioscorides certe hic unum aliquem amplius colligendi Ladani modum  
prescribit, qui funibus per forfices tractis coniungit, ut scilicet eo modo glutinata pinguitudo postea  
ex ipsis funibus deradatur: quum modum etiam Plinius lib. 12. cap. 17. tradit. Quin & tertium quem-  
dam modum eius colligendi prodiit: Plinius lib. 26. cap. 8. habet. per nerxos in arculanis circumdatos, atque dis-  
ti in Syria atq; Africa, unde etiam toxicum appellatur. Toxon enim arcum Graecis significat. Rufus  
porro apud Erembos populos Ladanum illud prouenire dicit. Sunt autem Erembi Aethiopiae popu-  
li, qui & Trogodytae, utroq; simili nominis etymo appellantur, siquidem ἐρεμβος ἀπὸ τῷ τῷ τῷ  
ἐραμβέσας populos appellatos uoluit, Sicut τρωγλοδυτας ἀπὸ τοῦ τῷ τῷ τῷ δυνέσας. Ad  
hospopulos se peruenisse Melanias apud Homerum. 4. Odys. gloriatur. Αἰθιοπίας δ' ἐκὼς μέλι γέ-  
ειδ' οὐλὸν ἤνι ἐρεμβος. Posidonius apud Strabonem lib. 6. ἐρεμβος & ἀρεμβος eosdem esse dicit,  
facta leui nominum commutatione & corruptela. ἐρεμβος nimirum ἀπὸ ἀρεβος λεγομένων. Gale-  
nus lib. 7. simpl. pharm. Cistibum qui & Ladanum, in calidioribus regionibus nasci dicit, non alterius  
generis ab eo qui in Asia prouenit, sed ob regionis proprietatem, illud discusforiam habere caliditate.  
& in hoc ab Asia differre, quod non solum frigiditatem deposcitur, sed caliditatem assumperit.  
Plinius lib. 12. cap. 17. apud Nabateos Arabas hoc fieri scripsit, atq; mox uerum Ladanum Cypro in-  
sula attribuit, quae sub illius fide relinquo.

Ebenus.

Caput CXI.



modum pollet. si quispiam facta ex eo coticula collyrijs utatur, melius proficiet. ad oculorum medicamenta efficax est, si fcores ramenta uino Chio die nouo-  
ctijs; macerata, in collyria digeratur. nonnulli prætrita ipsa excolant, reliquaq;  
eundem in modum peragunt. alij pro uino aqua utuntur. Vritur in fictili nouo,  
donec in carbones redigatur. lauatur plumbi usti modo, & ita fcois scabrisq; lip-  
pirudinibus conducit.

**E** Benus optima habetur Aethiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, factitij cornus laeoue. cā frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. sufficit iucundo odore supra carbones sine fumi tædio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur, & trita ad coctū fauēscit. Altera est Indica, internatis fegamentis candicantibus, & modicē fuluis, item frequentibus maculis. cæterum prior, bonitate ante cedit. Apud quosdā sesamina, aut spinea ligna\* cōsimilia pro ebno ueneunt, quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolunt, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præferentia. Caliginem oculorum absterget, ad ueteres destillationes, pustulasq; mirum in

\*Alij, Syda  
minina, aut  
spina Indica.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lignum, quod ea gens Barbara, quæ nobis transmittit, uernacula lingua Guaiacum appellat, ab Hispanis et Italis sanctum à Germanis Franzosenholz / Barrerholz, Gallis Guaiac, dictum, Latinis uerò Indicum lignum appellatum. Ego cum aliquot doctis medicis Ebenum esse puto uel omnino aliā quam eius speciem: namq; per omnia descriptioni quā de Ebēno hic Dioscorides ponit, conuenire



uidetur: præter enim soliditatem & renitentem duritiem, aquæ non superfidet: sed innata pluri-  
materreſtri ſubſtantia fundum petit, quod Ebeno tantum præ cæteris arboribus attribuit Ariſto-  
telis. Triplex eius genus eſſe dicunt, & quod ex Aetiopia uenit, probatiſſimum eſſe & in Pompeij ſal-  
thridatico triumpho, primum Romæ urbi ſpolium gratiſſimum & admirandum fuiſſe narrant. Ra-  
dicem magiſterra exerta, nigro colore, ſcribit Dioſcorides, nihilominus tamen pleriq; neotericorū,  
à Theophraſto non diſidentes, apud Indos in altitudinem mediocrem arboreſcere, eorum qui ab India  
ueniunt, relatu adſignant, craſſitie corporis hominis, folijs plantagnis, ſed minoribus paulò & rigidio-  
ribus, glandibus ad modum quercuum, & ueluti oliuis, ramorum extremitatibus inbianibus. Et ex  
eo optimū cenſetur, quod recens ſatis, neq; admodum uetus & cariolum exiſtit: tale etenim igni ſu-  
perimpoſitum, ob reſinaceos ſauos, quibus interius nigrum medullū diſcriminatur, citius acceditur,  
& flammā agit: quo ſolo ligni bonitatem ab adulterato probare ſolent: laudatur item quod ſubcitri-  
no & buxæo eſt colore, quale eſt noſtrum, quod paſſim in officiis diuenditur: & poſt detractum corti-  
cem, colore ad liuidum uergente: item quod in guſtu præter astringentem ſaporem, etiam leniter lin-  
guam eroſione mordicat. Lignū eſt ſatis calidum, morbis omnibus ex humore, præſertim frigido natis,  
ſalubre: nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, uacuat. De huius facultate mira do-  
ctiſſimus Anthonij Galli medici commentarius, his diebus paucis in lucem editus, facit, ne mihi de hoc  
pluribus ſit agendum: ut interim taceam Huttenum, Matheolum, Maſam, & alios quàm plurimos, quò  
uerboſiſſimè uires eius nobis inculcarunt, potiſſimum in curanda lue Hiſpanica ſiue potiùs Gallica: ſed  
tamen etiam morbis alijs, præſertim frigidis, conferre, adeò eſt hodie perſuſum, ut certatim eo etiam  
magnates uti geſtiant.

Rosa,

Caput CXII.



\* Aliàs, femo-  
rum intertri-  
gines.

**R**osa refrigerat & astringit, ſed ſicca multò magis. Succus recentibus folijs  
exprimitur, deſectis forſice unguibus (ſic appellatur candidæ foliorum par-  
tes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculo-  
rum circumſiſiones recondi. Siccantur etiamnum folia roſarum, continuò uerſa  
ta, ne muceant, neue ſitus in ijs inſi deat. Aridis roſis & in uino decoctis expreſſus  
liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, ſedis, recti inte-  
ſtini, ac uulvæ: pinna illitus aut inſuſus. eadem ſine expreſſione tuſa, præcordio-  
rum inflammationibus, humidis ſtomachi uitijs, igni ſacro illini prodeſt. ſiccis  
ac tritis fœmina\* aſperguntur. miſceri ſolent uulnerarijs antidotis, atq; compoſi-  
tionibus quas antheras uocant. Folia uruntur in calliblephara. Flos qui in me-  
dijs roſis inuenitur, ſiccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inſpergitur. Ca-  
pita pota citam aluum, & cruentas reiectiones ſiſtunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ρόσος. Latine &amp; officiis Roſa. Germanis Roſen.

Gallice une Roſe, appellatur.

Rhodon autem Græcis, Plutarcho teſte, nominatur, quod largum odoris effluuium emittat.

Roſa



Rosa omnis amara est atq; astringens, præcipue rubra, à qua substantia refrigerat, siccat: flos autem eius astringit magis, prouide etiam siccat ualensius. Rosarum flores potius quam rosas, quia imbecillam astrictionem habent, in Diabesasa ponit Heras lib. 6. comp. pharm. part. Gal. & Andromachus in stomachicis, lib. eodem. Flos autem est pars interior, in qua semen est & capillus. Id semen uulgus Antheram uocat, cum Anthera compositio sit Græcis rosas siccas & alia recipiens: quoniam & sine rosarum flore Anthera medicamentum est. lib. 6. comp. pharm. part. Rosæ præstantissimæ sunt, quæ longè omnium sunt suauissimæ, & alijs rubicundiores. Siccandæ uerò sunt loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrent, rosas tamen non tangerent. Rosarum succus essentia est tenuissimæ, nam celeriter acefcit, & lentore caret, & unguentorum omnino odores exoluit & obscurat. Ex Rosis calidissimæ uidetur Moschata: post has rosæ colore insignes, incarnatæ nobis dictæ, Germanicè Leibfarb rosarum, quæ & cerebrum ualenter ferunt, paulo minus albæ.

## Rosei pastilli.

## Caput CXIII.

**P**astilli quos rhodides uocant, hac ratione conficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorum pondus æquent, siccati; in umbra, in fictili non picato, atq; obturato reconduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle miscent. Mulieribus monilium uicè collo circumdato usui sunt, ad retundendum graue sudoris uirus. tritis etiam utuntur ad illitiones & diaphasmata, quæ fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

## EXPLICATIO.

Officinæ sub nomine trochiscorum diarhodu alio modo parant, ab hoc nō multum diuerso. ualidiores autem sunt omnibus his trochiscis qui à rosis nomen acceperunt, qui à Mesue traduntur sub nomine trochiscorum de Rosis & Eupatorio.

## Lycium.

## Caput CXIII.

**L**ycium, quod aliqui pyxacanthan uocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs buxi, densis, fructu piperis, nigro, læui, amaro, densiq; cortice pallido. non dissimili ly cio madefacto, radicibus multis, obliquis\*, lignosis. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. \*Alij, latiss. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis rursi & ante permultos dies macerati coquuntur, tum abiectis lignis itidē liquor, donec melis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, oculorū medicamentis additur, reliquo ad alia utitur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumq; rubentem spumam ostendit. glebis extrinsecus nigris, intus cum fregeris rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius. Lycium astringit, caliginem oculorum discutit, genarū scabiem, pruritus, ueteresq; fluxiones sanat, facit ad prurulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illitum. celiacis, dysentericis, potum inditumq; conuenit, datur sanguinem ex creantibus & rufis, ex aqua. contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. flauos facit pilos, reduiis, ulceribus quæ serpunt aut putrent, medetur. sceminarum profluuiā appositum sistit, rabioforum ictibus ex melle\* potum, aut uicè catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato, ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habēs, ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubo crassiores, à radice numerosos. fractus cortex rubescit. folia oleæ similia. Herba in aceto decocta proditur lienis inflammationibus & re gio morbo mederi: & sceminarum purgationes elicere. affeuerant etiam crudam in potu, eosdem effectus præstare: semen cyatho dimidio potum pituitam expurgare: uenenis quoq; auxilio esse. \*Alij, lacte.




*Lycium* à Lycia regione dictum, et delatū, hic succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi & Galeno liquidus, quo utebantur ad sugillata, Phlegmonas oris & sedis, herpes, putredines, ulcera consumacta, aures purulentas siccant, & digerit ordine secundo, astringit, terget. Calore symmetris est proximum. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicum autem ad omnia est ualentius. Haemorrhagiam à naribus *Lycium* sistit, linamento impositum. Gal. lib. 2. comp. pharm. part. *Lycium* coquit, digerit, ut castorium. Indicum autem dico, non quod apud nostros gentes nascitur lib. 4. comp. pharm. part. *Lycium* etiam Afrum dicitur lib. 3. comp. pharm. part. Spumam lycij appellat ex Solone, lib. eodem. Succus ex bacis *Peryclimeni Lyciam* memiuntur. Modus alius est in lib. de dynamibus, qui Galeno ascribitur.

## Acacia.

## Caput CXV.

**A** cacia in Aegypto nascitur, spina instar arboris fruticosa, non se in rectum attollens, florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis: ex quo succus expressus siccat in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiri di. Eligatur modice rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. aliqui expriment ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina, uis ei ad spissandum, refrigerandumque efficax. Succus oculorum medicamentis utilis, ualet ad ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris ulcera, procidentes oculos reprimere mensuram abundantiam sistit, proci duam uulnam cohibet, citam aluum supprimit, aut potus aut subter inditus, capillos denigrat, lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos, uritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturque in carbonum halitu perflata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spingummi, quod in uermiculorum speciem contrahatur, & uiri modo perluceat, ligni expers. proximum est candidum, sordidum uero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum quibus admiscetur acrimoniam hebetat, ambustis ex o uo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum acaciae genus in Cappadocia Pōtoq; prouenit, Aegyptiae spinæ similitudine, longè minus, tenerius, humile, a culeorum uallo munitur, folia habens rutæ, semen lentacula minus fert autumnis, in loculis connexis, ternum quaternumue capacibus. Succus eius astringit uiribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

*Pruna syluestris.*



## EXPLICATIO.

Acacia ueterum succus ex fructu seu semine, interdum & folijs spinæ Aegyptiae expressus



expressus, in umbra siccatus, siccatur ordine tertio, refrigeratur primo; secundo autē, si lotionē leuē suam acrimoniam deposuerit. Acacia  $\kappa\iota\epsilon\pi\alpha$ , lib. 7. comp. phar. part. indyaco dio Hera. Hæc tamen huiusmodi usurpari potest, ut in theriace leges apud Galenum.

Eligenda modicè rufa & odorata, quatenus illi datum est. Eius loco ex bacculis prunorum agrestium costis succum expressum tessellatim confectū insolatūq; usurpamus minimo errore, quia refrigeratur, siccatur, astringit ut ueterum acatia.

Ex hac Acatia Aegypti spina, ex cuius semine aut fructu succū exprimi antè diximus, manat gummi in uermiculorum speciem contractum, utriusmodi per lucidum, purum, refrigeratur, densatur.

Huius non meminit Galenus in Acacia lib. 6. simpl. ut nec Acatie nomen facit paulo post in Acanthia Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi uocatur) unde colligas licet Accaciam & Acanthiam Aegyptiam seu Arabiam diuersasse in Aegypto spinas arbores. Tamen in libro comp. phar. frequenter legitur  $\kappa\alpha\upsilon\iota$  absolute tragachantæ coniunctum pro gummi Arabico, quod  $\kappa\alpha\upsilon\iota$   $\mu\epsilon\lambda\iota$   $\beta\alpha\beta\iota\lambda\omicron\upsilon\upsilon$  uocat lib. 7. comp. ph. pa. à Thebis opinor Aegypti centisforibus, ut etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis,  $\kappa\alpha\upsilon\iota$   $\mu\epsilon\lambda\iota$   $\beta\alpha\beta\iota\lambda\omicron\upsilon\upsilon$   $\epsilon\pi\alpha$   $\beta\iota\kappa\omicron\upsilon$  per sepe Actuarium uocat.

## Vitex.

## Caput XCVI.



**V**itex siue lygos, frutex est in arborem assurgens. nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. ramos gerit prelongos, fractu peruioces. folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. una harum album florem mittit cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Ex calfactorias uires habet, & adstrictorias. semen eius potum uenenatis ictibus, aqua quæ cutem subijit, lienosisq; auxiliatur. lac euocat. menses ciet, drachmæ pondere in uino potum. genituram exoluit. caput tentat, & soporem affert. decoctum herbarum & seminis in defensione, mulieribus uulua malo opportunis opitulatur. item in inflammationibus. purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu uel appositu. capitis dolorem dissoluit illitum. instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargo & phrenitide. folia suffitu aut substratu fugant uenenata. illita quoque serpentium moribus auxiliantur. testium duritias cum butyro & folijs uitium emolliunt. rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat; & cum folijs medetur luxatis, uulneribusq; uirgam qui manu teneat dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicatur

castum, uocant Græci, quoniam matronæ in thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon quasi uimen, propter inuictam ferè ramorum flexitatem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè  $\alpha\gamma\upsilon\omicron\varsigma$ . Latine Vitex. Officinis agnus castus.

Germanicè / Abrahamsbaum / Feuschbaum / schaffs misle.

$\alpha\gamma\upsilon\omicron\varsigma$ , id est, castus, quod ad castitatem conseruat, folijs & floribus sumptis & substratis, & semine frixo, uel non frixo: id enim sumptum, ut semen rutæ, nocturnas ueneris imaginationes cohibet. Gal. lib. 6. simp. & lib. 6. sanitatis tuendæ. Calfacit, siccatur ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multum tenuis, status omnium maxime discutit. Ob id lege libro primo alimentorum, cal- Agnus castus facit, nōcū Græcis exēplaribus et ueteri interprete, refrigeratur, quod effectū illic adscripta indicat.



Item lib. 2. comp. ph. part. de cephalalgia ab astu, ubi Agnū inter refrigerantia cōmemorat: et pau-  
lō post ubi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima: Agni uerō mediocriter refrigerant.  
Legerem non ἄλγυον sed ἀκίον, quæ planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiam si Galenus for-  
te alibi nusquam ea herba sit usus. Neq; enim placet elusio, quod per accidens refrigerat: id enim e-  
tiam folijs Lauri & calidis omnibus commune est.

Salix.



Caput CXVII.

**S**alix uulgō nota est. Cuius semen, folia, cortex et  
succus spissandi uim habent. trita folia cum exi-  
guo pipere & uino pota, ileosis subueniunt, sumpta  
per se & cum aqua præstant mulieribus ne concipiāt.  
salignum semen in potu sanguinem expuentibus pro-  
dest. cortex eosdem præbet effectus. corticis cinis ad  
misto a ceto maceratus, illitu clauos & callos tollit. ex  
folijs & cortice succus cum rosaceo in calyce puni-  
calfactus, aurium doloribus auxiliatur. decoctio eo-  
rum podagras foueri utilissimum. furfures purgat in  
corpore. Excipitur succus qui manat ex ea, cum flo-  
ret, exciso cortice. in plaga enim concretus humor in-  
uenitur, qui ad purgandā, quæ obstant oculis, suam  
uim præbet.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἰτέα. Latinis Salix.  
Officina latinum nomen seruauit. Germanis Weiden.  
Gallis saulge, appellatur.

Salix uerō à saliendo dicta est, quod ea celeritate crescat, ut  
quasi salire uideatur. Sic etiam iteam quasi sali-  
cem uocauerunt Græci. Plura uide apud Theo-  
phrastum per nos in alium atq; commodiorem  
ordinem redactum.

Syluestris olea. Cap. CXVIII.



**S**yluestris olea, quam aliqui olea-  
strum appellant, alij Aethiopicam  
oliam. folia astringunt. trita autem  
& imposita ignem sacrum, ulcera que  
erumpunt, epinyctidas, carbunculos,  
reduuias, nomasque cohihent, cru-  
stas emarginant cum melle illita.  
quinetiam sordida repurgant. in-  
flammationes panosque, cum mel-  
le imposita discutunt. cutem à capi-  
te uulsam cōglutināt. oris ulceribus  
& priuatim infantium, commanduca-  
ta medentur. Succus & decoctum eos-  
dem habent effectus. sanguinis erup-  
tiones, ac muliebri profluuium, admo-  
tus succus inhibet. uux oculorum, pus-  
tulisq; prodest. ulcera & ueteres de-  
fluxiones sistit: quapropter in colly-  
ria additur, ad genarū erosiones per-  
quam utilis. Exprimitur succus tufis  
folijs, affuso uino aut aqua, siccatusq;  
sole in pastillos digeritur. sed longe  
validior ad recondendum succus ha-  
betur, qui



betur qui cum uino, quàm cum aqua expressus est. auribus subuenit, siue ulcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum farina hordeacea illinuntur. uruntur cum floribus folia, ut spodij uicem cinis præstet. in cruda olla, oblito ore luto, usq; dum figlinum percoquatur. restinctaq; uino & rursus subacta, eodem modo uruntur. postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere, sed eisdem uiribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ oleæ eadem uis intelligitur, sed aliquanto inferior: unde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem uim conuenientior est. Sudor ligno uirenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures & scabiem. Oleaginum semen illitum medetur furfuribus, & ulceribus quæ depascunt uorantq; quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina scabiorum unguis excutit. Colymbades trita & ambustis illita pustulas gigni prohibent. sordida ulcera purgant. muriæ succus collutatus gingiuas contrahit, & motus dentium firmat. Oliua staua & recens stomacho utilior est, uentri diffidilis. nigra autem & matura corruptioni opportuna est, stomacho aduersatur. oculis non conuenit. capitis dolorem mouet. arefacta illitu depascentia ulcera sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliuæ gingiuas puri uligine laborantibus colluitur. dentium mobilitates stabilis. calfacti foras, gingiuas fluxione laborantibus utilis est. lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuas admouere, donec alba spectentur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κότινος, ἢ αὑγίλαρος. Latine oleaster & syluestris olea.

Officinis latinum nomen retinet.

Germanicè Wylderölbaum.

Gallicè Oliuier sauvage, dicitur.

Syluestris olea fecundior satiuæ, quod ferè syluestres habent, cœu cura fertilitatem minuente. Oleastro uita longior quàm oleæ, sed olympiæ longissima. Syluestris olea ex satiuæ nucleo nascitur. Mansuecere hanc densis curatulis, aut omnino translatione mitè fieri, uix potest adduci Theophrastus ut credat.

## Lachryma æthiopica oleæ.

## Cap. CXIX.

**L**achryma quam æthiopica olea stillat, scammonia similis quadantenus est. fulua, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore uigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastrique, similem lachrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur. cicatrices albuginesq; illitu emendat. urinam & menses ciet. cauis dentium impressa, ad dolores efficax est. inter uenena scribitur. parius pellit. lepras & impetiges sanat. Appellatur aut æthiopica & agrestis olea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gummi Elemi ab elea uel corruptè & enhemum.

Ex elea, id est, olea Aethiopica & nostrate inquit Dioscorides, & Italica Plinius. & oleastro lachryma funditur scammonio similis, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Similis autem ammoniaci, uel gummi, colore nigricans, morsus expers, inutilis. Explora an uerum sit officinis.

## Amurca.

## Caput CXX.

**A**murca expressæ oliuæ recrementum est. decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis astringit, cæteros præbens lyçij effectus. insuper dentium dolori & uulneribus, cum aceto, uino aut mulso commodè illinitur. additur in medicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. uetustate meliorem fieri constat. utiliter infunditur sedis, genitalium, ac uulua exulcerationi. si uerò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. iumentorum scabiem cum decocto lupini & chamæleonte illitu sanat. cruda & reuerti amurca podagras articularesq; dolores foueri utilissimum. peruncta in uillosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

NOMINA



Amurcam greci ἀμύργην appellant: nos amurcam aut sedimentum olei. Germanicè Mheffen-  
trüböl.

Quercus, Glans, Fagus, Ilex.

Caput CXXI.

Viscum quercinum.



Fagus.



Ilex.



**Q**uercus omnis ad-  
strictoriam vim ha-  
bet, præsertim liber  
qui cortici & lig-  
no intercedit, quin  
etiam tunica puta-  
mini glandis subie-  
cta. decoctum ex  
his datur dysenteri-  
cis, celiacis, san-  
guinem excreanti-  
bus. tritain pessa,  
fœminis fluxione  
uulvæ laborantibus  
subijcitur. Glan-  
des eosdem effectus  
exhibent. urinam  
ciunt. capitis dolo-  
rem & flatum in ci-

bum sumptæ pariunt. resistunt escitæ uenenatorum ictibus: decoctum earum &  
corticis cum lacte uaccino potum prodest contra toxica. intritæ crudæ, inflam-  
mationes illitu leniunt. ad duritias quas cacoethe uocant, & malefica ulcera  
cum salsa exungia conueniunt. Iligneæ glandes uiribus quernas antecellunt.  
Fagus & ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iliginæ  
radicis cortex cum aqua coctus dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus,  
denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa & trita tu-  
moribus prosunt. & imbecillas membrorum partes corroborant.

NOMI



## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Quercus** Græcis Ἀγός. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Eychbaum.  
**Gallis** une chesne. appellatur. Existimatur dicta ueteribus etiam Hemeris, id est, placida. No-  
 vissima arbor est, procera, crassiori & asperiori caudice, ramosa, folijs profunde laciniatis. Glandes <sup>hæc</sup>  
 producit optimas, & maximas. gallas item & uiscum.

Græcis Ἰξός. Latinis & Officinis uiscum. Germanis Nystel & Nssolter.

**Gallis du guy** appellant. Calsicū cum acrimonia: plurima enim ærea & aquæ, paucissima terre  
 ua constat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.

**Fagus** Latinis. Græcis Φαγός. Germanis Bächbaum.

**Gallis Faus** uocatur, expuncta litera g.

**Fagus** glandiferis arboribus annumeratur: tametsi fructu nihil glandi simillimum habeat. assur-  
 get caudice crasso, & in orbem comoso, neq; ita procero: folio tenui & leuissimo, populo simili, celer-  
 rimè flauescente: & media plurimum parte supra hoc paruula gignitur bacca uiridis, fistigio aculea-  
 ta. Glans eius dulcissima, nucleis haud absimilis, triangula cute includitur, & parte postrema  
 utrinq; lapidescit in duritiam, si uirilis sexus fuerit.

**Ilex** glandifera Græcia ὁ πῆϊν & dicta, apud nos peregrina arbor est. Ilex uerò quæ aquifolia co-  
 gnominatur duplex existimatur, altera coccum tinctorum ferens officinis notissimo, paruo frutice:  
 altera magna, fructu inutuli, Germanis Stechend palmen: **Gallis houi** & **housson** appellata, cuius pi-  
 suram damus &c.

## Castaneæ. Cap. CXXII.

**S**ardianæ glandes, quas aliqui castaneas, aut lo-  
 spima, aut glandes lous appellant, adstringunt,  
 similesq; effectus præbent, præsertim tunica quæ car-  
 nem & corticē media intercurfat, caro his qui eph-  
 merum biberunt conueniens est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Κασάνα, ἢ Λιός Βάλαν & ἢ Λόπιμος.

Latinis Castaneæ, glans Sardiana, lous glans, appellatur.

Officinæ nunc Castaneam. Germani Keßten, Bastant.

Galli Chastaignes & marrons, uocant.

Castaneæ autem à Castana Magnesiæ oppido, unde primum ado-  
 uctæ sunt, nominatas esse constat. Sardianæ uerò glandes, quoni-  
 am in Sardinia optime nascuntur.

Adstringit & exiccat Castaneæ haud secus quàm aliæ glandes.  
 Calida uerò & sicca est primo ordine.

Castaneas inter ceteras appellationes Sardianas glandes &  
 Λόπιμα Græcis dici, hoc capite ostendit Dioscorides.  
 & Galenus libro 2. de alimentis τὰ κασάνα ἐνίοτε καὶ  
 Λόπιμος ὀνομάζουσι, inquit. Earum itaq; hispidum  
 corticem in usum assumit Galenus lib. 1. ca. de comp. ph.  
 part. uocatq; πωγιδνα Λόπιμα, id est, barbam casta-  
 neæ, id quod Plinius echinatum calicem dixit. Neq; aliud  
 quàm castaneæ cortex est, quem Aërius Βαλάνου κα-  
 σιεύς φλοιόν appellat, sermone. 8. cap. 73.

## Galla. Cap. CXXIII.

**G**alla fructus est quercus. Aliqua om-  
 phacitis appellatur, parua quidem sed  
 tuberosa, solida, nullo foramine peruia, alte-  
 ra plana, leuis, perforata. Eligi debet ompha-  
 citis, quæ efficacior est. Vtriusque uis uehe-  
 menter astringere, trita excrescentias in car-  
 ne, fluxiones gingiuarum & uux, atq; oris  
 ulcerationem cohibent. nucleus dentium ca-  
 uernis inditus dolorem sedat, crematæ car-  
 bonibus





NOMINA ET EXPLICATIO.

galle de romane, tertium galle legiere appellant.  
 Gallarum genera hoc cap. Diofcorid. duo facit his uerbis. καὶ ἐστὶν ὁ δὲ δι' οὗτος ἡ μὲν τις οὐρα  
 φάνησις καλεῖται καὶ μικρὰ καὶ κενὸν ὑλὸς ὄντι, σιβαρὰ, ἀπὸ ὑπὸ τοῦ ἰδίου λέγει καὶ κούρη καὶ  
 τερτὸν ἡ μὲν, hoc est Gallā fructus est quercus, & altera ex his omphacitis appellatur, parua, nodo-  
 sa, solida, non perforata. Altera uerò giabra, leuis & perforata. Galenus autem lib. 7. simpl. phar-  
 ma. alteram simpliciter omphacitim appellari ait, alteram uerò flauam, & laxam ac magnam de-  
 scribit, & siccare quidem ut priorem tradit, sed tantò minus, quamò acerbe qualitatis minus quam  
 prior complectitur. Ex quibus sanè uerbis pleriq; omnes qui omphaciti in Gallam apud Græcos Me-  
 dicos, Galenum, Diofcoridem, Paulum, ac alios legim, nobis immaturam uertunt, tanquam sanè ea ip-  
 sa, uoce ὀμφάκτιν ἂν significetur, quum aliàs ὀμφάξ uua itemq; oliuā immatura, & ὀμφάκτινον  
 ex oliuīs immaturis oleum appellatur.

exolius immaturus oleum appellatur.  
 Verum nos non temerè ita uertimus, sed semper omphacitum diximus, ut qui non per hanc uocem  
 immaturam Dioscoridi & Galeno ac Paulo dictum putamus, sed certum quoddam genus, quod Diosco-  
 rides ac Galenus alterum ex eis facit, quod immaturæ appellatio de utroq; genere intelligi possit,  
 quod non ad iustam maturitatem peruenit, atque ita accipio à Plinio dictum lib. 24. cap. 8. Immaturæ  
 ex his ex aceto potè licentem consumunt. Eadem crematæ & aceto falso extinctæ menses sistunt,  
 nullasq; procidentem fori. Neque enim aliud est quod Dioscorides & Galenus de utroq; genere dixerunt,  
 quod uidelicet ὀξύμαξ sunt, si ignitis prunis urantur, & aceto aut uino, aut oxalme extinguan-  
 tur. Quando igitur utraque Galla suo tempore immatura est, & dicitur, minime hæc certa  
 alterius generis differentia putanda est, minimeq; pro omphacitide primo gallarum genere, immatura  
 accipienda. Inquirendum itaque est quod genus gallarum sit omphacitis appellatum, alterum enim ge-  
 nus ne mihi non est notum, atque id conabimur ex descriptione quam Dioscorides habet eruere, singu-  
 lis eius uerbis æstimatis. ὀμφακίτις, inquit, καλὴν τὰς μικρὰς καὶ κορὴν ὑλῶδης, σιβαρὲς, ἀπὸ ὑ-  
 πέρους. Præuam itaque quæ primum dicit, mox non solidam, Solidam deinde, & non perforatam tradit, ut pla-  
 nè hæc differentie sint, quas Plinius dicit. Nimirum alteram solidam, alteram perforatam, illam mi-  
 norem, hanc maiorem. Nam albæ & nigre differentiam Dioscorides non habet, & Galenus alterum  
 genus, magnum scilicet, fuluum esse dicit, quod fortasse primum candidius iuxta Plinium fuit. Sicut  
 contrā à appellationis Omphacitidis differentiam Plinius nunquam habet. Habemus itaque non Gallæ  
 omphacitim esse paruum, nodosam, solidam, non perforatam. quæ certe immatura dici à Latinis non  
 potest, sicut neque etiam est, sed in suo genere perfecta. Quæ igitur talis est? Ego sanè omphacitim  
 gallam esse & appellari à Galeno, ac describi à Dioscoride puto, id quod cauum primum ex quercu  
 enascitur, ex quo postea ipsa glans prodit, eique innascitur, quanquam id non perpetuo contingat, ut  
 ex eo glans proueniat. atque in hanc opinionem induxit me Paulus, qui libro 3. cap. de dysent. aper-  
 tis uerbis docet. ὀμφακίτις, id esse quod dixi. ὀμφακίτις ἰδιος, inquit, legitur tamen in uulgato ex em-  
 plari ὀμφακίλος, κατὰ κίτους. δὲ ἵδ' ὁ κοῖλος δὲ ὅς ἐστι περικύβη, ἡ τὴν σφύον βαλάνος ὠπρὸς  
 βυσσὸς χροῖσται, hoc est: omphacitidis costæ, est autem cauum illud ex quo glans quercina enasci-  
 tur, quo coriarij utuntur. Euidens est descriptio rei quam uelit, & quom hoc amplius addat, eo co-  
 riariorum mihi, planè hoc indicat quod hodie etiam usu uenire uidemus, quanquam utraque galla à tinctori-  
 bus expectatur.

Vtraq; Galla refrigerat ordine secundo, siccat tertio, crassa est essentia, asringit.

Rhus.

Caput CXXIII.

**R**husquæ obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriarij fructicis, sic uocati, quoniam coriorum infectores eo utantur ad inspissandas pelles, arbuscula in petris nascens, binum cubitorum altitudine, folijs ob-



## Rhus. Sumach.



minarum profluua sistit. hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. aqua in qua semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ῥόδον καὶ μαγδαλὴν. Latine Rhus erythros & Mugiricus, quod obsonijs aspergetur. Officinæ nomen à barbaris mendicatum Sumach usurpant.

Rhus hic aut hæc, est fructus racemosus, cortice acido, astringente, repellente, nunc medicamentarius tantum, olim etiam culinaris, pro sale obsonijs aspergebatur, stomacho ualde idoneus; aliter uero & corarius densandis pellibus applicabatur. Ille etiam Syriacus & ruber, lib. 3. & libro 6. comp. phar. part. uterq; tamen musto austero incoctus stomachicum est medicamentum optimum, lib. 6. comp. phar. part. Eius succus omphacij uice est in Gallia Narbonensi, in hortis Guilelmi Pelliserij, Episcopi Montispeffulani longè omnium doctissimu & optimi.

Rhus erythros differt à byrjodepsico, quandoquidem utrunq; in pastillum pantolimon dictum Medici diuersis ponderibus contra dysentericos & cruenta reijcientes requirunt.

## Palma.

## Caput CXXV.



**P**alma in Aegypto gignitur. Ea medio maturitatis uigore, autumnno decerpi solet, Arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore uiridi, & odore mali cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est & adstringens. contra alui sceminarūq; profluua, in uino austero bibitur. hæmorrhoidas sistit. uulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt. copiosiores in cibo inebriant. siciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis utiles in cibo. illinuntur cum cotoneo & cerato œnanthiuo uesticæ uitij. Cariotæ, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat. uires recreat cum hydromelite ueteri sumptū. cibo idem faciunt. Fie ex eis uinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu et gargarizatione magnopere adstringit, et cohibet. Nuclei palmarū, cæterorum more, cremati in crudo ficti, & uino restincti, cinere loto, spodij uicem efficiunt, miscenturq; in calliblephara. quod si non iustam uestionem acceperint, denuo cremandi vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt. contra oculi



lorum uiam & pustulas, palpebrarum defluuia, cū nardo effectum præbent, corporis excrescentias cum uino reprimunt, ulcera ad cicatricem perducent. Sed inter primas utiles ex palmis humilibus Aegyptiæ.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φοῖνιξ. Latine Palma arbor.

Germanicè Dattelbaum. Gallicè arbre de dattes, appellatur.

Fructus palmæ, Græcis δάκτυλος. Latine palmula.

Officinis dactili. Germanis Dattlen.

Gallis dattes & figue royale, dicuntur.

Ex palmulis caryotides celebrantur cibus, harum generat tria sunt, Nicolai, sorores Græcis adelaphides, Patri, sunt & Eunuchi Aristoteli genus Palmulæ, quod alienorchos uocant, quasi testicularum ac spadonias. Sunt & Magarides auctore Plinio, palmæ breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis similiores: quare à margaritis nomen accepere.

φοῖνιξ, ut hoc loco Dioscorides tradit, in Aegypto nascitur, uiridi colore, odore mali cotonei, medio maturitatis uigore per autumnum decerpi solet. Arabici Myrobalani similia, sine osse, quam Myrobalanum quoque uocari Hermolaus affirmat. ὡς αὐτὴν ἔρ' ἄλλοις ἔτι ἀμ' Dioscoridi uocatur, quod ex hoc fructu palmæ Aegyptiæ humidior, acerbior, astringentior, expresso, potus sit sitim sedans Solino auctore, qualis nobis ex pomis, pyris, sorbis. Hic autem fructus si usque ad maturitatem in arbore sinatur, solibus nigricat, & φοῖνικον βάλανος uocatur. φοῖνικος ἢ φοῖνικον βάλανος, uel quomodo aliter uocare, & moderatè stringunt, acerbior sapore, φοῖνικον βάλανον ἢ Ἐγκενός, & in colice Scribonij ibidem. Caro φοῖνικον ὀνυχίου in arteriæ Andromachi 12. caro φοῖνικον βάλανον in 15. φοῖνικον βάλανον proprietatem quandam habent capitis dolorem excitandi: easdem dat ibidem in cephalagis: sed addit, si sint consuetæ & accipienti iucundæ. Adhæc bilem pellunt deorsum, ut absinthium, & refrigerant. φοῖνικος δὲ βαῖνον à Thebis Aegypti opinor, & paulò post, φοῖνικος ὡς τῆς τοῦ celebrantur, φοῖνικος πᾶσι τοῖς μέγιστοι bis lib. 9. comp. phar. part. & paulò ante φοῖνικον ἡγεῖται, ὡς τῆς τοῦ autem uocatur, quod id genus tertium palmularum caritatarum præhumidum in parente rumpat se præ humore, calcato simile redditum. φοῖνιξ uero palmæ ipsius fructus, præsertim dulcis, non paucam obtinet caliditatem: tamen desiccatur, roboratur, contrahit, stipatur, densatur, sumptus & admotus.

Hic autem fructus à palmæ Aegyptiæ fructu ex osse differt: nam hic os habet magnum & longum & durissimum, in quo semen, uel ustum & tritum ualenter digerit, lib. 6. comp. phar. part. Dactylus à digitorum forma dicitur. ὅθεν φοῖνιξ uero dictus Actuarius & alijs quibusdam Græcis recentioribus ab acido sapore, palmæ syluestris fructus, Tamar Indus, id est, Dactylus Indus Barbaris. Germanis uero Tamarindus & saur dattel uocatus: quamuis cholagogus sit comprimendo, ut palmæ Aegyptiæ fructus Phœnicobalanus, tamen os habet quod satum arborem nobis produxit, alijs multis conueniunt & differunt, ut mox audies: sed Oxypheanix ueteribus indidus, cum phœnicobalanus in his frequens sit. Oxypheanix subniger, lucidus, tener, uillis tanquàm radicibus mistus, recens, pinguis, acido sapore. Quibus notis apparet, quantum conueniat cum Phœnicobalano, & quantum discrepet: ad hæc osse ut diximus, & usu hic recentiorum tantum: ille etiā ueterum. Si frigidus est ueteratus, oxypheanici debet misceri mastiche uel macis uel spica nardi. Rarò per se datur, picrocholis saluberrimum ad uncias quatuor dari potest: annis 10. seruatur.

## Palma elate.

## Cap. CXXVI.

**P**ALMA, quam aliqui elaten aut satham appellant, fructus palmarum adhuc florentium, inuolutus est calyxque, quo in spissamenta unguentarij utuntur. Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus pinguis. uis ei adstringentia, sistit ulcera quæ depascunt, laxatos artus committit, trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis, prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iecinori affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat, datur bibendum congruè, reni, uesciæ, & uiscerum uitij, uulguè ac uentris fluxiones sistit, scabiè cū refina et cera sanat, si uiginti diebus recens apponatur. Inuolutusque in ea elate fructus, quæ suo amplexu fouet, elate etiā uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & satham effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ borassus.

## NOMI



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Non solum summus cortex palmule (ut quibusdam placet) ἐλάτῃ appellatur, sed ipsum adeo re-  
 tes palmule fructus germen, ut Galenus ait. ὁ δ' ἐλάτῃ δὲ ὡς ἐλάτῃ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τοῦ ἐλάτῃ καὶ τοῦ  
 πικρῶς, Idem hic Dioscorides indicat, καὶ ὁ πικρὸς ὡς ἐλάτῃ καὶ τοῦ πικρῶς ἐλάτῃ καὶ τοῦ  
 πικρῶς, hoc est, contentus in ipso cortice fructus itidem elate dicitur. Ceterum quod a Galeno ἐνέφρατος  
 in eade palmula dicitur, id ab eodem. 2. de alimentis, uertex & summitas palmæ appellatur. καθεωρε-  
 ῖσθαι, inquit, ἐδ' ἐστὶν τὸ πικρὸν καὶ τὸ πικρὸν, ὡς οὐκ ἔστιν ἐνέφρατος αὐτῇ. At uerò quod  
 hic a Dioscoride ἐνέφρατος uocatur, omnino aliud est, medium uidelicet in eius ligno, tertium a  
 cortice. ἐνέφρατος enim uocabulo etiam aliàs medium alicuius rei, & quasi corculum aut medulla ap-  
 pellant, quomodo Græci Medici etiam ἐνέφρατος οὐκ ἔστιν scille internam partē uocant. Ipse  
 autem Plinius palmule ἐνέφρατος, cerebrum dixit.

## Malum punicum.



gingiuasq; lædunt. Vinosa uerò mediā sortiuntur naturam. Nuclei acinorum  
 acidi punici in soleficati & obsonijs in sparsi, concoctiue, fluentem aluum sto-  
 machumq; sistunt. cœlesti aqua madescunt, bibunturq; commodè sanguinem  
 excreantibus ad defessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione uulvæ labo-  
 rantium utiles sunt. expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, ui-  
 rililitatis, & sedis ulcera, nomas, reducias, & ea quæ in corpore extuberant, aurium  
 dolores et hæruiuitia, præsertim acidorū. Huius flores cytini uocantur, q adstrin-  
 gūt, siccant, cohibent, sanguinolenta glutināt. quas punici, præstāt utilitates, hu-  
 mida gingiuarū uitia mobilesq; dentes decocto colluuntur. herniā prolapsu in-  
 testini erumpentem cataplasmate repellunt. memoriæ tradunt, qui tres quam mi-  
 nimos cytinos deuorauerit, nullam eo anno lippitudinem passurum. eliquatur  
 hypocistidis exemplo. Malicorium, asperum est mali punici putamen, quod ali-  
 qui fidion appellant. Id spissandi uim habet, & quos cytini, præbet usus. deco-  
 ctum radicis potu latas uentris tineas pellit, & easdem euocat. Balaustium sylue-  
 stris punici flos est, cytino similis. cuius complura genera reperiuntur, candi-  
 dum, fuluum, colore rosaceo. succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui ad-  
 strictoria uis inest, eadem faciens quæ hypocistis & cytinus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ποικίλον, apud nonnullos οἶδον.

Balaustia.



Latine Mala punica. Officinis granata.

Germanicè Granattbaum, arbor. Granattöpfel,  
 fructus.

Gallis arbor ung pomeir de granade fructus pomier  
 de granade & Mygrenes appellatur.

Malum granatum seu punicum triplex, dulce, aci-  
 dum, & acidodulce, scilicet succo, saporis naturam uiri-  
 bus refert: omnium tamen flos, cortex, nucleus astringit,  
 sed acidi & acerbi magis, dulcis multò minus: medij horū  
 mediocriter. malicorium, id est, cortex nondum adulte-  
 rum sed perfectum propinquorum est melior ad astrin-  
 gendum in ore affectus ex fluxione nascentes.

Balaustium syluestris punica flos cyrinus satiuæ &  
 domesticæ Dioscoridi & Galeno. καὶ οὐκ ἔστιν ὡς οὐκ ἔστιν  
 τῶν αὐτῶν ποικίλων ποικίλων, id est, primogenita punica.  
 Nam quando arbor florere desinit, fructus ipsius appa-  
 ret in mali Punici speciem figuratus. Hi in fine neti



76  
gignuntur. & meliores sunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis astringunt, ibidem. Ambo ta-  
men insigniter astringunt, refrigerant, siccant, crassa sunt substantia: ambo etiam hodie à medicis  
Plinio Balauſtia, Germanis granat plâst, Gallis suer de pome granade uocatur.

## Myrtus.

## Caput CXXVIII.



lignem emendat. purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus  
eadem efficit. Trita folia & ex aqua illita humidis ulceribus & partibus om-  
nibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt. & admisto omphacino oleo,  
aut exiguo rosaceo cum uino, ad ulcera serpentia, ignem sacrum, testium inflam-  
mationes, epinyctidas, & condylomata. arentium foliorum farina utiliter in-  
spargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum sceminumq; perfusiones. car-  
diorum sudores cohibet. folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paro-  
nychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus adfuso uetere uino aut  
aqua coelesti, cuius recentis usus est, nam exiccatu planè cariem sentit, & uires  
amittit. Myrtidanum dicitur, adnatum inæquabile, uerrucosum intumescensq;  
& concolor, quod perinde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis  
quàm myrtus astringit. tusum addito austero uino reponitur, coactiq; in pastil-  
los siccat in umbra: multo efficacius & folio & semine, cerato, pessis, infessionib;  
bus, cataplasmatibus admistum, ubi astringendum aliquid est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Μυρτίνα, uel μυρτίνα. Latinis Myrtus.

Officinis grana Myrti, Myrtilli.

Germanis Welsch oder fremde heydelber.

Gallis grain de Meurte appellatur.

Myrtus ita etiam nota arbor, Dux potissimum eius species, nigra & alba: nigra folia habet quæ in  
uiriditate quandam intensam, & serè subobscuram tendunt, quæ nigredinem quandam præ se  
fero



**Myrtus. Officinarum.**

ferre uidentur: alba uerò uiriditatem habent magis apertam, quæ respectu intense uiriditatis albedo dici potest. In genere autem omnia ex myrto, quæ in usum medicorum ueniunt, feliciora & efficaciora in nigra sunt, quàm in alba.

Myrti utriusq; germina, folia, bacca, succus constant substantia calida, tenui, & contraria illi frigida terrea, astringente magis sylvestris quàm satua. Bacca Catoni Myrtia, Murtâ Varroni. Myrtilli. Officinis, uulgo Welsch heydelber.

Myrtus alba & nigra passim dicitur Galeno in comp. pharm. part.

**Cerasia.**

tum calculosis auxilio est.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Grecis Κερασις, κεράσιον.

Latinis Cerasus & Cerasum fructus.

Germanis Kirschbaum. Rursen.

Gallis Cerisier: fructus, une cerise.

**Caput CXXIX.**

Cerasia aluo utilia sunt, si uiridia sumantur, ea dem siccata illam sistunt. Gummi quod cerasi resudarunt, cum uino diluto tussi uetustæ medetur. colorem commendat, uisum exacuit. appetentiam inuitat. idem ex uino potum calculosis auxilio est.

Cerasia dicta sunt à ciuitate Ponti Cerasunte, unde primum ea attulit L. Lucullus, ut auctor est libro 15. Plinius, qui ait: Cerasi ante uictoriam Mithridaticam. L. Luculli non fuisse in Italia. At urbis anno sexcentesimo octogesimo is primum uexit à Ponto. Plura eorum genera inter quæ Aproniana maxime rubent. Nigerrima sunt Asiæ. Cecilianæ uerò & rotunda. Iulianis gratus sapor, sed pene tantum sub arbore sua, adeo teneres, ut gestati non tolerant. Principatus Duracinis, quæ Campana Plinius appellat. sunt & alia quæ tamen omnia alij sapore discernentes in tria genera contrahunt & discriminant, dulcia, austera, & acida: quorum dulcia uentrem molliunt & citissime dilabuntur, maxime recentia, quæ quia lubricos ac putridos gignunt humores, stomacho minus utilia sunt. Austera stomacho utiliora, adstringentia. Acida pituitosos & uiscidos stomachi humores incidunt, & ipsum confirmant, sitim sedant, & appetentiam excitant. In uniuersum ut & hoc loco Dioscorides testatur, bonam faciunt aluum recentia, siccata sistunt. Et Plinius libro 23. idem tradens ait: Cerasa aluum molliunt, stomacho inutilia. Eadem siccata, aluum sistunt: Vrinam ciunt. Inuenio apud authores si quis matutino roseida deuoret cum suis nuculeis, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo



# DIOSCORIDIS

liberentur. Siccantur sole aut furnis, saccharo ac melle condiantur, ut quotannis apud nos fieri solet: quare uiderit Palladius quid dicat, cum in Octobri mense ait: Cerasa non aliter quam in sole usque ad rugas siccata seruantur. sed forte hic seruandi modus tantum suo eno in usu conuictus fuit:

## Siliquæ.



## Caput CXXX.

**S**iliquæ recentes stomacho aduersantur. aluum soluunt. eadem siccatae fiunt, stomachoq; utiliores fiunt. urinam ciunt: sed præcipuè, quæ uinaceis condiantur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κερατρία, κερατάρια, εὐλακεράτα, κερατρία.

Latinis arbor, siliqua, fructus xylocerata.

Officinis fructus corrupto uocabulo xyloceresita. Germanis S. Johans brott.

Gallis carouge appellatur.

Quod ad medicinâ pertinet ferè nullo in usu sunt. Siliquæ, soluunt tamen uirides, utpote humectiores aluum, quam resiccate sistunt, et tum quoque stomacho utiliores esse ait et urinam ciunt Dioscorides, maxime eas quæ reiectis acinis siue internis grauis ipsarum edantur, ita enim existimo legendum, tametsi cura exemplaris uetustioris fidem id non assensuantius astruam, nempe pro eo quod habetur in uulgatis exemplaribus omnibus, τα ἐκ τῆς σελύλλας σαρτιδεμένα quæ uerba nullam certam sententiam exhibent. τα ἐκτος τῆς σελύλλας ἐδιόμλετο, ut sit id quod Plinius lib. 15 cap. 28. dixit. Quum in pluribus semina placeant, in siliqua damnantur. σελύλλα porro grana eius sicut uinaceas dici opinor, quantum etiam solida retrimenta uinæ in torculari expressa, Galenus 2. de alimentis σελύλλα uocet, et alios radices uuarum ex sarmenis enascentes ita appellare tradat. sed σελύλλα pro oliuarum nucleis siue osiculis accipiuntur Constantino Cesare de

agricultu. libro sexto caput. 11. teste qui sic ait: ἐστὶν δὲ καὶ οἱ σελύλλαι οὗ καὶ τινες νομίζουσι τὰν ἐλαίων, μόνον ἐστὶν πυρρὴς, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν σαφύλλων γίγαστα. Galenus tamen loco iam citato, σελύλλα quidem oliuarum etiam dici sicut et osicula, sed oleo iam expresso reliqua.

Porro quum in solidis illis uinæ retrimentis σελύλλας appellatis, tum ipse uinæ ollares distillantur, uelut alio loco declarauimus, tum etiam oliuæ ipsæ componentur, ita ut antequam exprimantur uicissim in uase cum oliui reponantur, uelut idem Const. Cesar libro nono de agricultu. cap. 31.

Videtur mihi omnino fieri posse ut eodem planè modo uelut oliuæ, etiam ipsæ siliquæ componentur ac adseruentur, easque ipsæ τὰ ἐκ τῶν σελύλλων σαρτιδεμένα Dioscorides appellauit, hoc est, siliquas in retrimentis uinæ compositas et adseruat, atque hæc sententia mihi præ superiore probatur.

## Mala.

## Cap. CXXXI.

**F**olia, flores & germina cum omnis mali, tum maxime cotoneæ, adstringunt. Pomis acerbis adstringendi uis inest, maturis uerò longe secus. Ex his uerna bilem



Mala Cydonia

Mala.



Melinella.



Epiratica.



bilem gignunt. nervos omnes lædunt. inflationes pariunt. Coronea stomacho  
utilia. urinam cient. verum tosta mitiora habentur. profunt celiacis; dysenteri-  
cis. purulenta extussientibus, cholericis, præsertim cruda. maceratorum liquor.  
commode in stomachi aut utris fluxionibus potui datur. Succus crudorum as-  
sumptus orthopnoicis salutaris est. decocto fouentur uulæ & sedes si procident.  
Coronea quæ melle condiuntur urinam mouent. mel autem sibi constringentem  
illorum uim & inspissantem asciscit. quæ cum melle coquantur, stomacho atque  
ori gratiora sunt, sed minus inspissant. cruda cataplasmati adijciuntur, ad cohi-  
bendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in uomitiones effundatur, ad manima-  
rum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit uinum ex ipsius tuis  
expressisq; sed quò perduret, quindecim sextarijs succi unus mellis adiungitur,  
alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quæ dicta sunt. Fit & oleum ex  
his quod melinum uocauimus, quo utimur quoties astringenti oleo est opus. Eli-  
gi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, & parua & odorata; quæ uerò struthia di-



cuntur, magna quidē sunt, sed minus utilia. Flos & uiridis & ficcus cataplasmatīs imponitur, ijs conueniens quæ astrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibus sanguinis. contra citam aluum, & mensium impetus, in uino bibitur. Melimela uentrem molliunt, & ab eo animalia expellunt. stomacho negotiā exhibent, æstuosa. Ea multis dulcia mala uocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho utilia. sistunt aluum, urinas euocant. malis tamen cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt uernis. & adstringūt. sanē in hūc usum immatura omnia opus sunt. Perfica poma matura tam stomacho quā uentri utilia sunt. acerba aluum cohibent, sed sicca uehementius decoctum ē ficeis alui stomachiq; fluxiones sistit. Armenia ea, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho utiliora. Medica mala aut cedromela, quæ Latini citria uocāt. nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascētibz. malum oblongū est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum semen habet pyri. Id in uino potum uenenis resistit. aluum mouet. oris suauitatem commendat, decoctio eius colluto, aut succo. estur in malacia mulieribus. uestiarijs impositum ab erosione uitio uestes uindicare existimatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *μυλέα* arbor, fructus *μύλον*. Latinis Malus. Malum.

Germanis ein apfelbaum/ein apfel. Gallis une pome & ung pomier dicitur.

Malorum sicut & pyrorum infinita sunt genera, quorum copiose meminit Plinius lib. 15.

Malis cydonia quæ & cotonea dicuntur. *α* sunt ex creta insula aduecta, à cuius ciuitate Cydonia dicta sunt. Cydonia Q. Serenus. Aut quæ poma Cydon Creteis mittit ab oris. Horum plura sunt genera. Nam sunt Chrysomela, quæ aurea mala interpretatur, à colore aureo, quem referunt. Sunt demum de minoris et odoratus fragrantia, quæ Struthæa uocatur. sunt item quæ à melleo sapore Melimela, & eadem à nascendi maturescendiq; celeritate uocantur mustica, uulgo uero ab arborum paruitate quidā pomilæ sunt in quibus nascuntur, Nana appellantur &c. quæ genera lib. 15. à Plinio describuntur. Fit & uinum, mel & oleum ē cydonijs, & condimentum Cotoneatum uulgo, Quitten Latweg. Gallis uero contingnat appellatum. Cæterum cotonea cocta suauiora in cibo. Cruda & matura prosum sanæguinem excrementibus ac dysentericis, cholericis, coeliacis, ut Dioscorides testatur.

Perfica.




Perfica nota sunt poma, uulgo pferfisch, Gallis de pesches dicta, ē Persia ad nos translata, unde nomen habent. Nec unum eorum genus est, ē quibus tamen ante alia in precio sunt à duricie & soliditate dicta duracina, quibus corpus ligno adheret auelliq; nequit, in reliquis facile separatur. Plinius lib. 15. cap. 12. Persicorum palma duracinis. Nationum habent eogomen Gallica & Asiatica. Post autumnum matureseunt, Aestate præcocia Germanis S. Johans pferfisch/Gallis abricot dicta, intra xxx. annos reperta tempore Plinij, & primo denarijs singula uenundata. Supernatia ē Sabinis ueniunt, popularia undiq; Pomum innocuum, expectitur ægris, nec aliud fugacius: longissimū enim decerpto bidui mora est cogiq; senenundari. Paulus Aegineta lib. 1. Perfica, inquit, mali succi sunt, acelescunt & facile corrumpuntur, ideoq; in prima mensa sumenda, quo deiciantur protinus, neque propter moram in uentriculo corrumpantur. Præcocia uero & rhodacina et Armenia, persicis meliora sunt, neq; enim acelescunt, neq; similiter corrumpuntur, ac sunt etiam delectabiliora. Ex quibus illud etiā intelligi potest, quod Celsus lib. 2. tradit. Non quicquid boni succi est protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse. Nec illud omitterendum, uidelicet. Armeniaca non inter Perfica à Palladio & alijs, sed pruna numerari à Plinio & Columella.

Citria mala, quæ Dioscorides capite præfenti Perfica quoq; & Medica et Citromala, Plinius Assyria appellari dicit. Quorum uaria sunt genera, magnitudine potius quā genere differētia, & iisdem quasi uiribus dotata, odoratissima & uenenis aduersantia, præcipue quod priuatim & peculiariter Latine Citrū, Germanice Juden apfel/ Citrimat. Gallicē ung Citron uocatur, de quo & Virgilius



Citrum.



gilius intellexit, cum ait:  
Folice mali quonon prestantius ullum,  
Pocula si quando seue infecere nouerca  
Miscuerumq; herbis & non innoxia uerba.

Estq; hoc pomum grande & ut hic Dioscorides illud describit, oblongum, rugosum, colore ad aurum inclinato, cum grauitate odoratum. Habentq; arborem toto anno fecundam & superfecundam, ut à Palladio etiam in Marcio mēse traditur ubi ait: Quod ego in Sardinia, & in territorio Neapolitano in fundis meis comperi (quibus) solum & cœlum tepidum est, & humor exundās) per gradus quosdā sibi semper poma succedere cum maturis se acerba substituant, acerbos

Pomeranzen.



Limonen.



Pum uero etatem florentia consequantur, orbem quendam continuæ fecunditatis sibi ministrante natura. Quæ omnia ferè etiam à Plinio traduntur lib. 12. cap. 3. Verum diuersis citri partibus, diuersæ insunt uires. Cortices enim calidi sunt: qui intus est succus semiacidus: semen item calidum, auctore Aui-cenna. sed Paulus Aegineta lib. 7. dicit esse frigidum, & carnem eius crassam generare humorem et peccatam ad augere, atq; refrigerare, & lib. 1. ait: Citrei mali extrema pars acris est, quæ uerò ueluti carnis speciem præ se fert, licet esui sit idonea, uix tamen concoquitur. Id uerò quod intus continetur, siue acidum siue aqueum fuerit, uehementer infrigidat. Sunt præterea in citriorum & Medicorum censu minora quæ Autrātia ab aureo colore, Germanis Pomeranzen, Gallis aurenges uocantur, duplici sapore prædita, dulci & acri. Sunt & citrigenum generis quos Limones dicunt, Germani Limonen, Galli Limons, de quibus omnibus eadem ferè dici possunt, & de quorum utilitate eleganter et copiose satis scribit poeta percelebris Iouianus Pontanus lib. 2. de hortis Hesperidum.

## Pyra.

## Caput CXXXII.



Pyrorū multa genera, quæ tamen omnia astringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata, decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt. ieiunos esitæta lædunt. Achras pyrastrī genus est, quod tardissimè maturescit. Vim pyro astringentiorē habet, & ad eadem conuenit. stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis effica ceter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis pyrus arbor ὄχρῳ, αὐτοῖς ὁ φρούτος ἀπὸ τοῦ ὄχρῳ, uel ὄχρῳ; Et si hæc duo posterius a de syluestri potius dici uelint ἀγροῦ ὁ ὄχρῳ.

Latina



Latinis *Pyrus arbor*. *Pyrum fructus*.

Germanis *Birbaum* / *Bir*.

Gallis *ung poirier* & *une poire*, dicitur.

*Pyrorum* innumera sunt genera, quæ copiosius à Plinio tractantur lib. 15. Ceterum *pyrorum* cibus etiam ualentibus onerosus, ægris quoque uini modo negatur, ut lib. 23. scribit Plinius: Decocta eadem mire salubria & grata, Quæcumque uero cum melle decocta stomachum adiuvant, ipsa aduersantur boletis atque fungis, pelluntque pondere & pugnante sacco.

*Pyrum sylvestre* tardissime maturefcit. Comeditur, suspensumque siccatur ad sistendam aluum, quod & decoctum eius potum præstat. Decoquuntur & folia cum pomo ad eosdem usûs. *Pyrorum* ligni cinis contra fungos etiam nunc efficacius proficit.

### Mespilus.

### Caput CXXXIII.



**M**espilus, quæ à nonnullis aronia uocatur, spinosa arbor est, folio acutæ spinæ. fert pomum iuaue, exiguum, tribus intus ossiculis, quæ ex causa id nonnulli tricoccon appellauere. tardè maturefcit, esu astringit, stomacho gratum est, aluumque supprimit. Alterum mespili genus in Italia nascitur, quod aliqui tetanium, alij epimelida uocant. arbor folijs mali, sed minoribus. pomum fert rotundum, esui aptum, umbilico latiore: quod astringit, seroquæ maturefcit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *μίσσιλος*, ἢ *μίσσιλος*.

Latinis *Mespilus*. Legitur & *Mespila* scem. gen.

Germanis *Mespelbaum* / *Mespel*.

Gallis *ung mespier*, *meslier*, appellatur.

Theophrastus ideorūsecutus obseruationem tria Mespili tradidit fastigia, Dioscorides duplici genere contentus est, ita ut alia quædam

Theophrasto & Plinio mespili distinctio representata est, & sanè quæ dubitat, an Mespilum cum sorbo ueteres confuderint, quandoquidem altissimis connumerant, quod certè sorbo quàm mespilo nunc uocata, magis conuenit, nisi quis nostratē Mespilum chamæmepilum appellandam fortasse censeat.

Epimelis frequentissima est hodie ad syluam Hirciniam, fructus eius unedo, uulgo *ezber* appellatur. Hippocrates autem *γυακίσιον*, α. α. *μακίσιον* uocat, uelut Galenus in glossis eiusdē testatur.

### Lotus arbor.

### Caput CXXXIII.

**L**otus arbor est uastæ magnitudinis, ferens baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gratam, stomacho facilem. Aluum sistit baccis. ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione, dysentericis ac foeminiis fluxione uulū laborantibus auxilio est, rufat capillos. citam aluum cohibet.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci *Λωτός* *Λεωτόσιον*. Aphri celtim. Latini *fabam* Græcam appellant Italia hodie tum *Amarenum*, tum *pongericum*, tum *uiscium*, quidam *acrisolium*, alij *cicraginem*. Veteres *fabam* Syriacā unde forsā Padi accolæ *baccam* Syriacam adhuc uocant, Romæ *pultem* Syriacam, Cænoniani hodie *Calamum*. Germanis hoc tempore incognita arbor.

*Λωτός* *πίνυς*, id est, scobis *Loti*, ad sanguinis sputum usurpatur Actuário in *ἡλ. ἀλ. ε. τ. ο. υ. :* *Galenus* leno autem ad muliebrem profluuium, dysenteriam, coeliacos affectus. Huius fructus etiam ualenter astringit.

In Gallia partibus uulgo *Alisa* dicitur & arbor ipsa *Alifer*.

Cornus



## Cornus.

## Caput CXXXV.



Cornus sylvestris.



**C**ornus dura arbor est, baccas ferens olivæ modo oblongas, quæ primùm uirent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem representant in cibo astringunt. profluuij alui atq; dysenteriae salutare, siue in edulio, siue in detruto exhibeantur. Muria ut oliuæ, condiuntur. Sanies quam uirentia folia torrendo refudarunt, impetigini cōuenienter illinitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεγώϊα.

Latine Cornus.

Germanicè Welsch Eirschen / Cornelbaum / Rurberbaum / Thierlinbaum.

Gallicè Cornier, ou curmier, arbor: fructus, corne ou corme.

Cornus arbor nota est Germanis. Nam & apud Heluetios & Alsatias nascitur, et alijs etiam ad Herciniam syluam locis, & fructus eius ab illis instar oliuæ muria conditur, quod etiam Dioscorides fieri hoc loco tradidit & Columella. Cornus scemina quam etiam syluestrem cornum appellant Græcis Ουλυνγώϊα. Germanis Spindelholz & Faulbeer dicitur, corearijs expetitus frutex. Theophrasto, caudice fungoso & inutili assurgit, ob id Germanicam appellationem Faulholz sortita est, uirgulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus baccis perquam acerbis, & cunctis animantibus gustu intæctis.

## Sorba. Caput CVXXVI.

**S**orba colorē luteum referētia prius quàm maturefcat, dissecta & sole siccata manduntur, ut aluum sistant. eadem est functio molitorum farinæ, si polentæ loco sumatur. quod & decoctum eorum in potu præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄξα, uel ὄνα arbor, fructus ὄξορ.

Latine sorbus arbor, sorbum fructus.

Germanis Äschtröslin / Speierling / Spößbyren / Alesber.

Gallis corma uel sorba, cormes, sed arbor cormier.

Sorba sunt fructus, malorum pyrorumq; generi iure antiquo

numeranda, quibus quadruplex differentia, ut lib. 15, cap. 21. tradit Plinius. Alijs enim eorum rotunditas mali, alijs turbinatio pyri: alijs ouat a species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia acri odore & suauitate iucunda. Cateris uini sapor. Generosissima quibus circa pediculos folia. Quartum genus Torminale appellant, remedio tantum probabile, assiduum prouentus, minimumq; pomo, arbore dissimili, folijs penè platani. Non ferunt ante trimatum ex ullo genere. Cato & sorba sepe condi iubet. Seruantur etiam du hoc genere, ut in Ianuario tradit Palladius, lecta duriora, ac posita, ubi mitescere cœperint, fistilibus usq; ad plenum cōduntur urceolis, gypso desuper tectis & bipedanea scrobe loco suo sub sole merguntur ore peruerso, et desuper spissius terra calcatur. Item secta per partes siccantur in sole ut



## DIOSCORIDIS

Sorba.



Prunus.



sole ut hoc loco Dioscorides tradit, & seruantur in uasculis in hys  
bernum. Cum uoluerimus uti, aqua feruente macerata reuircum sa-  
pore iucundo. Aliqui cum pediculis suis uiridia lecta suspendum lo-  
cis opacis & siccis. Celsus sorba stomacho aptissima tradit, & ali-  
um astringere, magisq; ea quæ toruentalia uocantur. Martialis uis  
sorborum uim astringentem & naturam exprimit hoc disticho:

Sorba sumus molles duramta uentres,

Aptum hæc puero quam tibi poma damus.

Et Q. Serenus uentris solutioni mederi docens ait:

Proderit & pueris quos demis origo fatigat,

Castaneas coxisse nuces, & sorba uictuista.

## Prunus. Caput CXXXVII.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur, sed sto-  
machum malè habet, aluum mollit. Syriaca pruna  
& præcipuè quæ Damasci gignuntur, exiccata sto-  
macho utilia sunt. aluum astringunt. Folia pruni in ui-  
no decocta collutiõe & gargarizatu uiam, gingiuas,  
& tonsillas fluxione laboranteis reprimunt. præstant  
idem syluestrium prunorum baccæ, post maturitatem  
exiccatae. cum sapa uerò decoctæ, stomacho utiliores  
redduntur, aluumq; magis astringunt. Gummi pruno-  
rum agglutinat. potum in uino calculos comminuit,  
& ex aceto quoq; illitum, lichenas infantium sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεωνύκεια arbor: λεωνύκιο φρούτος.

Latine prunus arbor: fructus prunum.

Officinæ Latinum nomen seruant.

Germanicè pflaumen / Briecken.

Gallicè prunier arbor, fructus une prune dicitur.

Ingenitæ, inquit lib. 15. Plinius, turba prunorum, uersicolor, ni-  
gra, candicans, Hordeacea appellata à comitatu frugis eius. Asinina  
cognominata à uilitate. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ so-  
la & odore commendantur. Damascena à Syria Damasco cognomi-  
nata. In uniuersum Pruna aluum molliunt. Stomacho utilissima, sed  
breui momento, ut ait Plinius. Dioscorides hic uerò stomacho nocere  
re dicit, et Damascena siccata stomacho accommodata esse, sed aluum  
cohibere, cum manifeste hæc soluam, licet minus quam alia, ut Pau-  
lus Aegnetæ lib. 7 tradit. Martialis: Pruna peregrina carie rugosa  
senectæ Sume, solent auri soluere uentris onus. Et Serenus: Sæpe ci-  
bi specie, uitio uel corporis ipso, Potibus aut duris restricta mora  
bitur aluus. Vincitur talis mora gramine Mercuriali: Prunaq; con-  
ueniunt quæ mittit clara Damascus. Sum autè talia ceteris præstan-  
tiora & salubriora. Seruantur etiam pruna sole uel furnis siccata  
& aliter. Palladius in Nouembri mense, Pruna, inquit, siccantur in  
sole per crates loco sicciorè disposita. Hæc sunt quæ Damascena di-  
cuntur. Alij in aqua marina uel in muria feruente recentè lecta pru-  
na demergunt. & inde sublata, aut in furno tepido faciunt, aut in so-  
le siccari.

## Arbutus.

## Caput CXXXVIII.

Arbutus siue unedo, arbor est coronæ malo non dissimilis, tenui folio, cuius  
fructus pruni magnitudinē implet, nullo intus nucleo. huic memæ cilo  
cogno



Arbutus.



cognomen est. maturus aut flauet, aut rube-  
scit. in esu acerosus. stomacho aduersatur,  
capitisq; dolorem mouet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἄρβυκος. Latinis arbutus.

Germanis incognita. Gallis arbouces. dicitur.

Arbutus ἄρβυκος Græcis est. quæ arbor una cum  
fructu suo, Memecylo Græcis appellato, acerbæ quali-  
tatis est, et stomacho incommodat, ac capitis dolorem in-  
ducit, ut Galenus 7. simpl. phar. de ea prodit, & Diosc.  
cap. præsent, quod ipsum etiam de comp phar. part.  
de ipso fructu Galenus perhibet, eaq; propter in capitis  
dolore febrili uitandum censet. Verum Plinius lib. 15.  
cap. 24. ait: Vnedo pomum in honorum, ut cui nomen  
ex argumento sit unum tantum edendi, duobus tamen hoc  
nominibus appellam Græci, Comarum & Memecylon,  
ex quo apparet totidem esse genera & apud nos, alio  
nomine arbutus uocatur. Quibus uerbis Plinius quatuor

oces Vnedonem, Comarum, Memecylon, & arbutum, uni arbori ac fructui tradit, cuius tamen duo  
genera esse putat, atq; ita etiam lib. 23. cap. 8. sentit. Arbutus, inquit, siue unedo fructum fert difficilem  
concoctioni & stomacho inutilem. At uerò ἄρβυκος & arbutum eandem arborem esse, eiusq; fru-  
ctum Memecylon uocari, ex supra citatis Galeni ac Dioscoridis præsent capite clarum est. Vnedo  
nem autem alium esse fructum, & non Comari siue arbuti, sed arboris Epimelidis appellatæ superius  
cap. 133. ex eodem Galeno ostendemus, Sexto namq; simplicium phar. de Epimelide, ἐπιμελίδος  
acerba planta est, & ut dicere possis syluestris malus, appellatur autè à ruralibus in Italia οὐνεδος  
hoc est unedo, ac plurimum in Calabrianascitur. fructus eius acerbus. stomacho incommodus, & capi-  
tis dolorem inducens, nam peregrina qualitas quædam ei est ammixta. Quæ uerba ex Galeno etiā Pau-  
lus transcripsit, ut dubitari non debeat quin alia arbor sit ἐπιμελὶς, quæ unā cum fructu suo in Italia  
unedo appellatur, & alia arbutus, cuius fructus Memecylon Græcis dicitur. atq; hoc propterea quòd  
diuersis locis eorundem mentio fiat, & hoc ab his authoribus qui æquē ut Plinius in Italia uixerunt  
quanquā Plinius innuat potius quàm exprimat duo unedonis genera esse, ut uidelicet alterū de Memecylo,  
alterum de unedone accipi possit, Sed tamen mox leuiter satis dictum confundit, cum ait: alio no-  
mine arbutus uocatur. Quare certum est ipsum existimasse arbutum & unedonem Latinis esse, quod  
comarum & Memecylon Græcis, atq; id ut opinor ob similem uim, quæ de Memecylo & unedone pro-  
ditur. Verum ex Galeni uerbis ostenditur unedonem epimelidis fructum esse, Memecylon autem arbuti.  
Neq; refert fructuum & arborum appellationes singulatim inter se in suo genere confundi. Quin &  
lib. 2. de alimentis idem Galenus manifestè inter comarum arborem, cuius fructus Memecylon appella-  
tur, & inter arbutum aut sentem potius, quæ Epimelidas fert, & in Italia unedo appellatur, dis-  
tinguit, ut certum sit duo diuersa genera unedonem & Memecylon esse, quorū αὐτὸς ὁ γὰρ Galenū suis-  
se credo, Plinium uerò ut non adeò circa has res curiosum, ex Græcis tantum transcripsisse, & in his  
uelut multis alijs eos non assequutum esse. Porro Dioscorides supra cap. 133. alterum genus Μεσπύλου  
Italia nasci prodit, sed ab aliquibus ἐπιμελὶς uocetur, ut ex eius uerbis Epimelis & unedo ex Me-  
spilorum genere sint. Arbutus uerò & Comarus ac Memecylon sui generis, & ab eis diuersi existunt  
ut supra ostendimus cap. iam citato.

## Amygdalæ.

## Caput CXXXIX.

**A**Mygdalæ amaræ radicum tritatum decoctum uitia cutis in facie corrigi-  
t. illitæ nuces idem munus præstant. menses admotæ ciunt, capitis dolori au-  
xilantur, illitu fronti aut temporibus cum aceto uel rosaceo. epinyctidas sanant,  
ex uino item putrescentia ulcera, & quæ serpunt. & morsus canum cum melle. ea-  
rum autem esu dolores finiuntur. aluum emolliunt. somnum faciunt. urinam ciunt.  
contra sanguinis reiectiones cum amylo assumuntur. renum uitij & pulmonum  
in inflammationibus ex aqua in potu aut elegmate cū resina terebinthina dantur.

H



## DIOSCORIDIS

## Amygdala.



calculosis difficiliq; urinæ in passio auxiliantur, & illinctu cum melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis septenisue præsumptis ebrietatē nō sentiūt potiores. uulpes si cum quadā esca eas uorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & astringit. reijcientibus sanguinē, potum auxilio est. impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. tussi uetustæ cum diluto uino potum medetur. calculosis cum passio bibere prodest. E nucibus Græcis, dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedijs quàm amaræ: attamen extenuant, urinam ciunt. recentium esu cum suo putamine, stomachi uitia emendantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμύγδαλα. Latine amygdala.

Officine Latinum nomen seruarunt.

Germani Mandelbaum / Mandel Kern.

Galli des amandes appellant.

Amygdala amara incidunt, tenuant, tergun, digerunt sine morfu: ob id ex pulmone exsecrationem crassorū et lentorum promouent, obstructum hepar, lienem, renem, colum à crassis & lentis humoribus expediunt. Amygdala dulcia sunt moderatè calida, leuiculam tamen amaritudinem habent, sed à dulcedine occulta tam, quæ tamen temporis spacio fit manifesta.



Pistacia.

## Pistacia.

## Caput CXL.

Pistacia, quæ constat in Syria gigni, pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. trita cum uino contra serpentium ictus profunt, siue edantur, siue bibantur.

Pistacea Germanica.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πίστacia.

Latine



Latine pistacea uel pistacia. Nicander Pistacia. Posidonius listacia uocauit.

Officina fistici.

Germani Welsch Bimpernuslin.

Pistacia in Syria prouenit ut Galenus quoq; scribit à pineis nucib. non absimilia stomacho accommodata. Galenus exiguum præstare alimentum pistacia tradit, confirmando dilatandoq; iecori haud inutilia: infractos enim humores excernunt: at stomacho ne prosit Galenus incertum reliquit: Serapion Dioscoridis monitu tantum recenset stomacho conuenire, atq; auellana magis excalfacere: quare & amygdalis calorificis amplius: Auicenna uerò phisticos hæc eadem nominās duobus integris numeris calere testatur, calidiores amygdala ac ipsa nucē: uerum putauerim ego nucē auellanam Auicennam concepissee, etenim inglandem tertio ordine calorificā scripsit, quod erroneum cum sit, deprauium de iuglande scribentē Auicennā uerisimile est: addidit ille perexiguū nutrire pistacia, iecori peramica, stomachum non parum iuuare, quem nauseantem confirmant & muniunt.

Eam arborem quam nupine pistaciorum Germanicorum adproximus omnino eam esse existimo que Plinio Staphylo dendros dicitur, arbor, ut ipse tradit, trans alpes, simillima aceri, alba in materia, sili quas ferens, & in ijs nucleos sapore nucis auellane. Germanis Bimpernuslin dicti. & figura & sapore parum à pistacijs differentes. de his plura in herbario nostro Germanico.

Nux iuglans.

Caput CXLI.



**N**ux iuglandes, quas nonnulli Perficas uocant, sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & uomituris ieiunis in cibo aptæ, cum ruta uerò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, uenenis resistunt nec minus si à ueneni haustu comedantur, largius esitata tineas latas pellunt. illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatissq; cum mellis exiguo & ruta. cum cepa autem, sale & melle, canis hominisq; morsui proficiunt, tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nux trit capillum. alopecias replet. Siftunt menses nuclei usti, si triti ex uino admo-ueantur. idem è ueteribus, illiti carbunculis, gangranis, & ægilopijs medentur. alopecijs commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tufis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suauiores. itaq; alio


H 2



# DIOSCORIDIS

Nux Indica.

mista eximunt acrimo-  
niam. liuores in corpo-  
re illitu tollunt.



## NOMINA EX explicatio.

Græcè *καρύδι Βασιλι-  
κόφ, ή εν Βασιλειά, ή εν Βασι-  
λειά.*

Latine *nux Basilica, iuglās,  
Persica.*

Germanicè *Baum nuss/  
Welsch nuss.*

Gallicè *Vne noix.*

*Nux iuglans seu regia, nu-*

*cleo est tenuium partium ubi inaruit, siccante etiam sine morfu, ex quo inueterato oleum ualenter  
digerit.*

*Nux Indica Actuaria in diasatyrio & diaromato. Veteres huius non meminerunt.*

## Nuces auellanae:

## Caput CXLII.



**N**uces auellanae, quas & leptocarya uo-  
cant, stomacho infestae sunt. ipsae tamen  
trita, & in aqua multa potae, tussi ueteri me-  
dentur. tosta & cum exiguo piperis potae de-  
stillationem concoquunt. crematarum cinis  
cum axungia aut adipe urfi perunctus alopecu-  
ri capillum reddit. Aiunt nonnulli usta ea-  
rum putamina, & in cineris speciem redacta,  
cum oleo, caeterorum oculorum pupillas infan-  
tibus denigrare, peruso sincipite.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Αελλόνα, id est, nux tenuis, Pontica, Praenestina.  
Auellana, à locis ubi luxuriat Ponto, Praeneste, Auellis, di-  
citur, Germanicè Haselnuss Gallicè Noisettes, ou mellis-  
ne. Plus habet terrae & frigidae substantiae, ob id auste-  
rior iuglande. Noces tenerae, rancidae, usta, cinere diges-  
tunt & astringunt. Gal. lib. 6. part.*

## Morus.

## Caput CXLIII.

**M**orus arbor nota est. cuius fructus aluum soluit. stomacho inutilis est, & fa-  
cile corruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus: decoctus autem  
aereo uase atque insolatus, adstringentior redditur. facit ad fluxiones, nomas, &  
tonillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed insolens citius eius, adiecto  
scissili alumine, galla, croco, & myrrha: item myrica semine, iri, & thure. Imma-  
tura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhois uice obsonijs miscentur, ut cee-  
liacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit. latas uen-  
tris tineas excutit. his quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita ex  
aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, uitiis & fici nigrae fron-  
dibus simul coctis in aqua coelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus con-  
tra phalangiorum morfus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure den-  
tes aptissimi



Morus.



res aptissime in dolore colluuntur. Radix cit-  
citer messem incisa, facto in ambitu scrobes  
succum emittit, qui postridie concretus inue-  
niri solet. Is in dolore dentium efficax est. ru-  
bercula discutit, & aluum purgat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè *ἡμορρα, ἢ συκάμυρ* & arbor, fructus uero  
*συκάμωρ*.

Latine Morus arbor; Morum fructus

Officinae Latinum nomen seruauerunt.

Germanis Maulber & Manlberbaum.

Gallis ung meurier & une meure dicitur.

Morum albam Grecis ueteribus indicium uidetur &  
Latinis, præter quam Ouidio, forte quia per insitionem  
in populo alba gignitur: nigri catarisimum, & arbor  
cuius folijs bombyces pastu sericum uent pulchrius &  
splendidius, Mori tamē alba foliū ad hos alendos est mol-  
lius, eoq; hodie tota Italia utitur.

Mori fructus ab eo quod in stomachica pharmaca cō-  
modus est, apud nostrates nomā inuenit. Maulber / ap-  
pellatus.

## Sycomorus. Caput CXLIII.

**S**ycorum aliqui etiam sycaminum, id  
est, morum, uocant, cuius fructus sycomo-  
rum etiam propter inefficacem gustum appellatur arbor est magna, fico similis,  
frondosa, multo lacte abundans, folijs mori, pomum ter aut quater anno fert, non  
ramis, ut ficus, sed caudice ipso, caprifico nō dissimile, dulcius grossis, sine granis  
interioribus, quod non maturefcit, nisi ungue aut ferro scalpatur. Nascitur plu-  
rimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici fera cibus, ubi prouentu fce cun-  
do restibiliq; iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum aluo uti.  
Ie est, sed perquam exilem præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus pri-  
mo uere tenera arbore, antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo  
cortice desquamato. si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia  
aut uellere lachryma excipitur, quæ siccata & in pastillos coacta fictili uase re-  
ponitur. Vis succi emollit, uulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni res-  
pugnantes. bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lie-  
nes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerrimè teredinem sentit. Gignitur &  
in Cypro arbor genere distans, quæ cum sit ulmus, prædita tamen est folijs sycō-  
mori, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sycomora eadem non sunt cum sycaminis siue moris appellatis, quanquam Dioscorides hoc loco  
quosdam etiam ipsam sycamorū sycaminum appellare prodat: Sycorum enim Galenus, plantam  
unā cum fructu se in Alexandria uidisse dicit, fructum quidem consimilem ficui parue albe, eumq; in  
medio mororum & ficuum locari posse ait, unde etiam nomen sit adeptus, à similitudine uidelicet  
quam ad utrumque fructum habet. Amplius autem ridiculos esse ait eos qui sycomora dicta putent,  
quod sitis ficubus, hoc est, τοῖς μωποῖς ὅτι οὐκ ὁμοῖοι αὐτῶν καὶ τῶν κατὰ τὸν σικαμῶνα, ὅτι  
ἡ αὐτὴν notari qui præfati capite ait: *καλὴ δὲ καὶ ὁμοῖοι αὐτῶν καὶ τῶν κατὰ τὸν σικαμῶνα, ὅτι*  
*ἡ αὐτὴν notari qui præfati capite ait: καλὴ δὲ καὶ ὁμοῖοι αὐτῶν καὶ τῶν κατὰ τὸν σικαμῶνα, ὅτι*  
videtur enim sentire Dioscorides ob æbilem saporem sycorum quasi  
ficum esse dictum. Sed & aliud mirum de hoc arbore eodem loco Galenus prodit. Nempe




uerationem eius diuersam esse à reliquis arborum fructibus. Neque ex uirgultis ac germinibus, sed ex ipsis ramis magnis ac stipite siue trunco enascitur. Sed in Græco exemplari corrupte legitur ἀ-  
 κρεμύων pro πρέμων. Meminit huius arboris itemq; fructus eius, etiam Plinius, sed non sycomo-  
 rum appellat, uerum ficum Aegyptiam libro decimotertio, capite septimo: Arbor inquit, moro similis  
 folio, magnitudine, aspectu. Pomum fert nō ramis, sed caudice ipso. idq; ipsum est ficus prædulcis, &c.  
 & paulò post. Huic similis quadantenus quæ uocatur Cypria ficus in Creta. Nam & illam caudice  
 fert pomum & ramis, quum in crassitudinem adoleuerit.

## Fici.

## Caput CXLV.

**F**ici maturæ recentes stomachum lædunt. aluum soluunt. sed faciliè contracta  
 ab eis fluxio sistitur. sudorem euocant papulasq; sitim sedant, calorem restin-  
 guunt. siccis natura ex calfaciendi. uires alunt, sed sitim magis stimulant. aluo uti-

Ficus.



Ally, Cro-  
co,

les, rheumatismis uentris &  
 stomachi contraria. gutturi  
 autem, arteriæ, renibus, ue-  
 sicæ, & ijs quos longa uale-  
 tudo decolorauit, anhelato-  
 ribus, hydropicis, comiti-  
 alibus aptissima. feruefa-  
 ctæ cum hyssopo & potæ,  
 thoracem purgant. tussi ue-  
 teri, diurnisq; pulmonum  
 uitij conueniunt. aluū mol-  
 liunt tuso cum nitro & cui-  
 co\*, dein manducata. deco-  
 ctum arteriæ & tonsillarum  
 inflammationibus gargari-  
 zatu prodest. cum hordea-  
 cea farina cataplasmati mi-  
 scentur. & in muliebres fo-  
 tus cum scenugræco & pri-  
 sana. cæterum cum ruta co-  
 ctæ torminibus infundun-  
 tur. coctæ illitæq; duritias  
 discutiunt. parotidas & fu-  
 runculos emolliunt. panos  
 ad maturationem perdu-  
 cunt, maximè nitro, iri aut  
 calce addita. crudæ si cum  
 antedictis tundantur, eas  
 dem efficiunt. cum malico-  
 rio, pterygia purgant. cum  
 atramento sutorio, deplo-  
 ratis uerè tibiæ fluxio-  
 nibus, & cocoëticis ulceri-  
 bus medentur. quin & cum  
 uino decoctæ addito absin-  
 thio & hordeacea farina,  
 utilissimè hydropicis illi-  
 nuntur. crematæ cum cera  
 to sanant perniones, pruri-  
 gines, sonitusq; si crudæ re-  
 rantur, & sinapi liquoreq;  
 aliquo



aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris quàm satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumquæ dissoluit, ut acetum. exulcerat corpora, meatus aperit. soluit aluum. uulnam recludit cum detrita nuce græca potus. menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica cera podagrico rum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto utilis. lepras, lichenas, utiligines, uitia cutis in facie, pforas, ulcera in capite manantia, cum polenta expurgat. instillatus plagæ, percussis à scorpione, uenenatorum ictibus & rabiosi canis morsibus auxiliatur. prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum additus, uerrucarum informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tusi exprimuntur, & siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus imponuntur exulceratorijs medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spathæ loco moueatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ζυκν.

Latine &amp; Officinis ficus.

Germanis Feigenbaum

Gallis ung figuier.

Ficuū plura traduntur genera, de quibus Plinius partim libro decimo tertio, partim 15. agit. Inter quæ sunt mariscæ uocatae, grandiores & insipidiore, de quibus Martialis extat distichon hoc,

Infanti melimela dato, satuasq; mariscas,

Nam mihi quæ nouit pingere, Chia sapit.

De qua chia eiusdem etiam est alterum, distichon hoc,

Chia seni similis Bacho, quam Setia misit,

Ipsa merum senum portat & ipsa salum.

Sunt deinde à locis etiam dictæ Cossana, de quibus etiam apud Martialem est distichon tale.

Hæc quæ torta tibi uenerunt condita mentha,

Si maiora forent Cossana, sic erat.

Item Caricæ, quæq; confendenti nauum aduersus Parthos omen fecere M. Crasso uenales prædictantis uoce Caucæ. Quæ omnia in Albenferusè Syria intulit L. Vitellius, qui postea censor fuit, cum legatus esset in ea prouincia nouissimis Tiberij Cesaris temporibus. Inter quas iam nominatas Caricæ optimè siccantur. Vnde quidam siccæ ficus Caricæ nominant. Sicut item Aphricanæ à prouincia dictæ, quæ Romanis delendæ Carthagini occasionem dederunt libro 15. tradente Plinio. Cætonanque perniciali odio Carthaginis flagrans, nepotum securitatibus, cum clamaret in omni Senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in curia præcoccem ex ea prouincia ficum, ostendensq; patribus: Interrogo uos, inquit, quando hoc pomum demptum putatis ex arbore? Cum inter omnem recensere constaret. Atqui tertium, inquit, ante diem scitote decerptum Carthagine, tamen prope à muris habemus hostem. Statimq; sumptum est Punicum tertium bellum, quo Carthago deleta est: & unius pomi argumento euersa. Sunt præterea à prouentu eadem serotine & præcones, bifere, albæ ac nigrae cum messe uindemiæq; maturescentes. Serotine sunt, & à corio appellatæ duro, duricorise. Grossi demum dicuntur fici antequam maturescant. Sed de generalibus earum ad præsens factis. Fici mollis omnibus tactus. Maturis frumenta intus. Succus maturefcentibus lactis, percossis mellis. Senescunt in arbore, anusq; distillant gummi modo lachrymam, siccanturq; Panis simul & obsoni uicem siccata implent. Ceterum quantum ad naturam earum attinet, Ficus multi alimentum sunt Sed alienæ stomacho, inflant & aluum mouent, auctore Celso, Maturæ recentesq; stomacho, testante Dioscoride, noxiæ sunt. Sanguinem malum generant, unde si multum commendantur, pedunculos præcreant, auctore Paulo Aeginetha & Oribasio.

Grossi.

Cap. CXLVI.

Grossi, quæ erinei nonnullis uocantur, coctæ, illitæ, strumas nodosq; omnes mollit. crudæ formicas, uerrucas & thymos, nitro farinaq; additis, tollit. Folia eadem possunt. illita cum sale & aceto ulcera in capite manantia, epinyctidas & furfures sanant, ijs ficosæ extuberationes, & genarum scabritiæ perfriantur.

H 4





Nigra ficus folijs cauliculisq; candida uitilignes perunguntur. faciunt ad canum morsus, & ulcera quæ ceria, id est, fauos, uocant. Grossi cum syluestris papa ueris folijs ossa extrahit. furunculos cū cera discutit. cōtra muris aranei morsus, & scolopendræ uenena, cum eruo & uino illita, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam syluestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod sub indema cerari opus est & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: namq; expurgat & cōsumit quæ ex crescunt. eoq; sic utendum est: Spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdū dysentericis, & in fluxiones uetustas, & sinus cuniculatis exedentes, magnosq; instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atq; emplastra quæ cruentis uulneribus iniiciuntur: enama uocant. bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. celiacis, dysentericis per se cyathus datus prodest neruorū uitij, cōuulsionibus commodè illinitur ex oleo, ut pote quod sudores moueat. aduersus gypsi potum & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiua, præsertim quernum. omnia tamen adstringunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grossi dicuntur fici qui non maturuerunt. Germanicè Onzeitrig feigen.

Persea.

Caput CXXVII.

**P**ersea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneus, stomacho utilem, in quo phalangia cranocolapta nomine inueniuntur, præsertim in Thebais de Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui ex Nicanari interprete uulgari pomum persici arborem eandem esse uelim, quæ tum persica tum persea dicitur, & pomum ipsum uenenatum cum cruciatu gigni in Persia, in Aegyptū deinde translatum factum fuisse mutius & esui aptum. Quod & Columella in carmine innuit his uersiculis.

Stipantur calathi pomis quæ barbara Persis

Miserat (ut fama est) patrijs armata uenenis,

At nunc expositi paruo discrimine læti

Ambrosios præbent succos, oblita nocendi.

Verum hoc falsum esse, & non de Persici, cuius mentionem supra fecimus, sed Persee arboris fructu, intelligi debere ostendit Plinius lib. 15. cap. 13. Vbi sic scribit: in totum quidem Persica peregrina etiam Asia Græciæq; esse ex nomine ipso apparet, atque ex Perside aduecta. Nam Persica arbor sero & cum difficultate transire, ut quæ in Rhodum nihil ferat, quod primum ab Aegypto carum fuerat hospitium. Falsum est uenenata cum cruciatu in Perse gigni, & poenarum causa a regibus translata in Aegyptum & terra mitigata. Id enim de persea diligentiores tradunt in, quæ tota alia est: mixis rubescentibus similis, nec extra orientem nasci uoluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphis satum. Idem de persea & non per



non per se fructu testatur etiam hoc loco Dioscorides, & Galenus lib. simp. ph. &c.

Iberis.

Cap. CXLVII.



Iberis siue cardamantica, folia habet nasturtij, uere uidentiora: caulem cubitalem, aut minorem. in incultis nascitur. estate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes & adurentes. ipse enim ischiadicis cum salsa axungia emplatri modo utiles, quaternis horis alligæ, ut deinde in balneas descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Iberis, ἡ ἰβερὸς ἀμάντις, ἡ αἰγυριακή γόλαμος Græcis. Galeno & Paulo Lepidium minus.

Latinis Iberis. Nasturtium agreste. Germanis Gauch blüm, wilder Kressen / Stein Kressen &c.

Iberis herba, à regione Iberia nomen inuenit, & uelut Galenus testatur, eadem est quæ Lepidion Græcis appellatur. Quò magis mirum est Dioscoridē hoc loco seorsim de Iberide tradere etim. 2. lib. seorsim de Lepidio, ut herba in ciborum usum ueniente: quam sane de Lepidij folijs testatur, cori esse uim acré & exulceratoriā, ut ea gratia ischiadicis cōmodū cataplasma exhibeatur. De Iberidis aut radicibus prodit plenè auxiliū Galen. li. 10. de cōp. ph. part. 2. Democrate præscriptū, quod uidelicet cum adipe suillo tuse, ischiadicis impostæ conducant. Paulus tamen Aegineta lib. 2. cap. 77. Iberidem & Lepidium, & agriocardamon, pro eadem herba agnoscens, item foliorum usum ischiadicis præscribit, & si eo tempore quo usus eius expetitur, folia non sint, tum de muncortice radicis, cum axungia ad emplatri formam tusum, imponendum ischiadicis dicit. Damocrates autem foliorum Iberidis in hunc usum nō meminit, sicut neq; Aëtius duodecimo, cap. 2. qui uersus Damocratis, sed tamen lege carminis soluta prodit, & Iberidem etiam Cardamum appellari dicit, propterea quòd odorē, & saporē, & figurā cardami, hoc est nasturtij habeat. Id quod etiam Galenus libro 7. simp. ph. de Lepidio testatur. Quare eadem est herba, Lepidion, Iberis, Cardamina & agriocardamon, siue nasturtium syluestre appellata.

In Dioscoride tamen hoc loco ἡ ἰβερὸς ἀμάντις pro καρδαμύν, falsò legitur. Sicut de scriptio quoque corrupta est, μὴν & ὅσον πυχρὰ ἢ ἑλαττέρα. Deest enim καυλὸν uox, & πλεον: ut sic legatur, μὴν & ὅσον καυλὸν ὅσον πυχρὰ ἢ ἑλαττέρα, & sic sententia uersuum Damocratis, qui sic habent καυλὸς δὲ αὐτῆς ὄντος μῆκος πύχνης. μίκεδόν τε ἑλατὸν καὶ πλεον. Id est, Caulem cubitalis longitudinis gerit. Paulo maiorem aut rursus ampliorem &c.

Nam & Aëtius sic describit. Sed & quod ad finem huius capituli habetur, καὶ ἑλατὸν μετὰ πριον τοῖς τοῖς ἐπιχρίδω, corruptè legitur, pro καὶ ἑλατὸν μετὰ ὀνομα τοῖς τοῖς ἐπιχρίδω, hoc est, oleum cum uino locus illinatur. Sic enim faciendum aperte docet Damocrates loco superius citato, & Aëtius quoque.

Sed & Plinius libro 25. cap. 8. Postea oleo & uino corpus perungatur dixit.

Finis Libri Primi.



94  
**PEDANII DIOSCORI-  
 DIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA**

teria Liber Secundus. Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figura  
 rum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per  
 Gualtherum. H. Ryff. Argentinum. Medicum, ex doctis.  
 uirorum lucubrationibus adiectis.

**P R A E F A T I O.**



N primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali ma-  
 teria condidimus, de aromatibus, oleis, unguentis, arbori-  
 bus, & nascentibus ex eis succis, lachrymis, seminibusque  
 disseruimus. In hoc aut secundo de animantibus, melle, la-  
 ste, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus, subnexis  
 herbaceis quæ acri prædita sunt facultate, utpote quæ cum  
 ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi, in-  
 telliguntur. Idque ideo, ne cognatorum uires disiunxisse  
 uideamur.

**Echinus siue erinaceus.**

*Erinaceus Marinus.*

**Cap. I.**

*Histrix.*



*Erinaceus terrestris*



**M**arinus echinus stomacho uentriq; utilis est. urinam cit. huius testa cruda  
 inassata, commodè medicamentis admiscetur, quæ pforas abstergunt. cre-  
 mata uerò cinis sordida ulcera expurgat. luxuriantem carnem reprimat. Terre-  
 stris erinacei corium combustum alopecij cum pice liquida aptissimè illinitur.  
 assiccatum corpus, & aceto mulso potum, renum uitij auxilio est. item aquæ cus-  
 tem subijit, conuulsionibus, elephantia & malè habitis, quos cachectos uocant.  
 uiscerum fluxiones exiccat. eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad  
 eosdem usus utilissimè reconditur.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Echinus inter uarias significationes suas significat etiam animal marinum & piscem è testaceo-  
 rum genere, erinaceus uulgo dictus: forma orbicularis, spinis circumuallatus, quibus pro pedibus ut-  
 tur in orbem sese uoluendo, nec aliter ingreditur. Caro illi intus nulla, idq; illi peculiare, sed nigra  
 quædam in omnibus uice carnis spectantur. Meminit echini huius Martialis hoc disticho.

Iste licet digitos testudine pungat acuta,

Cortice deposita mollis echinis erit.

Verum de Echinis, quorum etiam non unum genus est, authore lib. 4. de hist. ani. Aristotele: Plu-  
 nius lib. 9. ubi de sanguine carentibus agit piscibus, ait: Ex eodem genere sunt Echini quibus spina  
 pro pedibus. Ingreditur his in orbem uoluitaq; detritis sepe aculeis inueniuntur. Ex his echino-  
 metra appellantur, quorum spina longissima, calices minimi. Nec omnibus idem uireus color. Circa  
 toronem



toronem candidinaſcantur, ſpina parua. Oua omnium amara, quina numero. Ora in medio corpo-  
re in terram uerſa. Tradunt ſeuitiam maris preſagire eos, correptiſq; operiri lapillis, mobilitatēq;  
pondere ſtabilientes, nolunt uolutatione ſpinas atterere. Quod ubi uidere nautici, ſtatim pluribus an-  
choris nauiga infrenant. Echinus marinus ſtomacho accommodatus eſt, authore Dioſcoride. Celſus  
quoq; aluum mouere teſtatur. Et Plinius lib. 32. ait, Echini ad calculos in cibis proſunt. Eſt & Echi-  
nus terreſtre animal, cuniculi magnitudine, ſed ſpecie porcina, aculeis uallatus quemadmodum hiſtrix  
eſt: ubi uero ſenſit uenientem, contracto ore pedibusq; ac parte omni inferiore, quā raram & inno-  
cuam habet lanuginem, conuoluit in formam pile, ne quid comprehendī poſſit præter aculeos: in  
deſperatione uero urinam ex ſe reddit tabicam, tergori ſuo ſpinisq; noxiam, propter hoc ſe capi gna-  
rus, cute cuius expoliuntur lina, & uulgo ericium, Germanicè Lin hechel appellant. Echinus Germa-  
nicè Lin ygel iam aquatilis quā terreſtris Græca uox eſt, à Latinis erinaceus appellatus: quanquā  
Theodorus echinum marinum ubiq; in Ariſtotele non aliter quā echinum interpretatus eſt, Ple-  
nium forte imitatus: attamen qui terreſtris, Erinaceum conuertit. Hiſtrix Erinaceo ſimilis eſt.

## Hippocampus.

## Cap. II.

**H**ippocampus marinum animal eſt exiguum, cuius cremati cinis exceptus,  
cum liquida pice aut axungia ſeu amaracino unguento illitus, alopecias  
replet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Breuem paruumq; hunc piſcem Dioſcorides ait eſſe, & nihilominus magnitudinis notam illi con-  
iunctam. Quod enim Græci Hippo, multis in natura adiungunt, grande ſignificat. Sed id ſic intelligen-  
dum eſt, ut comparatum id animal olerum, aut arborū crucis, grande ſit: marinis uero beluis & piſci-  
bus, breue & paruum.

Purpura, buccina, corumq; uolutæ.

## Cap. III.

Buccina.

Purpura.



Voluta.



**P**urpura uſta exiccat, dentes abſtergit, excreſcentias in carne cohibet, ulcea  
ra purgat, & ad cicatricem perducit. Eadem præſtant concremata buccina,  
ſed uehementius urunt, ſi quis ſalis plena, fiſtili crudo adurat, dentifricio  
conueniunt, ambuſtis utiliter illinuntur, quibus ſolui medicamentum non opor-  
tet, nam poſteaquā uulnus cicatricem duxerit, ipſum in teſtæ modum indura-  
tum, ſponte ſua decidet. Fit etiam calx è buccinis, ut in eius mentione demonſtra-  
bimus. Cionia uocantur purpurarum buccinorumq; mediæ partes, circa quas  
teſtæ uolumen clauiculatim intorquetur cremata ſimili modo, maiorem purpu-  
ris buccinisq; facultatem urendi conſequuntur, quoniam apprimendi naturam  
obtinent. Buccinorum carnes ori gratæ ſunt, & ſtomacho utiles, ſed aluum non  
molliunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Purpura Græcis porphyra uocata, Concha eſt è turbinatorū genere, aculeis clauata, lingua digi-  
tali, ſerina, toroſa et ualida, duritia tanta ut cōchas poſſit perforare, flore purpureo, qui nigrantis ro-  
ſe ſplendore ſublucet, colorum omnium gratiſſimo, tingedis uestibus maxime expetito. Purpuram diu  
multumq; conſideraui, cum aliam concham tandiu mordicus premeret, quoad ſuffocata hiſceret. Con-  
ficiendi purpurei coloris rationem noſtri homines ignorare putantur. Olim purpurarum teſtas con-  
ſtingebant, & carnes ad tincturam condiebant, & aqua dilutas, & ſordibus expurgatas, ſuccenſis  
ignibus

Petrus Gilo



ignibus in lebetē coquebant, harum sanguis ab igne incallescens, fluebat, & efflorescebat, partimq; flavescebat; partim Cyaneo colore fiebat; partim in alium colorem conuertebatur, ac nunc quid imponeretur, commutabatur in illius colorem. Massilienses hanc, & Murices, & Buccinos uocant Bios.

Ceryx à Plinio Latine Murex, & Buccinum appellatur: Concha est clauicula in intoria, & turbinata, scabra, sine aculeis, magnitudine purpuris inferior, Buccino turbinato, quo sonus editur, similis, excepto ore rotundo in margine inciso. Ergo eadem erit Buccini descriptio: nam est è genere turbinatorum Concha, sine aculeis, Buccino Concharum generi quo sonus editur similis, nisi rotundo ore differret, in margine inciso: Buccinum enim quo sonus editur, non est incisum. Ligures Buccinos nunc uulgo Cornetos nominant. Massilienses Bios Cornetos: Græci quidem hac etate Strophilidas. Speusippus dicit similes esse κρύκας, καὶ τροφύρας καὶ σφαβύλιν, siue ἄσφοβύλιν: Dercitius dicit commodos esse ad reddendum sonum. Officinæ hæc Concharum genera corrupto nomine Entale & dentale appellant.

### Mituli.

### Cap. III.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. priuatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur. genarum crassitudines absumunt. albugines purgant, & cætera quæ oculis caliginem offundunt. carnes eorum ad canis morsus utilissimè imponuntur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Myes à Theodoro uertuntur Mytuli, sed quàm rectè, indicare nondum audeo. Plautus tamen Myes in Rudens musculos uidetur appellare: & Cornelius Celsus inter ea quæ alium mouent, salisamenta ponit Ostrea, Pelorides, Echinos, Musculos, & omnes ferè Conchulas. Equidem cum Græcis hominibus eos quos uulgo Veneti uocant Musculos, & Cuniculos offenderem, dixerunt esse Mydia, hoc est, Musculos. Athenæus tradit sua etate Tellinas à Romanis Mytulos nominatos fuisse.

### Tellinæ.

### Caput V.

Recentes tellinæ alio utiles, sed maximè ius earum. salitæ uruntur, tritaq; in cinerem & cum cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Athenæus dicit Romanos sua etate Tellinam nominasse Mytulum. Marcellus, Dioscoridis interpres, Tellinas opinatur conchulas esse, quas memoria nostra Tellinas Romanas uocant. Sed Aristophanes grammaticus Tellinas patellas dicit similes esse, eisdemq; pueros pro cornibus uti solitos fuisse: à quibus longè diuersæ sole clariùs uidentur eæ, quæ uulgo Tellinæ uocantur.

### Chamæ.

### Caput VI.

Chamarum conchularumque in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum uino assumitur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamæ marina & uaria & multiplices sunt, nam aliæ asperæ, aliæ leues: & hæc quidem digitorum compressu confringuntur, illæ uerò uel ægerrimo saxo conteruntur. Quædam ipsarum nigerriimæ sunt, nonnulli argentei coloris, ac quemadmodum est earum uarium & multiplex genus, sic multas & diuersas sedes habent. Quædam enim in litoribus dispersæ, iacent in arena, nonnullæ sub algam subijciuntur, aliæ in humo commorantur, aliæ in saxis & stabulantur, & præfulciuntur &c.

### Vnguis odoratus.

Vnguis odoratus.

### Caput VII.

Vnguis siue onyx conchyliæ tegumentum est, ei simili quo purpura integitur, quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur: suauem ideo spirans odorem, quod conchyliis inibi nardi pabulo uescantur. Colligitur postea, quàm stagnantes aquæ æstiuis squaloribus inaruerunt. Laudatissimus qui à rubro mari defertur. candicans, pinguis. Babylonius nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. sed aliqua





aliqua tenus castoreum olent. idem suffitu excitant foeminas uulue strangulatu  
oppressas, comitialesq. poti uentrem molliunt. Crematum conchylium eadem  
efficit quæ purpura & buccinum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galenus unguem odoratum qui hoc loco Dioscoridi ὄνυξ quoque dicitur, officinis uerò Arabica  
aut certe barbara uoce, blatte Bysamie, inter ostraca ac testes purpurarum ac muricarū generatim  
comprehendit, eorundem enim uim habet, & præterea suffitu ab utro strangulatas foeminas, & co  
mitiali apprehensos morbo excitat, quod tamen etiam de purpurarum testis Galenus in simp. ph. tra  
dit. Meminit eius onychis Plinius quoq. 22. cap. 2. quum ait: Inuenio apud quosdam ostracium, quod  
aliqui onychem uocant, hoc suffitum uulue poenis mirè resistere.

Βλάττος & Βλάττιον Βύζαντος appellatur Actuatio in aurea Alexandrina, diamargarito calis  
do, Vnguis odoratus uel aromaticus, lib. 1. comp. ph. part.




## Cochleæ.

## Cap. VIII.

## Cochleæ Terrestres.



## Cochleæ marine.





**T**errestres cochleæ stomacho utiles sunt. & non facile corrumpuntur. Opti  
mæ Sardonicæ, Aphricanæ, Astypaleicæ, & quæ in Sicilia ac Chio gignun  
tur. & quæ in Liguria alpibus, pomatiæ, id est, operculares, cognominatæ. Ma  
rina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis uirus olet. quæ uerò



# DIOSCORIDIS

Concha margaritifera.



uepribus frutetisq; glutinata coheret, quam uocant nonnulli sefilon, uentrem & stomachum turbat, uomitiones excitat. Cremata omnium teste excalfaciendi & urendi naturam sortiuntur. purgant lepras, uiliginis, dentesq; emendat oculo rum cicatrices, & uitia cutis in facie, albugines, ac uisus hebetudines si cum carne sua uita tritaq; ex melle illinantur. crudæ cum tegumentis impositæ, aqua inter cutem tumores exugunt. sed non antè soluantur, quàm omnis hauriatur humor. podagricas inflammationes leniunt. impactos corpori aculeos illitæ euocant. menses trita & admota ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum uulnera alia, tum maximè quæ nerui acceperunt, conglutinant. trita in acetio, sanguinem naribus erumpentem infrenant. uiuæ corpus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cum testa, uino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli uesciq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo aculeo lentore eius, pilum attingat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo cochlearum genera sunt. Aliæ namque Aquatiles quas Græci serombcos, Latini turbines com muni alio nomine uocant, quod ex amplo in tenue deficiant in uertiginem tori. Aliæ sunt terrestres quæ per hyemem terra delitescunt, uere prodeuntes, Græcè cochleæ & cochlia appellantur, testa clauiculatim intorta: quæ ut domicilio utuntur, quo se exerentes, quoniam oculis carent, bina cornicula prætentandi iter causa protendunt, & si quid obstaculi sentiunt, resiliunt. Plinius libro nono ubi de crustatorum sanguine carentium genere agit: In eodem genere inquit, sunt cochleæ, aquatiles, terrestresq; exerentes se domicilio: binaq; ceu cornua protendentes contrahentesq; oculis carent, ideoq; corniculis prætentant iter. Ait uero, ceu cornua, quoniam hæc non propriè cornua, sed similitudinariè tantum dicuntur. Nam, ut idem lib. 11. dicit, Cornua multis quidem & aquatiliū & marinorū et serpentium uarijs data sunt modis: sed quæ iure cornua intelligatur quadrupeditantium generi.

Cochleæ Germanis Schnecken. Gallis escargots appellantur. Limaces marinas uulgo aquatiles cochleas Masilienses nuncupant, itemq; Cochlon Aristoteles animal testaceum aliud alimace tradit, quod Theodorus Umbilicum conuertit, fortè hoc quod Officina ostendunt nomine umbilici marini cuius pictura hæc est.

Umbilici marini.



At uero duræ carnis & coctū difficilis sunt, quæ licet nutriat, mali tamen succi est, quapropter nonnulli ius cum garo & oleo condunt, atq; sic uentrem subducunt. Item ethiopicis pro sunt: pectori & pulmōni ac iccori auxiliares.

NOMI



## Cancrī.

## Cap. IX.



**C**ancrorum fluuiatiliū exustorum cinis qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianæ modo, triduo potus cum uino, magno opere prodest canis rabiosi moribus. rimas pedum, sedisq; perniunculos, & carcinomata, cum decocto melle lenit. triti crudi, potique ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumque morsus, atque scorpionum ictus. decocti autem & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. ne cant scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Pos-



Sunt eadem marini, uerum inefficacius omnia præstant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cancrī ueris principio senectutē anguium modo exuunt, renouatione tergorum. His uita longa, pedes octoni omnibus in obliquū flexi. Fœminæ primus pes duplex, mari simplex. Præterea bina brachia.

Locusta marina.

Cancer marinus.



denticulatis forcipibus, superior pars in primorib. hls mōs uetur, inferiore immobili. Dextrū brachiū omnibus maius. In pauore retrorsum pari uelocitate redunt. Autumno & Vere pinguescunt, & plenilunio magis Aristot. lib. 4. de histo. ani. caneros uidetur appellare eos tantū quibus corpus rotundum est, cum locustis, squillisq; longum sit.

Ceterū cācri difficilis cōcoctionis sunt, cocti uerō asib. maticis et phthisicis profunt: præstatq; ad ischia fouēda materiā, euacuata testa, ipsorū carne ex cauda & chelis tusa: & per se quoq; mensis cōueniunt cocti ex uino & p. p. & sc. seu ex aqua, aceto et sale, aut ablata testa in oleo butyri.



ne frigidi in sartagine, & præsertim parui aut teneri qui senectutem iam primum exuerunt. Germani  
Mussæ dicti.

## Terrestris scorpio.

## Cap. X.



Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium  
est. quin estur assatus, ad eadem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aelianus, libro uaria historie, plura Scorpionum genera esse scriptum reliquit,  
albū, fulvū, nigrū, sumi colore, uiride, flammeū, quod omnium pessimū, uentrosū.  
caninicide, uolatile. In India enim uolantes Megasthenes esse prodit, in uniuersum non coitu, sed hu-  
more ac calore concipiunt, singulis cauda sese complectentibus, nec oua, sed animal pariunt.  
Oleū ex Scorpionibus paratū mirandū uirū est. cōtra uenena omnia et pestilentia: de hoc oleo scri-  
bit Manardus se scire hominē hoc solo munitū, quantū uis suam pestilentia nihil facere, sed eū et sera-  
uos suos unā secū uisentes pestilentia affectos, incolumes seruari: & sola unctione quosdā à sauis-  
ueneris potis liberatos. Duplici modo in officinis ex doctrina Mesue fieri solet. Prius ob scorpiones  
frigidū est: posterius ob aromata calidū & efficacius, nō ob horū calorem et essentia tenuitatē (quibus  
aperit, incidit, tenuat, terget, perrumpit) sed etiam totius substantiæ scorpionum proprietate, et ut lo-  
quuntur forma specificā, qua utrunq; calculum renū & uesicæ frangit, illitum tantum lumbis, si in re-  
nibus est: si uerō in uesicā, pubi, perinæo, & iniecta etiam tum pauca in meatum urinarium. Modum  
parandi docet Mesue & Nicolaus.

De Scorpione plura in sequentibus.

## Marinus scorpio.

## Cap. XI.

Marini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines & hea-  
betudines.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cū Scorpio & Scorpēna eiusdem generis sine, multum tamen & colore & bonitate differunt.  
Nam scorpio rufus & pelagijs est, Scorpēna nigra & littoralis, & cibi suauitate longē Scorpione  
inferior: quod ipsum non modo ex antiquorum conscriptione accepi, sed certē palati sapientia ex-  
pertus sum. Iam porro nonnullæ regiones Italiæ utriusque Scorpēnem appellant: & Græci à uero  
nomine aberrarunt, nam utrunque Scorpionum appellant: Massilienses ut nondum cessant rectē Scorpe-  
nam appellare, ita parum Massiliæ Scorpionum Rascliam nominant. Secundum Pastinacam & Dra-  
conem nihil in mari uenenatius: etenim in dorso & brachijs bene acutos robustos habet aculeos, quos  
si Syontinus uidisset, non à similitudine terrestrium nomen duxisset scripsisset, sed ex eo potius, quod  
quemadmodum terrenorum aculei, sic horum permuciosi sint, nuncupatos esse.

## Draco marinus.

## Cap. XII.



Draco marinus dissectus & apertus impositusq; ictus spinæ suæ qua ferit  
medela est.

NOMI



Plinius lib. 32. Draconē à Dracunculo distinguit, huncq; dicit similē Graculo esse, atque in branchiis ad caudam spectantes aculeos habere, eiusque idem uenenatum esse. Hunc Dracunculū Aristoteles & Oppianus uocant draconem, & similiter Plinius ipse, cum inquit libro 32. Draco marinus ad spine sue, qua ferit uenenum, impositus prodest, quod idem hoc loco testatur Dioscorides.

Ab Ephippo uocatur Draconis: ipsum arbitror esse quam Ligures, & Massilienses, & Plinius ipse alio loco Araneum uocat. Hac etate Græci Draconem, Sicuti & Neapolitani, Traginam appellunt, corrupte, quasi Dracnam. Secundū Pastinacā nihil in mari uenenatius: acutissimos in dorso habet aculeos, quos piscatores ab hoc capto statim abscindunt. Aculeos quoque in branchiis habet ad caudam spectantes. Iam porro cum qui ab Aristotele Araneus uocatur, multi Græci authores uenenatum esse tradunt: hunc uero omnes scriptores, atque etatis nostræ piscatores cum à Pastinaca discesserunt, omnium marinarum uenenatissimum esse assueuerant &c. plura apud Petrum Gyllium.

Scolopendra.

Cap. XIII.

Scolopendra in oleo decocta si illinatur, auellit capillos. sed contactu pruritus facit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Scolopendra marina, terrestri perquam similis est, quam primum ut homo contigerit statim prurit, mordetur, & simili atq; is qui ab urtica terrestri pungitur, doloris sensu afficitur. Scolopendra marina tacto piscatoribus quoq; infestissima est: postea enim quam hamum hæc contigerit, nullus piscis ad hamatam escam accedit, quod huius tetro odore procul pellatur.

Torpedo piscis.

Cap. XIII.

Marina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus uoluntati mulcet. eadem apposita euerfam fedem prociduamq; coercet.

EXPLICATIO.

Torpedinis piscis plantæ cartilagineæ torporem manus sue tactione se periclitatur esse scribit Petrus Gyllius mihi fide dignis, nec tantopere sibi manum obtorpuisse quam scriptores decantant Torporemq; non modo letalem non esse, sed non ita multo post euanescere. Venetijs, Ianiæ, Massiliæ, ac ubiq; putat gentium comedi. Massilienses Turpilliam corrupte uocant: Ligures, Tremorizam.

Viperæ.

Cap. XV.



Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt, neruorum uitij auxiliantur, incrementis strumas reprimunt, detracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne uacant, amputari debent: quippe commentitium est quod precipitur, certam utrinq; mensuram præcidi oportere. reliquum uero corpus exemptis interaneis elotū dissectumq; discoquitur cum oleo, uino, salis exiguo. & anetho. Aiunt ijs qui uiperas escent, pediculos procreari, quod planè à ueritate abhorret. adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo uescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. uiua autem uipera in fictile nouum demittitur, adijciuntur salis caricumq; tritarum, singulatim quinq; sextarii, mellis cyathi sex: mox fictilis operculum luto oblinitur, & fornacibus inasatur, donec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, resconditur. Plerumq; ut ori gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malabathri momentum.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Viperæ. Latini uiperas. Itali Marasas. Germani Braitzschlangen, & vucken appellant. caro earum siccat, ualenter digerit, mediocriter calfacit. Vis eius ad cutem properat, & ad eam expellit corporis excrementa, à quibus in multum eacochymis ingens numerus pediculorum prouenit, ut Galenus testatur contra mentem Dioscoridis lib. 11. simpli. De his plura apud Iacobum Sylium hac tempestate medicum præclarissimum, in præparatione Theriaces.

Senecta anguium.

Caput XVI.



Senecta anguium in uino decocta dolori aurium, infusu, & sidentium collutione, auxilio est. addunt eam in medicamentum oculorum, sed præcipue uiperinam.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Serpentis pellem Græci uocant γέρας & φίδιον, id est, senecta anguis. Plinius aut uernatione appellat quod: æpore ueris senectutē depellat, ac nouam induat pellem. Germanis ein Schlangen balck.



Lepus.



Cuniculus.



**L**epus marinus loligini paruae similis est, qui per sese tritus, aut cū urtica marina illitus, capillos euellit. Terrestris leporis inasatum cerebrum manditur, iuuandis tremoribus qui ualitudine contracti sunt, affricu aut cibo facilem infantibus dentitionem prestat. exustum caput & cum adipe urfino aut aceto illitum, alopeciarū inanitatibus medetur. Leporinū coagulum post tridū à cōcubitu potum, conceptū adimere, partusq; spem intercipere proditur. uulue & alui fluorem sistit. comitiales iuuat. contra uenena ex aceto bibitur, praefertim aduersus cōcretū lac, & uiperarū morsus. Sanguis eius si calidus illinatur uitia cutis in facie, uirtiginē, lentiginesq; sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lepus marinus in ceno gignitur, et sepe unā cū Apicis capitur specie cochlea tegmine caudate cernitur. Magni maris lepus (nā qui in alio mari nascitur ante dixi) ex omni parte ad terreni similitudinē accedit, praeter pilos: nā terrestris pili et molles sunt, et ad tactū haud quāq; resistentes. Cōtra illius spinosi et erecti: hunc qui contigerit, laeditur. sed de marino Lepore plura in sequentibus. Terrestris leporis caro in cibis non paruae laudis est etiā apud ueteres habita, ut Martialis distichon testatur.

Inter aues turdus, si quis me iudice certet, Inter quadrupedes gloria prima Lepus. Leporū tria genera ferē sunt, ut tradit Varro li. de Re rust. 3. Vnū pedibus primis humilibus, posterioribus altis superiore parte pulca, uentre albo, auribus longis. Qui latinis lepus, Germanis *Lein* hase Gallis unglicure dicitur. Alterius generis sunt, qui hoc ferē mutāt, quod toti cādidī sunt. Tertiū generis est, quod in Hispania nascitur, simile lepori ex quadā parte, sed humile, quod Latini Cuniculū, Germani *Ein Fünglin*. Galli unglicōn appellāt. Lucius Belius putabat ab eo dictū leporē à celeritudine, quod leuipes esset. Ego arbitror à Græco uocabulo antiquo, qd' eū Aeoles Boeotij leporē appellabāt. Cuniculi dicti ab eo, qd' sub terra cuniculos ipsi facere soleant, ubi lateant in agris. Martialis.


Gaudet in effosis habitare cuniculus antris.

Monstrauit tacitas hostibus ille uias.

De leporibus plura Plin. li. 8. Leporū caro crassi succi est, sed in hoc à bobus et ouibus uincitur, authore Paulo Aegi. Verū quae cumculorū est, melius et facilius alit. Hippocrates ait: Caro leporina siccat, sistitq; sed lotiū mouet. Celsus leporē in media materia numerari debere dicit, et boni succi esse, aluum adstringere, & urinam mouere. Coagulum quod Germani *lyp* & *Fels* *lyp* uocāt, uiscerū pars est, qua ad densandū lac utimur, substantia et mucilago quaedā superflua lacti coagulato quodāmodo similis in uentribus, et certis animalū uiscis genita et appēta. habēt autē ungula omnia ruminantia, et interdenta utrinq; lepus. Quo uetustius coagulū est, eō prestātius. Tale profluuiū alui mederi precipue potest, etc. Plin. uerō li. 11. c. 41. Dasipodis coagulo hoc tantū asserit, ingens, Coaguli inutile leporis, boedi laudatū, precipue tamē dasipodis, quod et profluuiū alij medetur, unius utrinq; dentatorum.

## Pastinaca Marina.

## Caput XVIII.




**M**arinæ pastinacæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squammis reflectitur, dentium dolorem mitigat; nam eos frangit & euocat.

NOM I-



Pastinaca piscis planus cartilagineus, radium digiti, interdum semipedis longitudine, ad similitudinem ferræ dentatum, dentibus reflexis, in cauda habet: quo nihil usquam pestilentius mare generat. Ligures uocant Ferrasam: Massilienses Glorum: Siculi Bastonacā corruptè quasi Pastinacam, de tra-cto radio in littore Ligustico ac Gallico comeditur.

## Sapia



## Caput XIX.

**S**epiæ coctæ dum estur atramentum ægrè concoquitur. aluum mollit. collyrijs è testa factis conuenienter genarum scabritiæ perfricantur. ustum in sua testa donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum expurgat uiliginis, surfurres, dentes. & uitia cutis in facie. elotum in medicamenta oculorum addi solet. contra albugines, oculis iumentorum effaciter inspiratur. pterygia oculorum absumit, cū sale tritum & iniectū.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sepia è piscium sanguine caremium & mollium genere est, eiusdem similitudinis cū loligine, octonis pedibus, solidum in-  
tus quoddam infernum continens, quod Sepium uocant. Sepiarum generis mares ut Plinius scribit, uarij & nigriores, constantiaq; maioris: percussæ tridente scemina auxiliantur, At scemina isto mare fugit. Ambo autem ubi sensere se apprehendi, effuso atramento, quod pro sanguine his est, infuscata aqua absconduntur, quod & Oppianus testatur Halienticon lib. 3. cum ait:

Quin & natina fecunda est sepiæ fraude.  
Est liquor in tumida concretus turbidus aluo,  
Qui piscis piceam superat caligine massam:  
Conditus hic humor nutritur corpore, præsens  
Auxilium miseræ, subita formidine captæ  
Atras emittit guttas, & polluit æquor,  
Obscuratq; uias ponti tenebrosa cruore  
Permixto sanies piscantis lumina turbans,  
Auerit uisum & prospectum surripit omne.  
Hæc facili cursu pertinet æquoris undas,  
Effugit horrendos pisces, hominemq; sagacem.  
Loligo atq; alij qui findunt æra pisces  
Tales inueniunt artes: non est liquor ater:  
Illis purpureos potius de corpore fundunt  
Humores: sed fraude pares astuq; putantur.

Ceterum Sepiæ atramentum, auctore Celso, uentrem mouet. Ipsa elixa sepiæ mollis est & suavis & facile concoquitur, & bonam aluum facit. Sucus uerò ipsius sanguinem extenuat & mouet per hæc morrhoidas, ut auctor est Diphilus, referente Massario. Paulus tamen Aegineta difficilis coctionis esse tradit. inquit: Molles pisces, ut polypi, sepiæ, lolignes duri sunt coctioni: renitentur, præsertim polypi. atq; falsum quodammodo habent humorem. Si uerò coctione uincantur, haud parum alimenti corpori præbent.

## Mullus piscis.

## Caput XX.



**M**ullorum assiduo cibo aciem oculos rum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mullus piscis est magnitudine modica, gemina barba inferiore labro insignitus, à qua uulgo barbonem, & M. Varro Rei Rusticæ lib. ultimo ad finem, barbati mullum, & Greci gneatida, quod uerò ter pa-



DIOSCORIDIS

riat in anno Triglen uocant. Olim etiam in precio habitus. De quo plura apud Plinium in lib. 9. & 31. cap. 8. Is etsi piscis est haudquaquam in uulgo ignotus, tamen in sermone Latino ignotius esset nubil, nisi Ausonius suo carmine, quod Mosellam inscripsit, illustrasset.

Tuq; per obliqui fauces uexate Sarau,  
Qua bis terna fremunt scopulosis ostia pilis,  
Cum defluxisti fama maioris in annem  
Liberior, laxos exerceas Barbe natatus.  
Tu melior peiore auro tibi contigit omni  
Spirantum ex numero non illaudata senectus.

Hippopotamus.

Caput XXI.

**H**ippopotami testes exiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Hippopotami qui et Hippocampi quibusdam dicuntur. Capite & collo equino, & rostro oblongo sunt, ab eorumq; fronte tanquam equorum coma propendit, & eo loco quo e qui iubam habent, pilis diffiunt, horum cauda draconis speciem similitudinemq; gerit.

Ligures & Massilienses uocant Caballos marinos.

Fiber.

Caput XXII.

**F**iber ancipitis uitae animal, plerumq; cum piscibus & cancriis ex aqua uictum capeffit. Huius testes serpentium uenenis aduersantur, sternutamenta mouent, & in uniuersum uarios obtinent usus. siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti, partus secundasq; eijciunt: contra inflationes, tormina, singultus, uenena, ixiampq; ex aceto bibuntur. lethargicos, & utcumq; ueterno obdor miscentes excitant infusi. cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt. poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus neruorum uitijis. in summa, calfas foriamuim habent. Eligi debent testes qui ex

Fiber.

Lutra.



uno ortu connexi sunt (feri enim non potest, ut gemini folliculi in una membrana coniuncti reperiuntur) liquore intus ueluti ceroso, odore graui, & uirus redo lente, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quae fraus de aliqui corrumpunt, coniicientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abiici, cum uenatu urgentur: siquidem rangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Operae autem precium est, diuisa pellemellum liquorem cum euefficiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Testes Castoris seu castorium, calfacit, siccant, est tenuium ualde partium, coquit dispositiones contumaces & scirrosas. Eligendi qui ex uno principio committuntur, & quibus est intus liquor caerosus, friabilis, odore graui & uirus olente, gustu acri & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possis, substantia nobis esse aduersissimos, nulli autem uel ad motum uel sumptum est perniciosum castoreum. Pontici Castores sunt praestantissimi, quod & Virgilius nemini lib. 7. Georg.

Nec inepti qui ad Matronam, uulgo la Merne, Galliae flumini crebro capiuntur, mirabili spectaculo animalia, cauda piscosa, solae amula, pilo superne canino, alibi lutrae, pedibus anterioribus, anseris, sed ungatis, similes posterioribus, auribus minimis, rotundis, dente ualidisimo, aduico, praelongo, setae oris cornea, architectura in fossa sua mirabili.

Castoreum nigrum foetidum, rancidum, die uno necare affirmat Auicenna. Castoreum est Perside ferre ad nos deferitur: sive enim tanta uis odoris est prae ditum, ut olfacienti uiscum castoris, sanguinem e naribus eliciat. Seruatur annis decem.

Germanis



Germanis ein Syber. Gallis Biure. Fiber methathesi dictus.  
Lutra animalis fibro similis testes idem pollere addit Hermol.

Mustela.

Caput XXIII.

Mustel.

Must.

Mustel.



**M**ustela quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inuetera-  
ta sale, in umbra ficcatur. Ea binis drachmis cum uino pota aduersus om-  
nia serpentium uenena præsentaneo est remedio. toxico, simili sumpta modo, re-  
sistit. eius uenterculus coriandro factus inueteratusq; percussis à serpente, & co-  
mitialibus potu auxiliatur. cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto  
illito, sanguine perunctæ strumæ iuuantur. comitialibus etiam prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Mustela nomen πολύσχημος est, quæ πολυσχηµα magni nominis uiros decepit. Plinius appella-  
tione Mustela, & Galen. istida complectitur. Nam quod Aristoteles scribit, ἡ γὰρ ὄρεα ὄφι µε-  
γέλει, & ὅτι τὸν γὰρ. Hoc Plinius penè ad uerbum translulit, cum ait: Mustella cum serpentibus  
dimicatura, rutam ore gerit. & lib. 29 cap. 4. quas Aristoteles istidas uocauit, has ipse quoque Mu-  
stellas uocat. Ita enim scribit, Mustellarum duo genera, alterum syluestre, distant magnitudine. Greci  
uocant istidas. Ex his locis iam citatis, satis liquet Mustellam esse Plinio generale nomen, & Latinis  
Mustellam dici animal quod Grecis γαλῆ & ἱκτίς dicitur. Mustellas uerò illas quas Greci Galas  
uocant, opinor à uulgo appellari Vuisellas, Herminas, seu Hermellas. Galli penè eodem nomine dicunt  
Herminas, Vuisellas autem fouinos appellant seu Marturellos, à quibus etiam Frette intra Galas po-  
nuntur. Nam Frette sunt opinor illa animalia, quæ Galli Furones uocant, & Latini uiuerras. Pucri uis-  
ueris utuntur ad extrahendas de parietum nidis auiculas. Immittuntur & in caua arborum, & inde  
auiculas unguibus referunt. Præterea in uenatione cuniculorum utuntur Viueris, ut Plinius refert quæ  
ita scribit: Magna propter uenatum coru Viueris gratia est, immittunt eas in specus, qui sunt multi  
formes in terra. Vnde & nomē animalis, scilicet cuniculo. Gale igitur genus esse constat. Vuisella, Her-  
mella & uiueria Galorum species, sed Vuiselle sunt domesticæ Gale, Hermella uerò & uiuerie sylue-  
stres. Caterum istidum duo genera sunt, alterum Galli pariter Germanis uocant Mar dram, alterum ge-  
nus Germani Mustis dicunt, uoce nī fallor à Græconomine deriuata, Mustis, conuerso c. in l. sit Mustis, &  
Galli hoc genus uulgarilingua uocant ung putois, quod uidelicet hoc animal putreat, quod uerò Mu-  
stelle nomen tā latè pateat ex etimologia uocabuli accidisse puto. Nam apparet Mustellā esse nomen  
compositum ex nomine Mūs, id est, mus, & σῆλα, id est ὀπισθῆλα, id est surripio, ut dicatur mu-  
stella, quasi murium sur, seu aptor. Germanicè ein Mustel dieb. Mustella quoq; uocatur auis quæ mu-  
res uenatur, & mustella piscis est, quem Græcè γαλῆ, uulgo Lampetram & Lampredam corru-  
ptè uocant, quia perinde, atq; gale serpentes prosequitur, ita & galeus piscis uenenatum piscem Pastic-  
macam dictum persequitur. Et quidam recentiores uiri citra controuersiam doctissimi, mustellam pra-  
fite usurparunt, inter quos est Marcellus Virgilius Dioscoridis interpres & commentator, is enim  
scribens in caput præfens, satis indicat se per Mustellam domesticam intelligere feles seu catos, cum to-  
tum hoc caput non περὶ τῆς ἀλώου, ἀλλὰ περὶ τῆς γαλῆς intelligi debeat. Quod autem Virgo-  
lius Marcellus Mustellam & selem promiscuè usurpauit indicio esse poterunt ipsius annotationes in  
caput de lychnide. Nam inibi multa narrat de felibus, & postea addit se de felibus copiosius scripsisse  
in hoc secundo uolumine, præfenti capite, ubi de Mustellis agitur. Idem in capite de Ruta uertit, ut de-  
buit, ἀλώου, feles. At Aristoteles ait Acluros & galas esse diuersi generis animantia. hic uerò tam  
fædus error ex eo manauit quod pleriq; arbitrati fuerint γαλῆς esse feles seu catos, & cum legebane  
præfens caput in Dioscoride de domestica Mustella imaginabantur esse selem siue cattum. Et Erasmi  
multis in locis γαλῆ uertit selem, utpote in prouerbio γαλῆ ταρτησία, id est, feles Tartesia, &  
in prouerbio: γαλῆ λεροκωτῆ. Feli crocoton. Ipse tamen ingenue fatetur se dubitare an rectè uerterit.

Verba



Verba Erasmi sunt hæc in prouerbio supra citato. Porro uox hæc, γαλῆ, falem ne significet an Mustellam, an quem uulgo cattum appellant, quoniam inter eruditos controuersum est, relinquo alijs iudicandum. Hic Erasmus uidetur innuere aliud esse falem, aliud esse Mustellam, & aliud esse cattum, & sequitur fortasse hæc in re Columellam, cui felis est bellua illa quam supra diximus Fouinū appellari, mustellam autem forsitan capit pro istide. Nec dubium est, quia felis sit animal quod Græci αἰλῶπος, & quod uulgo ab aslu, cattum nominant &c. Sit igitur cattum post hæc, Galem & istida esse mustellam, & elurum esse falem seu cattum uulgo eim Wenset/oder Ratz.

## Ranae.

## Caput XXIII.

**C**ontra omnium serpentium uenena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusq; earum itidem sorbeat. contra inueteratos tendinum rigores pollent. illitus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. explendis alopexiarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. uiridum ranarum cruor auillos genis pilos reuolui nasci prohibet, in uestigia euulorum instillatus. decoctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ranarum plura genera, alia est rana quæ dicitur phrynos, hoc est rubeta: perniciofa item chersidros, cunctarum grandissima. Bufo quibusdā dicta Germanis ein Brött & Pogg. Apocynon quoq; dicunt, quod canum im petus cohibeat: aliud genus dictum calamites. Est & palustris rana, dicta elobatrachon Græcis, Germanis ein Scosch, Gallis une raine, & une grenouille, Aristoteles, ranas omnes telmaticos dicit, aut lymnæos.

Hodie passim ex ranis palustribus oleum parant officinae. Podagra calenti admoerunt quidam, sed nullo fructu. Neq; enim frigidas in eo magna esse potest à ranarum capitibus, coquendo coctione tam longa, & ea in oleo sesamino, alteratis. Rectius meo iudicio ranæ uirides in syluis crebrae, uirgibus reptantes in altissimas quasq; arbores & sub noctem brexantes (uox enim earum unica est, brex) oleo uiolato, uel omphacino, ad hos usus incoquerentur. Quas manibus uiuas hodie ex mere tenent ad refrigerium febre acuta aliqua ardentes, croiser Gallis, Germanis Laub si Scsch dictas, quarum meminit uidetur Galenus lib. 10. simp.

## Silurus.

## Caput XXV.



**S**ilurus recens in cibo nutrit & facilem præbet aluum. sale uero conditus, minimum suppeditat alimentum. arteriam expurgat, & uocem expedit. illita saliti caro, aculeos & infixas corpori spicula extrahit. muria eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium fatus adijciatur: fluxiones siquidem ad summa cutis elicit. ischiadicis infusa medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silurus piscis in fluminibus priuatimq; in Nylothymnos in mari præcipua magnitudine æquans. Hunc quidam Sturionem. Germanis ein Störz, dictum esse putarunt, sed falso. Silurus enim maleficus & dentatus est, cum sturio neq; dentatus neq; maleficus sit. Plinius lib. 9. ait: Silurus grassatur ubicunq; est omne animal appetens, equos innatantes sepe demergens, præcipue in Mæno Germaniæ amne prope Lisboum. in cibo aluum mollit silurus è iure eodem Plinio auctore lib. 32. Item cum ceteri omnes mares suis foeminis sine præstantiores. Silurus foemina præstat suo mari.

## Smarides.

## Caput XXVI.

**S**maridis piscis caput exustum, excrecentes ulcerum oras puluillosq; reprimat. Snomas cohibet, thymos clauosq; absumit. caro non secus atq; falsamentum prodest à scorpione percussis, aut à cane demorsis.



## EXPLICATIO.

Vide annotationes nostras ex Petro Gyllio in cap. 27. proximè sequens.

**Mænæ.**

**Caput XXVII.**

**M**Aenarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas aboler. eius etiam garum oris putrilagines collutione sedat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Mænæ** pisciculus, hyberno tempore candidus, æstiuo cerulea uarietate pictus. **Ligures** **Manulum**, **Masilienses** **Medolam** uocant, neq; modò speciei uerum etiam generis nomen esse ex eo conicio, quòd uarium & multiplex est earù genus, aliæ in utroq; latere nigrâ maculâ orbiculatâ habent, quas ij qui **Adriaticum** sinum accollunt uulgo **Mænæ** **Selanas** appellant: aliæ **Leucomandes**, hoc est albæ **Mænæ**, à **Græcis** **Smaridæ** uocant: **Masilienses**, **Gerres**: **Neopolitani** **Cerres**, per e. quos **Theodorus** secutus **Smaridæ** **cerros** uidetur conuertisse, non **Gerres**, de quibus **Marialis**, ueluti uilibus piscibus, ita ait:

**Alec.**



Fuisse **Gerres**, aut inutiles **Mænæ**. **Theodorus** **Menidas**, in **Aristotele** **Mænæ** & **Aleces**, & **Menidia**, id est, **Mænæ** paruulas **Aleculas** appellat, ut **Alecula** nomen generis sit, hoc idem Latine significans quòd **Græcè**, ut **Hermolaus** putat, **Anthracides**, hoc est, pisces qui succensis carbonibus commode coqui possint, cuiusmodi sunt **Smaridæ** & **Mænæ**: Equidem ipse generatim pisciculos ignobiles significari ex, **Columella** arbitror, qui **Aleculas** riuales pisciculos, ignobiles uocauit atq; alios pisces sale exesos, **Arencos** nuncupatos, **Thrysis** similes: itemq;

sunt **Mænæ** **Boopes** appellatæ, quas **Græci** adhuc rectè **Boopæ** uocant. **Ligures** & **Masilienses** **Bogæ** corruptè nominant.

**Gobius.**

**Caput XXVIII.**

**G**obius recens in suillum uentrem coniectus, si confuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo superint, decoquatur, ex colatus & sub diuo refrigeratus, porui detur, alius sine molestia deijcitur. illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Gobiorum** multiplex est genus, alij palustres, alij saxatiles, uulgo **Goacæ** uocati, quos **Cothonas** sicut **Nicander** inquit, **Sticuli** appellant: quosdam alios **Gobioni** saxatili propemodum similes, **Aristoteles** **Cortos** nominat, quos adhuc nonnulli **Coranos** nuncupant.

**Thunnus.**

**Caput XXIX.**

**C**onditanei thunni caro, quam **omotarichon** uocant, sumpta ijs auxiliatur, quos uipera nomine preiter, momorderit. sed oportet uinum quamplurimum subinde cogantur haurire, ita ut uomitione reddatur. contra acrimonias effratorum maxime ualet. canum moribus utilissimè illinitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Thynni** pelamidum generis esse uidentur, nam ut **Aristoteles** lib. 6. de **Historia animalium** ait, **Limaribus** **Thynni** prouectiore ætate, anno esse putantur uno. Et **Plinius** lib. 9. **Pelamides**, inquit, cum annum excessere tempus, **Thynni** uocantur. quod falsum esse, nec ex **Pelamidibus** unquâ fieri **Thinnos**, sibi piscatores **Ligures** & **Masilienses** aperte ostendisse scribit **Petrus Gyllius** harum rerum peritissimus, quæ rationes in aliud tēpus rejcit, lib. de **Gallie** nominib. pisciù. Est itē **thynnorum** generis qui uocatur **pompilus**, hunc **Masilienses** piscatores haud ignorantes corruptè **Pampalum** uocant.

**Garum**

**Caput XXX.**

**G**arum omne, quod ex piscibus carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo forus fiat, depascentia ulcera sistit. morsus à cane medetur. dyfentericis atq; ischiadi cis infunditur: nonnullis, ut exulcerata adurat: alijs autem, ad laceranda quæ ulcera non senserunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quid sit garum sine garum docet nos **Plinius** **Naturalis historie** lib. 8. cap. 7. ubi inquit: Aliud etiam



tiamnū liquoris exquisiti genus est quod garon uocauere, quæ intestinis pisciū ceterisq; abijcienda esse sent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur ex pisce quam Græci garon uocabant, Nunc è scombro pisce laudatissimum in finibus Carthagini, Spartariæ & Cetrijs, sciorū appellatur. Nec liquor ullus penè præter unguenta maiore in precio esse cepit, nobilitatis etiam gentibus fiebat etiam ex alijs piscibus, ut plura apud Plinium loco iā citato. Sunt item qui coctiorū piscium ius garum uocant, & ita, ut in uetusto quodam manuscripto codice, sed incerto auctore, reperi, confici præcipitur. Confectio gari. Sume pisces minores salsos, aut si salsi non fuerint, saliantur pauco sale, & mitte ex illis sextarium unū, & de bono uino sextarios tres, et coque in æreo uase usq; dum duæ paries consumantur, & tertia remaneat, tum cola per saccum usq; ad claritatem, & refrigeratum mitte in uitream ampullam, & utere. Ceterum ex syluro pisce aliquando etiam fieri solitum, testatur reliquit Cælius Aurelianus medicus Chronicorū, siue tardarum passionum lib. 2. cap. 1. de paralyti, cum ait: Garum quod appellamus liquamen ex pisce syluro confectum. Demum quamuis liquaminis uocabulo garum intelligit Apicius, Latino tamen nomine aliquando caruisse testis est Ausonius in epistola ad Paulinum, his uerbis: Scis autem me ad nomen murie, quod in usu uulgus est, nec solere, nec posse dicere, cum scientissimi ueterum, & Græca uocabula fastidientes, Latinum in gari appellatione non habeant, sed quocunq; nomine loquar, liquor iste sociorum appellatur. Quod reliquum est non modo ex piscibus & eorum extis, sed ex animalibus salis fiebat garum, liquor scilicet ex salsura eorum exsudatus fluens & aque modo supernatās, ut hoc loco Dioscorides tradit. Differt autem ab Alece garum, quod alex imperfecta nec colata fixa est Horatius: Quo fece primus & alex.

Differt item ab Halme, id est, muria: quod garum sanies intestinum piscium est: halme uero muries & salsugo piscium in aceratorum, hoc est ius salsum in quo seruamur, Germanis Lac dictum, asserunt utruq; Martialis, murie quidem hoc disticho:

Antipolitani fateor, sum filia Thygni,  
Essem si Scombri, non tibi missa forem.

Garum uero sociorum hoc altero:

Expirantis adhuc Scombri de sanguine primo  
Accipe serosum munera chara garum.

### Ius piscium.

### Caput XXXI.

**R**ecentium piscium ius, modo per se, modo ex uino potum, aluum subducit, priuatim ad hunc uisum conficitur è phycidibus & scorpionibus, & iulide, è percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec uirus resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo & anetho.

### EXPLICATIO.

Zomos, id est, piscium ius conficitur apud Paulum lib. 7. ex his qui testacea cute integuntur. tellinis, hiatulis, et conchulis, ius quoq; ueteris galli (apud eundem) cum sale diuissime excocti, uentrè subducit. è contrario gallina ius comprimit.

### Cimices lectularij.

### Caput XXXII.

**C**imices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante februm si gnificationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt. & citra fabas sumpti, percussis ab aspide profunt. uuluarum exanimationes olfactu reuocant. poti cum uino aut aceto, adhærentes sanguisugas abigunt, triti & urinariæ fistulæ impositi, urinæ angustias leuant.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Cimices Germanis Wanzen/Gallis à tetra odore, punaises dicuntur. foetidissimum animal, hostis nocturnus, nam in lectis quietem dormituris, adimit & putridum odorem ingenerat tægentibus eum. Elsi tamen foetidissimum animal sit, non tamen ui medica caret, ut apud Plin. lib. 29. cap. 4. traditur.

### Millepeda.

### Caput XXXIII.

**M**illepedæ, quæ sub aquario uase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. hæc ex uino potæ diffusi cili



**Millepeda.** ciliurina, & regio morbo auxiliatur. millepedas illini anginis cum melle utilissimum. trita, & in cortice mali punici calfacta, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Animalia que Græci οἰστροί, & οἰστροί, & πολύποδες, hoc est, aselli, & Latine millepede ac multipede. Germanis Heitel appellantur, satis nota sunt, ut que non solum sub hydris & aquariis uasis, uelut hic ait, nascuntur, sed ubiq; in locis humidis, uelut cellariorum parietibus & fenestris pluuia aut tempestate madefactis proueniunt, itemq; in sterquilinis generantur, & ad contrarium mares in globum contrahunt, coloris alius fusci, & ad gryscum declinantes, Dioscorides etiam hoc loco λευκοπόδας appellat, Galenus λευκός, id est, fabus à similitudine Asianos uocare dicit, Marcellus uero Cutiones, ob cutis ut uidetur, duritiā & soliditatem, cap. 8. & 9. nominat. Verum significantissime ea Galenus lib. 3. comp. pharm. part. describit, his uerbis: ὁ οἰστροὶ πολὺ ποὺς ὅτι τῶν ὀστέων ὡς ἡμεῖς ἔχουσιν ἡμεῖς ἔχουσιν ἡμεῖς ἔχουσιν. Et Plinius 29. cap. ult. Millepeda ab alijs centipeda aut multipeda dicta, animal est & uermibus terræ, pilorum, multis pedibus armatus, repens, tactuq; contrahens se, oniscum Græci uocant, alij tilon. Quare manifestarium incurrit errorem qui οἰστροὺς uermes terrenos esse credunt quod hi in Italia Niculi, quasi corrupta ex Græca uoce, uulgo appellatur, quum uermes terræ longe alia animala sint, &c. de his plura infra cap. LIX.

## Blatta pistrinaria.

## Caput XXXIII.



**B**latta eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillati mitigant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius libro XXIX. capite ult. Blattarum tria genera facit his uerbis: Hoc quoque animal inter pudenda est, inquit, sed propter admirationem nature, piscorūq; curæ, totum in hoc loco explicandum. Plura earum genera serui. Molles quas in oleo decoctas, uerrucis efficaciter illini experti sunt. Alterum genus Mylocion appellat uere, circa molas ferè nascens. Has capite detractio attritas, lepræ sanasse, Musa & Pictor in exemplis reliquerunt. Tertium genus & odoris tedio inuisum, ex acuta clype, cum piscalco sanare ulcera alias insanabilia &c. Germani Geyllen & Symichem appellant.

## Pulmones.

## Caput XXXV.



**P**odagras pernionesq; emendat pulmo marinus recens tritus & illitus. Suillus & agnus urinusq; pulmo imposito, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vulpinus uero si arefactus bibatur, suspiriosos adiuuat, adeps quoq; liquefactus, infususq; auris dolorem finit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pulmones marini sua sponte nascuntur, cum nascant, Curas ex imo, more polypi, emittunt: quod autem speciem quandam mulieris uulue representant, tota circò Italia eos turpibus nominibus appellat, ut nulla ratione scriptis honestè mandari queant. Ligures nominant, Capellos marinos: Masilienses, Carneos pileos: cum iacent omaso similes sunt: cum eriguntur, pulmones uidentur: Adcò omnino lucidi & uirei sunt, ut sine sectione interiora omnia uidere possis: ac quamuis fluctibus in litus ex pulsi, nullo negotio capiuntur: tamen cū non sine esculemi, à pretereuntibus præclare contemnuntur. Pulmonem uulpis siccatum potumq; asthmaticis Galenus, phthysicis uero ob eandem totius substantie familiaritatem saluberrimum, omnes propè præfici inculcant.

## Genitale cerui.

## Caput XXXVI.

**G**enitale cerui tritum & in uino potum, à uipera demorsis auxiliatur.



# DIOSCORIDIS

## NOMINA ET EXPLICATIO.



Cervi genitale, Asininum iecur, ungula asini, lichenes equorum (Germanice der Kamp) ungula caprarum, iecur caprinum, apri, canis rabiosi, ueteres solum leueteramentariorum, nota omnia nulla explicatiōe opus habent.

### Vngula asini. Caput XXXVII.



Vngularum asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus proditur comitiales adiuuare. eadem oleo subacta strumas discutiunt, & illitæ perionibus medentur. Caprarum cinere peruncta ex aceto alopeciam sanantur.



### Lichenes equorum. Caput XXXVIII.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super ungulas in flexu harum partium indurati calli. qui triti & in aceto potius comitialibus mederi traduntur.

### Iecinora.

### Caput XXXIX.



Asini iecur inassatum esu comitialibus prodest. ueruntamen ieiunis edendum præcipitur. Capræ uero inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest, & dum coquitur, apertos oculos halitu eius uaporari. prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iecinoris cibo comitiales deprehendi. Aprinum recens si arefactum teratur, ex uino potum contra serpentium uolucrumq; morsus auxilio est. Iecur canis qui rabie exagitur, tostum & in cibo ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. hunc à cane qui momordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt. In ueteratum autem sale mergi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Caput extorum iecur est, dextra in parte situm. Aegre concoquitur, crassos generat humores, appetentiam tollit, lactentium tamen iocinera minus insalubria putantur, & adhuc minus gallinacea & anserina, anatumq; & porcina. Paulus Aegineta: Cor & iecur crassi succi sunt, coctum difficilia, & tarde transmittuntur. Sed suillum iecur bonitate ceteris præstat. Celsus tamen libro secundo, omne iecur boni succi esse dicit.

Iecur lupi in medicamentum ex eupatorio hepaticum sæpe indidi, nec multo efficacius ob id comperi. Hepaticos tamen ipsum tota substantia iuuare sufficientem se habere experientiam scribit libro octauo compo. pharmac. part. Gale. Puluerem quoque ex eo in hydropse cum uino albo in dies aliquot mane potum, inter secreta quædam remedia reponunt nonnulli. Hepar tamen uulpis aridum ex oxymelite potum, splenicis imponit Archigenes apud Galenum lib. 9. compo. pharmac. part. Hepati calido sicco salubre existimo hepar raie, cithari, id est, rouffete, & hepatis, id est, aquile maris, & si qua sunt alia in piscibus similia.

### Coria ueteramentaria.

### Caput XL.

Veteris corii cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, nec non calceamentorum attritus sanat.

Gallina



## Gallinæ.

## Caput XL.

Gallus.

Gallina.

Capus.



**D**issecta gallinæ & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliatur. sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in uino bibendum datur contra serpentium morsus. sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiore uentriculi galli linu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea uerò inter coquendum abijci solet) siccat, tria; in uino conuenientissime stomachicis datur in potu. Ius è uetere gallinaceo aluum deijcit, abiectis itaq; interaneis salem coniici oportet, & consuto uentre de coqui inuiginti sextarijs aquæ, donec ad tres heminas redigantur. totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquant olus marinum, mercuriale, cinis cum, aut filiculam. Crudos humores crassosq; atram bilem, & strigmenta elicit. prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Varro Rei rustice libro 3. cap. 9. ait, è gallinarum generibus proprio nomine uocantur feminae, quæ sunt uillaticæ, gallinæ Germanicè Hennē. Gallicè gelme. mares Galli. Germa. uerò ein Hæn / Galli ce ung coq; capi seminares, qd sunt castrati, German. ein Capaum / Gallicè ung chapou. Et Columella libro octauo capite secundo ait: Cohortales feminae proprie appellantur gallinæ: mares autem galli: seminares capi, qui hoc nomine uocantur, cum sint castrati, libidinis abolendæ causa, nec tamen id patiuntur amissis genitalibus, sed ferro cadente calcaribus inustis, quæ cum ignea ui consumpta sunt, facta ulcera dum consanescant, figulina creta liniuntur. Capi earo laudabilis est, temperata, boni alimentum, & sanguinis generatiua. Horum testiculi nunquam improbat, cum aliorum animalium sine indigestibiles & cacochymi, digesti autem benè nutriendi. Gallorum autem optimi præsertim saginatum, qui & suauis sunt, & probum alimentum corpori præbent, authore Paulo Aegineta.

## Quorum natura.

## Caput XLII.



**O**uum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Luteum oui, contra oculorum dolores utile est. inflatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo & condylomatis, cum meliloto. cum uua autem fruticis eius, quem rhoa dicunt, aut galla, in patinis frigitur, ut cibo aluos sistat, per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat. spiramenta cutis ocludit. inflammationes oculorum infusum lenit. ambusta, si statim eo perungatur, pustulas non sentiunt. faciem à solis adustione tueretur. fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertitq; inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle & uino, mitigat. utiliter contra hamorrhoidis serpentis morsus crudum forbetur. summe tepidum prodest uescicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritig, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dum de ouis loquimur, gallinarum oua potissimum intelligimus, quæ gratioris saporis incommuni ciborum usu sunt, & de quorum ad ganeam delectu sic præcipit Horatius:

Longa quibus facies ouis erit, illa memento,

K 2



Vt succi melioris, & ut magis alba rotundis  
Ponere: namq; marem cohibent callosa uitellum.

Cibos quot modis inuent, notum est. Nullus alius cibus, ait Plinius, qui in aegritudine plus alat, neq;  
oneret: simulq; uini usum & cibi habeat. Ouum durum, inquit Celsus, ualentissima materiae est: molle  
uerò uel sorbile, imbecillissima.

Et Dioscorides quoq; hoc loco molle magis nutrire quàm sorbile testatur, & molli rursum quod du-  
rum est. Sed de ouis quid sentiat Paulus, uide lib. 1. Seruari ouis in tomento, aut hyeme in paleis, estate  
in furfuribus utilissimum tradit Plinius. Sale exinaniri creduntur. Et inter alios custodiendi modos di-  
cit Columella nonnullos solida, multos etiam fresa faba coaggerare. Germani ouum eim ex Galli ung-  
ocuf appellant.

Cicadae.

Caput XLIII.

Cicadae quae inassatae manduntur, uesicae doloribus profunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicadae nostrae Germaniae peregrina ac incognita animalia, haec uero omnino in animalium genere  
ore carent. prolixum quiddam compactum, indiuisumq; gerunt, simile ei quod linguae speciem refert,  
in ijs quibus aculeus in ore, eoq; ipso rorem hauriunt, alimentum unum & peculiare. Excrementum ci-  
cadis nullum in alio reperitur. Plura earum sunt genera, quae magnitudinis modo differunt, ut Aristoteli-  
teles lib. de historia animalium copiosius tradit.

Locustae.

Caput XLIII.



Locustae odoris suffitu urinae difficultates adiuuant. praefertim quae feminas male habet. earum carnes nullo sunt  
in usu. Est & quoddam genus locustae, quae asiracos aut onos di-  
citur, sine pennis, praelongis cruribus, exiccata autem si ex uino  
bibatur, contra scorpionis morsus magnopere proderit, hac ac-  
bundè uescuntur Aphri, qui Leptin incolunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Locustae Germanis Hewschecken. Gallis saulterelles dicuntur.

Locusta est insecti generis, uolucris animal. Italis uulgo Caballeta dicta, quae pedes ultimos habet  
longissimos, & cetera.



Ossifragus.

Caput XLV.

Venter eius auis quam Latini ossifragum appellant, parti-  
culatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ossifraga auis ex genere aquilarum, Germaniae peregrina est, hanc quoq; uim  
quam illi Dioscorides attribuit, nostri medici motacilla ascribunt.

Galerita.

Caput XLVI.



Galerita auicula est parua, apicem in uertice, pauonis mo-  
do, gestans. quae assa & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Galeritam alij alaudam, Germani uero eim Walde lerdh uocant, haec auis Romanae legioni nomen  
dedit: nam apud Romanos alauda dicta est. Galli galeam siue galeritam, alaudam uocant, quare milia  
tes galeati à Romanis dicti alaudae. Itaque cum Caesar ex Gallis conscriberet legioni, alaudam ap-  
pellauit. Omnia uero quae hoc capite Dioscorides de alauda scribit, illud falsò attribuit Serapion A-  
rabs upupe.

Hirundines.



## Hirundines;

## Caput XLVII.

**D**issectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in uentre eorum lapillos offendes: è quibus duos, unum colore uarium, alterum purum eximes. si priusquã terram attigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle brachio aut collo adalligati, comitialib. proderunt, & sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedulæ, in cibo, aciei uisus medicamentum præbent. tam pullorum quàm matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert. angine eo commodè perunguntur. uua & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. & ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui angina morbo conficiantur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cinis recens hirundinum in diabetsa recipitur. Pulli hirundinum cum primis in fictili super priu nasusti, diachelidonium stomacici ad Anginas Andromacho faciunt apud Galenum. Hirundinum ster-  
cus acre & digerens, ut aliorum animalium magis, minus.

Aristoteles in Samo ait albam nasci Hirundinem, cuius oculos si quis pupugerit, statim quidem exacatur, post uero uisum recipit, & sicut ille dicit, sic acutè quemadmodum à principio uidet.

Cinis pullorum hirundinum medetur angina, ut hoc loco Dioscorides testatur. & Celsus libro quarto scriptum reliquit. Hirundinis cerebrum ex melle illitum ad suffusiones facit. Hirundo Germanis ein Schwalb dicitur.

## Ebur.

## Caput XLVIII.



**E**Boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obrinet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ebur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare, præcicis scribitur, frigidum siccam primo gradu. Germanis Hellsantbeyn.

## Suillus talus.

## Caput XLIX.



**S**vis talus comburitur, dum è nigro albo scat. qui tritus & potus inflationibus colis, longisq; torminibus medetur.

## Ceruini cornu? Caput L.



**C**eruini cornus cinis clotus, binis ligulis epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & uescicæ doloribus cum tragacantha, sceminis fluxione uulua laborantibus, cum liquore huius rei accommodato. Cerui cornu conrusum, erudo fictili luto circumlito, & in furnum indito: uritur donec albescat. id cadmiæ modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. infriatum dentes expurgat. crudi cornus suffiti ni-



## DIOSCORIDIS.

dore serpentes fugantur. seru factum in aceto, si eo gingiuae colluantur, maxilla  
rum à dentitione dolorem adimit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cornibus cerui & caprae uctis, & (si opus est) lotis utimur ad dentium candorem, gingivas molli  
tie fluidas, dysenteriam, fluxiones in oculos, oculorum ulcera, quia tergent sine rosione: tamen nec dolo  
rem leniunt, nec coquunt, quia frigida sicca.

Cerinum cornu, Germanis Stutz horn, Gallis corne de cerf.

## Eruca.

## Caput LI.

**E**RUCIS quæ in oleribus gignuntur, cum oleo peruncti, à uenenatis bestiis feri  
rinegantur.

## EXPLICATIO.

Erucae uermes sunt frondes arborum erodentes, quare ab erodendo erucas dictas uolunt, aliqui Gru  
corum erucam Chryselidem uocant. Germani ein Raup, & Holzwurm.

## Cantharides.

## Caput LII.



**E**FRUMENTIS congestæ cantharides  
ad recôdendum idoneæ sunt. quæ  
fictili uase non picato conduntur, &  
raro linteo obligato ore, & deorsum  
conuerso suspêduntur super aceti fer  
uentis quàm acerrimi halitum, donec  
æstu exanimentur, postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uas  
riæ, luteis lineis, quas in pennis transuerfas habent, promissioq; corpore cras  
sæ, ac blattarum modo perpingues. sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt  
coloris.

## EXPLICATIO.

Totis utitur Galenus ad psoras, lepras. Hippocrates caput & pedes auferit, lib. de foeminarum  
morbis. Hæ uesciam ulcerant solæ, ureticis autem salubriter miscentur.

## Buprestes, &amp; pinorum erucæ.

## Caput LIII.



**S**IMILI modo reconduntur bupres  
stes, genera quædam canthari  
dum, & pinorum erucæ, quæ supra cri  
brum suspensum feruenti cinere pau  
lisper intostæ, reponuntur. uis om  
nium communis erodere, ulcerare,  
calorem elicere. quæ de causa admiscentur medicamentis quæ lepras, ferasq; li  
chenas & carcinomata sanant. menses ciunt pessis emollientibus additæ. Aliqui  
cantharidas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argu  
mento, quod urinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum ueneficia re  
medio esse tradiderunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Buprestes uulgo ein Knölster quod boues rumpantur hoc animante, sic dictæ. Pini erucæ die  
würm von fichten appellata, non ut cætera, pini frondes, sed ipsum lignum sub cortice erodunt: Lur  
seinijs gratissimus cibus.

## Salamandra.

## Caput LIII.

**S**ALAMANDRA lacertæ genus est, iners, uarium, quod frustra creditum est ignibus  
non uri, Vim habet erodentem, calfactoriâ, exulcerantem, additur, ut cantha  
ris, in



## Salamandra.



ris, in medicamenta quo-  
rū uis est exesse, & lepras  
abolere. similiq; modo re-  
conditur. liquefacta \* in  
oleo pilos euellit. exente-  
rata, detractis pedibus &  
capite in melle feruatur  
ad eundem usum.

\* Alij cremas  
te cinis.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Salamandra non continuo, nec  
semper in igne uiuit, ut hoc loco

Dioscorides quoque testatur, sed aliquantulum in eo durare potest, nec est adeò ignotum animal:  
Imò illud quod Germanicè ein Olm, uel Woll, cuius picturam damus, appellatur. Et falsum est  
ex eius pilis, quos nullos habet, inextinguibilem telam fieri. Nam huiusmodi materia est uel ex Amian-  
tho lapide, uel ex quodam apud Plinium lini genere, si non et id Amiantho lapidi idem fuerit.

## Araneus.

## Cap. LV.



Araneus, quem holcum, alij lycon, id est, lupum uocant, suba-  
ctus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; utrisq; tempori-  
bus aut fronti, tertianos circuius persanat, tela eius imposita san-  
guinem sistit. uulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflamma-  
tionis iniuria uindicat. Est & alterum aranci genus, qui candidam, tenuem, den-  
samque telam orditur: quem in aluta ligatum, & lacerto appensum, quartanis  
circuitibus mederi narrant. decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus  
auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀράχνη. Latine araneus. Germanicè Ein spin.

Araneorum plura genera uide apud Hermolaum Barbarum, in Coroll.

## Lacerta.

## Cap. LVI.



Lacertæ caput intritum & appositum, aculeos &  
L omnia corpori infixæ extrahit. uaros\*, formican-  
tes uerucas & penfiles, quas acrochordonas uocant,  
tollit. iecur ex eis dentibus coniectum dolores finit. si  
diuulsa admoueat, ictis à scorpione leuamentum præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lacertum & lacerta, utroque genere dicitur. Inuamenta eius lege apud Plinium libro 8 cap. 39.  
Græcè σαύρα. Germanicè Ein eydeys dicitur. Quanquam est & genus herbe Saura Plutoni sa-  
ura, de qua in Nicandro.

## Seps.

## Cap. LVII.



Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam uocant, in uino  
pota morsus suos sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Seps ideo etiam Chaleis appellatur, quod à quibusdam lineis, ævis speciem,  
similitudinemq; gerentibus, eius dorsum distinguatur. Itemq; ad octo palmorum  
longitudinem accedit, tum in Syria, & Libya, & Cypro nascitur, in saxis domesticam sedem solit  
habere.

## Scincus.

## Cap. LVIII.


Scincus aut Egypti, aut Indiæ, aut rubri maris alumnus, quamuis inuenia-  
tur in Lydia Mauritanix. Est autem terrestris crocodilus sui generis. Sa-  
le inueteratus cum nasturtio, aiunt carnes quæ renes amplectantur id sibi uirum  
uendicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, uenerem accendant, uerum decocto



## DIOSCORIDIS

lentis cum melle aut femine lactucæ cum aqua potio, ueneris cupiditates inhibentur. additur in antidota.

Scincus siue Crocodilus terrestris.



Stinci Officinarum.



### NOMINA ET EXPLICATIO.

Recens scincorum, crocodilorum terrestrium, tanquam pudendum ad uenerem intendentes quidam bibunt: alij sumen quoque et caudam assumunt: unde compositio est Aſtuario diaſcineu. Officina corrupte ſtincum marinum uocant, et aliud genus lacertæ ostendunt in paludibus et cœno uiuens, a uero crocodilo longè diuerſum.

### Terreni uermes.

**T**erreni uermes impositi, præciosos neruos glutinant. tertianas discutunt decocti cum anserino adipe. infusi, affectis auribus medentur. cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium doloribus præstant auxilium. triti in potu ex passo urinam ciunt.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Υἄσεν τερεπ, hoc est, intestina terra Græcis. Plinio autem et Latini uermes terreni. Germanis Regenwurmi dicuntur: similes sunt lumbricis, qui aluo et intestinis innascuntur, et λυμβες spongyæ, id est, rotundi Græcis appellati. quare permiserunt sibi etiam uermes terrenos lumbricos appellare, magno errore si quis rei medicæ usu, pro uerme terreno lumbricum ex aluo humano adsumat, quum uermes terreni exigendis ex aluo lumbricis, in potu ab ætæio præbeantur.

### Mus araneus.

**M**us araneus dissectus & impositus, sui morsus ueneficia luit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Mus araneus qui Germanicè Ein Syfinaus, dicitur, si in orbitam inciderit, tanquam unculis capitur, ac moritur: ei qui ab eo fit morsus remedium est, ut Dio, corides tradit, terra ex orbitarum transitu sumpta, eaque simul ut uulnus aspersum sit, statim sanatur.

### Mures.

### Caput LXI.



**M**vres, qui in domibus oberrant, con-  
cisos scorpionum plagis utilissimè  
imponi, in confesso est. si in aſtatos infantes  
ederint, oris saluam exiccare promittunt.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Plura esse murium genera liquet, ut Ponicæ, alpini, herinacæ pungentibus pilis. Omnium autem nature murium Aristotel. sexto nature animalium meminit his: Murium mirabilis est præter cetera animalia, cum numero, tum celeritate. Iam enim femina prægnante in uase nulliario aliquando concupata, paulo post reſerato uase, musculi numero uiginti et centum reſerti ſunt, hæc ille, et multa id genus, qui plura uolet locum habet quem adseat.

Murium



Murum capitum caudarumq; cinere ex melle inunctis, claritatem visui restitui dicunt, multoq;  
magis gliris aut muris sylvestris cinere.

Lac.

## Caput LXII.



**L**ac generatim omne boni succi est. corpus alit. aluum emollit. stomachum et intestina inflatio ne uexat. uernum tamen dilutius aestiuo habetur. & e uiridi pabulo aluum magis emollit. Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod ungui in stillatum cogitur. aluum minus tentat caprinum, quoniam pecus hoc adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, & terebintho magna ex parte uestitur, inde stomacho accommodatissimum reddi solet. ouillum autem dulce, cras-

sum, & præpingue, non usque adeo utile stomacho. Bubulum tamen, asininum, & equinum, uentri magis idonea, sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora scamoniam, ueratrum, clematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne uentrem & stomachum subuertit: quale in Iustinis \* montibus esse, à nobis proditum est. *De hoc supra lib. 1. cap. 9.* Siquidem capræ quibus candidum ueratrum pabulo fuerit, primo foliorum partu euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in uomitiones effundit. uentrem adstringit lac omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exustum: & in summa, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, uesicæ & renum. foris uerò contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & uitiatos corporis succos, recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. minus inflat quodcunque semel feruefactum. decoctum cum calculis marinis ad dimidias, ulcerosas uentris fluxiones adiuvat. Lac quodcunque serum continet implicatum: quod ubi discessit à lacte, multò potentissimum ad purgationes redditur, datur quibus sine acrimonia uolumus deiectionem moliri, ut melancholicis, comitialibus, lepris, elephantis, & erumpentibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod schistum, id est, scissile, appellant. Lac autem fictili nouo feruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, in sparsis, postquam bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt heminae lactis, ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne superfluum datur, cōueniet spōgia ex frigida cōtinuò fictilis labrū detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis, usque ad quinās, ita ut intercedentibus spacijs potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones ustionesq; ab exitiabilibus medicamentis factas, uti à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. præsertim bubulum ad id exitiè confert gargarizatur autem exulceratis faucibus, tonsillisque. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasque stabilis. fluxiones alui, si ulcera sentiantur, tenesmosque, ouillum, bubulum aut caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit. per se autem & cū hordeaceo, ptisana aut halicaceo cremore infusum magnopere intestinorū rosiones mitigat. exulceratæ uulue immittitur.

Humanum lac dulcissimum est, & maxime alit. mammis autem exustum, prodest tibi & stomachi rosionibus. contra haustum leporem marinum præsidio est. oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur. podagricis utile est cum meconio & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, uertiginosis, & neruorum uitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdum purgationis gratia, ut ostendimus, schistum præbeat. Primiparæ canis lacte perunctos narrat glabrescere. potum contra uenena antidoti uicem obtinet. abortus mortuos expellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lac lauat, terget sero, emplasticum est butyro et caseo: ob hæc acres & mordaces fluxiones obtundit, recens utendum.

Caseum



## DIOSCORIDIS

## Caseus.

## Cap. LXIII.



**C**aseus recens sine sale sumptus alit. stomacho utilis est, & facile in mēbra delegatur, corpus augeat, aluum modicē emollit. alius tamen alio praestantior, pro natura lactis à quo conficitur. decoctus autem & expressus, deinde in assatus, aluum sistit. illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui uerò recens salitus est, minus alimenti praebet, corpus apte minuit, stomacho aduersatur, negotium uentri interaneisquē exhibet. uetustiore sistitur aluus. Sero quod à caseo manauit, quam optime canes aluntur. Quod hippacem uocant, caseus est equinus. ea uirus redolet, magnopere alit, bubuloq; proportionē respondet. Nec desunt qui hippacem, equinum coagulum appellarint.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Caseus recens refrigerat, repellit, siccatur, uulnera etiam magna glutinat. Ex uetustate uerò acer, cum perne decocto subactus tophos eliquat & aperit.

## Butyrum, &amp; eius fuligo.

## Cap. LXIII.



\* Alias lactis  
sui facultate  
praeditum.

**E**lacte pinguisimo probatum fit butyrum, quale ouillū est. fit & ex caprino, agitato in uasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum natura oleosum est & emolliens\*: unde largius epotum, uentrem resoluit, prodest, ubi oleum non adfuerit, contra uenena. cum melle si infri cetur, dentitiones adiuuat. gingiuarū pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. illitum foris capaciore alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summascatentibus asserit. contra inflammationes & duritias uuluae, quod nec uirus respicit. nec uetustatem sentit, butyrum efficax est. dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. in medicamenta addi solet quae pus mouent, utile praesertim cum nerui, aut cerebri membranae, uesicae ceruix, uulnera acceperint. id autem purgat, replet, carnem creat, ab aspidē percussis utilissimē imponitur. recens obsonijs additum olei uicem penfat. & adipis uice fungitur in bellarijs. Colligendae ex eo fuliginis ratio haec est: Butyrum in lucernam nouā ingestum accenditur, fistilique operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna post deraditur ad usus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare & adstringere, fluxiones cohibet, & ulcera celeriter ad cicatricem perducit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Butyrum Germanis Butter, & ancken. Gallis buyre. Hispanis manteca dicta, minimum terget, ut decoctum Glycerhizae: coquit item & digerit, bubonas, parotides, oris phlegmonas in pueris & mulieribus, gingiuas puerorum cum dolore dentientium crebro illitu tenuat, quantum mel: idem lacti canino, & leporis cerebello tribuit Archigenes. Expuitionem Butyrum promouet (maximē cum melle aut Sacchere) in pleuritide & peripneumonia, quos affectus etiam coquit. In uinguentis potissimum fuliginis usus est. Fumi par est, quae parieti inhaeret: quippe fuliginem summam crassiores condensatum uocamus, Germani Rhs.

## Medicina lanarum.

## Cap. LXV.

**S**ucciduae lanæ molles, è collo fœminibusq; laudatissime habentur. Subueniunt inter initia uulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto, oleo aut uino imbutae. siquidem facile succos cōbibunt quibus immerguntur. & ob pecudū sordem, sic enim cespiti uocant, emolliunt. capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cū aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. Crematarum lanarum





lanarū cinis crustas obducit, ex crescentias in carne cohibet, et ulcera ad cicatricem perducit. Mundæ autem & carptæ, in fictili crudo, cæterorum more, uruntur. Nec secus fimbriarū marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Aliqui cum fordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq; modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula inter se distantia cōponunt, & cōcerptas carminatasq; lanas oleo ita suffusas ut ne stillare qdem possint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & ustas tollūt. quòd si è teda pix, pinguitudo uē ulla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & confidere patiuntur: idq; sapius, mutantes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Conferunt humano generi lane, tum ad tuendum corpus à frigore, tum ad sanitatem ualent, potissimum succida: quas ita describit Varro libro rei rusticæ, cap. ultim. Tonsura tempus inter æquinoctium ad ærniū & solstitium, cum sudare incœperint oues à quo sudore recens lana tonsa succida est appellata, Germanicè Schmutzig wollen / robe vngewaschen wollen &c. Lana igitur huiusmodi plurima præstatur remedia ex oleo uinoq; aut aceto, prout quæq; mulceri, moderari opus sit & astringi laxariue.

Lana succida et sordida confusis utilis ob æsypium: lota uerò est uice linamenti capiti: uisita autem æris, calida sicca, tenuum partium.

## Oesypum.

## Caput LXVI.

Oesypum uocant Græci, succidarum lanarū pinguitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succida molles, radícula nō curatæ, calida aqua lauantur, & quibuscunq; fordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, uti respumer, agitur, aut lignea rude ualidiuscule conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur. & confidite pingui quod supernatabat, collectoq; in altero fictili uase, denuò aqua in labellum fusa agitur. spuma iterum mari perfunditur, & demū eximitur. hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet, collectum æsypum manibus emollitur, & si qua infedit spurcitia, confestim demitur: ex clusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus miscetur, donec ad motum linguæ æsypum, astringat leuiter, nec mordeat, atque pingue candidumq; spectetur, tum in fictili uase conditur. Verum omnia feruendo sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant: ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & fordibus quibuscunq; exemptis, a lento igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue qd supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, linteo operiunt, atque soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spacio aquam effundunt, nouamq; adhiçunt. Melius est læue, radícula non curatum, quòd succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens, ueluti quod cerato aut adipe adulteratur. Oesypum ex calfa cit, explet ulcera, & emollit, præsertim sedis ac uulnæ, cum meliloto & butyro, in uellere appositum, menses & partus euocat. ulcera non aurium modò sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. contra erosos angulos oculorum, scabiososq; genas quæ occalluerunt, & ciliorum destituta, efficax est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinem amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, uti demonstrauimus, quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet.

## EXPLICATIO.

Oesypum est succidarū lanarū pinguitudo, ut Dioscorides præfenti capite docet, *ὄσσυρον* & *ὄσσορον* ὄσσορον apud Paulum aliquoties legitur, unde opinor præfatis consuetudo appellandi hysopum humidum.



humidum, pro cespum, uolentibus ab hyssopo herba separare: *διοντος* autem Galeno cum Diosco-  
ride semper dicitur.

## Coagulum.

## Cap. LXVII.

**L**eporis coagulum tribus obolis ex uino, uenenatorum moribus, celiacis, dysentericis, & fecminis fluxione uulue laborantibus, ac reiectionibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumos concretum discutit. post menstruas purgationes appositum uulue cum butyro, præstat mulieribus ut concipiant. potum uero partus enecat, & à puerperio, pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui uocant, priuatim celiacis dysentericisque conuenit. Hædi, agni, hinnuli, capreæ lati cornis, & dorci, apri, cerui, uiruli, bubalique coagula similes naturas sortiuntur. contra aconiti potum in uino, & concretum lac in aceto, conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini, castorei uires representat. comitialibus, strangulatis uuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit uiruli marini, hoc ex primentum est: aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum, maduerit. nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: si minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natari possunt. in summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Coagulum omne Germanis *Bynn* / *lypp* & *fäsa* *lypp* appellatum, ex lactis in uentriculo primo corruptione acre, digerit, siccatur. Lac aut sanguinem in uentriculo coagulatum dissoluit: leporinum omnium est præstantissimum. Qui igitur menses immodicos cum Practicis & Medicorum uulgo querat sistere, cum calidum sit uitandum, ubi sanguine fluit, aut fluxurus est.

## Adeps.

## Caput LXVIII.

**A**deps anserinus aut galli cenaceus recens & sine sale conditus, ad uulue uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spacio acrimoniam concepit, uulue inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis quem curare insitueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur, eliquescentis inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco uehementer frigido reconditur, & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis uicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusque in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento, mox lineo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum de tractus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissime manibus confricatur, et exprimendo ferme siccatur, subindeque noua aqua abluitur. cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur, eliquatusque colo transfunditur in aquam: ubi uero refrixit, & guttatim aqua omnem excludit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quod facilius faculentum uirus pessum eat: postea in pilam spongia madefactam transfunditur: ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. tertio citra aquam eliquatur, repurgatusque fictili bene operculato, perquam frigidis locis reponitur. Hircinum seuum, ouillum, ceruinumque ita curato: Elotum ex his quodcunque, tunicis, ut in suilli mentione dictum est, exemptis, pilæ emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum uirus ex cernatur, aut pingue aliquid innatet, sed nitida spectetur. deinde in ollam fictilem coniecto, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacto, & moueto, atque in aqua colato: cumque refrixerit, iterum in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus faci- ro, tertio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratumque, ut in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluenda est, mox



est, mox in pila tundendum diligenter, affusa maris aqua. cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniiciendum, & marina aqua, quæ non minus doctante superemineat, proluendum. decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seu Atticas minas, quaternis Tyrrhenicæ ceræ drachmis: excolatumq; detractis quæ pessum ierāt sordibus, in nouo fictili reponendum, operitumq; soli interdiu credendum, ut ad candorem reducatur, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorū pingue sic curari debet: Renibus euulsum pingue proflute amnis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo postquā exiguum salem insperferis, liquefacito, dein in nitentem aquā excolato, & ubi con crescere cœpit, manibus iterū cōfricando uehementer lauato, aqua sæpius infusa, refusaq; donec quā optime elotum uideatur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquito, & cum iterum effuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. postridie si grauius adhuc oleat, noua olla repetitum, uino odorato perfundatur. eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet, sed ita paratum nō magnopere albescit. Eodem modo pardorū ac leonū\* pingui curari oportet. Taurinum autem et uitulinum pingue, necnon ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odoramentis imbuitur hac ratione: Pingue qd odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, elotum et uino quāmodoratisimo, nulla maris aqua diluto, feruescitur, pernoctare finitur: alterū id genus uinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur, nouemq; eius heminis, iunci Arabici septem drachmæ adijciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantior fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cū paribus palmæ, calami, & casie modis additur, & xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie, omnia exactius tunduntur, et affuso uino odorato, in uase operto, qd supra carbonēs firmiter collocatū sit ter effervescent, & semoto ab igni uase inibi pernoctāt. postridie uinū effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur ter simili modo bene cōferuescat, deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur, & abluto uase, si qd imo subsidens hēsit, detergatur. postremo eliquatum pingue & excolato, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est uerū antè dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorū uires adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horum uoles, cum uino feruescitur, impositis unā myrti ramulis, serpyllo, cypetro, item aspalatho plenius tuso, aliqui tamen ad hunc usum, uno duntaxat horū contenti sunt. cum aut ter effebuit, exemptum leniter, & linteo colatum, aromatizati, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunq; acciperis, oportet ut recens tundatur) Sincerus & sanguinis expers adeps, reliquas habens notas quas sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet. lento igni feruescat, dum uernaculus odor aboleatur. planèq; uinum redoleat. at ubi deposito uase refrigerit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij, & seminis Loti, eius inquam cuius è ligno ludi crē tibiē facituntur, tusi minæ quatuor adijciuntur, lento igni subinde miscendo decoquuntur, cumq; odoris uirus euanescit, excolatoq; adeps refrixerit, una contusi aspalathi minæ, cum amara cini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una hæc odorem rapiunt, comibunt. postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini unā feruescunt, quousque & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit, qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguiissime myrrhæ uino macerata, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallina cecus anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur. erysiceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè cōtusi, singulorū fescuncia admiscetur. uini Lesbij ueteris cyathus unus adijcitur, ea ter effervescent prunis, mox uase sublato ab igne, die noctuq; refrigerantur. postridie liquata per linteum crassum, mundum, in uas excolatur. ubi uerò adeps

\* Quidam ad  
dunt, suis an-  
grestis came-  
lorum, equo-  
rū, & similia.



# DIOSCORIDIS

322

coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet, æstate siquidem pingua nō coguntur. Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciunt, quō facilius in unū corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus cæteri q; id genus, odor, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quā optimē adipis, præsertim taurini, mina una, tempestiuq; sampsuchi exquisitē confraeti sesquimina miscentur, & insperso laregiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperto nocte quiescunt, maturinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua, leuiter coquuntur, dumq; suum adeps odorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet: postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur: alijs quē diximus peractis, decoquitur & colatur, & si qua fundo hæsit spurcicia, deraditur, & rigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut uitulinum, à putredine tueri uelit, ita faciundum est: Quemuis adipem diligenter elotum & siccatum in umbra super cribrum, per lineamunda manibus uehementer exprimat, linoq; confutum umbroso in loco suspendat, & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pingua autem indito melle uindicatur à putredinis uitio. uis omniū est excalfacere, mollire, rarefacere. Taurinus adeps, bubulus & uitulinus aliquantum adstringunt, earundem uis rium compos leoninus, nam resistere eum aiunt ijs qui insidias moliantur. ceruinus, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt, adstringentior est caprinus, quæ ex causa decoctus cum polenta, rhoë & calce, dysentericis datur, & cum ptisanæ succo infunditur. ius decocti phthysicis in sorbitionibus prodest, datur quoque utiliter ijs qui cantharidū uenena hauserunt. hircinus, ut ualidissimē discutiat, podagricis auxiliatur, cū fimo capræ & croco impositus, huic proportionē respondet ouillus. Suillus uerō contra uulnæ & sedis uitia idoneus est, ambustis igni medetur. è sue uetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, et emollit, elorus uino pleuriticis prodest, cinere aut calce exceptus inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit, asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere, anserinus gallinaceusq; conueniunt muliebribus malis, & labiorum rimas, ad mangonizandā faciem, & contra aurium dolores, ursinum constat raptos uitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire, uulpinus medetur aurium doloribus. Fluiuatilium pisciū pingua perunctis oculis claritatem afferunt, si in sole liquecant, & melli admisceantur. uiperæ adeps contra oculorum hebetudines suffusionesq; efficaç est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo uetere, pilosis euulsos perunctis radicibus recens & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Adeps seu pinguedo. Germanis Feyst/fettigeyt & schmalz. Gallis de la gresse appellata, calea facit, humectat magis uel minus, prouaria animalium natura. Leoninus calidiss, siccissimus, id est, minimum humidus, potentissimē omnium digerit ob acrem multamque caliditatem, & partium tenuitatem, ob id scirrhis & inueteratis tumoribus tantum aptus. Pardinus ei proximus, pardino uersinus, taurinus ursino uicinus, sed tanto quā suillus calidior siccior, quanto minus leonino est calidius siccior: ab utroque enim ex æquo distat in amborum medio constitutus.

Suillus autem omnium propē humidissimus. Caprinus, præcipuē hircinus, crassior taurino, ob id celerrimē concreuit.

Inter taurinum & suillum fuerint uulpinus alopecias sanans, caninus, melinus, felinus, curculinus, equinus, uaccinus, camelinus, uitulinus.

Anserinus maximē tenuium partium, ob id in uolucrum genere præstat ad scirrhi curationem: Gallinaceus illi proximus. Adeps humanus omnium est temperatissimus. Iidem uetustate calidiores & sicciores euadunt ut oleum, mel, uinum.

Reponitur aut incuratus, lotus, siccatus in umbra, uel exemptis pelliculis super sole uel igni in uase duplici, Adeps cerui nullo medicamentorum mollicinium est inferior.

Medulla



## Medulla.

## Caput LXIX.

**L**audatissima est ceruina, mox uitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur ætatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni tēporibus concrementum sanguinis, et ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. nec facile cognosci potest, nisi quis eā ossibus extrahat et recodat. Oēs medullæ molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, ulcera explent. ceruina perunctos uenenata fugiunt. Curantur recentes, ad ipis modo, aquæ resperfu subactæ, selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteam expressæ, donec aqua syncera emanet: & deterfa forde pinna, si qua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimuntur, & ubi coiere, omni fece quæ ad ima sedit derasa, fictili nouo reponuntur. quod si libet in curatas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauimus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Medulla Germanis *Waxel*. Gallis *de la moelle* dicitur, calfacit, rarefacit, emollit scirrhusque rumus partium, præcipue ceruina, et post hanc uitulina. Taurina, hircina acrior & sicior est. Loco sicco & edito & septentrionem spectanti reponitur, cum folijs lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit, sunt qui reponant bisariam adipum modo.

## Fel.

## Caput LXX.

**F**el omne curatur hoc modo: Recens præligato ore folliculi lino tandiu demissum in feruentem aquam, dum quis spacium trium stadiorum percurset, mox exemptum siccatum umbroso loco, asperginem nō redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in uitreum uas, quod mel habeat, immittitur. circumuoluto ad os uasis lini principio, & aperto uase reconditur: est. n. uis omnium acris et exalfaciens. Intensius tamen & remissis uiribus differunt. si quidem præstantius in effectu esse uidetur fel marini scorpionis, et piscis qui callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyenæq; item perdicis, aquilæ, gallinæ cādidæ, & syluestris capræ, qd priuatim prodest cōtra suffusiones incipientes, et oculorum caligines, argemas, & genarum scabritias. ouillo, suillo, hircino, atq; ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, deiectionē quis molietur, si intinctum eo tomentum aut fimbriā sedi subijciat. priuatim taurino angina cum melle punguntur. sedis ulcera sanat, & ad cicatricē usq; perducit. idem auribus fractis & purulentis cum muliebri lacte aut caprino instillatum medetur. & sibilo earundem ex porri succo. admisceri in suauit, uulnerarijs emplastris & circumlinationibus, quæ contra uenenata parantur. phagedænicis ulceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest, lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quā optimè purgat, ouillum & ursinum cōtra eadem pollent, uerūm ineffacius hæc præstant. ursinum eclegmate comitiales adiuuat. fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest. nariibus inditum comitiales erigit. syluestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. hircinum idem obit munus. thymia abolet, & luxuriantes elephanticorum extuberationes illitu reprimunt. suillum autem contra aurium ulceram, reliquaq; omnia, magno usu assumitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Felle animalium ob acrimoniam & calorem solo uix utimur, præter quā ad aperiendæ hemoroidas, sed collirijs, trochiscis, alijsq; remedijs miscemus.

Fella piscium oculis sunt tutiora, ut eorundem hepata sicco hepatis salubriora.

## Sanguis.

## Caput LXXI.

Lib. Tobia.

**S**anguis anseris, anatis & hædi, utilissimè in antidota miscentur. Palumbi autem, turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, et recentibus eorū uulneribus, lusciosisq; illinuntur. peculiariter columbe sanguis, cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. Hirci, capræ, cerui & lepōris sanguis in assatus sartagine, dysenterias & celiacorum profluuiā sistit. in uino potus cōtra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut tepet illitus, uitia cutis in





alijs, equorū  
admissario-  
rum.

sunt, in medicamenta additur quę erodunt, septica uocāt. Sanguine chamæleonis genarū palpebras euelli creditum est. Hoc. n. uiridiū ranarū sanguine præstatur. Mēstrua sanguis fœminarū, circūlitu conceptū inhibere existimatur: aut si omni no mulier mēstrua supergrediatur. Leuat podagrę dolores et ignē sacri illius.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Sanguis hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti uino albo, foeniculo, sefeli, lauro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) uase uitreo receptus, testus linteo raro, sole siccatus, etiam cum myrrha, folijs lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur Tralliano, Auicenna, & ceteris praticis. Huic quandiu ab animali calet coquendi abscessus uim tamū tribuit Galen. lib. 10. simp. qualem caprino, taurino, & ceteris calidis humidis modicē.

Quod si hircinus sanguis adamantem frangit, sed calidus tamū ab animali: sic lapidem calidum tantum epotus refrigerit. Quod & sanguinem uulpinum ex uena secta potum præstare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum feruens factum, aut coagulum.

Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sart agne fixū, dysentericorū & celiacorum profluuium sistere tantum hoc capite docet Dioscorides, non addit calculum frangere, quæ uis tenuibus conuenit, cum dictorum animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore siccatoria, dysenterias sanat.

Sanguis ex secta uena sinistra profluens lieni affecto infricatur Archigeni, lib. 9. com. ph. part. Antidotum de sanguinibus quomodo parari debeat, uide apud Manardum.

#### Fimum.

#### Caput LXXII.

**A**Rmentarię bouis fimum si recens admoveatur, uulnerum in inflammationes mitigat, folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. coxendicis cruciatus foris compescit. illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. priuatim suffitu fimi, quod à masculo boue redditum est, procidentis uulnæ reprimuntur, accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum, præsertim in montibus degentium, potum in uino, regium morbum emendat. menses cit cum odoramentis haustum. & partus euocat. tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, fœminarum profluuium sistit. ceterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. medetur alopecij exustum, & cum aceto aut oxymelite illitum. cum axungia uerò impositum, his qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium moribus, ulceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici uestionem hunc in modū accipit: In eo interstitio ubi pollex brachiali committitur, caua ueluti la cuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde figillatim feruentes stercoreis caprini pilulæ imponuntur, dum uapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire. & coxendicis dolorem mitigare. adustio id genus Arabica appellatur. Ouillum illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles uerrucas, thymos, & ambusta ex aceto igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suis syuestris aridum, in aqua aut uino potum, reiectiones sanguinis sistit. uetustum lateris dolorem multo. adrupta & conuulsa ex aceto bibitur. luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum quàm equorum fimum siue crudum siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. armentarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in uino, mox potum, contra scorpionum ictus magnopere auxiliatur. Columbini uementius & ex calfa cit et urit. cū hordeacea farina mixtum strumas ex aceto



ex aceto discutit. carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini femine & oleo. ambustis igni medetur. Gallinaceū uerò omnia eadem, sed efficacius præstat. priuatim tamen cōtra uenena fungorum, et coli cruciatus ex aceto aut uino bibitur. Ciconiæ fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excūti produntur. Murinum detritū cum aceto, et illitum, alio pecijs medetur. cum thure et mulso calculos expellit. subditā infantibus muscerdē, alui deiectionem promouent. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptum, cum uino aut aqua potum, sistit aluum. Humanum sterco illitum, uulnera ab inflammatione uindicat, & obiter intumescere nō patitur, sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginę perungi commodissime traduntur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima et friabilis, amyli modo, minime potius derosa, in humore statim eliquescens, quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenuis refert. Adulterant eā sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt, ipsumq; non dissimile uendunt. Alij amyllum aut cimoliā miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorū speciem: qui siccati pro crocodilea ueneunt. Inter omnes conuenire inuenio, humanum sterco caninumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

## EXPLICATIO.

Tria genera fimi Columella secundo libro memoriæ mandauit esse, quod ex auibus, quod ex hominibus, quod ex pecudibus sit, ubi de hac re plura. Item apud Plinium lib. 17. cap. 10.

## Vrina.

## Cap. LXXIII.



Humanam urinam suam cuiq; bibere, contra uiperæ morsus, ac uenena, incipientemq; aquā inter cutem proderit. scorpionis, uiperæ marinorum, draconisq; morsus ea conuenientissime fouentur. Canina ad perfundendos canis morsus idonea est. pruritus & lepras nitro addito expurgat. sed uetus, ulcera capitis manātia, furfures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. nomas, & præcipuè genitalium, cohibet auribus infusa manans pus supprime: decocta q; in calyce mali punici, earum uermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur. decocta in æreo uase cū melle emendat cicatrices, argemā, caliginēsq; ex ea et cupro idoneū auri ferrumen cōficiunt. Quod in urina subsidit, illū ignem sacrum mitigat. feruēfactum cum cyprino, inditumq; uulua dolores mulcet. strangulatus leuat. genas deterget. oculorum cicatrices expurgat. Taurina, si cum myrrha instilletur, aurium dolores lenit. Aprina uiribus eisdem prædita est. priuatim cōminuit uescicæ calculos, & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subiit, cū nardi spica quotidie binis cyathis cum aqua bibitur. urinamq; per aluum extrahit. aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum uitij inderi. Lyncis urinā, quā lyncurium appellant, simulac ex cernitur, glaciari coire eū in calculi duritiā, uulgò creditum est. quare quod de ea proditum est, uanum esse conuincitur. est enim quod a nonnullis uocatur succinum pterygophoron, ideo dictum quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua, stomacho aluoq; fluxione laboranti conuenit. Asinina urina potu renum uicia sanari traduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galenus huiusmodi impura medicamenta stercoris & urina, ut ingenuo & honestate mundicie studioso uiro merito abominanda improbat: præsertim circa caput & faciem adhibenda, quo magis indignè ferendus est aliquarum urinarum, uel etiam humanarum potus, ex quo tamen pestilentia grassante in Syr. a. quidam conualuisse uidebantur, Galeno tradente ac asseuerante: item orthopnoia gratia, pueri urinam bibere, non est necesse; quam alia sint multa pharma huic malo commoda, & quidam etiam eo potu opem non senserint. Verum tam abominanda medicamenta etiam homines dūram apud aniculas quasdam, & uulgus fortè potioribus & purioribus indignum, non modo

Hæc clausula abundat.

Cornarius.



peste, & orthopneia, ac anhelosis, uerum etiā in alijs tum uentris, tum intestinorum morbis, & praesertim in doloribus coli, ut pote quod uomitus irritando, & deiectiones coëcitando, omne uitium ualent expurgent, uelut etiam Marcellus cap. 27 testatur.

Mel.

Caput LXXIII.



Principem locum obtinet mel, quod Attice regionis est, praecipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & Sicilia, cognomine hybleū. Magis probatur dulcius et acre, odoratius, subflauū, nec humectum, graue, et minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiā nō facile abruptitur, tractumque resilit in digitos. Mel abstergendium habet. ora uenarum aperit. humores euocat, qua ratione in fordida ulcera sinusq; cōmodissimè infunditur.

decoctum atq; impositum, abscedentem carnem glutinat. medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum. item aurium sonitui et dolori, cum fossili\* sale trito, tepidum instillatur. lendes & fœda capitis animalia illitum\* necat. nudam glandem recutitis operit, praesertim quæ circuncisione aperta non est, si melle preputium à balneo triginta diebus emolliatur. oculorū caliginem discutit. faucibus, tonsillis, anginae collutū gargarizatūue medetur. urinā ciet. auxiliatur tussi, & à serpente percussis. contra haustum meconium, cum rosa ceo calidum assumitur. aduersus uenena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. crudum tamen aluum inflat. tussim lacessit, & ea de re despumatus usus aptior est. Primatum tenet in mellis genere uernum, deinde aestiuum. hybernum uerò, utpote quod crassius cōstet, deterrimum reputatur, ceraginis halitum expirat\*. Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est, quoniam apes inibi absinthio uescantur: quo uitia cutis in facie et maculae aptissimè perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdā anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflat, quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffuunt. Remedio sunt, esitata ruta, & fassamenta, aut eorum mulsum, resumpta quoties uomitio ne reiiciuntur. acre autem est, & olfactu sternutamenta mouet. Quod cum costo illitum, fœminarum cutem emendat, & cum sale sugillationes rapit. Est & aliud concretum mellis genus, quod saccharon nominatur. In India uerò & felici Arabia in arundinibus inuenitur. salis modo coactum est, dentibus, ut sal, fragile, aluo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur. uexata uelica renibusq; auxiliatur. illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

\* Quidam, cremato.  
\* Collutum, alij.

\* Alij ceraginis faciunda idoneum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Mel Germanis Honig. Gallis du Myel dicitur, in succorum censum referri potest: quod autem est calidum, siccum ordine secundo, ut medicamentum: ut alimenum uerò, & dum actu nutrit, calidum humidum libro tertio. temp. terget, alit, coquit, putredini resistit, ut uinum, non cogendo substantiam corporum quibus exhibetur, uti sal, sed siccando, tergendo, ora apriendo, transitus purgando. Vrinam mouet, stomachum subuertit, ob id non miscendum remedijs uomentum: immoderate frigidas humiditas tūto sanat, calidis siccis seu bilosis est aduersissimum, sinuosa ulcera glutinat. Coctum & despumatum minus acre, & tergens redditur, sed magis nutrens. Mel medicamentis miscetur, uel crudum, uel coctum, uel solum despumatum, uel cum his coquendum, aut solum despumandum, aut ut crudum maneat. Cum autem despumandum est, coquitur supra prunas aut flammam lignorum aridorum, & sine fumo.

Mel optimum sit purum adeo, ut totum perluceat, odorum, flauum, acerrimum, dulcissimum, gustu uicundum, consistencia nec crassa, nec liquida: sed tam sibi coherens, ut continuitatem suam quasi linea longissimā non intercisum seruet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam remittit, nec thymū improbe olet. Albū etiā ex Gallia Narbonensi praestantissimū affertur, & pallidū magis est primo apum mellificio. Sachar autem, ut uocant, & ipsum mellis species, ex India, et felici Arabia aduectū, in calamis, ut (hoc loco Diosc. tradit) cōcresecit, minus dulce q̄ nostras: similititer tamē terget, siccet, digerit nec in meū stomacho est, nec suum affert, ut nostras, quæ res ipsum à melle subtilia differe possidet. Idē sal Indus quibusdā dictum uidetur, in solis gutta extra canas extracta et densata.

idem



Idem zuchara Arabum re ipsa esse apparet, solo differens compositionis modo per coctionem & expressionem: noto quidem Varroni & Straboni, ignorato autem Dioscoridi, Galeno, Plinio. Nec tibi difficile fuerit rationes eluere eorum, qui Sa-



charum Græcorum à zuchara Arabum diuersum contendunt. Actuarius sachar ubiq; scribit pro Arabum zuchara, uoce ab his suo more ex Græcis deprauata, aut fortasse contrà, cū res ea fuerit Arabica, Græci ex his nomen mutati sunt. Sacharum rubrum est ipsa uelut spuma sachari, spurcitiæ coctione deponentis, calidius et acrius sacharo, uti spuma mellis, melli. Germani see fallen Zucker. Galli Cassonade appellant.

## Cera.

## Caput LXXV.



**C**era optima est subfulua, subpinguis, pura, odorata, & halitum quadam tenus melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo: Ex ea radunt album syncerumq; atq; transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petitiæ, inspersoq; nitri momento decoquunt. cumq; iterum tertioque inferbuit, separatim uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa forde, si qua fortè adhæsit. tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus, & uase dempto ex igne, fundū ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. orbiculi lino confuti, interuacante spacio, suspenduntur, & interdium, continuo sub sole, noctu sub luna asperguntur, usq; dum perfectè albescant, uerū si eximius ille candor desideretur, eadem facituri, & identidem recoqui operæ precium est. Nec defunt qui pro marina, in muria quàm acerrima semel aut iterum excoquant, dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente, extrahunt, postea orbiculos, substrato affatim cespite herbofo, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut nō facile liqueatur. Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet corporea. datur in sorbitione dysentericis. ac milij magnitudine, decem grana ceræ hausta, lac in nutricibus non patiuntur coagulari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cera calidi frigidi, humidi siccī quodammodo media, crasse essentia, emplastica, debilitè coquit ad mota, habet paulum quiddam digerentis calidæq; potentia, quæ melli plurimum inerat. Materia ob id est aliorum medicamentorum & refrigerantium. Ea aut lutca est, aut fusca, aut alba, & hæc aut natura, ut Pontica apertè acris, aut ablutione, ut Tyrrhenica, & nostra acrimonia expers. Ceteri colores sunt ascitij, ut uiridis ab ærugine, ruber ab anchusa uel cimabrio uulgarī, nigra à fuligine tede, charta usta, aut atramento, à quibus mistis uires mutat, Germani Wachz. Galli de la cire appellant. *Λαγός σάκτος*, id est, cera stacte, & stillaticia, initio lib. 2. comp. pharm. gen. legitur.

## Propolis.

## Caput LXXVI.



**P**ropolis eligi debet flaua, odorata, styracem referens, in uehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere calfacit & euocat. aculeos & omnia infixā corpori extrahit. in uetere tussi suffita proficit. impetigines admota tollit, ea in alueariorum foribus cerosæ naturæ inuenitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Propolis Germanis Voistoss, uel bett. Est enim quod apes ante alucum



faciunt, unde Varro tertio rei Rusticæ Propolim uocat quod apes faciunt ante foramen introitus porrectum in alueum maxime æstate, fauorum stabilimentum, quo omnes frigoris, aut iniuriæ aditus obstruntur, magna ad medicamina usus.

## Triticum.

Optima è tritici generibus ad secundæ ualitudinis usus habentur, quæ recentia & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt: dein sequuntur trimesia, quæ nonnullis sitania nominatur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt.

Triticum gallicum.

## Caput LXXVII.

Triticum.

Trimestre.

\* Quidā addunt: Calentesq; lepras illi aufert, incipientesq; inflammationes omnes itide illitum, in ruæ decocto, etiam.



canum moribus profunt, mansa & imposita, confectus eorum similitudine panis, plus alit quàm cibarius. è trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra demandetur, farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant, item contra interaneorum inflationes. lentiginos ex aceto mulso tollit, furfures autem in acri aceto decocti \*, turgentes mammillas sedant, uiperarum ictibus auxiliantur, & torminosi profunt. Farinaceum fermentum calfaciendi extrahendiq; uim habet, priuatim callos pedum, clauosq; extenuat, & cetera tubercula furunculosaq; ex sale concoquit, & aperit. Sitianiorum farina contra uenenatos ictus cum aceto aut uino commotissimè illinitur. eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excreationib. proderit, cõtra tussim & exasperatas arterias, cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus cum aqua mulsa inflammationes omnes illitu mulcet, cum emolliat, & quadam tenui refrigeret: sed herbis succisue huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus, adiectis cõuenientibus, citam aluum cohibet. recens, muria maceratus, illitu uetustas im-

petigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè τριψός. Latine triticum. Germanis Weissen. Gallice Ble. Fourment.

Triticum plures includit differentias, ut robum, siliginem, sitianum. Triticum uero dicitur, quod tritum ex specie sit, ut author est M. Varro.

Triticum quod cibariorum aut panificij gratia agricolæ serunt, huius plura sunt genera, quæ gentes fecerunt, à quibus nomen acceperunt, ut Italicum, Siculum, Aphricum, & alia, sed qui scrupulose obseruant, tria statunt genera, Primum Robus Latine, Græcè ὁ λεῖψος τριψός, ὁ ὀψός. Germanice



manicè der schönste vorkommenst weissen / dicunt, quia pondere & nitore præstat. Secundum ge-  
nus Latini trimestre. Græci στράων, ωρεὶ γελύω, uel γρημύω, quod post sationem tertio men-  
se maturefcit, & metitur. Dicitur & de hordeo, & de farre. inueniuntur autem bimestria, sed circa  
Thracium finem, quæ quadragesimo, quàm sata sunt die metuntur. Eorum autem postremorum agrico-  
lis usus gratissimus est. Nam ubi propter aquas aliânuccausam matura satio est omiſſa. præsidium ab  
hoc petatur. Hoc tritici genus Germani Zimmelforn. fortè ab amylo, quod inde fit præstantissimum.  
Galli Martium uocant, quod à Martio in quo satum est, tertio inde mense matureſcat. id quod tamen  
in nostro orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tadem, hoc est, Iulio mense metitur. Tertium  
tritici genus non undiquaq; notū, Germanis Welscher weissen, & weissen olb / dicitur, in Alsatia co-  
pioſe gignitur. Sunt qui hoc frumenti genus Columellæ & Plinij siliginè esse putât, diuersum tamè à La-  
comica siligine, quæ sine crista est, rectam habens speciem, nunquã matureſcens, iumentorū pabulū &c.

## Hordeum.

## Caput LXXVII.



**H**ordeum optimum est candidum purumq; id minus  
quàm triticum alit. Ptisana tamen ob cremorem in de-  
coctione redditum, plus alimenti præbet quàm polenta ex  
hordeo facta. contra acrimonias atque gutturis scabritias,  
exulcerationesq; pollet, quibus etiam triticea ptisana præ-  
sidio est, sed plus alit, magisq; urinam mouet. lac ab ubi sup-  
deditat, si cū fœniculi semine decocta sorbeatur. Hordeū  
abstergit, urinam ciet, inflationem parit, stomacho aduer-  
ſatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in  
mulsa aqua cum fico, ut inflammationes collectionesq; di-  
ſcutiat. duritias cum resina & fimo columbarū concoquit.  
cum meliloto autem & papaueris calyce dolores finit, qui  
latus excruciant, aduersus intestinorum inflationes cum li-  
ni semine, fœnogræco, & ruta illini iuuat. strumas cum pi-  
ce liquida, cera, oleo, & impubis pueri urina, ad concoctio-  
nem perducit. Et cū myrto aut uino, aut malicorio, aut syl-  
uestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit. podagri cis  
inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest. deco-  
cta in aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & cali-  
da imposita, lepris medetur. Cremor uerò farinæ ex aqua,  
atq; cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est. cū aceto  
subactus itidem & cum pice contra articulorum fluxio-  
nes prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammatio-  
nesq; mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεπιδν γρημύω.

Latine Hordeum Cereale.

Officinis antiquum nomen retinuit.

Germanicè Gersten.

Gallicè Orge dicitur.

Hordeum in duo genera distinguitur λεπιδν & γρημύω,  
quod & Cantherinum uidetur dictum, quia folliculo castra-  
tum enasceitur. Germani groſſ gerſe. Galli mundum uo-  
cant hordeum, non sponte granum gluma concidit. Alterū  
genus hordei λεπιδν αλίσυω, id est, hordeum distichū &  
Galatinum. Germanis fînster gerſt / & Flein gerſt. Gallis  
orge, dicitur, ponderis & candoris eximij, adeo, ut triti-  
co mixtum egregia cibaria familie præbeat. Est & hor-  
deum trimestre, λεπιδν γρημύω, summer gerſten / & seccurgeon, ou seccurgeon, quasi succursus gen-

tium, Gallis dicta.

Hordeum quod tundendo deglubitur, ac suo cortice castratur, mundatum hordeum officinæ, Ger-  
mani gerolte gerſten, uocant, mundituren im, nec hoc molitur.

Zy-



## Zythum.

## Caput LXXIX.



**E**X hordeo potus fit, cui Zytho nomē est: is urinam cit. uestientibus, officit. inflationē parit. uitiosum succū creat. elephantiasin gignit. perfusum Zytho ebur, obsequiosum & operi tractabile redditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ex hordeo & hodie passim potio conficitur, in quibus regionibus uini penuria est, quem Dionysium apud Aegyptios primū inuenisse ferūt. Quā de causa apud Poetas Pelusianus potus nuncupatur. Est autem uelut uinū quoddā, sed facticiū. Suidas zythum uinū rectē hordeaceū nominat, quōd fit ceruisia ex hordeo cocta, uicem uini natiui gerens. Sophocles autem et Aescibilus id genus uini ex hordeo factum nō zython, sed *Bevzoy* uocant. Quod rursus Hellanicus ex oryza fieri commemorat Hispani Ceriam, Germani *Byer*, Galli *Berium* uocant.

## Curmi.

## Caput LXXX.

**F**it & ex hordeo potus, quem curmi nominant, eoq; sēpē potu, pro uino utuntur: uerum dolorem capitis mouet, malum succum gignit, neruis nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent, in Iberia quā occidentem spectat, & Britannia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Zea simplex.

Hoc itē fortasse sit hordeacea ceruisia. Posidonius homo Stolicus non curmi sed corma maluit appellare, a curmite tradit. Dioscorides addidit Hispaniam quoq; occidentalem & Britanniam ex tritico similes potus excogitare Germani. *Weysenbier*, dictū bier appellatur. Nec alios ex fruge fieri, nisi supradictos inueniet, qui nationes has exacte consulerit.

## Dicocon.



## Zea, seu semen. Caput LXXXI.

**Z**ea duorum generum est. una simplex, altera in geminis putaminib. grana bina iuncta gerit, ob id dicocon appellatur. plus quā hordcum alit. ori grata. digeritur in panificia, minus quā triticum alens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcē *zea*. Latine *zea*.

Germanis *Tünckel*, quod Græcē *μυώνκοκκος*. quod *λίονκος* Græci Germ. *Spelz*. S. *peterstorn*. *Wlisen*. *Rintorn*. Galli *Espelira*, & de *b'espeautre* appellant. Apud Campanos priuatim semen uocatur, ubi bis anno feritur. Hanc Homerus nō parum illustrat, quando aruum (*εὐδωπον*) nominat, quod nōnulli quasi uitam donans, latinitate donarunt, sed idem a Plinio non probantur. Ceterum eadem sēpē simplex est propter unum granum, sēpē *λίονκος* propter duo grana, siue geminum granum duobus utrisulis coniunctum, ut hoc loco Dioscorides testatur, ex qua olim alica fiebat, sicut post ex hordeo.

## Crassior farina. Caput LXXXII.

**C**rimnon crassior est ex zeatriticoq; farina, ex qua pultem faciunt. Abundē alit. facillē conficitur, aluum uehementius astringit, si *zea*, ex qua fit, prius torreatur.

*Alia, egrē.*

NO-



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Crimnon hoc loco Dioscoridi pars est crassulem farinae, tritici atq; zea. Sunt qui suspicentur crimnon farinae cremorem esse, ut succus à cremore differat sola crassitudine. Cornelius Celsus cremorem ferè pro succo usurpauit. Crimnon hordei genus est Photioni. & cyceonis Homericum liquamētum. Hippocrates crimnon dicitur pro crassius, & ad similitudinem farinae tritici corpulentis accepit, ut Gado lenius testatur. Germani Crimnum uoce parum mutata Breiss siue Grieß appellant.

## Siligo.

## LXXXIII.

Eidem generi siligo ascribitur, sed minus aliquanto nutritur in panes, ut zea, cogitur. Fit quoque è filigine crassior farina, quam Græci crimnon uocitant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius li. 18. de siligine ait: Silignè dixrim ppriè tritici delicias, eādor est, & sine uirtute, & sine pondere. Et mox post ait: E siligine lautissimus panis, pistrinarumq; opera laudatissima. Præcellit in Italia, si Campana pisis nata misceatur. Ruffior illa: at Pisana candidior, ponderosior uerò Cretica. Panis siligneus quem siligniten Græci uocant, omni alio magis alit, ut author est Paulus Aegnetæ. E quibus omnibus facile apparet silignem hanc à ueteribus celebratam longe aliud esse à frumento quod nostra ætate silignè, Germanicè Roßen, uocamus, ex quo panis conficitur niger et plebeus. Et ab aliquibus Tipha, ab alijs olyra creditur. Cum tamen id genus fumentum sit, quod secale & sarrago Plinio dicitur lib. 18. cap. 16. Cuius pictura hæc est.

Roßen.



Samel Korn.



## Athera.

## Caput LXXXIII.

Athera ex zea fit tenuissimè mollita. est autem forbitio, quasi liquida pultricia, infantibus conueniens, & cataplasmatis efficax.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Atheram è zea fieri tenuiter emolita hoc loco Dioscorides asserit, et in forbitione decoctum pultricia dilutioris modo, infantiibus utile, unde Germanis Binder bapp dicitur. Actius ex Amylo constare prodit. Iulius Pollux Atheram uocat pultem è mile acca farina. Est autem puls quod Germanicè etn müssader bappen/ appellamus, cibus ex farre in puluerem & farinam redacto factus, de quo Plinius lib. 18. cap. 8.

## Tragos.

## Caput LXXXV.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit. multò minus quàm zea nutrit, quòd multum aceris habeat, quare ægrius conficitur, aluumq; magis emollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Tragus cerealis, ut ab herba distinguatur, frumenti genus, aspectu similis alicæ seu chondro: granum eius compluribus glutinis uestiri refert Galenus, & ob id minus zea nutrire, ægrè in nemriculo conuinci & aluum magis emollire.

Græcè τράγος.

Latine Tragus cerealis.

Germanicè Samel Korn.

Galicè du ble turguet dicitur.

## Auena.

## Caput LXXXVI.

Avena genicula quædam habet. folio & stipula triticum imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas ueluti locustas bipedes gerit, in quibus semen conti-




## DIOSCORIDIS

Bromes.

Aegilops.



Avena.



continetur, utile ad catarrhū  
plasmata, uti hordeū. pul-  
te huius aluus sistitur. pro-  
dest rufficientibus in forbi-  
tione succus.

NOMINA ET  
explicatio.

Avena, genus est cuius due refe-  
runtur species, quarum una folio  
et stipulatriticum imitatur, in ca-  
cuminibus semina habet ampla, al-  
ba et ualde pilosa, ex quibus bina  
crusta nigræ prodeunt: caui-  
detur esse, quam Theophrastus  
αἰγίλωτα appellauit. Germani  
Weiß haben / et Niederlendisch  
haben uocant. Altera est que ab  
hoc βῆμα, ab alijs αἰγίλωτα  
dicta. Germanis schwarz haben  
Elein haben, superiori non dissi-  
lis folio, stipula et semine, quod  
huc minus est neque ita pilosum et  
ber, apud nos iumentorum pabu-  
lo potius quam hominum cibo na-  
scitur. Cogitur tamen in panes,  
quando extrema urget fames. Vi-  
detur tamen Plinius Germanos non  
nihil notare barbarici propter  
pultem, quam nominamus auena-  
ceam, cuius et Dioscorides hoc  
loco meminit, Germani uocant etiam  
haben müß / et haben biei.

Oriza. Caput  
LXXXVII.

**O** Riza frugum gene-  
ris est, in palustribus  
riguisque nascens. Mediocriter alit, sed aluū supprimit

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀρυζα. Latine oriza.

Officinis et uulgo risum. Germanice Reis.

Gallis Ris appellatur.

Frumenti genus est notum, non pauci usus in cibo. Ex hoc ptissa  
na etiam conficitur. Vnde illud Horatii: Sume hoc ptissanarum ori-  
ze. Plin. li. 18. Italici, inquit, maxime oriza gaudent, ex qua ptis-  
sanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Oriza egre  
concoquitur, aluū supprimit, et modicas in nutrendo uires habet  
ut hoc loco Dioscorides testatur, et Paulus Aegineta tradit. Celsus inter res boni succi et que crassio-  
rem pituitam faciunt, enumerat, et his que imbecillis materia sunt annumerari posse dicit. Est et al-  
terum genus orize quod oriza minor, Germanice Rinkelbrot, et Schwaden dicitur.



## Halica.

## Caput LXXXVIII.

**H** alica fit ex zea, quam dico con appellauimus. plus alit quam oryza. al-  
uū magis cohibet, stomacho longè utilior, decocta in aceto illitaque lepras  
tollit



collit. unguium scabritias extricat. incipientibus ægilopijs medetur. decoctum dysentericis, quos ex cruciat dolor, infusum, idoneum est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alica siue Halica nunc frugis genus est, nunc ex fruge facta farina, et inde pulicula uel sorbitio. Pro Puge accipitur à Plinio, lib. 18. cap. 7. ubi de frumentis per tempora satis agens, inquit: Aliqui uerna, milium, panicum, lentem, cicer, alicam appellant. Et non longè post ait: Tunc ex frumento plures, horum decem maximè nudum et alica. Celsus item lib. 2. cap. 17. Cumq; panificia, inquit, omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, oryza, ptisanæ, uel ex eisdem facta sorbitio, uel pulicula, & aqua quoq; madens panis, imbecillissimis annumerari potest item cap. 19. Boni succi sunt triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Et iterum cap. 25. Pulicula uel ex alica, uel ex panico, uel ex milio, itemq; ex iisdem sorbitio. Est autem farriis adorei genus, quod Halicæstrum etiam, ut putamus, uocatur Columella lib. 2. cap. 6. ubi de farriis generibus agens, sic scriptum reliquit: Adorei autem plerumq; uidimus in usu genera quatuor. Far, qd' appellatur Clusinum, cædoris nitidi. Far, quod uocatur uernunculum rutilum, atq; alterum candidum, sed utrumq; maioris pòderis quàm clusinum. Semen trimestre, quod dicitur halicæstrum, idq; pondere, & bonitate est præcipuum. Et hoc alicam esse uolunt, Græcorum chondro haud ab similem, teste Paulo Aegineta, qui lib. 1. capite de frumentaceis ait: Alica in reliquis quidem chondro haud ab similis est, sed aluum magis supprimit. Demum halica pro pulce etiam accipitur à Plinio & alijs, quæ in sanitatis usu & medicinali locum habuit, sed diuersis locis diuersimode præparata, ceu ex Plinio lib. 18. cap. 11. patet, ubi uaria eius genera & cõficiendi modos ponit, & ex ea quæ semè dicitur, fieri tradit, quæ admodum & hoc loco Dioscor. Fiebat etiã ex hordeo, cuius cõficiendâ ratio docetur ab Apicio, quæ tamen faciliore est, & paratior, quàm in lunio mense docet Palladius, his uerbis: Hordeum seminaturum, cui adhuc superest aliqd de uirgore, per manipulos ligabis, et torrebis in furno, ut facile nota possit infringi, & in modio uno salis aliquantum dum molitur, miscere curabis, ac seruas.

Milium.

Caput LXXXIX.



**M**ilium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit. fistit pulce sua aluum.

M



Vrinā cit. Torretur milium, feruensq; in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λείψον. Recenioribus Græcis μίση. Straboni λείψον. Hippocrati πασιπλά.

Latinis Milium, à milliaria summa.

Germanis Byrsen.

Gillis du millet appellatur.

Ex milio quoq; panem fieri Columella testatur, qui priusquam refrigescat, sine tedio potest absumi, quo non parum e oblectane Campani. Plinius rursus Sarmatarum geneses tradidit maxime pulte mellea ali, quæ & Germanis hodie usitatissima est, adeoq; penè in pauperū culina quotidiana, quæ admodum Rugis, quos sub Pomeranorum uocabulo complectimur (Germanicè die Rugianer) puls auenæ-

cea, illius autem purgamentum sicut & panici & sesami applauda dicitur non aliter in frumento palea, apud Plinium lib. 18. cap. 10.

Milium Indicum in Italiam Nero-  
nis principatu conuectum, nigrum colo-  
re, amplum grano, arundinum culmo.  
Adolescit ad pedes altitudine septem,  
prægrandibus culmis, lobas uocant, om-  
nium frugum fertilissimum, ex uno gra-  
no terni sextarii gignuntur. Hodie apud  
nos passim in hortis ostentationis grati-  
ferum, grano pisum æquante, atro, sti-  
pula arundinea, quoniam apud nos: senuna-  
tur pedum proceritate, & frumentum  
Sarracenicum, Germanicè Türetsch  
Forn oder Indisch Forn appellat. Græ-  
cè uerò λείψον & ενδιχός, cuius pictu-  
ra hæc est.

Quatuor huius Milij Indici generâ  
reperiuntur. Quoddam enim grana rus-  
sa, quoddam uero purpurea, aliquod  
subcandida grana profert. Spicarum si-  
ue panicularum etiam in ijs est diuersi-  
tas: etsi enim omnes muticæ sint, tamen  
alia cædidos, alia luteos, alia purpureos,  
prout scilicet grana colorata erunt, flo-  
res obtinet. Alias quod ad formam attie-  
net, in ijs nulla est differentia.

Panicum: Cas-  
put XC.

**P**anicum frumētaceis semi-  
nibus annumeratur, milio  
simile. eodemq; modo in panes  
subigitur. eisdem habet usus.  
minus tamen & nutrit & strin-  
git.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄλυνος. Latine panicum, à paniculis, in quibus semen est.

Germanicè pfentch & süchschwanz.

callic





Panicum.

Sesamum.



Gallicè panix, dicitur. Panicum milij similitudine prosilit, denis ut plurimum folijs luxuriat, culmo penè in surculū extenuato, nutante, rubido panicularū fistigo, prædèssis acervato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, aliàs nigris, itè candidis.

Sesama. Ca.

XCI.

Sesama stomacho inutilis cibus. halitus gravitate facit, quoties inter mādendū cōmissuris dētium inhæsit, nervorum crassitiem illitu discutit, medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus, capitis dolores, qui estuatione cōcitantur, ex rosaceo lenit. eadem efficit herba decocta in uino, præsertim inflammationibus oculorum doloribusq; prodest. ex ea fit oleum, quo Aegyptij utuntur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σφοδαυ. Latine sesamum.

Officina sesamum uocant. Germani Leindotter.

Gallicè du sesama, de la iugoline.

Sesamum nunc penè intercidit, quod multis in locis ignoratur, quod tamen Columella & Plinius, ex medicis Galenus, & ante hunc Dioscorides capite præfenti collaudant. Veteribus sanè omnibus, ut pleraq; alia notissimum erat, ut ipse Dioscorides, qui in herbarum pictura diligentissimus est, ista ipsa γωδιννα, id est, nota indicat. Ideo talium historiam præter morem plerunq; neglexit, ex qua colligimus, quodnam certum esset sesaminum genus. Sunt enim pauca seminum cerealiū nota, aut sepe nulla, quibus dinosci possint, adeo ut frugem ipsam non certo uocabulo nominare liceat, ex qua panis quotidianus conficitur, ita uidemus in plerisq; sola nomina nobis restare: ut suprâ quoq; ostendimus.

Lolium.

Caput XCII.

**L**olium quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, putrescentia ulcerat, gangrænasq; emarginat. sanat cū raphanis, sale & aceto feros lichenas: & ex aceto & sulphure uiuo, lepras. strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in uino, rumpit quæ ægrius ad coctinè perducuntur.

M 2



## DIOSCORIDIS.

Lolium.



decoctum ex aqua multa utilissimè ischiadicis illinitur. si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis αἰζα.

Latinis lolium.

Germanis Rhi weissen Aulch.

Gallis luraya, yuroie, teuille, gasse, dicitur.

Lolium fit ex corruptis seminibus tritici & hordei, inebriat & uertigines facit. unde prouerbiū: Lolio uictitat, quod Plinius inter frugū morbos potius quam terre pestes numerat. à nonnullis xizanon appellatur. Euchsus errore manifeste depingit aliam herbam, quam Germani Raten uocant, pro lolio.

## Amylum. Caput XCIII.

**A**mylum ex eo appellatum est, quod sine mola fiat. Optimū ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptium. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre tritici madescit quinque die, & si fieri potest, nocte: cum emollitum fuerit, effunditur sensim, sine agitatiōe, aqua, quò minus cremor utilis unā excludatur ubi mollissimum esse uidetur, mutata aqua pedibus calcarari oportet: rursus infusa, tertium demum enatantes ibi furfures incerniculo eximendi, reliquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis confestim torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper uidum maneat, a corem concipit. Contra fluxiones oculorum, pustulas, cauaq; ulcera efficax est sanguinis reiectiōnes potu cohibet. Exasperatas fauces lenit. lacti atq; obsonijs admiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farinæ modo manibus subigitur, pressaq; feruentissimo in sole, ut ante retulimus, exiccatur, nullius in medicina usus, ad alia tamen conueniens.

Fœnum græcum.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Amylum factitium est & frumenti medulla, arte præparata, appellatum ab eo quòd sine mola fiat, siq; ex omni tritico & siligne, optimum autem ex trimestri, ut Dioscorides tradit. Inuenio eius Chio insula debetur, ut lib. 16. Plinius tradit, unde & laudatissimum. Post quod maxime laudatur Creticum, mox Aegyptiacum probatur leuitate, leuore, candore. utq; ut recens sit. E siligine quomodo fieret, docet Cato libri sui cap. 87. Conscitur item ex zea, ut hoc loco Dioscorides testatur. Est item frugis generis aliquando significans amyllum, ex quo fit illud factitium. In qua significatiōe Celus accipit lib. 2 ubi id cum alijs quibusdam inter ea quæ boni succi sunt, & stomacho aptissima, connumerat. Germanice Amidum, amlung, & Braßtmell. Gallis quoq; amy dum dicitur.

## Fœnum græcum. Caput XCIII.

**F**œnigræci farina uim habet emolliendi discutiendiq; in aqua multa decocta aduersus tam internas quàm externas inflammationes efficaciter illinitur. lienem cum aceto & nitro trita extenuat. succus decocti eius fumarum



minarum malis subuenit: & siue tumor, siue præclusio sit uulua, fouentur, & insident. Fenigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis ulcera purgat, locos dilatat & emollit, si cum anserino adipe pessui ce subiiciatur. uiride cum a ceto utilissimum imbecillibus locis, & ulcera sentientibus, decoctum eius prodest aduersus tenesmos fœtidamq; dysentericorum proluuiem. Oleum quod eo exprimitur & myrto, capillos & genitalium cicatrices abstergit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis τήλιν, λεγέταις, αζύονες, βόκας.

Fœnumgræcum Latinis & Officinis.

Germanis Fenigree, & Boeshorn.

Gallis fenigree, & senegreue, dicitur.

Fœnum Græcum inter fruges est. Plinius & Varro Silicam, & Siliculam dici testantur: Columella siliquam simpliciter uocat. Vis eius siccare, mollire, dissolvere, testame Plinio lib. 24. ad finem. Nec dubitatur, quin decoctum eius utilissimum sit uuluis, interaneisq; exulceratis: sicuti semen articulis atque præcordijs, sumitur & sorbitio est farina ad pectus exulceratum, longamq; tussim. Diu decoquitur, donec amaritudo desinat: postea mel additur. Siccum primo gradu, calidum secundo, lib. 8. simpl. calidum autem mediocriter, ob id digerere dicitur lib. 1. comp. pharm. part. Nam is gradus est medius inter summum & omnino temperatum, quod nec calidum absolute, nec frigidum iure dixeris, phlegmonas arduentes irritat & exacerbat, minus calidas & duras digerendos sanat. Paulus Aegnetæ lib. 1. calfacienti, uentremq; subducendi uim illi tribuit, si ante alios cibos sumptum fuerit.

## Linum.

## Caput XCV.



Linum uulgo notum est. cuius semen eandem quas fœnumgræcum uires habet. discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. uitia cutis in facie uarosq; crudum tollit. illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasq; discutit. ulcera quæ serpunt, fauosq; cum uino decoctum expurgat. ungues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis. uitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis uicem substituitur. tussim lenit, uenerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum uuluaq; erosionibus immittitur. alui excrementa euocat. ad uulua inflammationes in defensionibus perquam utile.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Linum λινόν.

Latinis & Officinis linum.

Germanis Lein, & Flachs.

Gallis du lin appellatur.

λινόν τε γάρ, id est, lini semen, Germanicè Leinsamen, humido et sicca quodammodo temperatum, calidum autem quodammodo ordine primo: flatuosum est etiam si frigatur, adeo plenum est humiditate recrementis. Quia igitur calidum, humidum, flatuosum, semen homini generat. Lini semen torrefactum tergeti, ut prisana & farina fabarum, lib. 7. comp. pharm.

Lini semen tepide calidum, ut chamæmelum. Lini semen in aqua coctum refrigerantem succum gignit. Lino spermon & succus rosarum frigidioris media temperie sunt natura, sed non ita multo, quam potius caloris sunt tepidi. Lini semen refrigerat, siccatur. Lino spermon tanquam frigidissimum uisandum asthmaticis censet Galenus, ut meconium. Mandragorâ, hyoscyamû, cicutâ, psylliû. Lino spermon urinas exigue mouet: frigidum autem ureticum magis sit, & aluum magis sistit esu.



## Cicer.

## Caput XCVI.

Album.

Rubrum.



Faba.



Hoc quidā  
sarcinē.

Cicer satium aluo idō-  
neū est. urinā ciet. infla-  
tionē parit. colorem cōmen-  
dat. mēses ac partus expellit.  
lac auget. cū eruo decoctum  
illinitur ad inflammatiōes tes-  
tium, uerrucosas informica-  
tiones, ad scabiem, ulcera ca-  
pitis manātia, impetiginesq;  
contra carcinomata, & ulce-  
ra quæ cacoēthe uocantur, cū  
melle & hordeo prodest. Al-  
terum genus arietinum nomi-  
natur. utrunq; citurinas, dato  
cum rore marino, hydropicis  
aut regio morbo laborātib;  
eorum decocto. Lādunt ea ex  
ulceratam uescicā & renes. in  
uerrucarum formicantiū pen-  
siliūq; genere, prima luna  
singulis granis singulas tan-  
gunt, eaq; grana linteolo deli-  
gata abijci post se præcipiūt,  
ita decidere eas arbitrantur.  
Syluestre cicer folijs fatiuo si-  
mile est. odore acris, sed semine  
discrepat. idem quod fatiu-  
um præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cicer legumen est, cuius differētia plures, magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim arietino capiti simile, unde ita appellatur. Græcis λπίος, Germanis Kicher, Kichererbs, ziser erbs. Gallis Ciche, uel pois ciet. dictum, album nigrumq; est. Et columbinum, quod alij Venerum, Columella Punicum uocat, candidum, rotundum, lene, arietino minus, quo reliquo perungijs adhibet. Est et cicercula Græcis δάκτυλος, ut Theodorus ē Thēo-  
phraſto reddidit. Columella tamen eandem ciceram & cicerculam uocat, Gallis cerre, uel pisa cerra. Quāquā & ἀραβίς sic uocant, Martinus Gregorius interpretatur Jesse: inæquales angulos habens, ueluti pisū. Dulcissimū autem id quod eruo simillimū, firmitusq; quod nigrū & rufum quāquam quod album: author lib. 18. Plinius. Paulus Aegineta lib. 1. de his sic tradit: Cice-  
ra instant, abstergunt, genitale semen augent, Venerē simulant, calculum te-  
runt. At fricta statim quidem emittūt, sed difficulter concoquuntur.

Faba.

Caput XCVII.

Faba inflationē excitat. agrē concoquitur. tumultuosa  
somnia facit, tussi confert, carnē gignit\*, media calidi  
frigidiq; natura. decocta in posca, & cū suo cortice esitata,  
dysenterias & cœliacorū profluuiā sistit. contra uomitio-  
nes cōuenienter mādatur. inflatio leuior cōtrahitur, si aqua  
prior inter coquendū abijciatur. uiridis plus nego cū stoma-  
cho exhibet, maiorēq; flatū parit. Lomentū eius & per se,  
& cū polenta illitū, inflāmationes quas uulnus excitauit, mitigat. cicatrices cō-  
colores facit. turgentes grumoso lacte mamas, etiā si inflāmatione tentētur, adiu-  
uat. lac restinguit, furūculos, sugillata, parotidasq; cū sœnigra ci farina et melle  
discutit



discutit. cū rosa autē, thure et oui candido, procidentes oculos, tumores, uuasq; re-  
primit. subaetū uino, suffusiones et ictus oculorum recreat. Manducata sine cor-  
tice faba, ad auertendas fluxiones frōti illinitur. decocta in uino testis collectio-  
nes sanat. quō tardius pubes erumpat, pueris imo uentri illinitur. uutiligine pur-  
gat. Fabarum cortice illiti capilli q post euulsionem renascuntur, gracilesunt,  
et minus alimenti capeffunt. cum polenta, scisso alumine, et uetere oleo impositi  
cortices, strumas discutiunt. decocto earum lanx inficiuntur. Faba dempto corti-  
ce in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis  
de fluxionibus ab hirudine concitatis: nanque eas suppressit, si semisecta ap-  
primatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *κνίφος*. Latinis *Officinis faba*.

Germanis *Bon*. Gallicè *sebue* dicitur.

Faba nostris nō ita dānatur quemadmodū olim à Pythagorā maximè cū fresca fuerit, hoc est, quā  
uola leuiter cōfracta et decorata fuerit. Altera enim solida dicitur, quæ adhuc integra et cū cute  
est. Fabalia uerō sunt cortices et siliquæ, de quibus Columella inquit, se audisse ueteres rusticos malle  
matura fabalia, quā fructū trimestem, cuius ratio ex Plin. colligitur. Nā siliquæ caulesq; gratissimo  
sunt pabulo pecori. Folliculi uerō eius apud Festum ualuuli dicuntur, sed quod in summo fabæ nigri-  
cat, hylum est.

## Faba Aegyptia.

## Cap. XCVIII.

**A**egyptia faba, quam aliqui Ponticā uocant, in Aegypto plerumq; proue-  
nit. in Asia etiam Ciliciæq; lacubus inuenitur. Folia habet ampla, etiam si  
ad arborum frondes cōparentur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: florem *\* Alij, galrē*  
roseum, dupla papaueris amplitudine. & ubi flore exuitur, fert folliculos uespa- *modo.*  
rum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullantis ampullæ modo, pro-  
minet. Ciborion ideo nominant, id est arculam, quoniam feratur ipsa, humenti  
glebæ mandata, & ita in aquā demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ  
cruda cocta uē estur. ei colocasia nomen est. Faba uirens mandatur, & exiccata ni-  
grescit. uulgarem magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & sto-  
macho utilem. dysentericis, cœliacisq; prodest, in sparso, polente uice, lomento.  
datur quoq; in pulte. Cortices in uino mulso decocti, si terni inde cyathi biban-  
tur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio uiride spe-  
ctatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum infillitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius totā plantā Aegyptiæ Fabæ colocasia nomine intelligit: quā li. 21. sic depingit. In Aegypto  
uobilissima est colocasia, quā cyamon uocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule cū coctus est harenoso  
in mandendo. Thyrsos autem qui inter folia emicat, speculabilis, folijs latissimis, etiā si arborescōparens  
est, ad similitudinem eorū quā personatā in nostris amnis uocamus: adeoq; nihil suis dotibus gau-  
det, ut implexis colocasiæ folijs in uariā speciem uasorū potare gratissimū habeant, unde illud Horatij.

Ciboria exple. Et Strabo geographiæ lib. 17. ait: in Aegypti lacubus ac paludibus bibulus nasci-  
tur, & Aegyptia faba, ex qua Ciborium fit ( & paucis interpositis ipsam describemibus uerbis ait, )  
oblectaneum autem mirum in modum scaphis Thalassicis densissima faba subeuntes, & eorum folijs  
innumbrati, quæ adeo magna sunt, ut poculorum & catinorum usum præbeant. Habent enim concui-  
tatem quandam ad id idoneam: unde Alexandrinæ officinæ ijs plene sunt, & ut uasis utuntur.

Faba & semen ipsum quod amarum est, uiride ægrè concoquitur, exigui nutrimenti est, & inflat.  
Exiccata tamen minorem inflandi uim habet, auctore Theophrasto & Athenæo.

## Lens.

## Cap. XCIX.

**L**ens frequenti cibo aciem oculorū obtundit. ægrè concoquitur, stomachum *\* Alij emollit.*  
malè habet, etq; & in testina inflat, sed aluum cū cortice cocta sistit. Præstat  
in cibo quæ facillimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. uim habet ad-  
stringendi, quæ ex causa aluum cohibet. si detracto antea cortice discoqua-  
tur accuratè, primaque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id  
decoctum uentrem resoluit) somnia tumultuosa excitat. capiti, neruis, ac pulmo-  
ni inutilis. melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum a ceto



## Lens.



intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut bacca myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbifus, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionem abijciuntur, uel uuarum rhois quæ obsonijs insparguntur. uerum acetum cum eo diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lentis deliberata deuorari proderit, decocta cum polenta, & illita, podagras lenit, sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat, decocta in aceto duritias & strumas discutit, cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo; sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici, ac ficcis rosis, adiecto melle, decoquitur. nomis quæ in gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua, pustulis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq; ut antea dictum est, contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lenticula quæ et lens, Germanis Linsen. Gallis Létile, Græcis uerò quia edendo est panis idio, ueros dicitur, leguminis genus est, cuius duo genera in Aegypto dicit esse lib. 18. cap. 12. Plinius. Alterum rotundius, nigriusq; Alterum sua figura. Vnde uario usu translatus est.

in lenticulas nomen. Inuenio apud athores æquanimiorem fieri uescitibus ea. Laudatur maxime quæ apud Pelusium nascitur oppidum. Vnde illud Vergilij: Nec Pelusiaca curam aspernabare lentis. Et Ausonius in monosyllabis ait: Et Pelusiaco de semine planta, teres lens. Martialis item: Accipe Niliacæ Pelusia munera lentæ. Vtilior est alica, carior illa faba. Optima ut Plin. lib. 22. ea ultimo tradit, quæ facillime coquitur, eaq; quæ maxime aqua absorbet. Aciem oculorum et stomachum inflat, sed aluum sistit in cibo, magisq; discocta aqua calet. Eadē soluit minus percocta. Propter dissolutionem stomachi. 30. grana lentis deuoratur. Celsus ipsam inter ea quæ aluum adstringunt enumerat his uerbis. Lenticula cui uel Beta uel Intubus, uel ambubeia, uel Plātago adiecta est, magisq; etiā si illa ante fricta est.

## Phasioli.

## Cap. C.



Phasioli inflat, spiritus cient, ægrè coquitur, uirides cibo aluum emolliunt, ad uomitiones idonei.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Phaselus differt à phaseolo, & phasiolo, ac ochro, quem Gazanunc cicera, nunc eruliā trāstulit, super quo multū hodie inter clarissimos Medicos cōtrouertitur. Annuerantur aut nō tā leguminibus, quā iumentorū pabulo. Ea igitur uisa est mihi ratio, cur uilem Verg. nuncuparit. Editur tamen in quibusdam regionibus in modum phacoptisane, id est, Ereforum cremore, cuius & Plinius meminit.

## Eruum.

## Cap. CI.

Eruum paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in ualculis habens, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi usus cōueniens, eruā capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguinem per urinā extrahit, elixo boues saginatur. Parandæ farine ratio hæc est: uberiora grana candidaq; deliguntur, permiscen



LIBER SECVNDVS:

Eruum sativum.



permiscendoq; aqua resperguntur, do-  
nec sufficienter combibant: postea tor-  
rentur, usque dum hiās cortex disrum-  
patur: molitaq; farinario cribro in-  
cernuntur: postremo farina recondi-  
tur. Hęc aluo utilis est. urinam ciet me-  
liorem colorem efficit. sanguinem per-  
uesicā aut aluum cum torminibus eli-  
cit, si largius in cibo aut potu assuma-  
tur. ulcera cum melle purgat. lentigi-  
nes & uitia cutis in facie, & maculas,  
totumq; corpus emendat. nomas, gan-  
grānas, duritiasq; serpere non pati-  
tur. mammarū duritias emollit. atra  
ulcera quæ theriomata uocāt, fauosq;  
emarginat. carbunculos rumpit. cum  
uino subacta illitu moribus uipera-  
rum, canū, hominumq; medetur. uring  
difficultates, tenesmosq; ex aceto mi-  
tigat. Eruum tabidis, qui alimentum  
nō sentiunt, tostum, & ad nucis magni-  
tudinē melle exceptum, sumptumq;  
conuenit. Eius cremor perniciōes, &  
pruritus in toto corpore, sanat fo-  
uendo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὄροβος. Latinis & officinis Eruum, ab eruendo dicitur.  
Germanis peregrinum. In Gallia Narbonensī, ers.

Eruū calidū primo ordine, succum secundo, amarum proinde, inci-  
dit, terget, obstructions liberat, largo usu sanguinem per urinas euo-  
cat, præsertim rufum. Nam Eruum non candidum sed rufum uehemen-  
ter amarum est, candidum dulcius. l. b. acid. Sal. li. 8. simpl.

Lupini.



Lupini.

Cap. CII.

Satius lupinus notus est. Cuius farina cum melle  
delinctu, aut potu, uentris animalia expellit. ipsi  
quoque macerati, & cum sua amaritudine elitati,  
eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus præ-  
stat, cum ruta & pipere potum. quare lienosis prodest.  
eodem ulcera tetra, quæ theriomata uocant, gangræ-  
nas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, ulce-  
ra in capite manantia, uirilignes, maculasq; fouere uti-  
lissimum, menses & partus extrahit, cum myrrha & mel-  
le subditum in uellere. Eorum farina cutem liuoresque  
corrigit. inflammationes cum polenta & aqua mitigat.  
tubercula, & coxendicum cruciatus ex aceto lenit. stru-  
mas in aceto cocta illitaque dissipat. carbunculos rum-  
pit. Decocti cœlesti aqua, donec in cremorem lentef-  
cant, faciem abstergunt. medentur pecorum scabiei, cū  
radice nigri chamaeleontis, ita ut tepente decocto ablu-  
antur. Cit urinā radix cum aqua cocta. Lupini triti, ubi  
maceratu dulcescere cœperint, cum aceto poti, fastidiū  
detrahunt, & cibi aueritatem faciunt. Gignuntur & syl-  
uestres lupini, satius similes, sed omnino minores, qui  
eadem quæ satiui possunt.

NOMI-



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ὁ λυγρός.

Latinus Lupini, quod instar lupi terra sit appetens, id quod et nomenclatura Germanorum alluatis.

Officinæ genuinum nomen retinere. Germanis Seigbonen / Wolffschoten / Wict bonen.  
Gallis Lupini dicuntur.

Lupinus est satius, idemque uel dulcis, uel amarus: agrestis uero minor sed amarior, et ad omnia ualentior domestico, terget, tenuat, incidit, digerit, siccat sine morfu: uiliginis, psoras, achoras, ulcera cacoethe sanat, lumbricos necat sumptus et admotus, iecur et lienem purgat, phymata, cheradas, liuida ex aceto uel posca, uel oxymelite pro ægri natura et affectus uarietate coctus digerit.

## Rapum.



Rapum sylvestre.



\*Potius, Napus  
pus et eius ra-  
dix cocta.

## Cap. CIII.

**D**ecocta rapi radix alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, uenerem stimulat. decocto podagra, pernionesque fouentur: contritoque rapo atque imposito iuuantur si excauata radici rosa ceum ceratum adigatur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cymæ eius decocta manduntur, & urinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna uocant, idoneum est. potum contra uenena salutare est. Venerem concitat rapum. muria conditum, minus alimenti sufficit, sed multo magis appetentiam recreat. Sylvestre rapum in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinem assurgens, ramosum, læue, in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora: & fructum in siliquis calyculatis. cumque coru inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quædam capitis speciem præbet, in aqua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totoque corpore utimur, præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ῥαπὺν. Latinis et officinis rapum, uel rapa.

Germanis Rüben. Gallis ung nauea.

Rape nota sunt et in cottidiano cibi usu. Quondam ut alia salgama etiam condiebantur: quarum condicendarum modum unum tradit in Deo cembri men'e Palladius. Alium etiam modum habes apud Columellam lib. 12. cap. 54. Apud nos nunc integra, resecta herba in fossis subterraneis, substratis nucum aut aliarum arborum folijs, et coopertis adseruantur: aut integra et deterfa, leuiterque cocta cum alijs oleribus et pomis ac pyris in muria infusa, in uasis seruantur, pondere imposito ut ius superna tet. Interdum etiam leuiter cocta et munitissime concisa saleque plurimo aspersa, in doliolis seruantur.

Rapum Sylvestre quod Græcis ῥαπὺν ἁγρία, Germanicè Rapumzlen. Gallis Raponen appellatur. Describitur enim cubitali altitudine consurgere, fruticosum, in cacuminibus læue, folio glabro, longitudine digitali, aut interdum maiore. fructum fert in siliquis calyculatis, dumque seminum in uolucra dehiscunt, alia intus capitulata contineatur siliqua, in qua paruula semina concipiuntur, foris nigra, sed quæ fracta candicent.

## Napus.

## Cap. CIIII.

**C**octa napi radix inflat, modicum alit. semen eius potum uenenorum uires hebetat: antidotis admisceatur. Conditur sale radix.

NOMI-



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Βουβιάς. Latinis & officinis Napus.

Germanis Stœck rûben/satiuus tructen stœck rûben/sylvestris nafs stœck rûben.

Galus Rouonnete, naueau, Raue ronde de sauoye, ou de Limosin.

Easdem quas rapa uires obtinent, nam congêneres sunt rapis, à quibus longitudine in primis differunt. Plura eorum genera. Palma Romæ, ut libro. 19. scribit Plinius, Amiternis datur, deinde Nursini, tertia nostratibus. Hinc illud Martialis de nâpis. Hos Amiternus ager felicibus educat hortis, Nursina poteris partius esse pilas. Condiuntur etiam raparum modo, conditurseq; rationem docet Col. libro 12.

Napus bumus.

Napus bumus sylvestris.

Raue de sauoye.



Raue de Limosin.



Radix.

Cap. CV.

**R**adix, quæ græcis raphanus dicitur, ex calfacit. flarus gignit. ori suavis est, sed stomacho aduersatur. ructus ciet. urinam pellit. aluo aptior. summo ramen cibo sumi debet, quò magis eius distributionem adiuuet. cum autem præsumitur, cibum suspendit. quare uomitur commodissimè datur ante cibum. seu suum aciem excitat. decocta contra ueterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. cortex ex aceto nullo, celerius uomitiones mouet. hydropicis commodissimè illinitur. lienosis utilis. sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur. contra uiperarum ictus auxiliatur. alopecias ad pilum reducit. lentigines cum loliacea farina emendat. his qui fungis strangulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen uomitiones facit. urinam mouet, menses cit, lienem extenuat. cum aceto illitum gangrænas ualidissimè emarginat, coctum cum aceto nullo, anginis perquam utiliter gargarizatur. contra cerastis morsus, potum ex uino, auxilio est. Sylvestris raphani, quæ Romani amoraciâ uocât, folia sat uo similia, sed magis lampsanâ imitatur. radix gracilis, tenera, subacris. Tâ foliâ quàm radix in olera recipitur. sed hæc ex calfacit, urinam concitat, æstuosa est.

NOMIN



DIOSCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.  
Raphanus. Raphanus sylvestris.

Sifer.



Græci  $\rho\alpha\pi\epsilon\upsilon\epsilon$ ,  $\eta$ . Latini & officinis Radix, Raphanus.

Germanis Rätzch. Gallis Refret. quasi radix fortis dicitur.

Raphanus apud antiquiores Græcos pro Crambe, id est, brassica accipitur, quod postea rices ue  
drum Græcos cū Latinos radicem significat, quæ comeditur, & quam radiculam uocat Celsus. Cui  
amaritudo est plima, ut inquit lib. 19. Plinius, & uis mira obligandi sp̄ritum, laxandi q̄ruclum, ob  
id cibis illiberalis utiq; si proxime olus mandatur. Aegypto mire cel. bratur propter olei fertilita  
tem. quod de semine eius faciunt. Frigore adeo gaudet, ut in Germania, præcipue in agro Arg. minens  
infantium puerorum magnitudinem æquet. Utillissimi in cibis hiberno tempore existimantur: ijdemq;  
deneribus semper inimici, quoniam atterant. Mirumq; omnibus uehementiam saporis inesse. Caesar de  
agricultura lib. 12. cap. 22 ex Florentino: Succus ipsorum ex aqua acceptus boletis & uenenis resistit.  
Si uero raphani succo quis manus suas probe illinat ac confricat, intrepide & citra periculum repti  
lia ac serpentes apprehendet. Dulceserunt, quorum semen in uino, aut utiarum passarum succo sua  
rit maceratum.

Raphanus sylvestris cuius pictura hæc est Græcis  $\chi\rho\pi\alpha$ ,  $\eta$   $\chi\rho\pi\alpha$   $\tau\rho\alpha\gamma\epsilon$   $\delta\rho\omega\pi\alpha\varsigma$  Latinis Amo  
racia. Germanis Hederich dicitur. Fuchsius Raphanum sylvestrem falso pro Irione pingit.

Sifer.

Cap. CVI.

Sifer uulgo cognitum. Cuius radix decocta origrata est, & stomacho utilis.  
Urinam ciēt, & appetentiam inuitat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci  $\delta\rho\omega\pi\alpha$ . Latine Silaron & sifer. Germanis Geylin & geygelin. Gallicè Chervy.  
Plinius lib. 19 mox post pastinacæ genera sic scribit. Sifer & ipsum Tiberius princeps nobilita  
uit. Flagitans omnibus annis in Germania, Gulduba appellatur Castellum Rheno impositum, ubi gene  
rojit.



rositas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruus qui in decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magna parte relicta, quæ mulsio in cibis temperata etiam in gratiam accritur. Et lib. 20. idem ait, Stomachum excitat, fastidium abstergit sifer.

## Lapathum siue rumex.

## Caput CVII.

Lapathum acutum.

Oxalis.



EX generibus rumicis, oxylapathum uocant, quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi palustribus nascens. alius est satius, illi dissimilis. tertium genus sylvestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum, quartum est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon uocant. folia eius sylvestri ac exiguo rumici similia, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. crudi illi melicerides, rosaceo aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius quam oxalida nominat, semen ex aqua aut uino utiliter bibitur contra dysenterias, & cæliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant. sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est, pruritus corporis decoctum earum sedat, si foueatur, aut in folijs balnearum confricetur. coctæ in uino & instillatæ, aurium dentiumque dolor emulcent. strumis parotidasque discutunt. lienem cum aceto extenuant aliqui amolendis strumas radicum gestamine utuntur, eas collo appendentes, tritæ & admotæ fceminarum profluuia sistunt. cum uino autem potæ, re gio morbo medentur. calculos uesicæ comminuunt. menses cient. scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. eadem habet uires quas supradicta rumicis genera.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lapathi siue lapatii, utrunque enim dicitur, plura sunt genera: Vnum quod oxylapathon quasi acutum lapathum uocatur. Germanis Lende wurz / mengel oder menbel wurz. Gallis Herba aux: trigneulx. appellata, palustribus locis nascens, folijs duris & in cacumine acutis.

Secundum genus est hortense, Ἀκτωῶδον ῥίζιον Græcis. Jam lende fraut Germanis, de la lampe apud Allobroges dictum priori omnino dissimile, folia habens lata, similia betæ.

Tertium genus est agreste Græcis Ἀκτῶδον ἄγριον. Germanis Beroyt saur ampfer / breus. plantagini simile, molle & in terra iacens.



DIOSCORIDIS

Rhabarbara monachorum.

Bunium.



Quartum postremo est quod quidam ab aciditate saporis oxalida appellant, alij anaxyrida, aut egreste lapathum. Græcis ὀξυρίς. Officinis acetosella. Cretes oxymidam vulgo dicunt. Germani Spiess amphex dicunt, cuius folia tertio generi similia sunt, et eius caulis non adeo grandis est, semen acuminatum, colore rubro, sapore acri, quod in caule et adnatis nascitur.

Est et q. Hyppolapathū, id est, græde lapathū à Græcis uocatū, grande olus in palustrib. nascens. Sunt qui Monachorum Rhabarbarum, sic hodie tanquam peregrina et incognita res, appellas tū, specie Rumicis siue Lapathi esse contendunt, cuius pictura supra. Plinius hæc genera aliter tradere uidetur lib. 20. cap. 2. Lapathū digerit modicè, oxylapathū, digerit, et repellit, utriusq. semen leuiter astringit, unde dysenterias et diarrheas sanat, præcipue oxylapathi. Hyppolapathū, quod in aquis omnino nascitur, eadē præstat, sed imbecillius: idē uerò ualētius fuerit in hortos hodie traslatū.

Lampfana.

Cap. CVIII.

**L**ampfana syluestre olus est. plus alit quàm ruuex, & stomacho utilius, cuius folia caulesq. coquuntur in cibo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λαμψάνη. Latine Lampfana, holus syluestre. Germanis Wild Föl / wild senff Kraut / weys heyderich. Rura Gallie sanuas albas, quasi syluestres napos uocant, de sanues blanches.

Bunium.

Cap. CIX.

**B**uniū caulē emittit quadrangulū, et in eo foliosos ramulos, tenues, prætenui bus foliolis & flosculis scatentes, lōgitudine digitali: folia propter radicē apio similia, sed multò tenuiora, et quæ modo quodā folia tribuli imitētur. Flores anethi. semē odoratū, minus hyoscyamo. Excalfacit buniū. urinā ciet. secundas detrahit lieni, renib. et uescicē utile. eo humenti aridoue utuntur, exempto radice & caulibus succo, ex aqua mulsā.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βουνίον. Latine Bunium. Germanis s. Barbarē Kraut. Gallis herbe au charpétier, dicitur. Vulneca



Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius & experientia docet. His uero potissimum ulceribus medetur quae impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit: nam quia ualenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.

## Blitum.

## Cap. CX.

**B**litum estur oleris modo. aluo utile est. nullius in medicina usus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Βλίτον, ἢ Βλῆτον. Latinis Blitum. Officinae cum beta confundunt. Germanis Wäxer. Gallis Porrete rouge, Tourgon in Narbonensi agro, du blit, breyon apud Sabaudos.

Blitum imbecilliter refrigerat & humectat libro 2. comp. ph. par. in secundo recessu à temperatis, lib. 6. simp. iam uulgare est.

## Malua.

## Cap. CXI.

**M**alua fatiua esui longè aptior syluestri. stomacho adueriatur. aluum iuuat: sed multò magis caules. interaneis & uesicæ utilis. cruda folia cum salis exiguo manducata, ægilopas ex melle sanant.

## Malua satina.

uerum cum cicatrice trahere ceperint, ea demum citra salem utendum est. contra aculeatos apium uesperti quæ ictus, illita efficax est. eadem cruda cum oleo trita peruncti, non feruntur. ulcera manantia in capite, surfuræque cum urina sanant. sacris ignibus & ambustis decocta folia, tritaque, utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum uulvas in fessione mollit. prodest erosionibus uesicæ, et intestinorum, uulvæ, sedisque clystere infusum. ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxilium, si continuo à bibentibus reuocatur. contra phalangiorum morsus remedio est. lac euocat. semen in uino potum, addito loti

N 2



Malua vulgaris.





malua arborecens.



sylvestris semine, uesicæ cruciatus lenis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quæ maiores, aut minores dicantur maluæ satis, ex Plinio lib. 20. cap. 21. colligere licebit, ubi de maluis & earum generibus agens describit: In magnis laudibus malua est utraq; & sativa & sylvestris. Duo genera earum amplitudine folij discernuntur. Maiorem Græci Malopen uocant in sativis, alteram ab ea molliendo uentre dictam putant malachen. Et sylvestribus cui grande folium & radices albæ, albæa uocatur, ab excellentia effectus à quibusdam aristatibea. Ex quibus Plinij uerbis colligitur maluas bisariam inter se diuidi: suntq; prima & præcipua illorum genera duo. Satiua siue hortensis, Græcis Μαλάχην ἡ κτηνία: Germanis Römisch bappel dicta, et sylvestris, Μαλάχην ἡ γηία. Germanis Gemein bappel appellata. Quarum utraq; iterum in alia diuiscernitur. Prior quidem illa in satiuam & hortensem, quæ in hortis ad ciborū usum serbatur, & quæ pro oleris utebantur: & in eam quæ locis incultis nascitur sylvestris, quæ etiam edendo fuit, sed minus quam alia. Posterior autem quæ sylvestris est, duobus illis undiq; procerior, & altius à terra erigitur, & in hortis crassior arborecens, unde à Galeno andendromalacha, quasi arborea seu arborecens malua Germanis uerò eyn rosen & herbst rosen uocatur. Quartum maluæ genus quod itidem sylvestre est Germanicè Rofs bappel dicitur. Galli malua Madoe appellant. arborecem uerò rofes doultre mer, id est, rosas ultramarinas.

Maluas aluum mollire testatur etiam Martialis hoc disticho.

Vtere laetis, & mollibus utere Maluis:

Nam faciem durum Phœbe cecani habes.

Et Paulus Aegineta lib. 1. inter olera efculentanda connumerat & aluum subducere testatur, cum ait: Malua refrigerat quidem, sed obscure, magis uerò humectat, atque ob uiscositatem aluum ducit.

Nec his tantum contenta est dotibus, sed dici horas insuper nobis ostendit, ad solem circumgendo folia, uti testatur Theophrastus & Columella. Quam ob causam etiam ab aliquibus heliosiphos uocata est, ut refert Apuleius.

## Atriplex.

## Caput CXII.

**A** Triplicem aliqui chysolachanon uocant, cognitum olus est. Duo eius genera, sylvestre & sativum. coctum estur, ut olus aluum mollit, panos discutit siue coctum illinatur. semen cum aqua malsa potum, regium morbum sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Ἀτρίπλεξ, πλεῖστον τὸ ἀποδὲν ἀνέδωκε.

Latinis atriplex, ueteribus Atriplexum.

Germanis Burehart / Damm milten.

Gallis bonnes dames arroches, bonnes femmes, follete, à gustu insipido.

Sylvestris atriplex Ἀτρίπλεξ ἡ γηία Græcis.

Germanis Schys malter, wilden burehart / myst milten dicitur.

Non



Atriplex:



Crambe.



Non parum miror Bertrutium Bononiensem ut doctiss. ita etiam accuratissimum in docendo virum in numerum laudatarum herbarum recensuisse Attriplicem, quum adeo parum commoda sit stomacho, ut non contentus Galenus hanc herbam cum oleo & garo miscuisse, ob eam causam acetum quoque addat, quo facilius citiusque secedat e stomacho. Eadem ille gratia blitum quoque condit ob humorem aqueum utrique familiarem. Atriplex tamen in maiore neglectu fuit olim, si fides habenda Plinio est, quippe accusatum à Pythagora fuit olim, tanquam faceret hydropicos, morbumque regium, & pallorem: coqui præterea difficilime, & in hortis nihil nasci iuxta id, nisi languidum, culpauit. Addidere Dionysius & Diocles plurimos ex eo gigni morbos, nec nisi mutata sepius, aqua coquendum stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere &c.

Brassica seculis.



Brassica crispa.



## Brassica. Cap. CXIII.

**B**rassica satiuia alio est idonea, si modo leuiter feruefacta edatur: nam percocta aluum fistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. stomachum autem male habet, acrior est æstiuia, in Aegypto propter amaritudinem non estur, excutientibus & tremulis esse prodest. summo cibo sumpta crapulam discutit, & uini noxam restinguit, melior stomacho cyama: sed acrior, & ad ciendam urinam ualidior, ea cocta stomacho inimica est. aluum cõturbat. Crudus succus cum nitro et iride uoratus, aluum emoluit, cum uino quoque epotus uiperarum moribus auxiliatur, cum scenigraci farina, podagris et articulorum uirgis illinitur. prodest & sordidis ulceribus, & uetustis, illitus, caput purgatur

ribus infusus, menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, cõferunt inflammationibus, tumoribusque, epinystidas, ignem sacrum, leprasque sanant, carbunculos ex sale rumpunt. fluentes capillos retinent. cocta,

addito melle, aduersus depascentia ulcera, gangranasque ualent, lienosisque ex aceto cruda profunt, manfa, deuorato succo, retusam uocem instaurant. Decoctum eius potu, aluum & menses ciet. Flos post cõceptionem in pello subditus, partum abortu uiuat. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit, in anridota theriaca additur, faciei cutem lentiginesque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant.





Brassica, ut Cato dicit, antistat, et ad salutem tempora comesta sese semper cum calore, et rigore arido, simul et humido, et dulci, et amaro, et acri. Quatuor earum genera. Prima est levis, quae nominatur læx. Germanicè breiter Föl, grandibus et latis folijs, caule magno: ualidam hæc habet naturam, et uim magnam: Altera est crispa, quæ à similitudine apij, et aliorum in Grecis, Germanis transfer Föl, uocatur: hæc est et aspectu et natura bona ad curationem, ualidiorque est quam quæ supra scripta est. Item est tertia, quæ negā. Bn. uocatur, minutis caulibus, tenuioribus folijs ob id Germanis Kleiner Föl dicta, acerrima omnium est istarum, tenui succo uehementissima. Est et quartū genus Græce νεράβη νεράδωρ. Latinis Brassica lacuturris, uel tertia aut sessilis siue Capisulata Germanis Cappis trant Gallis Capini uel cabini coles, nonnullis albi, uocata, reliqua Brassica genera Galli communi uocabulo choils, id est, caules appellant. Caulis enim etsi dicatur in herbis rotundus ipse siue stirpes, lae pius tamen ob sui caulis ac thyrsi magnitudinem pro brassica sumitur.

Est autem Brassici peculiaris quædam uis contra uina, ut Dioscorides hoc loco tradit, ebrietatis et crapulæ noxas tollit à cibo sumpta, imò et Plinius historia naturalis lib. 20. Græcorum opiniones referens, scribit Brassicam uino aduersari, ut inimicam uitibus: antecedente quidem cibus caueri ebrietatem propter sumpta, crapulam discuti, cuius rei rationem ex Aristotele colligere licet in problematis. Amplius de brassica scribit Plinius lib. 19. cap. 8. et lib. 17. cap. 24.

Brassica esculenta sapore nitroso, parum acri, siccatur, tergit, sumpta et admota, induratas phlegmonas digerit, lepras terget, ulcera etiam maligna glutinat. Cinis ustorum eius caulium siccitate est caustica, cum adipe ueteri mistus ueteratos laterum dolores discutiit.

Brassica syluestris.

Ca. CXIII.

**S**yluestris brassica, maritimis præruptisq; locis magna ex parte gignitur: satiuæ similis, sed candidior, hirsutiorq; amara, cuius cyma in lixuria cocta, ori non



non infuauis. Folia illita uulnera conglutinant, & inflammationes tumoresq;  
discutunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hec uidetur eadem herba esse, de qua supra cap. CVII. egimus. Germanis Weiß heydenich, uel  
Brafica syluestris semen maxime tenuat, efficitur  
siccatur, & digerit lib. 4. comp. ph. part.



Beta.

## Brassica. Caput CXV.

Marina brassica à satua prorsus ab-  
horret, quod folia ferat rotundæ aris-  
tolochia, prælonga, tenuia singula à ramu-  
lis rubentibus exeunt, singulari, ut hedera,  
pediculo, albo succo prædita est, sed pauco,  
salso gustu, & aliquantum amaro, pingui  
concretu. Herba in totum stomacho inimi-  
ca, acris. uehementissimè aluum ciet, in cibo  
cocta. coquitur propter acrimoniam cum  
pingui carne.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis λεγέβη θαλασδία.

Latinis Brassica marina.

officinis Soldanella.

Germanis Weerföhl.

Gallis Soldana appellatur.

Brassica marina subsalsa, et subamara, uentrè deijcit,  
& cætera præstat, quæ has qualitates sequi cõsuevere.

## Caput CXVI.

Beta duorum generum est. è quibus nigra co-  
quitur cum lenticula, ut uentrè sistat, quod ma-  
gis radice eius præstat. candida aluo utilis  
est. utraq; tamen propter nigrosum humorem, què  
habet in se, noxi succi est. Vnde succus earum cum  
melle naribus inditus, caput purgat, aurium dolo-  
ribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorum,  
furfures lendesq; deterget. perniões fori mitigat.  
crudis folijs utiligines, nitro ante perfrictas: alo-  
peciarum inanitates, scalpello prius exasperatas:  
atq; depascètia ulcera, illini prodest. eruptionibus  
papularum, igni sacro, ambustisq; cocta medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Beta hortensiorum leuissima. Vnde illud Martialis: ut sapi-  
entis fabrorum prandia Beta, O quam sepe petet uina, piperq;  
cocus. Eius duo genera nigra quæ Græcis, τεύτλον, τεύτλον  
manis Roter mangolt, in inferiori saxonia Röt ruben, ob ra-  
dicis magnitudinè exuberant, & altera alba quæ Græcis τεύ-  
τλον, λευκόν, τεύτλον, τεύτλον. Germanis Weiß mangolt.  
Gallis Peres, dicitur. & altera præfertur, meliorisq; succi est,  
euthore lib. 8. Theophrasto. Mira differentia si uera est, inquit,  
lib. 19. Plinius, cãdidis soluis alnos, mo dicè nigris imhiberi. Et e-  
brassica corrumpitur in dolo uini sapor, odore betæ, folijs demer-  
sis restitui. Medici innocentiorè quàm olus esse iudicauerunt.



Beta nigra.

Asparagus  
quid.

Lib 3. sim.  
et li. comp.  
phar. part.



quam ob rem appositus memini de-  
stare etiam religio est, utq; ualida po-  
tius in cibo sine. Semina ijs natura &  
oleris, et capite ipso exilicentis. Nam  
ut Paulus Aegnet a lib. 1. ait. Bliti, La-  
tuce, atriplicis, malinae, et beta pla-  
ta humida, asparagi uero succus est.  
Per asparagum autem intelligit, quod  
primum, et nondum in folia explici-  
tum carum plantarum ex terra pro-  
dit germen etc. Nec sine remedio est  
utraq; Beta uiridis, alba, et nigra, ni-  
trose est facultatis, qua digerit sine co-  
lore manifesto, terget, per nares pur-  
gat, alba ad haec ualentior: nigra sub-  
stringit, praesertim radice: coquendo  
has uires exuit.

Portulaca. Cap.

CXVII.

**P**ortulacae uis astringit. ca-  
pitis doloribus, inflama-  
tionibus oculorum, cere-  
terisq; cum polenta imponi-  
tur. ardoribus stomachi, sacro  
igni, uesicae doloribus, auxi-  
lio est. commanducata, dentium  
stupores sedat. stomachi & in-  
testinorum aestuationem, flux-  
ionesq; mulcet. renes & uesi-  
cam adiuuat, etiam si erosionem  
sentiant. ueneris impetus exol-  
uit. succus epotus simili esse-  
ctu prodest, in febribus ualens.  
contra teretes uentris tineas,  
cruentam excreationem, dys-  
senteriam, haemorrhoidas, &  
profluuia sanguinis, percocta  
efficax est. item contra sepi-

morsus ocularibus medicamentis utilissime comiscetur. interaneis fluxione la-  
borantibus, atq; uulnarum erosionibus infunditur. contra dolores, quos aestus exci-  
tauit, caput ex rosaceo & oleo fouetur. eruptiones papularum in capite, cum ui-  
no emendat. uulneribus quae ad syderationem spectant ex polenta illinitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Portulaca Graecis ἀνδράκυν. Latinis et officinis portulaca.

Germanis Burrekfraut / Burrelen / Burrelen / gronsel. Gallis pourpier, porcelles.

Portulaca in duas species distribuitur. Vna in hortis emicat cauliculis teretibus, in altum erectis,  
leniter uergentibus in punicum, folijs pinguibus, a tergo candidis, gustu subulso, semine nigro, in herba-  
Gal. 2. eom. ccis calycibus collecto. Alia sponte sua in uitibus nascitur, et ternis quaternisue coliculis in terra se-  
ph. part. et libus serpit, culcaq; latius uagatur, folio carnosio, uerum turbinatiore, cetera priori consimilis.  
lib. 6. sim. et Portulaca frigida ordin. tertio, humida secundo, subaustera: fluxiones biliosas, et aestus febriles ma-  
de optima se xime cohibet sumpta, et adnota, Haemodium. id est, denium stuporem non omnem, sed cum solum, quae  
sta. ab acerbis, austeris, acidis est nata, sanat, quia ab his asperere extecata lenit, et replet humiditate lenit:  
uel quia



Vel quia suo lentore acidulo herens ac subiens, acorem illum sibi affinem sapore ex dente extrahit, ut  
Aristoteli placet, huius autem effecti omnibus cogniti causam inexplicabilem, et soli Deo notam, scri-  
bit Aphrodisius initio problematum suorum.

Portulaca sylvestris.

Portulaca sativa.



Asparagi. Cap. CXVIII.

Corruda siue sylvestris asparagus  
vulgaris est notitia. Huius cauliculi  
in cibo cocti ventrem emolliunt. urinam  
ciant Radicis decoctum contra urinæ diffi-  
cultatem, regium morbum, renum vitia,  
& coxendicum cruciatus, in potu profi-  
cit. cum uino autem, phalangiorum mor-  
sibus auxiliatur. si decocti succus super den-  
te coëlineatur, eius dolori medetur. semē  
potum ad eadem ualet. canes, aut aiunt,  
si decoctum bibant, emoriuntur. Aspara-  
gum etiam nasci prodiderūt, arietis cor-  
nibus contusis, atque defossis quod, quan-  
tum equidem sentio, planè à ueritate ab-  
horret. Altilis autē asparagus multis ra-  
mis fruticat, folijs fœniculi, longis, nume-  
rosis: radice rotunda, grandi, spongiā ha-  
bente. Huius teneri cauliculi triti in uino  
albo, renum dolores sedant, asus autem  
coctus



coctusue, urinæ stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum uino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. decocta cum ficis aut ciceribus, supra, regium morbum sanat coxendicis cruciatus stranguriamq; leuat. alligata radix, aut haustum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem aufert.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Syluius.

Asparagus, uel Atheniësum more per ph. Aspharagus, uel etiam apharesi, Sparagus, generatim quidem est coliculus tenerior herba, fruticis, arboris, ad fructum & semen increfcent. Speciatim uero herba uulgo nota, eaq; duplex, radice utilis & semine ad deterendas renum & hepatis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur et Helij, id est, palustris, meminit Galenus lib. 2. alimentorum: & huius etiam initio lib. 1. comp. ph. part. ad iterum. & illius lib. 5. simpl. Petrei autem lib. 6. simpl. qui post inuentos alules asparagos, Corrua proprie dicitur: Polluci autem syluestris asparagus, hic multo est satius efficacior. in asparago mas a femina semine separatur. Asparagus Græcis ἀσπάργος.

Officinis genum nomen seruauit. Germanis Spargen. Gallis Esparge dicitur.

Plantago.

Caput CXIX.

Maior.

Minor.



**D**uo plantaginis genera. minor folia habet angustiora, minora, molliora, leuiora, & tenuiora: caule anguloso, in terra sessili: floribus pallidis: semine summis caulibus emicante. altera maior, latior, uirentiorq; latis constans folijs, oleracei generis. cuius caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, a medio ad uerticem tenui semine circumdatus. radicibus nititur teneris, hirsutis, can didis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus & locis humidis. multo utilior magna est. Vim habent folia exicatoriam, constringentem. quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis atq; elephantiasis for didisq; illita profunt. profluuia sanguinis, ulcera que serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent. uetera ulcera & inæqualia cicatrice obducunt chironia sanant. sinus conglutinant. moribus canis, ambustis igni inflammationibus, parotidibus, strumis, ægilopijs, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sa



& sale olus, dysentericis, cœlia cistq; sumptum subuenit. datur & in locum betę cū lenticula coctum, & ad aquam inter cutem cui leucophlegmatia nomen est. datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit. comitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat. cū timolia aut cerusa igni sacro medetur. fistulis infusus prodest. lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria. gingiuis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert. clystere dysentericis infunditur. contra tabem datur in potu. aduersus strangulationes uulua, inuellere subijcitur, etiam si uulua fluxione laboret. Semen ex uino potū alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducatu, & collutio ne, dentium dolores sedat. eadem cum folijs, ulceribus renum & uesicae in passio datur. Ferunt treis radices cum tribus uini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis, Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo hoc loco plantaginis genera facit Dioscorides. paruum, Græcis ἀγρόν λωσος μέγας.

Latinis plantago minor. Officinis quinqueneruia.

Germanis Spitz wegrich. Gallis Lanceola dicta.

Alteram magnam & hac efficaciorē. Græcis ἀγρόν λωσος.

Latinis & officinis plantago maior, latifolia, septimeruia.

Germanis Breycht wegrich. Gallis du plantain appellatur.

Præter hæc est tertium nobis Arnoglossum uel Arnoglosa nomine generis appellatum, folio rotundiore, sessili, hirsuto, in usu medicorum frequentissimum. Plantago refrigerat, siccatur ordine secundo, stringit, repellit, digerit, ob hæc ulcera recentia & uetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab his dysenterias coarctet, hepatis & renū obstructions tollit: Semen & radix eadē præstant, sed siccant magis, refrigerat minus, ad hæc semini adest essentia tenuitas.

Sisymbrium.

Siam.

Lauer seu sium. Ca. CXX.



Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda cocta q; esu calculos rumpunt, atq; excernunt, urinas cient. menses & partus extrahunt. dysentericis in cibo auxiliatur. De sio Crateuas tradit, herbâ esse fruticis specie, pauca folia ferentē, rotunda, maiora quàm mentha, nigra, & ad erucam accedentia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σιον.

Latinè sium, lauer, recentioribus Bernula.

Germanis Wassermerck.

Gallis de la berle dicitur.

Euchsius Sium falso interpretatur Wasser-pungen.

Sisymbrium. Cap. CXXI

Sisymbriū, alij serpyllum syluestre uocant, in solo inculto nascitur, mētha hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. calfaciendi uim habet. contra stillicidia urinæ, calculosq; semen ex uino bibitur.

tormi



tormina & singultus sedat. folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. item contra uesperum apiumq; ictus uomitiones potu cohibet. Alterum sifymbrij genus, quod aliqui cardaminam, alij sion appellant. ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, prouenit. quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est, nasturtium, representet. folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id ex calfacit. urinas mouet. crudum estur. purgat lentigines, cutisq; uitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sifymbrij hoc loco duo genera facit Dioscorides, unum quod in aridis, & locis incultis nascitur. Græcis σισυμβριον. Officinis Menta rubra, uel aquatica: item Thymbrea: Germanis Belsam Eaut/ Rotebachminis.

Alterum quod in aquis nascitur, Græcis σισυμβριον ἑρπεον. & Cardamine à nasturtij sapore. Officina nasturtium aquaticum uocant, & cresionem.

Germani Wasserressig/ Brunressig. Galli Duresson.

Sifymbrium primum ex calfacit, atq; resiceat intertio ordine. Alterum autem quum siccum est, itidem terij ordinis est ex calfacientium, & exiccantium: quum humidum & uiride, secundi.

Sifymbrium, primum tenuium partium est, digerentis, calfacientis, & exiccantis facultatis. Semen quoq; eius tenuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultuentibus, & tormina patientibus.

Sifymbrium quod quidam Cardaminum uocant, quandoquidem Cardamo, id est, nasturtio simile quiddam gustu præfert, eadem ferè potest.

## Crithmum.

## Caput CXXII.



Crithmū, seu potius, ut aliqui, crithamon, fruticosa & undiq; foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petens. Nascitur in maritimis, & petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, ueluti portulacæ, latioribus & longioribus, falso gustu. Flores candidi sunt, & semine, ceu roris marini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur. habet intus tritici modo nucleum. radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen & folia in cocta uino, potu urinae difficultati & regio morbo auxiliatur. menses cient. estur crudum coctumue in olere. seruatur etiam in muria.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λεγβουον.

Latine Crethmus, seu crithamus.

Officinis creta marina, & bacula, seu bacille.

Germanis Bacillen.

Gallis Bacille, ou fenail marin.

Desertur ad nos Crethmus sale & aceto conditus. Verum de conditura non satis inter Plinium & Columellam conuenit: quandoquidē. Plinius unā cum Dioscoride seruandum in muria olus prodidit: contra, Columella portulacæ, & bati muriam non conuenire contendit.

Neg; pugnare ista mihi uidentur, cum Plinius de crithmo seu bati marina loquatur. una cum Dioscoride, qui satis nullam rationem habuit: Columella tantum altis & hortensianæ condituram profecutus est.

Coro-



Coronopus. Caput  
CXXIII.

**C**oronopus oblonga herbula est, per terram repens, fissis folijs coquitur in oleo. radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo coeliacis facit. Prouenit in aggeribus, & locis incultis, & secus uias.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Coronopus, siue, si dicere malis, cornicis pedem, inter aculeatas sponteque nascentes herbas Theophrastus retulit, Interim tamen medicina ad usum feri Plinius commemorat, qui oblongam esse herbam cum fissuris, cauliculis per terram serpenteibus designauit. Leoniceus, Capriolam uulgo dici censet: nonnunquam et sanguinariam, quod indit a naribus sanguinem eliciat.

Græcis Κορωνόπος.

Germanis Braen füss, dicitur.

Galliæ olitores, nunc dentem canis ab acumine folij uocant, quanquam eodem nomine gramen appellant. u. legari eorum lingua, la dent de chien.

## Sonchus. Cap. CXXIII.

**S**onchi duo genera, siue strior quidam est, & magis spinis horret, alter teneritate Sonchus satiuus.



Sonchus syluestris.





quandam mollescit, cibus expetitus, angulosa caule, inani, interdum rubente: folijs in ambitu per interualla dissectis. Vtriusq; uis refrigerat, modicè adstringit, unde æstuanti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorū stomachi rosiones sorbitione mitigat, lac elicit, in uellere appositus, sedis ac uulvæ collectionibus opitulatur, tam herba quàm radix illita uibratis à scorpiōe ictibus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, latis constans folijs, caulem in ramos exeuntem folia distinguunt, sed ad eadem pollet.

*Cichorium latifolium satium.*



Gens dyscel.



#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie tria genera Sonchi nouimus. primi generis Sonchus, qui candidus, tener & esculentus est, Dioscorides Cicerbitam à Romanis dici prodidit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruatur. Herbarijs nonnullis leporis palatium dicitur. Fortassis eadem Apuleio lactuca leporina fuerit. Veneti lactucinos indigentant. Græcis σόνχης & σόνχου. Germanis Hasenköhl Gallis lacterones, uel potius lacterones, Dulaceron, Sonchus sylvestris hic & niger, & spinosior est, Græcis σόνχης & τράκους. Germanis Wilder hasenköhl Gens dyscel/moss. Sonchi genus tertium est tenerum, arborescens, latiore folio, in quo ramosum caulem folia interserant, hic à solo Dioscoride describitur. plura in capite sequenti.

#### Seris siue intybus. Cap. CXXV.

Seris duum generum est, altera satia, altera sylvestris, quæ picris & cichorion uocatur: latioribus folijs constat, stomacho quàm hortensis utilior. quæ iterū in duas species digeritur: una folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara, utraq; refrigerat, & astringit. stomacho utilissima. aluum sistit cocta si cum aceto adsumatur. sylvestres stomacho meliores, quandoquidem æstuantem ipsum & quem imbecillitas uexet, cibo leniunt. cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illi nuntur. podagris & oculorum inflammationibus auxilio sunt. herba cum radice illita, percussis à scorpiōe subuenit. igni sacro cum polenta medetur. succus cum cerusa & aceto, ualet ad illius eorum quæ refrigerationem desiderant.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Intybum, uel intybus satium Græcis λυγώριον λεγεται ὅτι ὁ ὀφθαλμὸς



Cichorea glauca.

Cichorea sativa.



Es. Officinis cichorea hortensis. Germanis zame Wegweiss. Gallis Cichorea, ou endive: huius generis est & scariola.

Intubus erraticus. Λιχόριον ἄγριον, ἀνός, Græcè. Germanis W. gweiss, W. gwart. Gallis cichorea sauvage, dicitur.

Cichorium, Romana lingua intybum olus dicitur. Gallis lib. 2. comp. phar. part. Id uero et reliqua proospecies, foliorum magnitudine, & cultu distinctæ, facultatibus parum discrepant, nisi quod agrestia satius sint sicciora & amariora. Omnia enim hæc subamara sunt, subfrigida, modice astringentia: & in his multa humiditas mista siccitatem extinguit. Ob hæc hepatis intemperiem calid. m. tum solam, & cum corruptis humoribus & ichoribus maxime iuuane refrigerando, roborando, simam eius partem & gubam obstructione liberando, præsertim si cum uino albo bibatur, & cum melle, sic enim illos humores per urinas pellunt: nec frigidum multum laedunt, ut alia permulta, quæ sunt frigida humida sine amaritudine & astringitione: sumuntur succo, decocto, puluere. libro octauo composi. pharmaco- rum part.

Condrilla.

Caput CXXVI.

Condrilla, quam aliqui cichorion, alij ferin appellant, caulem, flores & folia habet cichorio similia. qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciem esse pronuntiarunt: uerum tenuior tora est. in cuius ramulis, gummi mastiches si- millimum, tuberculo fabæ inueniri solet. quod cum myrrha tritum, & linteo ap- positum, instar oliuæ, foeminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adico- cto melle, diuiditur in pastillos, qui nitro admisti uirilignes emaculant. Gummi



# DIOSCORIDIS

Condrilla.



inordinatos pilos replicat. quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus, pilis admoveatur. contra uiperas in uino pota proficit. Succus decoctus, in uino, aut per sese potus, aluum sistit. Aliud habetur condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosum, humi sparsum, caule succo madentem laeteo: radice tenui, rotunda, leui uegeta, flauescente, succosa. Cuius & caulis & folia concoquendi uim habent. succus in commodos palpebrarum pilos refectur. Nasclitur in laetis & cultis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chondrilla omnis, & sonchus, & Hieraceum utriusque serios species etiam Galeno putata, & serios ac cicborij nomine etiam ab alijs dignata (licet Chondrillam non seri iungat, lib. 2. Alimentorij) sui forma & temperatura sunt affines, sic uiribus minime discrepant. Ob id ea tanquam congeneria iungit, & hoc loco Dioscorides. Pro intubo autem uulgus Enduiam re & nomine corrupit, ut pro seri scariolam, quasi seriolam dicere tentauit.

## Cucurbita. Cap. CXXVII.

Cucurbita esui apta, cruda trita illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriam uocant, in fincipite illinuntur. oculorum inflammationes podagrasque refrigerat. Succus è ramentis tuis per se, aut cum rosaceo infusus, aurium doloribus auxiliatur adustiones cutis in ardenti febre illitu adiuuat. totius feruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbita recentè excauata infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu alui laxigabit.

Rotunda.

Longa.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè leonourus. Latine Cucurbita. Officinis genuinum nomen seruauit.  
Germanis Kürbis. Gallis Courge dicitur.

Cucurbita



Cucurbitarum duo genera sunt, longæ & rotundæ. Cibus quo longiores tenuioresq; eo gratiores, & ob id salubriores quæ p̄dendo creuere, minimumq; seminis tales habent, duricia eius in cibus gratiâ terminante. Rotundæ uasorum usum præbent. Sed de his plura apud Plin. lib. 19. De uiribus eius dicit Paulus Aegnetæ, quod refrigerat, & humectat. atq; aluum mouet, sed paulû alimenti præbet. Chrysippus Medicus, ut lib. 20. refert Plinius, declamabat eo in cibus, Sed omnium consensu stomacho utilissime iudicantur, & interaneorum uesciarum exulcerationibus.

## Cucumer satiuus.

## Caput CXXXVIII.

Citrullus.

Cucumis marinus.



Cucumis satiuus.

Pepo.



Satiuus cucumis aluo & stomacho perquam utilis habetur. refrigerat, qui corruptionem non sentit. uesciæ prodest. olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semē modicē urinam mouet. cum lacte aut passio, uesciæ exulcerationibus subuenit. Illita cum uino folia, morsus canum sanant: & epinyctidas, cum melle. Peponis caro in cibus, urinam cit. inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adustionem infantium, quam syriafin uocant, fincipiti imponuntur. fronti admota, oculorum fluxiones auertunt. Succus cum



Melopepo.



semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in sinegmata, quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere, uomitionem mouet. Si quisquam moderatè secundum cœnâ uomere cupiat, geminis obolis sit contentus, sanat. quoq; illita cum melle ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cucumeres qui priuatim & conuenienter hoc nomine uocantur. Germanis dicuntur Gorken, & gorken Cucumeren.

Græcis σίνωπ ή πεπο.

Gallis Cucumbre.

Sunt enim & alij in cucumerum censu, suis etiam priuatim designati nominibus, ueluti citrini, et citrulli nunc dicti; item pepones & melones. De quibus omnibus Plinius lib. 19. cap. 5. Quod autem de cucumere, & cucurbita dicit crescere qua cogamur forma, id etiam ab Hippocrate in libro de seminis genitalis natura prius proditum est, ubi ait: Si quis cucumim cucurbitamue iam deflorescentem, matrisq; pediculo adhaerescensem in paruo uasculo mittat, cauo uasis illius par similisue redditur. Si uero quis eundem in maiore uasculo mittat, quod probè cucumim cucurbitamue capiat (quod tamen maius quam cucumis natura non sit) cucumis par similisq; cauo huius etiam uasis erit. Nam cum crescit cauo illius uasis heret, & inuititur. Cunctaq; uascentia semper fermè crescunt, & habent, quemadmodum ea quis cogat &c. Cucumeru generis sunt, ut diximus, tum pepones, tum melones, figura tantum & quantitate differentes. Pepones quidem uocantur, cum magnitudine excessere, aut in longitudinem processerunt. In rotundum uerò effigati & mali formam referentes, melopepones ex pepone & malo facto nomine, dicuntur, & hi sunt quos in Martio Mense Melones uocat Palladius, quo nomine etiam nunc in cõmuni usu sunt. &c.

Lactuca.



Lactuca. Caput CXXIX.

Lactuca sesilis, uel excaulis.



**L**actucæ satiuæ quibus natura refrigeratrix inest, stomacho gratæ habentur. somnū cõciliant, aluū emolliunt, lacuo cant. uerū decoctæ magis alūt. stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compefcit, & ueneri refragatur. p̄s uerò frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant. inflammationibus & ighibus facris opitulantur, muria condiuntur. cum in caulem exierunt, uim quandam nanciscuntur succo aut lacte subiectis. &c.

NO.



*Lactuca latecaulis.*



*Lactuca* Græcis θειδία, ἢ θειδία, uulgo apud recentiores  
Græcos μαϊούλα. *Officinis* *lactuca* latino nomine.  
Germanis *Lactich*.  
Gallis *Lactue* nuncupatur. nota herba est.

*Lactuca* dicta, ut in Ianuario mense tradit Palladius, quod d abundantia  
lactis exuberet. Huius diuersas ob causas, diuerso etiam tempore ua-  
rius fuit usus. Antiquitus enim quod d ebrietati obluetur, eamque  
prohiberet, in cenæ fine sumebatur: post uero ad conciliandam appe-  
tentiam in cenæ principio sumi coepta est, unde illud Martialis extat.

Claudere quæ cenæ *lactuca* solebat auorum,

Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Hæc nunc quoq; æstiuo tempore plurimum utimur in acetarijs.

Herba multum salubris, Vnde Columella in carmine.

Iamq; salutaripropere*lactuca* sapore,

Tristitia quæ releuet longi fastidia morbi.

Et Paulus Aegineta libro i. ipsam optimi succi sanguinem facere testatur. Plura eius genera à Co-  
lumella & Plinio traduntur: est enim *Lactuca*, cuius diminutiuum *lactucula*, quam Græcis θριδία  
num uocari supra diximus. Germanis Gemeiner *lattich*. Gallis *lactues* appellata est & *Lactuca*  
*latecaulis* apud Theophrastum ἡ πλεονεχὴς θειδία appellata & tertium genus. *Lactuca*  
sefiliis quam eandem sequenti existimo, scilicet *Lactucam* excaulem, Græcis θειδία ἀναυδός, Py-  
thagorici εὐρύχλοπ, mulieribus assuâs. Germanis Kraus *lattich* mit Rôpflin & Rômischer *lat-*  
*tich* dicta &c.

Est quidam natura omnibus refrigeratrix, ideo æstate gratæ, à stomacho fastidium auferunt, ci-  
biq; appetentiam faciunt. Celsus somno aptam dicit &c.

*Endiua* *Officinarum*.

*Lactuca syluestris.*

Cap. CXXX.



*Syluestris* *lactuca* satiuæ similis est, sed longior  
caulis, & candidiora folia, graciliora, & alpe-  
riora. amaro gustu est, & uiribus aliquantum pa-  
paueri similis. unde lacteum eius succum aliqui me-  
conio permiscuerunt. Aquam per aluum elicit, po-  
tus in aceto mulso succus ad duos obolos. argema ca-  
liginemque repurgat. contra adustiones efficaciter il-  
linitur cum lacte mulierum. in summa, somnum al-  
licit. doloris leuamentum præstat. menses trahit. con-  
tra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Se-  
men, non aliter quàm satiuæ, libidinum imaginatio-  
nes in somno amolitur, ac uenerem arceret. Succus ad ea  
dem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur in fictili  
nouo lac eius, antea, ut in alijs liquaminibus moris est,  
insolatum.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

*Lactuca syluestris*, nisi sensus me deficiat, est quæ passim ab offi-  
cinis nostris nunc *Endiua* dicitur.

Germanis *Endiuen*.

Gallis uero *Endiue*, cum in aruis nascatur sponte, & uinearum  
limitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spiculis in-  
horrescente, quasi prona carinæ parte echinata, supina leniore,



## DIOSCORIDIS

nonnāquam cū infenuit laciniatim serrato, caulibus bicubitali proceritate consurgentibus, bir-  
tis, flore luteo, succo candido, amaro, acri, ideo linguam & os aliquantulum uellicante. huius ut  
satina semen occultatur lenugine. Decoctum huius saccharo conditum officina, cuius tantus in-  
crebuit usus, ut nulla non fere sinistra ualitudine à medicis præbeatur, utinam tam salubriter quam  
in scitè.

## Gingidium.

## Cap. CXXXI.



**G**ingidium, aliqui lepidion, in Syria & Cilicia plerum-  
que nascitur. herbula sylvestri pastinacæ similis, te-  
nuior, & amarior: radice parua, candicante, subamara.  
Olus hoc crudum, coctum, conditumue estur magna sto-  
machi utilitate. urinam cit. decoctum ex uino potum uesicæ  
prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis γινγιδιον. Latini & officinis Cerefoliū pro cherephyllon.

Germanis Beibeltraut, Försfel.

Gallis Cersueil dicitur.

Paulus A. gnetā gingidion scandieī simile fecit, asringente uel & amara  
ritudine non pauca præditum, stomacho non ingrātā: quare ieiunia  
mediasq; commode satiat ex aceto, non tamen magnopere nutrit. Gale-  
nus, quod nonnihil amaroris & asringentie gustui representet, resfr-  
gerante uel simul & calfaciente donatum cenet, & ab utraque siccandi  
naturam sortiri.

## Scandix.

## Cap. CXXXII.

**S**candix, sylvestre olus est amarum, subacre. quod cru-  
dum coctumue manditur stomacho & uentri utile. de  
coctum in potu, uesicæ, renibus, & iecinori confert.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σκάνδιξ.

Latine Scandix.

Officina imprudenter inter dauci generareferunt.  
Germanis wild mozen dicitur.

Notissima olim omnibus Græcis scandix fuit, quæ  
toties Athenis in theatrorijum. & plausum excitauit.  
Vulgare & sua sponte nascens incultis plærunque lo-  
cis olus est, plebis eibus in quotidianum pulmentum, so-  
lijs gingidij uel anthrisci, sed maioribus & minus  
odoratis. gustu acris, subamaroque, nec aliter huius fa-  
cies ab authoribus designatur.

## Caucalis.

## Cap. CXXXIII.



**C**aucalis, quam alij sylvestre daucum  
uocant. cauliculo est dodrantali, aut  
maiore, subhirsuto: folijs apio similibus,  
fœniculi modo per extrema multifidis, hi-  
spidisque: candida in cacumine umbellæ  
suauiter olente. Crudum coctumue olus  
estur. urinam mouet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè καυκαλίσ.

Latine Caucalis.

Officinis pimpinella hirsuta.

Germanis rauher bibenel dicitur.

Huius



Caucalis.

Eruca sativa.

Sylvestris.



Fatiua herba radix foris nigra, intus alba est, cum rumpitur, caeruleum succum resudans. Galenus apud aliquos sylvestre daucum iradit nominatq; non à similitudine, ut aliqui credunt, quasi rudimentum quoddam esset nascentis dauci, sed quod & gustu & uiribus id imitetur. cum, ut inquit, modo eodem excocti faciat, excitet & propellat urinam.

## Eruca.

## Cap. CXXXIII.

**C**Ruda eruca uenerem largiore cibo concitat. semen eodem effectu prodest. Curinam cit. concoctioni prodest, aluo perquam commodata. semine ad cōdimenta utuntur. quod, uti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut a ceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat, cuius semine pro sinapi incolæ utuntur. urinā uehementius pellit. multo fatiua acrior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Eruca Germanis dicitur weisser senff samē. Gallis Roquette. herba est in acetarijs & ciborum usu non infrequens: cui, ut libro 20. testatur Plinius, in condiendis obsonijs tanta est suauitas, ut Greci ἐρωσιν appellauerint. Hæc uenerem impendio excitat, unde Martialis: Et uenerem reuocans eruca morantem. Et Columella: Excitet ut Veneri tardos eruca maritos. quod idem Dioscorides hoc loco testatur. Ad hæc Plinius libro 19. ait: Eruca præcipue frigorum contemptrix diuersa est quâ lactuca nature. Cōcitatrix Veneris, iccirco iungitur illi serè in cibis, ut nimio frigori par serior immixtus temperamentū æquet. Et Marcellus Medicus libro de medicamentis experimen-  
talis cap. 33. inquit. Ad abundantiam seminis præparandam erucam decoctam bibat, quoties quisq;  
inopia



inopia feminis se laborare perspexerit, uel potius assidue decoctam manducet: & mox post, tale me-  
dicamentum ponit. Erucæ feminis scrupulos. 3. teres singula diligenter & permiscebis, atque inde glo-  
bulos facies ad formam nucis auellanae: & cum opus fuerit singulos liquefactos, in caprimo lacte pota-  
bis, si uenerem uolueris accendi.

## Ocimum

## Cap. CXXXV.

**O**cimū uulgo cognitū. Id copiosiore cibo oculo-  
rum aciem hebetat. aluum molliat. spiritum mo-  
uet. urinam pellit. lac euocat. & agrè tamen confici-  
tur, illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo,  
pulmonum inflammationibus auxilio est. draconis  
marini & scorpionis ictibus per se prodest: & cum  
uino Chio oculorum doloribus. Succus uisus cali-  
ginem abstergit, distillationes exiccat. Semen po-  
tum conuenit atrabilem gignentibus, difficili uri-  
næ, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet ster-  
nutamenta: quod idem herba efficit: sed oculos pre-  
mi necessum est, cum sternutamentum uiget. Sunt  
qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem  
manducatum, & in sole positum, uermiculos creat.  
Aphri autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui  
ocimum ederint, nullo conficari dolore.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀνίμω.

Latine Ocimum.

Germanis Heyden Korn / grüß / bach weyzen.

Gallis de la dragee aux cheual.

Rura nostra ocimum ferunt, frugem in agris folio hederaceo,  
sanguineum colorem præferente, scapo grandi per fastigia pani-  
culas exerente, triangulis, rariuscule coaceruatis granis, quæ folia

ecis membranæ correpta delinentur. Hanc quoniam auorum nostrorum memoria è Græcia uel Asia  
uenerit Turcicū frumētum, siue Heydinsch Korn, uulgari lingua nominant. Ea pecudem omnem cater-  
raque ueterina quàm optimè saginant, & in candidissimam teruntur molunturq; farinam, quæ cum  
annone premit inopia in panificia subinde cogitur. Cum ematur uit granum suis apludis explicum si-  
gine glandis nucleo simile nascitur, quod incoquant rustici ut bubus, iumentis, pecudibusque cedat  
in pabulum, cuius uis uèhementer gliscit sagina, mire enim ab ei'dem expetit. tam agri plerique in  
Germania & Gallia hac fruge rubent. Ruellius uidetur hanc frugem facere Erysimum cereale.

## Orobanche.

## Caput CXXXVI.

**O**robanchæ cauliculus est sesquipedalis, & inter-  
dū maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio,  
pinguis: flore subalbido, & in luteum uergente radi-  
ce digiti crassitudine, & cum ariditate staccescit cau-  
lis, fistulosa. Hanc inter quædam legumina nasci con-  
stat, & ea stragulare, unde orobanche sibi cognomen-  
tum usurpauit. Estur, ut olus, cruda, & in patinis, as-  
paragi modo, decocta. legumentis addita, coctione  
accelerare creditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀροβάνχη.

Latine orobanche, quodd' eruum strangulet.

Germanis ontfraut der wicken.

Gallis Tigne appellatur.

Forsan hæc fuerit quàm absurdissima quorundam imperitia neo-  
scio unde, hypocisim audet appellare.

Barbula

\* hæc dictio  
alijs deest





## Barbula hirci.

## Cap. CXXXVII.

**B**arbula hirci, quæ ab alijs comeuocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci, supina\*, magno super caulem calyce, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. herba esui apta est. \* Hæc dictio alijs deest

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Barba hirci, uel barbula hircina, Græcis τριφυλλὸν ὄπλον appellatur Germani Bochs bart & Ganchbriott appellant, hæc facie representatur à Theophrasto: Radix longa, dulcis, folium croci longius, caule puro, super quem calix latus & barbula, quæ summo uertice incana & proluxa funditur, unde nomen accepit. Nascitur sua sponte in aruis & pratis, & magna ex parte luteo flore nitet.

## Ornithogalum.

## Caput CXXXVIII.

**O**rnithogalum cauliculus est tener, candicans, tenuis, sesquipedalis\*, tribus aut quatuor in cacumine mollibus adnatis: à quibus flores prodeant, foris herbacei, & cum hiantes se pandunt, lactei uisuntur: inter quos dissectum, chryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, ut melanthium, radix bulbosa, cruda & cocta manditur. \* Semipedalis Plin.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nunquam ullum offendere potuimus herbarium, qui nobis hanc demonstraret, incognita sere nunc omnibus etiam doctis, cum tamen plerisque tractibus ornithogalo frumentarij agri seateant. A rusticis passim eruitur rotunda radice, bulbaceam speciem præ se ferente, è cuius medio cauliculus exit, tribus aut quatuor adnatis appendicibus in cacumine, folijs in capillamenta quadam extenuatis, floribus exiguus, foris herbaceis, intus lacteo colore candicantibus, qui simul coaceruari uelut panicula quadam compacti callo squanatum coherentes in pilulam extuberant, nucamentum pincæ nucis representantem Suesionensis Gallie ager churlos. Germani uerò rustici erdt nuss & Foctel Fern, uocare consueverunt, pueris nō incognitos, qui propter astantes cum aratro terra proscinditur, aut in latiores porcas sulcatur, erutos uomere colligunt, multo castaneis suauiores in cibis, quibus & crudis & incineribus incostis rura uescuntur, odore iucundissimo eos mirum in modum commendante, nam tuberibus similes sere nascuntur, quare tanquam germanitate, uel quadam cognatione iunctos, Dioscorides hoc loco, his copulauit.

## Tubera.

## Caput CXXXIX.

**T**ubera rotundæ radices sunt, sine folijs, flauescentes, uere fodiuntur, cruda & cocta eduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄρυζα. Latine Tubera:

Officinis Cerui boleti.

Germanis Hirtz brunst.

Gallis Truffle appellantur.

Inter ea quæ sine radice proueniunt tubera quoque à Theophrasto numerantur. Credidit antiquitas cognationem illis aliquam cum cælo esse, nec nisi tonante Ioue nasci, ut in satyra Angas poetam monuit dicens:

Et faciem optata tonitrua cœnas.

Licet non fieri sed ostendi, & quasi signari tonitru tubera aliqui dicere, pulsu aëris ex eo, quemadmodum sole etiam fit, dehiscente terra qua parte ea latent, fallique qui aliter credant, non secus quam si opinentur imbrem cochleas facere non illeceas humore ex sepibus & macerijis

producere. Fuerunt tamen qui secretiores naturæ causas altius repetentes contra ostenderent, dicere, ingruentibus in terram à superiore cæli parte tonitru, fulgetris, fulminibus, uentis, & imbribus, quæ omnia plerunque simul fiunt, diuersos rerum succos contrarijque temperamenta fieri in his quæ ad generationem mouentur, non secus quam rorem dulciorem pecori facere herbam. Cœlestem autem arcum subiectam omnem sibi terræ materiam diuino halitu implere dicunt &c. Adde duorum genera esse, harenosa, dentibus immita, & altera syncera. Distinguntur & colore rufo, nigro, quæ, & intus candido de Tuberibus his sunt Martialis uersiculi hij.

Rumpimus altricem tenero de uertice terram.

Tubera, boletis poma secunda sumus.

Smilax





Smilax horten-  
sensis.Herba  
Medica.

## Smilax hortēsis. Cap. CXL.

**H**ortensis smilax, frutex, cuius semen à nonnullis lobia uocatur. folia habet hederæ, molliora tamen: tenues caules, & capreolos uicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adoleſcunt, ut opiaras scenas repræſentare uideatur. ſiliquas ſcenigræci proferit, longiores & roſiores. in quibus ſemina renuſumilia, ſed inæquali colore recluduntur: quæ quadam ex parte fulueſcunt. Siliqua cocta cum ſemine in oleribus, aſparagi modo, eſtur. urinâ ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Græcè Σμίλαξ ἡρτωνία.

Latine Smilax hortensis.

Officinis phæoli.

Germanis Welſch bonen.

Gallis Faſeoles. &amp; ſibes painctes.

Smilacis hortensiane fructum, lobia quod ſi ſiliquulas appellant, & alio nomine dolichon uocant. alius à phælo quem uilem appellat Vergilius: quare errant qui eundem putant, seu copioſe annotarunt uiri doctiſſimi, & in medicæ rei errorib. emendandis per celebres. Ioannes Manardus Ferrariensis, et Hieronymus Tragus.

## Medica Cap. CXLI.

**M**edica cum recenter prodijt, folijs & caule trifolio pratensis ſimilis eſt. procedens uero folia contrahit, caules ædens trifolij, & ſiliquas corniculorum modo intortas, in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id ſiccatum, iucundi ſaporis gratia, conditaneo ſali admiscetur. uiride, quibus refrigeratione opus eſt, illitus ſuffragatur. Herba tota pro gramine utuntur qui pecora alunt.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Eximia eſt ad ſaginanda iumenta, ad ſtercorandos agros, herba Medica, quæ cum ſeritur decennium durat, per annum quater & interdum ſexies dimittitur.

Mirum eſt quanta de hac herba ſcribuntur. attamen in Germania, niſi ſallor, paucis cognita, cum tamen aliunde ſemen afferri, & eodem



et eodem modo, quo apud Gallos, apud Sequanos, et apud alios coli possit.

Dicitur autem vulgo fœnum Burgundiese. Germanicè Burgundisch hew et Burgundisch gras, nempe quod à Burgundionibus semen aliò perlatum est, sicut ex Media in Græciam. unde Græcis Μαλινωτόν.

Gallis uerò foin de Bourgoigne, et fenacia dicitur.

## Aphaca.

## Ca. CXLII.



**A**phaca in aruis nascitur, altior lente, tenuibus folijs. siliquas lenticula maiores fert, in quibus terna quaternae semina nigra, lente minora, continentur. quæ adstringendi uim habent. quare torrefacta, stomachi alique fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

## NOMINA ET EXPLICATION.

Græcis ἀφάκη.

Latinis Aphace.

Officinis incognitum.

Germanis wilde wicken et fegels wicken.

Gallis de la ueste, uelut alij scribunt, ueste sauvage.

Hic notandum non idem esse Theophrasto quod Dioscoridi hoc loco constat aphacen, qui modò leguminum generi, modò inter olea connumerat, in quiens primo ab æquinoctio statim imbris germinare, et aculeis armari, folijs syluestri mortis similibus etc. Sed Theophrasto, quod eundem inuenerim, aphaca non siliquatur, cum flos euaneicat in pappos, in quibus magna ex parte semen occultatur: nec folium eius ad lenticula, sed magis cichorii frondem aspirat. Hieraciarum primum genus à Theophrasto nomine aphaces putatur intelligi.

## Porrum capitatum.

## Ca. CLXIII.




**C**apitatum porrum inflationem facit. noxium succum creat. tumultuosum somnum parit. urinam ciet. aluo accommodatur. extenuat. oculorum aciem hebetat. menses pellit. sed ledit exulceratam uesicam, renesque. cum ptisana uerò coctum, esu pectoris uitia extrahit. coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defensionibus, ad præclusiones uulnæ & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. semen acrius est, & quandam adstrictoriam uim habet. quare succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. uenerem itimulat. contra omnia thoracis uitia tabemque, pro delictu efficax est. arteriam esu purgat. sed si assidue estur, uisus obscuritatem inducit. stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. ipsum quoque cum aceto aut thuris pelline, lacte aut rosaceo, utiliter aurium doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cum uuarhois, qua ad obsonia utuntur. epinyctidi medentur. crustas ex sale illita rumpunt. ueteres sanguinis reiectiones cohibent, si binis



Ampeloprason.

Sectium.



drachmis & aequali baccarum myrti ponderibantur. Ampeloprasum stomacho magis aduersatur, & plus porro excalfacit. urina nam & menses uehementius ciet, id contra serpentium morsus esse conuenit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Porrorum duo genera sunt, unū sectium à secado dictū, quod frondem illi supra terrā emittente auferre sole rent. Cui nuper, ut lib. 19. scribit Plinius, auctoritatem dedit princeps Nero, uocis gratia ex oleo aestiuis mensibus diebus singulis, nihilque aliud, ac ne pane quidem uescendo. Alterum est capitatum uocatum, eo quod in caput crescat. Ambo eiusdem naturae, nisi quod capitato efficacior uis est. Si quis auctore Sottione, ut refert Constantinus, cum unum praesumat ante porros, non olebit.

Porrum capitatum, quod & aricinum. Dicitur & porrus Latine.

Græcè ἀρίκινον κεφαλωτόν.

Germanice Lauch.

Gallicè uerò ung porreau.

Porru sectium, Tareninum, Germanis schmit lauch dicitur.

Porrum agreste Græci ἀγρὸν ἀρίκινον. uulgo uisale porru. Germani Wild lauch. Sundis knobloch.

Galli pourree de chien, uocant.

Ampeloprason caule prostrato bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à natalibus ampeloprason, quasi uitiginem porrum nominatur. Galenus agreste porrum esse tradit, siccioreque natura donatum, uti syluestria omnia maiore satiuis acremento placent.

Cepa.

Cap. CXLIII.

**C**Epa longa acrior est quam rotunda, item flaua quam candida, & sicca quam uiridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent. flatus gignunt. appetentiam inuitant. sitim mouent, & extenuant. fastidium pariunt, & expurgant. aluo utiles sunt. ex detractis purgamentis in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosque excretionum exitus referant, subdita probalanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur. angina eodem perunguntur. suppressos menses pellit. caput purgat, naribus infusus, canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur. cum aceto autem perunctas in sole uirilignes sanat. & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. uaros cum sale reoprimat. contra calcæamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. citæ aluo prodest. in auribus sonitum ac grauitatem emendat. ad purulentas aureis, & eliciendam carum.





## Cepa capitata.



dam earundem aquam, ualet. alopeciae earum succo perfricantur, qui celerius quam alcyonium pilos euocat. largiore cibo cepa capitis dolores ciuit, coctaque uehementius urinam pellit. eos lethargicos efficit, qui ualitudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus a quo uescantur. elixa, & cum passis uuis & fico illita, tubercula concoquit, & celeriter rumpit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ceparum plura genera. Omnibus odor lachrymosus, unde & lachrymosam uocat in de cultu hortorum Columella.

Apud nos, inquit, libro decimonono Plinius, duo prima genera: Vnum condimentarium, quod illi gethyon, nostri pallicianam.

Germani Prysa lauch / Asch lauch.

Galli porrea & ciueta, appellant.

Alterum capitatum. Graecis κρόμμυον, Germanis Zwiebel / bollen / Sybollon. Gallis uero oignon dictum.

Optima autem quae rotundissima. item rufa acrior quam candida: sicca quam uiridis, & cruda, quam cocta: sicca quam condita. Gethium penè sine capite est, ceruicistantum longè, & ideo totum in fronde, saepiusque refecatur ut porrum.

## Allium. Cap. CXLV.




**A**llium quoddam satium atque hortensium habetur. quod in Aegypto, singulari, ut porrum, capite constat, dulce, in purpureum uergens, paruum. reliqua uero magna & candida, ex pluribus coagmentatur nucleis, quos aglitas, id est, spicas, Graeci nominant. aliud est syluestre, quod ophioscorodon, id est, anguinum, uocant. Vis alliacris est. excalfacit. mordet. excernit. aluum turbat. inflationes facit. stomachum exiccat. sitim gignit. flatum permouet. summam corporis cutem exulcerat. aciem oculorum esu hebetat. Eisdem effectus praebet anguinum, quod & elaphioscorodon dicitur. latas uentris tineas in cibo sumptum abigit. urinas detrahit. contra uiperarum ictus, & priuati hamorrhoi, prodest, ita ut non aliud magis, si cum uino iugiter assumatur. aut tritum in eodem ebibatur. contra rabioforum morsus & illitu & cibo ualet. magnae & allio utilitates contra aquarum mutationes. uocem clarificat. ueterem tussim crudum coctum uel lenit. potum autem cum origani decocto, pediculos & lentes enecat. cremati cinis illitus sugillationibus cum melle, & alopecij cum nardino unguine, medetur. eruptiones papularum cum oleo et sale sanat. uirilgines, lichenas, lentigines, ulcera capitis manantia, lepras, & furfures, cum melle eximit. cum thure & teda decoctum, dentium dolorem leuat, si in ore contineatur. contra uenenatos muris arnei morsus, cum ficulneis frondibus & cumino il-

\*Forfan a phoscorodō



Allium sylvestre.

Allium vrsinum.



linitus. Feruefactæ comæ ius, scemina  
rum defensionibus additum, menses &  
secundos partus extrahit. Allium eius  
dem gratia sufficit. factum ex eo et nigra  
oliua intritum, quod myrtoton vocat,  
esu citurinum. ora uenarum patefacit.  
hydropicis utile. Scorodoprasum ma  
gnitudine porrû æquat, qualitatu por  
ri & allij particeps. unde promiscuas  
sibi uires ex utroque uendicauit, effe  
ctus allij & porri præbens, inefficacius  
tamen. coctum, porrimodo, dulcescit  
& in olerum uicem transit.

NOMINA ET EX  
PLICATIONO.

Græcè Ξυπόδιον.

Latini &amp; Officinis allium.

Germanis Knoblauch.

Gallis Aulouaulx.

Tria in uniuersum allij genera sunt. Primum  
hortense & satium: alterum sylvestre, quod Col  
lumella, lib. xij. rei rusticæ ulpicum uocat, alijs  
phrosorodon, id alio satiuo grandius. Theo  
phrastus libro plantarum octauo Cyprium uocat:  
eius etiam meminit idem Theophrast. lib. 7. Plan  
tarum. Dioscorides, agreste uocat ophioscoro  
don, quasi anguinum. hodie vrsinum cognominant  
Germanis wilde Knobloch dicitur. Tertium  
genus itidem sylvestre, scorodoprasum appella  
tur Latinis. Græcis Ξυπόδιον περσόν. Offici  
nis allium porrum Germanis aber Knoblauch,  
quod & gustu & odore porri & allij conditio  
nes possidet, quasi olitorum diligentia in unum  
olera duo ueluti monstrum aliquod coeuerint.  
Communes utriusque uires ascribere sibi tra  
dit Galenus, cui Paulus astipulatur &c.

Sinapi.

Cap. CXLVI.

**S**inapi hortense, aliqui napi uocant. Eligi debet adustum, ualde rufum, non  
magno opere siccum, sed quod fractum internè uirescat, & ueluti quodam suc  
co madeat, casium colore. siquidem recens id genus, tempestiuum habet  
tur. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, effica est. ad eliciendam ca  
pitis pituitam manditur. contra præduros tonsillarum tumores, ac ueterem cal  
losamq; arteriæ scabritiem, succus ex aqua & melle conuenienter gargarizatur.  
sternutamenta ciēt, tritum & naribus admotum. comitialibus quoq; auxiliatur.  
sceminas uulua strangulatu oppressas excitat. lethargicis, de crasso capite, illini  
tur. cum ficis admistū, donec rubescat locus, & ad coxendici cruciatus impositū,  
ad lienes, & omne genus dolores confert, cum permutandæ ualitudinis causa, ex  
alto uitia extrahenda sunt. alopecis illitum medetur. faciem purgat. sugillata  
cum melle, adipe aut cerato rapit. feræ impetigines & lepræ, eo cum aceto per  
unguntur. contra febriū cir cuitus aridum bibitur, aut potui, polentæ modo, in  
spargitur. extrahentibus emplastris, scabiemq; extenuantibus, utiliter admisces  
ri solet. tritum, grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus  
ad hec.



ad hebetudines oculorum & genarum scabritias magna utilitate illinitur. ex-  
pressus recenti semine succus, in sole ficitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Σινάπης*. Latine Sinapi. Officinis latinū nomen seruauit. Germanis Senff/mosfardt.  
Gallis Moustarde, blanche, noire, seneue.

Duo genera sinapi obseruauimus, primum genus rapitiā frondem exprimit, alterum in *Eruca* fo-  
liū laciniatur, caulibus ramosis, sepe bicubitalibus, flore luteo, nonnunquam albic ante, siliquis tereti-  
bus, duro semine uescio pulloq; refertis, acerrimi saporis, igneiq; effectus. Sinapi calfacit, ficit at ordi-  
ne quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur lib. 9. comp. ph. part. Quomodo Sinapi ad salgamariū si-  
mul & conuiuiorum usum conficeretur, olim utrumq; docet nos Columella li. 12. per totum caput. 55.  
Est & sua sinapis Confectio Palladio in Iulio mense. Varro rei Rusticæ lib. 1. cap. 59. ait: Seruare rapa  
confectam Sinapi putant.

Sinapi.

Sinapi alterum genus.

Nasturtium.



Nasturtium.

Cap. CXLVII.

**N**asturtium optimum constat esse Babylonicū. Omnium semen est aere, ex-  
calfacit. stoma cho aduersatur. aluum turbat. tineas excutit. lienem immi-  
nuit. partus exanimat. menses cit. uenerem stimulat. sinapis & erucae simile intelo-  
ligitur. lepras & impetigines absterget. illitum cum melle, lienem extenuat. fas-  
uos expurgat. pulmonum uitia extrahit, sorbitionibus incoctum. serpentium ues-  
nenis potum resistit, atq; eas suffitu fugat. capillorū defluxia cohibet. carbuncu-  
los ad suppurationem perducit, & rumpit. coxendicibus cum polenta coimmo-  
dè ex aceto illinitur. tumores collectionesq; discutit. emittit furunculos, illitum  
cum muria. Herbe ad omnia eadem effectus licet minor.



# DIOSCORIDIS

*Thlaspi minus.*

*Nasturtium sylvestre.*

EXPLICATIO.



Græcè καπολαύου.  
Latine Nasturtium.  
Officinis Latinum no-  
men retinuit.

Germanis Keessen.  
Gallis Alenois, cresson  
de iardin.

Nasturtium autem ap-  
pellatum est. Varrone &  
Plinio testibus, à uariis  
torquendis, quod odore  
& seminis acrimonia sicc-  
nutimenta prouocet.

Nasturtium duarum ge-  
nerum est, unum satiuum.  
quo nunc communiter es-  
tuo tempore cum lactu-  
ca, oleo, aceto & sale ca-  
nas inchoamus.

Alterum est agreste de  
quo copiosius tractaui-  
mus capite ultim. libr. 1.

Nasturtium quinto die  
nascitur, herbis reliquis  
succum admittit mista salis,  
frigora contemnit. Quae  
re tam hyeme quam aestate  
facillime prorumpit.

Quod etsi nobilius quam  
ut representari deponat,  
uolumus propter gene-

rum differentias eius picturam subiungere quam Dioscorides omisit. Nasturtium coliculis absurgit  
sesquipedalibus, longe statim ab radice minorum foliorum pediculo, floribus albis, semine per ramo-  
rum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore, pinguibus iusculis in coctum  
magnam acrimoniae partem deponit. Natura ei omnino sinapis crucisq; similis est.

Thlaspi.

Cap. CXLXIII.

**T**hlaspi, herbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram uersis, suppin-  
guibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, nō sine ad-  
nascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: se-  
mine nasturtij in cluso, lenticulae uasis effigie, nisi quod infringitur, unde nome-  
n accepit. flos albicat. Nascitur in semitis, & sepibus, fossisq; Semen asperi gustus,  
excalfaciens. bilem utrinq; extrahit. potum acetabuli mensura prodest ischiadi-  
cis infusum. sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit, menses cie-  
sed partus enecat. alterum thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui Persicon sinapi  
uo cant, latis folijs, radicibus magnis, utile ischiadicorum in fusione.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Thlaspi, siue ut alijs placet thlaspidium Græcis θλάσπις. Officinis incognita. Duorum generum est  
primū Thlaspi maius folijs latioribus, Germanis bauer senff appellatur, alterum Thlaspi minus, fo-  
lijs angustioribus constat. Germanice besem traunt dicitur. Est & tertium genus Thlaspios. Dioscoridi  
θλάσπις τρεπός. Officinis Raphanus maior. Latine sinapi persicū. Germa. mödretich. Gallis raffe  
dictum. huic szechsius falso attribuit nomē armoracie. Galenus Thlaspios genera ita distinguit lib. 3.  
simpl. ubi inquit, Thlaspi duplex, Cappadocium, nigrius, non exacte rotundum, sed quadam sui parte  
uelut



Thlaspi minus.



Sinapi Persicum.



uelut *ἑρδασα* habet, id est, infra alium  
exiguum, unde illi nomen, multo ma-  
ius, & praestantius quam secundum,  
quod etiam in Cappadocia & Creta  
& ubique nascitur *ἑρδασα*, id est,  
ex pallido flauum, rotundum, admo-  
dum exiguum. Creticum tamen plea-  
rig, immiscet theriaca.

## Draba. Cap. CXLIX.

**D**raba herba ad cubiti al-  
titudinem assurgit, te-  
nues spargens ramos, & ex u-  
troque latere folia ceu lepidij,  
sed molliora, & candidiora. in  
ca cumine uero sambuci umbel-  
lam gerit, candidos\* flores ha-  
bentem. Herba hæc cum pitu-  
na coquitur, in Cappadocia  
maximè semen aridum pro pi-  
pere obsonijs admiscetur.

NOMINA ET  
explicatio.

Græcè *Ἀράβη*, *Ἀράβης*.

Drabe, dabra, Arabis. Apud Herba-  
rios quosdam orientale nasturtium, uel  
Babylonicum.

Officinis & Germanis incognita. Gallis *Draba*, *draue*, Cuminum sylvestre.  
Inuenitur in uualibus, & saepe cultis cubitali proceritate, ramoso surculorum prouentu, folijs leo-  
pidij, incanis sed mollioribus, umbella sambuci, flore candido, semine frere feniculi.

## Irio.

## Caput CL.



**E**rysimon, Latini irionem uocant, iuxta  
urbes, rudera, hortosq; nascitur, folijs  
erucæ sylvestris: cauliculis in lori modum  
lentis & obsequiosis: floribus luteis, siliquis  
in cacumine gracilibus, ut fœnogræco,  
corniculatis: semine nasturtij, exiguo, uren-  
tis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax  
est, & si purulenta extussuntur. regio morbo  
& coxendicibus prodest. contra uenena in  
delinctu cum melle datur. illinitur ex aqua  
aut melle utiliter cæcis, carcinomatis, paroti-  
dibus, duritijs mammarum, & testium inflam-  
mationibus. in totum extenuat, & calfa cit.  
mitius multo ad clysteres fiet, si aqua mada-  
scat atq; torreatur, uel linteo illigatum pinsa  
farina oblitum perassetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *ἑρυσίμων* herba.

Latinis Erysimum & Irio.

Officinis & Germanis proprio nomine destituitur.

Gallis *Erucageratina*, *tortela*.

Italis nobilis eruca dicitur.



Puchius falsus, & errore plus quam manifesto, pro uerbena mare Irionem depinxit in suis rhapso-  
dijs de stirpium uiribus, & natura.

Hæc pomeria, aggeres oppidorum, & rudera uirent, gustu mirum in modum erucam imitatur, qui  
re syluestris eruca, licet perperam, quibusdam est dicta. &c.

## Piper.

## Caput CLI.



**P**iper in India nasci, breui arbore traditur. quæ in-  
ter initia, prælongū fructum, ueluti siliquam pro-  
mit, quod longum piper est, habet intus aliquid  
tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper e-  
uadit. id autem suis temporibus dehiscens, pandensq;  
sefe, racemos emittit, grana ferētes qualia uidemus. Ea  
acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus re-  
medijs, antidotis & medicaminibus quæ contra uene-  
nata parātur: theriaca uocant. Longum uerò uehemen-  
tius mordet. & quoniā prius quam ematurescat decer-  
ptum est, subamarum relinquitur, antidotis & theria-  
cis medicaminibus expetitur. Nigrum uerò, utpote  
quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum  
esse constat, candido suauius, acrius, & ori gratius, nec  
non ad condimenta utilius. Sed candidum, & adhuc in  
acerbum uergens, antè dictis infirmius est. Eligio por-  
tet grauissimum, plenum, nigrū, sine multis rugis, recens. minimè furfurulosum. In-  
ueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defecta, casta, inania,  
minimiq; ponderis, quod uocant brasina. uis omnium excalfacit urinā ciet. con-  
coquit. extrahit, discutit. absterget caliginem quæ oculis obuersatur. piper fe-  
morisibus auxiliatur. partus extrahit. conceptum adimere creditur, statim à con-  
cubitu suppositum. tussi, omnibusq; pectoris uitijis, siue eclegmate, siue potu, suc-  
currit. anginae eo & melle conuenienter perunguntur. potum cum recentibus lau-  
ri folijs, tormina discutit. cum uua passa \* manducatum, pituitam à capite elicit.  
intinctus esculentorum additum. strumas cum pice discutit. uutiligines ex nitro  
emaculat. Fictili nouo, ut lenticula, motum torretur. Non est huius arboris radix  
gingiber, ut aliqui existimauere, sicuti paulò pōst ostendemus. Namq; piperis ra-  
dix costo similis est. ora gustantium accendit. saliuam ciet. hæc lienem reprimi-  
tum aceto illita, aut pota, caput etiam purgat, māducata cum semine pedicularis  
herbæ, quam staphidem agriam uocant.

\* Alias, sta-  
phide agria.

φάρμακον, non  
φάρμακον.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galen. lib. 3. Piperis fructus inter initia seu siliqua coryli nucamento similis, longum piper est Græcis πέντε-  
simpl. phar. πέντε. Officinis ut reliqua piperis genera nomen genuinum retinuit. Germanis Langer pfeffer. Gal-  
lib. 2. antid. lis poiure long dicitur: humidius, ob id cito perforatur, ut zingiber, & tardè, sed diu linguam mor-  
det, ut arus. Hæc siliqua postea in grana milij æmula racematim degenerat, quæ aucta & siccata,  
sed adhuc tanquam omphacodea, & immatura, piper album, Græcis πέντε λευκόν: Germanis  
Weiß pfeffer, Gallis poiure blanc appellatum, fiunt, nigro δέντε πορπ, id est, acrius: nam nigrum  
Gal. lib. 2. quod Græcis δέντε, πέντε, Germanis Schwarz pfeffer. Gallis poiure noir dicitur, iam superassa-  
antid. & li. tum sole, & super siccātū est, tamen utrunq; ualenter calfacit & siccāt, & maximè digerit. Itē quod in  
4. sanitatis agreste, rufum, coeli & soli iniquitate degenerauit. Germanis Leicht pfeffer / Taub pfeffer. Gallis  
tuenda. poiure legier dictum. Piper longum adulteratum seculo Galeni erat duplex, efferebatur alterum ex  
Li. 1. antid. Alexandria, alterum erat germen herbæ cuiusdam, quale est nobis coryli aut betulæ nucamentum. Pi-  
Lib. 9. com. per longum nec sit pertusum, nec adulteratum: album sit maximum, plenissimum, graueitidem & ni-  
pbar. part. grum, neq; id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & corticem habet tenuiorem & minus  
rugosum. Piper album stomacho est accommodatius, & acrius nigro. Piper omne coctione sumptum  
ignat



inuat, sed album supra duo reliqua genera stomachum roborat, lib. 4. sanit. tuenda. Radicibus piperis maxime proceris etiam utitur Andromachus apud Galenum lib. 7. comp. ph. par. His vires co-  
 fosimiles tribuit lib. 8. simpl. Piper longum & rotundum bis scribitur lib. 10. comp. phar. part. ut id  
 album, & nigrum comprehendat.

Piper *κοινόν*, id est, commune Astuario in antidoto podagrica, diapaeonia, & diatriopipereon, est nigrum: nam longum & album ibidem commemorat.

### Gingiberis. Caput CLII.

**G**ingiberis sui generis planta est, in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. qua uirente, ad multa, perinde atq; nos ruta, utitur, & primis potibus & edulij admiscet. Huius radices, cyperi modo, paruæ sunt, candicantes, & odorata, atq; piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant. Fistilibus in Italiam asportantur. Gingiberis cibo conueniens est, & cum condimento assumitur, ex calfactoriam uim & excoquentem habet. aluum leniter emollit. stomacho utilis est. efficax aduersus ea quæ oculis caliginē offundūt. in antidota addi solet. in summa, piperis uirib. respondet.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Zingiber Galeno & alijs cum indigenis ferè dicitur, quibusdam zinziber, alijs *zizy*, *ibegi*, Germanis Ingber. Gallis Gimbire, Lusitanis gengibre: radix est herbae granatis modo serpentis, candicans, odorata, piperis sapore, & uiribus, nisi quod tardius calfacit, sed diutius, uti longum piper. ob humiditatem excrementosam: cuius occasione utrunq; teredibus facile tentatur. Condiendū recens omnino est, nunq̃ uetus, impostorū more. Mittitur ex Arabia & Troglodytica.

### Hydropiper. Cap. CLIII.

**H**ydopiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro lapsu repunt. caulem edit geniculatum, prædurum, multis alis concauum: folia menthae, maiora, molliora, candidioraq; gustu piperis, acri, citra tamē ullam odoris gratiam: fructum acrem, in furculis paruis, propè folia racematim coherentem. Folia cum semine illita tumores ueteresq; duritias discutiunt. sugillata delent. quæ postquā inaruerunt, tusa pro pipere in obsonijs admiscetur. Radix parua, nullius in medicina momenti.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè *ὕδρωπερι*. Latine hydopiper.

Officinis incognita.

Germanis Wasser pfeffer, Muckentraut.

Hydropiper herba est in aquosis nascent, ramisculis ac folijs Menthae similis, maior tamē, gustu acerrima, ut piper, perexigua semina ut piper, singulis folijs ferens. Calida quia dem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugillata, ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addebant apud ueteres.

Pharmica





## Ptarmica.

## Cap. CLIII.

**P**tarmica frutex est, furculos habens paruos, multos & rotundos, abrotono non dissimiles: & circa eos folia oleæ, longa, multa, & in cacumine capitulum, uti anthemidis, paruum, rotundum, quod suo acri odore sternutamentum excitat, unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, fugillationes rapiunt, flores sternutamenta efficacissime mouent. Nascitur in montibus & petrosis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Ptarmice*, Ruellio uidetur ea quam uulgo in Gallia Draconis hortensis, aut ut ipse scribit pyrethri, *yluestris* appellatione uouit; reclamantibus tamen notis omnibus, ut huius pictura cum *ptarmice* descriptione collata clare ostendit. *Ptarmicen* uero alio nomine quam Germanico haud noui. uocat *Witter* Erant, quod locosis mulieribus presenti remedio succurrat, in montium summis nascitur, flore aurco chamemali, folijs oleæ quidem non dissimilibus, ut Dioscorides scribit: multo tamen latioribus, ut in letioribus nata ad plantaginem quandoque accedant. Sternutamenta cum folijs, tum flore uel solo odoratu ciuntur. radix fibras multas facit, ruffas, sapore zinziberis, muliebribus uitijs arida in potum trita bibitur. Sum qui a sternutandi numero, apud ueteres diptarmicem uocant.

## Radicula seu lanaria herba.

## Cap. CLV.



**S**truthium herba uulgo nota, qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinam ciat, prodest tussi, iecinorosis, orthopneæ ex melle sumpta, cochlearis mensura. aluum soluit. eadem cum panace & capparidis radice calculos frangit, & cum urina exturbat. duritiem lienis absument. menses imposita trahit, partus efficaciter enecat cum polenta aut & acceto illita, lepras tollit, tubercula discutit. cum farina hordeacea, & uino decocta, miscetur & malagmatis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa sternutamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci *Struthion*. Latini *Struthium*, *struthios*, *radiculam*, *lanariam*. Officina *saponariam*, herbam *fullonij*, *cordisi*.

Germani *Seyffent* erant. Galli *herbe à fullon* uocant.

Hec herba olim notissima fuit, ideo à Dioscoride minime depicta relinquitur: spinosa herba est, caule lanuginoso, folio oleæ, floret aestate, grata aspectu, uerum sine odore: semen ei nullum, radix magniteres, oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

## Cyclaminus.

## Cap. CLVI

**C**yclaminus folia habet hederæ, purpurea, uaria, in quibus suscipitque albi cant maculæ: caule nudo, quaternos digitos æquante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum uideri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamque detrahit, menses potu appositumue ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. partum appensa accelerat. contra uenenam, præsertim leporis marini, ex uino bibitur, illita contra serpentium ictus, remedio est, immista uino inebriat, regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis uestibus contentum, loco calido, & à perfrictionibus tuto recumbere, quod facilius exudet, electa autem sudores fellei colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur, ad deiicienda quoque alui excrementa, in uellere sedi subicitur, illito umbilico & imo uentre coxarum tenus, aluum emollit & abortum efficit, suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest.

medica





medicamentis abortum inferentibus admi-  
scetur. succus cum aceto illitus, proci-  
duam sedem restituit. Exprimitur tusa radice suc-  
cus, & ad mellis crassitudinē decoquitur. Ra-  
dix cutem purgat. eruptiones papularū re-  
primit. uulnerib. ex aceto per se aut cū mel-  
le medetur. lienem absumit. uitia cutis in fa-  
cie, & alopecias emendat. eius decocto luxa-  
ta, podagras, & capitis ulcuscula, pernio-  
nesq; foueri congruū est. ipsaq; in oleo uete-  
re feruefacta, illito oleo, ulcera ad cicatricē  
perducit. Cauata radix oleo expletur, & ci-  
nere feruenti imponitur, adiecto interdum  
Tyrrenicæ ceræ momento, ut strigmenti  
crassitudinem unguentū contrahat, cum pri-  
mis utile pernionibus. Radix, scillæ modo,  
concisa reponitur. Narrant ad amatoria as-  
sumi cōtusam, & in pastillos diuisam. Nasci-  
tur in umbrosis, maximè sub arboribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κυκλάμιον. Latine Cyclaminus.

Officinæ Cyclamen corrupte, et panis porcinus, uel  
terre panis & Arthanita. Germanis Schweibrott/  
Schweinbrott & Erdapsel. Gallis pain de porceau.

Cyclamini radix tota uehementer medicamento sa,  
magis eiusdem succus incidit, terget, ora uenarum ape-  
rit, trahit, digerit, illitus abdomini uentrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusus iuuat;

siccus mire emendat. menses & sudores mouet, ut Dioscorides fusiis tradit.

## Altera Cyclaminus.

## Cap. CLVII.



Est & altera cyclaminus, quam cissanthemon  
aut cissophyllon uocāt: folijs hederæ, sed mi-  
noribus: geniculatis caulibus, crassiq; circa uici-  
nas arbores, capreolorum modo, se uoluentibus:  
flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus,  
lenti gustus, aliquantulum acris: radice superua-  
cua, nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ u-  
nius pondere poti, cum uini albi cyathis duo-  
bus, quadraginta diebus, lienem per urinam &  
alium absumunt, ad orthopneam bibitur. reli-  
quias à partu purgat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κυκλάμιον ἄλτερον.

Latine Cyclaminus altera.

Officinæ Sigillum Mariæ.

Germanis hyndts krautt, Je lenger je lieber.

Gallis Le seau nostre dame.

Hæc altera cyclaminos à paucis nūc cognoscitur, omnesq;  
medici, eruditorum pace dixerim, hanc ignorāt cyclaminum;

sed superior pictura eam deliniat, quam nunc herbarij, uel officina, Sigillum Mariæ uocant, quando-  
quidem huic nihil refragari, sed omnia consensire declarabimus. Sigillum Mariæ folia fert hederæ ac-  
minora tantum, caules crassos, uel ut Plinius inquit, superuacaneos, geniculatos, uicinis arboribus ca-  
preolorum ritu se conuoluentes, flores candidos odoratosq; corymbis hederæ, sed mollibus, aliquan-  
tum




tum acribus, gustu lentis & glutinosus, radice nullius usus in medicinis, præ longa tamen & in miram  
molem extuberante, & cætera. Radicem tamen, utpote medicinae superuacuum, non explicuit Dio-  
scorides.

## Dracunculus.

## Caput CLVIII.



Dracunculus palustris:



**D**racunculus folio cõstat hederaceo, magno, candidis notis insigni: caule re-  
cto, bicubitali, uersicolore, maculis resperso purpureis, ita ut anguem pla-  
nè referat, baculi crassitudine, fructus summo caule racematim cohæret, colore  
primum herbaceo, & cum ematurit, croceo, gustu feruens, mordaxq;. radice ali-  
quantulum rotunda, bulbosa, aro non absimili, tenui obducta cortice. Nascitur  
in sepibus umbrosis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem miti-  
gat. naribus etiam ex lana impositus, polypum absumit. carcinomata illitu sistit.  
triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. odorem aiunt postea  
quam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. Radix exal-  
facit. orthopnceis, ruptis, uulsis, tussi, destillationibus auxiliatur. humores pecto-  
ris ex creatu faciles reddit, siue cocta tostaq; cum melle, aut per se se edatur, siue fa-  
rina eius ex melle delingatur, urinam pellit. uenerem excitat, cû uino pota. pha-  
gedænas ulcerum, & quæ ca coëthe uocantur, trita cum melle & bryonia alba, ex-  
purgat, & ad cicatricem perducit. collyria ex ipsa ad fistulas & eiciendos partus  
feri solent. qui radice suas manus perfricuerunt, à uiperis feriri negat. illita ex  
aceto, uirilignes emaculat. folia recentibus uulneribus, linamentorum uice, con-  
cõuenienter imponuntur decocta in uino pernionibus apposuisse prodest. caseus  
& oculorum caligines cõuenit. Radix cruda coctaue, ad sanorum usus pro olere  
recipitur



recipitur, in Gymnesijs insulis, quæ Baleares uocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix messibus effoditur, locaq; frustratim conciditur, & lino traicta siccatur in umbra, & ita reconditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ἀρκεντρία μεγάλη Latine dracunculus maior.

Officinis, serpentaria maior, & draguncula, corrupte. Germanis, Großnaterwurcz.

Gallis serpentine dicitur.

Iam in hortis studiose colitur Dracunculus, ludentis naturæ miraculum, & Draconis rudimenta in stirpibus facere condiscens. Simplici caule attollitur, binum cubitum alto, leui glabroq; baculi crassitudine, uersicoloribus anguium maculis uariiegato, purpureis etiam intercurrentibus lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremq; mentiri uideatur. in uertice remoto folia procedunt, sena septenaue, crassiore pediculo digitorum ritu propendentia, candicantibus respersa notis, rumicis figura, specie tamen hederasæa longiore. E foliato scapi fastigio uagna quædam foris herbacea profilit, cubitulis ferè longitudinis, in mucronem sensim turbinata, uelut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehiscens sese pandit, purpureum cornu in acumen fastigiatum demonstrat. Ea seminis incremento distensa disilit in rimam, & tandem elanguescens flaccescit, subarescensq; perit refracto cornu, cuius imam partem racemosus fructus ambit, acinis prima pubertate uirentibus, & per adolescentiam coccè rubore rutilantibus, gustu mordaci, odore uiroso, quandiu lanthinum illud exerit cornu: radice bulbo sat tenui libro uestita, nascitur in opacis sepibus.

Plinio Dracunculus triplici effigie demonstratus est, folijs betæ non sine thyrsos, flore purpureo, hic inquit, est similis Aro, huius picturam supra dedimus. Alij radice longa ueluti signata articulos atque demonstrauere, tribus omnino cauliculis. Tertia demonstratio fuit folio maiore quam cornu, radice arundinacea. totidem affirmat geniculata nodis, quos haberet acinos, totidemq; esse folia.

## Arum.

## Cap. CLIX.



Aron, apud Syros lupha uocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus\* distincta maculis: eadem superpurpureum, do drantalē, pistilli specie, è quo <sup>\* Alij, nullis.</sup> croceum semen exit. radice dracunculi alba, quæ decocta estur, utpote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta, manduntur. Radix, semen & folia, dracunculi uires habent, priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur, in totum, ob mitiorem eius acrimoniam in cibum expetitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Græcè Ἀρόν. Latine Arum.

Officinis pes uituli, serpentaria minor, sacerdotis uirile.

Larus: Germanicè Pfaffen pindt.

Gallis Vid de chien.

Ari radix ut dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur, eiusdem cortex spleneticos iuuat & hydropicos, Gal. lib. 9. ph. part. calida sicca primo ordine: incidit, tenuat, terget medicamentum.

## Arisarum.

## Cap. CLX.

Arisarum exigua herbula est, huius radix oleæ magnitudinem implet, sena gè maioris quàm Aron acrimonie. Vnde illi uinomas sistit, fiunt colyria ex ea, ad fistulas efficacia, illi uis radice genitalis animalis cuiuscunque in perniciem agit.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Arisaron pusilla est herba, radix ei olea tuberculo, acrior gustu quam Aron. Galenus longe minus aro tradidit, radicem magnitudine oliuam equare, multo maioris acrimoniae. Paulus multo minus esse sentit, sed acrius, radicem oliuam magnitudinem referre. Aris Plinio similis aro nascitur, minor tantum minoribusque folijs. Est etiamnum aris herba Hippocrati, sed qua sit facie non explicat. Haerent igitur utriusque consimiles redduntur. Plinius siquidem eisdem omnino notis arum quibus alij arisarum repredem uocabulis in unum coalescentibus, arisaron dici coepit. Cum igitur nec uiribus, nec reliqua facie dissideant, unam et eandem esse fatendum est.

## Hastula regia.

## Cap. CLXI.



**H**astula regia uulgaris notitia est, folijs maioris porri, caule leui, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant, radices subiacent oblongae, rotundae, glandibus similes, gustu acres, quae exalfaciunt. urinas & menses epotae ciunt. lateris doloribus, ruptis, conuulsis & tussibus, drachmae potare ex uino, medentur. Ea uero uomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine comanducata. a serpente demorsis datur aptissimè, uerum trium drachmarum potare. folijs, floribus & radice ex uino. morsus illinire oportet. item ulcera sordida & decapascencia. mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, furunculosque decoctis in foce uini bulbis. recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto uetere uino dulci, myrrha & croco decoquitur, fitque perquam utile oculis medicamentum. ad purueltas aureis per se, cum thure, melle, uino & myrrha tritum, prodest. in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum illitu exulceratis perionibus & ambustis igni, conducit surditati instillatum in aurem, auxiliatur. Candida utiliginem, linteo antea praefricam in sole, illita radix emendat. Semen floresque in uino poti, scolopendreae & scorpionum uenenis mirum in modum resistunt, aluum purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Ασφodelος.

Latinis hastula regia, asphodelus, albucom.

Officinis asfodillus, uel Aphrodili.

Germanis incognita.

Gallis des asphrodiles, phrodilorum.

Asphodelus Latinis hastula regia dictus, a caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad 80. Radice utilis est tergenti: eadem uis a magis calfacit, siccatur, tenuatur, digerit. Nunc porcorum cibis est, olim etiam hominum, muribus uenenum. Autumno legitur cum ualet plurimum.

Fuchsius pro asphodelo aliam herbam falso depingit, qua haecenus officinis non sine graui errore usi sunt.

## Bulbus esculentus.

## Cap. CLXII.



**E**sculentus bulbus uulgo cognitus, a nobis estur. stomacho & aluo utilis, rufus, qui & ex Africa deferitur. amarus uero & scillinus, stomacho aptior est, et decoctionem adiuuat.



ant. Bulbi omnes acrimoniam habent, exalfaciunt, uenerem stimulant. lin-  
guam tonsillasq; exasperant, multum alimenti præbent, carnes creant, inflatio-  
nem pariunt, luxatis fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. Spicula  
extrahunt, gangrænas & podagras ex melle aut per sese, hydropicorum tumo-  
res, & canum morsus cum melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compe-  
scunt, stomachi dolores mitigant, furfures & ulcera quæ in capite manant, cum  
costo nitro abstergunt, sugillata uarosque per se aut ex oui luteo, & lentigines  
cum melle uel aceto, emendant, fractis auriculis unguibusq; ex polenta medetur  
qdem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere e mænarum ca-  
pitibus, impositi, cremati uerò & cum aleyonio multo, uitia cutis in facie, atrasq; ci-  
catrices in sole illiti, emaculant, faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed  
copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Bulbi priuatim uocati cepis similes sunt, & cepe dicuntur album sine tunicis. Sumq; plura eorum  
genera, ut lib. 8. de plantis tradit Theophrastus. Siquidem magnitudine, colore, figura, et sapore disse-  
runt. Aliubi enim adeo dulces nascuntur, ut per se sine condimento alio eduntur, quales in Taurica  
Chersoneso sunt. Cato megareses tanquam omnium optimos celebrat, uenerem mare stimulant, unde et  
salaces à Martiali uocantur in libro Xeniorum ait.

Cum sit anus coniunx, cum sine tibi mortua membra,

Nihil aliud bulbis quam satur esse potes.

Colomella item de iisdem in hortulo ait.

Quæq; uiros acuiunt, armantq; puellas,

Iam Megaris ueniane gent alia femina bulbi.

Quibus & M. Varro ad stipulatur, tradens ob id bulbos sponis in legitimis nuptiis olim apponi so-  
litos. Et Paulus Aegnetæ lib. 1. Bulbi inquit, feminis abundantiam faciunt, & uenerem stimulat frequen-  
tior cibis eorum. Hæc uerò de priuatim dictis bulbis. Nam generaliter bulbi uocantur, quorum radi-  
ces sub terra sic crescunt, ut ad nouam quotannis sobolem decerpi aliqua pars possit ut lilio, croco &  
similibus: item & aliæ rotundæ, tunicate radices, & esui dantur radices & olera capitata, uti Celsus  
Sisyrinchion.

Aegnetæ li. 1.

Corn. Celsus  
lib. 2.

inquit libro 8. Vbi de alimentorum facultatibus agens, dicit in media ma-  
teria numerari debere ex oleribus ea, quorum radices uel bulbos assumi  
mus. Et mox post. Ex oleribus ualentior rapa, napiq; & omnes bulbi,  
in quibus cepe quoq; & allium numero, quam pastinacæ, uel quæ speciosa  
liter radícula dicitur.



## Bulbus uomitorius. Cap. CLXIII.



herbam silfo pro syluestri bulbo depingit, uidelicet Sisyrinchion Theophrasti.

**B**ulbus quem uomito-  
riori uocant, folia ha-  
bet lætiora multò & longio-  
ra quàm bulbus esculentus:  
radicem similem, cortice ni-  
gro. Earadix mansa, aut de  
coctum eius potum, uesice  
malis medetur. uomitiones  
mouet.

## EXPLICATIO.

Bulbus quem uomitorium uo-  
cant ab effectu, multò longior est,  
quàm esculentus. Fuchsius aliam





Pancration.



Gal. li. simp.  
Lib. i. antid.  
Plin. cap. 9.  
lib. 20.

**S**cilla uim acrematq; feruentem habet. affatam ad multa uiliorem esse constat. Polline ad crustam subacta, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut ca bonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit. quæ exempta, si non emollescat, alio polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius, fiunt. nam quæ ita non affatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Summi etiam solet, quod maximè est medium, direptis uiuotenus tunicis: quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat, traiectaq; lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. his scillæ segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum utimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo seruata, aut cæ resina liquefacta, imponitur, decocta in aceto demorsis & uipera cataplasma est, ad singulas affæ partis adiectis cichonistostis salis, cochlear unum aut alterum damus seu nis, ad emolliendam aluum, in potu autem & odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere uolumus, hydropicisq; & stomachicis, quibus innatat cibus, regio morbo, torminibus, in tussi uetere, suspiriosis, & ore reijcientibus tres obolos, in delinctu ex melle sumplisse satis est. coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maximè ut coctionem adiuuet. strigmenta per aluum extrahit, cocta & simili sumpta modo, eosdem præbet effectus, sed cauenda scillæ usus his qui intestinū sentiunt ulcus, ad peniles uerrucas et per niones, tosta efficaciter illinitur. Tritū semen, & carica aut melle deuorata, aluum emollit. Scilla tota in limine ianue suspensa, mali medicamenti noxam arcet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis Σκίλλα, ἡ.

Latinis & officinis, retinuit nomen priscum.

Germanis Neuszewel, merzwibel.

Gallis squilla oygnon marin dicitur.

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit: affam aut elixam sumi præstat, ut uirium eius uehementia exoluatur. Legenda ex terra quando folia eius & caules omnino aruerunt. Scille alba segmenta seu taleola cultello ligneo separata, lino traiecta, modicis interuallis ne se contingant, in umbra siccantur diebus 60 ut ex his fiat acetum scillites. Alba est masculus, eaq; utilior quàm femina nigra.

## De Pancratio

## Cap. CLXV.

**P**ancratium, quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore aut suppurpureo, gustu amaro ac feruente: folijs lilij, sed longioribus. Scillæ uires & præparatio nem habet, eodemque pondere in morbis efficaciter assumitur, cui tamen mitior quàm scillæ facultas inest. Radicis succus

cum



cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite commodissime dantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πανκράτιον*. Latine *Pancratium*. Officinis *Scylla minor*.

Germanis *Alme merzwibel*, oder *meuß zwibel*.

Gallis *Scille bastarde*.

Omnes *scylla* representat effectus, sed longe censetur inualidior. Paulus et specie et uiribus comparauit *scylla*.

## Capparis.

## Cap. CLXVI.



**C**APPARIS aculeatus frutex est, qui in terra stratus, magis in orbem euagat. spinas, ut rubus, habet, in hami modum ad uncas: folia mali cotoneae rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promittit: quo excusso, non nihil glâdis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parua, rubicunda, radices lignosas spargit, grandes numerosasq;. Tenui solo, asperisque locis, in insulis & iuxta rudera nascitur, caulis & fructus, cibi gratia condiuntur, aluum turbat, stomacho aduersatur sitim gignit. cocta tamen stomacho quâ cruda utilior est, fructus drachmis duabus in uino potus, quadraginta diebus, lienem absumit, & urinam cruentamq; excrementum emittit, bibitur utilissimè in coxarum doloribus, & neruorum resolutione, item ruptis et conuulsis, menses ei

et caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadem proficit, ulcera omnia uetera, & sordida, & quo calluerunt, expurgat, lienosis cum farina hordei illinitur, dente demorsa, dolori eius auxilium datur, cum aceto trita, utiligines albas absterget. Radix foliaq; in trita, strumas ac durities discutunt. Aurium uermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica capparis, uehementer inflat. Apula uomitus facit, & quæ à Libyco, & quæ rubro mari defertur, mirum in modum acris est: si quidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; ossitenus exest, quare in cibis non ab re damnatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *καπάρης*. Latine *Capparis*. Inturis.

Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis *Kappren*. Gallis *Cappres* dicitur.

Capparis radice cortex amarus, acer, acerbus, terget, purgat, tenuat, incidit, digerit, constringit, lienes induratos et ischiadas, ob hæc magnificè iuuat, sumptus, uel cum idoneis remedijs admotus.

Eadem radix etiam hepatica est, lib. 8. comp. ph. part. et splenetica, libro 9. eiusdem. Flos eius simp. et lib. 9. comp. ph. part.

Fructus aceto et sale conditus primis mensis ad excitandam appetentiam sumitur, licet stomacho noxius, siticulosus, aluum turbare Dioscoridi dicatur.

Folia capparis trita cum mero pota splenetica, lib. 9. comp. ph. part. ad mota cum uirium uehementium obtundatibus cheradas sanat.



Lepidium.

Hybent.



Lepidium.



Cap. CLXVII.

**L**epidium aliqui gingidum uocāt, herbula uulgo nota, muria cum lacte seruatur. Vis foliorum acris et exulcerans. quapropter ischiadicis trita, praesentissimum est auxiliū, si cum helenij radice, quarta parte tota, illinatur. Lienosis simili modo prodest. lepras eximit. Radix appensa collo dolore dētium liberare exstimatur.

EXPLICATIO.

Vide annotationes in caput ultimum lib. 1.

Ranunculum

Cap. CLXIII.

**C**omplura ranunculi genera, uis tamen omnibus una, acris, & uehementer exulcerans. Nam unum coriandri folijs constat, latioribus, subalbidis, pinguib. flore luteo, interdum purpureo; caule gracili, cubitum alto; radice alba,

exigua, amaraq; multis capillamentis, hellebori modo fibrata. nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plerumq; in Sardinia proueniens, quam acerrimū, quod

syluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo.

Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt, quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt. Stigmata delent, fornicantes uerrucas, & pēsiles, alopeciasq; paulisper illita, tollunt. repente decoctio perniones fouentur. sicca radix, tritaq; sternumenta ciet naribus admota, dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Plura ranunculi genera Dioscoridi demonstrantur. Primum genus ranunculi, Graecis Βατράχιον. Officinis pes corui, ulceraria, sclerata.

Germanice Gleißblümen / biennender hanensfuß.

Gallis bacini dicitur. Cuius pictura sequitur. Florem habet luteam, interdum purpuream, qui nihil tamen uisus non est.

Hoc genus ranunculi duplex est, unum folijs candidis, alterum nigrioribus, in medio quasi sanguineis guttis, rubecis maculis respersis, utrunq; genus cultis incultis nascitur.

Ranunc.



Primum genus Ranunculi.



Secundum genus.

Quartum genus.



Quintum genus.





Ranunculi genus alterum, lanuginosius, pluribus foliorum incisuris, altiore caule, gustus acerrimi, quod priuatim apium rusticum cognominant. Herbarij hodie apium rufus. Historici Sardoem aut Sardoniam herbam uocant, à Sardinia. Strabo ex hac herbatoxici genus Hispanos confecisse munimta hausta cuius urgence ui maiore citra dolorem ipsi sibi mortem consciscabant. Græci Βατράχιον ἑρπύλλιον. Officinis falsò hydropiper, Germanis, Stoschpfeffer, dicitur, quia palustribus locis prouenit cuius pictura supra est.

Ranunculus tertius minimus est, graui odore, flore aureo, plerisque locis conspicitur, Græcis Βατράχιον ἑρπύλλιον, χυσοῦν. Officinis incognita. Germanis Gelbwaldt henle, dicitur, nascitur enim in syluis.

Ranunculus quartus, superiori similis, flore tantum lacteo, Græcis Βατράχιον τετραγρον. Officinis quoque incognita, Germanis, Weisse waldt henle.

Est & Ranunculi genus quoddam à radicis figura uerticillum Apuleium uocauit, ob globosam rotunditatem. Minor alijs est, et radice floris inuerso. Gustus omnium acerrimi. Sunt qui lauream uocat. Græcis Εἰδὸς Βατράχιον εἰς αὐτὸν σφονδύλιον ὀνομαζομένην. Officinis pes columbinus & uesicaria Germanis Gieseltre gleipblümle, Alemer Zanen füss, Tauben füss.

Est & alterum ranunculi genus hortense, quod ob pulchritudinem in coronamenta uenit. Effecit enim cultura, ut qui in limitibus simplici foliorum compage flores oriantur, structili quodam densoque foliorum stipatu nunc in hortis colluceant. Germanis Gieseltre Zanen füss, Gallis Bacilles doublets appellatum.

Omnes Ranunculi species urendi nascuntur licentiam, pustulasque uelut ignis excitant, non eorum uis ualde acris & uehementer exulcerans, intra corpus sumi non debent.

### Anemone.

### Cap. CLXIX.



**D**VO Anemones genera, unum syluestre, alterum incultis nascens. Cuius multæ species, una phœniceū florem profert, altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum: harum folia coriandro similis, tenuioribus, prope terram diuisuris: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores ut papaueris, & in medio capitula nigra, aut cœrulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, fermeque geniculis quibusdam cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraque folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo, tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis utriusque acris, ea de causa succus naribus infusus, purgat caput, commanducata radix

pruitam trahit, decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus. cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida ulcera abstergit, folia et caules si cum præsana decocti edantur, copiam lactis præbent, menstrua ciunt, uellere apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à syluestri Anemone, argemone, & papauer, quod rhœada appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum congnationem in floribus, distinguere non possunt, uerum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & utraque tardius floret, quine tiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas uerò candidiorem & acrem, insuper Anemone & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in Anemone supernè crassiusculum\*, in rhœade subangustius. Anemones genera nec succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen, in aruis illa sæpius enascuntur.

\*Latiusculum.

NOMINA



Græcè *Ανεμώνη*. Latinè *Anemone*. Officinis herba *Venti*.Germanis *Ruchenschell* / *Sack* et *Frant*.Gallis *Coeque lourdes*, uel *corles*. Hortenses uero *passi* flores uocant.

Empirici hanc herbam uulnerariam faciunt. Secantur eius folia non sine acore quodam, ita ut oculos quemadmodum allium, aut cape feriant. illaq; per alembicum ui ignis destillata, aquam uulneribus mundificandis, curandisq; utilissimam præstant, quæ et putridam carnem erodat.

*Argemone*.

Cap. CLXX.

Proten  
tilla.*Argemone*.*Anagallis aquatica*.

**A**rgemone in totis syluestri papaueri similis est. folia habet Anemones, diuisa; florè puniceum: caput in cauliculo papaueris rotatis, oblongius, & summis partib. latum: radicē rotundam, succū croci colore acrem dimittit. Argema & nubeculas expurgat: folia illitu inflammationes compefcunt.

NOMINA ET EXPLIC.

Nostri herbarij hodie duo genera Argemones, unum papaueri syluestri omnino simile, alterum Germani *Geosvetch* uocant, quia asperibus hæc herba uoluptati est. tamen apud me horum certi nihil habetur.

*Anagallis*.

Ca. CLXXI.



Duo Anagallis.



**D**vo Anagallidis genera, quæ tantum flore distant, nam quæ cœruleo flores, folijs in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helixinæ folia accendentibus; semine rotundo. Vtræq; mitigandi uim habet, inflammationem arcer, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet, Succus caput gargarizatu purgat, & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam naricem injiciatur, argemacum melle Attico emendat, retusæ oculorum aciei auxiliatur, contra uiperarum morsus, iecinoris & renum uitia, si ex uino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ cœruleum ædit florem, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagallis in duo genera diuiditur, scemina flore ceruleo conspiciuntur, mas puniceo, lacet in terra uterque sexus. Folia in cauliculis quadratis pusilla rotunda in terra iacentibus nascuntur in hortis & aquosis.

Anagallis Fœmina Latinis.

Florus Galline officinis.

Αναγallis θηλεα Grecis.

Gauchhey l mit blaen blüm l in Ger.

Morgeline Gallis dicitur.

Anagallis Mas Latinis.

Grecis Αναγallis αρρηνη

Germanis Gauchhey l mit roten blüm l in.

Gallis quoq; Morgelina (flore enim tantum distans) appellant.

Est & tertium genus Anagallidis palustre, floribus cœruleis, Germanis Wasserpungen & Bachpängen appellatum Fuchsius errore manifesto Lauer seu Sion dictum, eius pictura supra est.

Galenus tradit Anagallidem siue quæ florem parit cœruleum, siue quæ phœniceum, quendam attractoriorum calorem possidere, quo spicula uel impactos corpori refigit aculeos. Qua de causa succus naribus raptus caput purgat, & ut summum dicitur exicatoriam uim citra morsum obtinet, quare uulnera glutinant, idem de utraq; Anagallide sentit Paulus.

Veterinarij uero in hodiernum diem usq; hac herba quam palustrem siue aquaticam Anagallidem appellauimus in tumoribus discutiendis, & scabie equorum sananda utuntur, ut ipse Fuchsius testatur, ut hinc manifestum fiat illam esse speciem Anagallidis & non Sium (ut Fuchsius falso conecndit) exicatoriam enim uim citra morsum obtinet ut Anagallis quare uulnera glutinat præcipue senum corpori, ad recentia quoq; uulnera tanta ei traditur uis, ut saniem ossibus extrahat, quemadmodum id longa uaria experientia multis constat, quæ uires singulatim à ueteribus Anagallidi utriq; attribuantur.

## Hedera.

## Cap. CLXXII.

**H**edera differentias multas in specie sortitur, summas autem genere treis. Nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix, candida, fructum fert candidum, nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam uulgius Dionysiam uocat, helix fructum non gignit sed albas habet uiticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens, nervos tentat, flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in uino



αμβροτερρα  
non ipudra.

bis die potus, ambustis cum cerato tritus illinitur, recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant, foliorum & corymborum succus, cum trino unguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra ueteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est, purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur, nigra hederæ succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mentemq; turbant largius sumpti, acini quinq; triti, calfactiq; in puncti mali cortice cum rosaceo, si instillantur à contraria aure, dolorem dentium mitigant, denigrant capillum, illiti corymbi, folia in uino decocta, illinuntur omnium ulcerum



ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint, uitia cutis in facie & ambusta sanant, uti antea diximus decocta. mouent menses triti et subditi corymbi. iidem poti, post purgationes foeminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. pediculus foliorum melle irrigatus, ac uulvæ inditus, menstrua & partus extrahit, instillatus succus putrida cædianarium, grauiolentiamq; emendat, & sanitati restituit. lachryma hædere psilothrum est, illitu pediculos ehecat, succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hædera plurimas, ut Dioscoridi placet, sigillatim habet differentias, sed summas species omnium generum tres. Candida fructum candidum fert, Græcis Κισσός λευκός & λευκονακτρός. Germanis Weisses Ephem. Gallis Lierre blanche.

Nigrum fructum nigra hædera fert, Græcis Κισσός μέλας. Germanis Schwarzes Ephem. Gallis Lierre noire, & dyonisia appellatur. Tertia quæ nominatur Helix, nullum parit fructum, tenuibus sarmentis, folijs paruis, angulosis, coccinno rubrisq; hæc Græcis Κισσός ἀκακτὸν & ἑλὶξ. Latinis Sterilis, Helix. Germani Ephem. onfrucht. & Klein Ephem. uocant.

Hædera satis omnibus inimica, sepulchra ac muros rumpens, serpenti frigori gratissima: quæ etsi crescendo arborum magnitudinem æquat, frutices eam tamen sibi uendicant.

Hædera, ut Aegnetæ placet, contrarijs constat potentijs. Stringit enim, & refrigerat, atq; cum quadam armonia calefacit, essentie aqueosæ particeps, uiridis, tepida.

## Chelidonium.

## Cap. CLXXIII.



Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali aut altiore, adnatis foliosis: folijs ranunculi, multis, mollioribus tamen, & colore cæsijs: flore uioleæ albæ, secundum singula folia prodeunte. in eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauius olens, radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratus, filiqua, ceu corniculati papaueris, tenuis, in metæ figuram longa: in qua semen papauere maius recluditur. Succus in æreo uase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur in eunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso & uino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt. imposita cum uino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi uidetur uendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excecatis pullis, admota herba uisum restituere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Χελιδόνιον τὸ μέγα.  
Officinis corruptè Chelidonia.  
Gallis Chelidoine, ou esclere.

Latine Chelidonium & Hyrundinaria.  
Germanis Schellwurz.

Herba nota est. dicitur autem nomen sumpsisse ex hoc quod eo tempore semper florescit quo Hirundines præsto sunt, quas Græci Chelidonas uocant: uel ut quidam memorant, quod nidis suis candida Hirundines serant ob acuendos succedentium uisus.

## Chelidonium minus.

## Cap. CLXXIII.

Chelidonium minus, quod tritum syluestre aliqui nuncupant, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: folijs hederæ, multo obtundioribus & minoribus, teneris, & suppinguibus: radices habet ex eodem callo complures, puillas, in granorum tritici modum acruatim congestas. quarum tres aut quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo



*Chelidonium minus.*

alignosi tractus scatent. Quam longe disidenti nomine, proprio ignoto, nunc officinae uocant scrophulariam, quod strumosa radix multis granorum frumenti granis uideatur coaluisse, quanquam putem inditam appellationem, quod strumis (quas uocant græca imitatione non latina scrophulas) medetur. Sed ne sine peculiari demonstratione testemur, id euidenter pictura poterit comprobare. Siquidem scrophularia herbula est à pediculis pendens, uida caule, folijs hederæ, rotundioribus multo, minoribusq; teneris & modice pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeuntes, paruas, complures in granorum tritici morem acervatim congestas, quarum tres uel quatuor in longum protenduntur. Humida sequitur & palustria. Flores aduentu hyrundinum, nec longo post tempore marcescens ena nescit, sic ut irrigui limites, qui large foliorum florumq; stipatu pubescebant, confestim ijs spoliati glabrescere conspiciantur, qua de causa Chelidonium, id est hyrundinariam dici nulli dubium est. Flos ei Ranunculi, luteo colore nitens.

*Othonna.* Cap. CLXVV.

**O**thonnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt, quidam glaucij; alij succum floribus corniculati papaueris expressum. alij permistos cœruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaueris succos, esse contendunt. alij Trogodyctæ cuiusdam herbæ succum, quæ Othonna uocatur: nasciq; eam in eo Arabiæ tra-

*Auricula muris.*

qui ad Aegyptum spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribri modo, & ueluti à tineæ derosis, squalore ob sitis, paucis; flore croci, latifolio. quare quidam anemones speciem esse putauerunt. extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus, mordet enim & abstergit omnē caliginem quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Alii tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaidē nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione mordaci.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Othonna, quid fuerit, etiam Dioscoride teste, ne inter ueteres quidem satis constat.

*Auricula muris.* Cap. CLXXVI.

**M**uris auricula, quam myosotida uocant, herba est caulibus plurib; ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis; folijs angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus caulibus ex-



lis ex alarum sinu prouidentibus: flore, ut anagallidis, cœruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopïa sanatur. Sunt qui alſanen, muris auriculam uocitent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μυρσώρις, ἢ Μυρσώρις.

Latine Muris auricula.

Germanicè Waldot Mangolt/ mit blaen blimen.

Existimatur ea, quam in Germania uulgo medici betam syluestrem nominant floribus cœruleis, diuersam à pyrola.

Syluestre glastum.

Glastum.

Cap. CLXXVII.



Satiuum Glastum quod infectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, uerum pinguius nigriusque cuius caulibus duum cubitorum altitudinem excedit. Illi folia tumores omnes discutunt, cruenta uulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Syluestre Glastum satiuo simile est, folia fert maiora, lactucaceis proxima, caules prætenues multifidos, quadam tenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quadam linguarum effigiem referentes, in quibus semen, flore tenui, luteo. Eadem quæ & supra dicta præstat, potu & illitu lienosis auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ιοκάρης. La. Gnadam, Glastum, Isatis. Officinis Indicum à colore. Germanis Weyd Endich. Gallis.

Du guesde, pastel de languedoc, dicitur.

Viridem herbam Trusatilibus molis præmunt, ut herbecam saniem excludant: dein abacto liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis in cinerem computrescere sinunt. hos coruinis infectoria coquunt officina, & laneos pannos ac uellera demergunt, ut cœruleum ebibant colorem. Cœruleam illam spumam innatantem quam igni conferuescentes eructant cortine, hæc ad pictorum usus siccant. Germani Indich. Galli Inde uocant.

Telephium.

Cap. CLXXVIII.

Telephium herba portulacæ similis & caule & folijs, habens gemina tubercula, \* à singulis radicum geniculis enascentia: à quibus rami seni septeniue fruticant, à radice referti cœruleis folijs, crassis, lentis, carnosiss: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maxime inter uites. Tempore uerno folia senis hodie sunt.

R



Telephium.



ris illita albam uiriliginem sanans: sed postea hordeacea farina illini debet. perunctam ex aceto etiam in sole uiriliginem tollunt. sed ubi inaruerunt, abstergantur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci Τηλεφίου: Latini Telephium.  
Officinis illecebra minor, Vermicularis minor.  
Germanis Katzen Treublin dicitur.

Hanc Fuchsius perperam tertium genus Sedi facit.

Breuius Dioscoride Plinius descripsit Telephium portulacæ simile, et caule et folijs, ram à radice septeni octoniue fruticant, folijs crassius carnosus. Galenus tradit, putrilaginosus ulceribus opitulari. Vnde Telephij nomen ductum puto, quod ulceribus malis, quibus rex Mysie Telephus consenuit, ab Achille uulneratus, auxilietur.

Finis Libri Secundi.

PEDANII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MATERIA

Liber I ertius, Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figurarum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per Gualtherum, H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctiss. uiuorum lucubrationibus adiectis.



P R A E F A T I O.

VPERIORIBVS charissime Aree commentarijs, tradidimus de aromatibus, unguentis, oleis, arboribus, earum fructibus & lachrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia praeditis. In hoc aut tertio lib. radices, succos, semina, herbas, & quæ uernacula & inter se cognata censentur, quæq; pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum.

\* Agaricu fertur radice lae perpitij simile.



Cap. I.

\* Agaricum radix fertur lae perpitij similis, sed facie summa solutior, & rariore fungosoq; tota contextu. Duo eius genera. foemina, quæ praefertur, rectis intus uenarum discursibus constat. mas rotundus est, & undiq; compactior. Vtriq; gustus in initio dulcis, mox in amaritudinem transit. gignitur in Sarmatiae regione, quæ Agarica dicitur. Sunt qui radicem esse plantæ affirmet, alij ut fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine: gignitur in Galatia Asia, & Cilicia, in cedris, sed friabile & infirmum. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta. prodest itidem contusis, & ab alto deuolutis. datur duobus obolis in uino mulso, febrim non sentientibus: febriculosis uero, in aqua mulsa. arquat is quoq; suspiriosis, iecinoris renumq; uitio laborantibus, dysentericis. item si urina ægrè red datur, si uulua strangulatus urgeat, si pallor membra decoloret, drachma una dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negocium exhibet, ex aceto mulso. si dissolutio



solutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, manditur, & sine ulla humoris fortificatione deuoratur. simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum, facit ad coxendicum, & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso, pari pondere assumatur. menses ciet. foeminis, quas inflatio uulvae uexat, utiliter æquali modo datur, horrores solum datur ante febrium accessiones. aluum purgat drachma una aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. uenenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum. si serpentes ictum uibrarunt, morsumque subfixerunt, tribus obolis ex uino potum, mire auxiliatur. In summa, internis omnibus uitijs conuenit, pro uiribus & etate datum, nunc ex aqua, nunc ex uino: ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

## NOMINA ET EXPLIC.

Græcè *Άγαραξός*. Latine *Agaricum*. Officina genuinum nomen retinere.

Germanus *Dammen Schwam*.

Gallis *Agaric* dicitur.

Gal. li. i. ant.

& 6. simpl.

*Sylvius hys mentatis est.*

*Agaricus* tanquam fungus est enatus truncis arborum præcipue glandiferarum, ut ilicium: toto contextu est rariore & fungoso, sed facie summa & mucrone est solutio: sede uero & radice semilignosa & semi putri, ob id abiicienda. In eo foemina rectis intus uenarum discurribus fracta constat, qui denium murinorum uestigia in caseo duro representant. Eadem leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, splendidior, proinde præstantior. Mas uero in fracturis filios neruorum modo, grauis, deius, durus, niger, lignosus, longus, interdum rotundus, sed ubique compactior: neuter ad alterationem recipit. Viri: sapor est initio dulcis, mox amarus, tadem etiam subacer, & subastringens: unde incidit, tenuat, terget, digerit, obstruata liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, stomacho aduersa: uitijs tamen omnibus internis ab ea natis saluber est in omni etate, ob quæ medicamentum familie ueteri bus est dictus. Datur drachmæ pondere, seu à scrupulis duobus ad drachmam unam pro ægri natura, ætate, uiribus, consuetudine, & morbi natura & tempore, cum uino, uino diluto, uino mulso, sapa, aceto, aqua, hydromelite, oxymelite. Quinetiam stomacho solutus, ut cibi tenax non sit & acida ructantibus manditur, et sine humore deuoratur *Dioscoridi*. Nobis omnibus nauseabundus est, fortasse quia de

Gal. li. 6. sim.

Rha Germanicum.

terior nunc ex Alpibus Germanicis, Gallicis, & Galliæ Delphinatu affertur, quàm quæ maioribus mittebat *Agaria Sarmatiæ regio* (à qua illi nomē) & *Galacia*, & *Cilicia*. Pōticus *Andromacho* iuniori in *Theriaca* probatur. Mendum igitur uideri iure queat in fine lib. 9. comp. ph. par. ubi suffocatis ab utero datur uncia una cū uino pro drachma una. Corrigitur uino, zingibere, caryophyllis, nuce muscata, uel alijs stomachicis. Seruatur anis quinq; integer præcipue cum dauco, libysico, polypodio: non solum autem sumitur, sed etiam foris admoetur, ut *Galenus* docet li. 6. simp. ph. & in fin. li. 10. comp. ph. part. in ischiadicis remedijs.

Gal. li. i. ant.

*Agaricus Galeno & Dioscoridi radix dicitur*, cum potius fungus sit aut uelut fungus quidam, candidus, odoratus, nocte lucens, truncis ilicium et aliarum arborum glandiferarum truncis innatus.

## Rhaponticum. Cap. II.

**R**Ha, aliqui rheum, latini *Rhaponticum* uocant, prouenit in ijs q̄ supra Bosphorū sunt regionib. ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantū laxius, sine odore. Optimum habetur quod teredines nō sensir, si gustatu cū remissa adstrictione lētescat, nō ducatūq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinante. Id epotū facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus

R 2





dolores, ad conuulsa, lienofos, hepaticos, tormina, ad renum, uesicæ, & pectoris uitia, aduersus intenta præcordia, & uulnæ mala, coxendicum dolores, sanguinis excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & cœliacorum affectus, contra febrium circuitus, & uenenatorum morsus. datur in singulis ualentinis. eodem quo agaricum pondere, & cum eisdem liquoribus si febri careant, in mulso: sin aliter, ex aqua mulla, si tabem experiuntur, ex passo, si lienis exercet, in aceto mulso. si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine forbitione uel la deuoratur. liuentia lichenasq; tollit, cum aceto illitum. inflammationes omnes ueteres ex aqua oblitum dissipat. summa eius uis adstringens, cum aliquanto calore.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rha, Rhaon, Rheon, Rhion, radix nigra, costis nigro foris, cernit aureo magno intus similis, sed minor & rufior, fungosa & laxa, aliquantum leuis, sine odore, teredinibus non exesa, quæ mansa colore reddi pallidum, ad crocum inclinantem, facile fragilis, amara, ut à Dioscoride præfemi capite describitur, sed præter hæc legi in Dioscoride Separio: adstringens, plusculum manditur, subacris.

Ex riguis ad Rha fluuium supra pontum (unde Rhaponticum Græcis & Latinis, & radix pontica Celso dicitur) & Bosphorum septentrionali tractu affertur: parum purgatorium, experientia posteriorum, licet inuentum sit rarissimum, & hodie prope ignotum: obscuratum opinor à Rhabarbaro seu Indico, quod ex India meridionali in totam prope Europam quæstui maximo conuulitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, resstringens, amarum, cholagogum, magis, colore dum manditur plane croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, uiribus tamen, colore, odore, pondere nonnihil distimile soli & cœli ratione: siue omnino diuersum, alijs disquirendum relinquo, quibus plus est otij & facultatis: cum præsertim etiam celebres medici hodie, in ea controuersia sibi non consistunt, et nunc idem nunc diuersum affirmant. Manardus namq; in epistolis nunc idem, nunc diuersum censet. Mesue & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quæ Dioscorides & Galenus Rheo. Mihi satis fuerit admodum re, in locum Pontici iam prope desiti Indicum uiribus proximum, & ubiq; copiosum potius esse suffici-

Gentiana.



endum, tanto tamen parcius, quanto efficacius, in Græcorum compositionibus, quam Centaurij magni radicem minimo uirium commercio cum Pontico conuenientem. Præsertim autem sufficiens est, quod in Indico est, adstringens magis, minusq; purgatorium, quale multum inuenitur: aut saltem eius macerati, uel asi magna, prout Medicus iudicauerit. In Arabum autem compositionibus, utrumq; distinguitur, illud Rheoponticum, hoc Ramed Seni appellatum. Rhion uel ῥήιον Ponticum, uel Rhion Pontici radix fratre Galeno dicitur in composit. medic. part. 7. & 8. & in antid. ῥήιον πόντιον, & ῥήιον ῥαπὸν. Actuarius: Rheopontici radix, idem Pontica radix in Esdra antidoto, ῥήιον ῥαπὸν Actuarius, in diaclydo pro Ramed Seni Mesue. Seruatur annis. 3. 4. psillio, milio, cera oblitum sola, uel cum tercbinihina.

Quod autem uulgo Europa pro Rhabarbaro in hortis passim ferit, cuius picitur à damus, nomine Rha Germanici Lapatbi genus omnino uideatur, licet radicis colore Rhabarbaro nonnihil sit affine, uiribus autem becillius est. At cum reliqua Rhei utriusq; historia nemini scribatur, sed radicis solius, conuincere ne queas, congenerem plantam uel de genere & diuersam, nisi ex partis unius natura.

Gentiana.

Cap. III.

Inuentio Gentianæ prima assignatur Gentio Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit, folijs partim proxime radicem, iuglandi plantaginiue similib. subrubris, partim à medio caule, et præsertim iuxta cacumē, paulum distans: caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex interuallis maioribus foliato binum saepe cubitorum: semine in calycibus lato sine pondere, aceroso, satis ad sphondylii semen accedente: radice longæ aristolechiæ, crassa, amara. Nascitur in sublimibus montium iugis, umbrosis locis, aqua hinc. Vis radicis ex calfactoria, & adstringens, contra morsus serpentium, dual drachmis



drachmis, cum pipere, ruta & uino pota, auxiliatur. extracti succi drachma, late-  
rum doloribus, & ex sublimi deturbatis. ruptis & conuulsis, prodest. hepaticis et  
stomachicis, pota cum aqua subuenit. radix collyrii modo subdita, partus efficit.  
imposita, ut lycium, uulneraria est. & ulcerum cuniculatim depascit. medela.  
succus præcipue eodem effectui prodest, oculis inflammatione laborantibus illi-  
nuitur. pro meconio collyrii acris immiscetur. radix uiriliginem absterget. Suc-  
ci extrahendi ratio hæc est: Contusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea  
in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo ex-  
colatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, fictiliq; reconditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Γεντιανή*. Latine Gentiana. Officinis Latinum nomen integrum seruauit.

Germanis prima littera ablata, *Genian*. Gallis de la Gentienne.

Huius genus maximum Sabaudi uocant *Verlache*: minimum (Germanis, *Arctus wurtz*, & *Witter wurtz* appellatum.) du peret.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum, tenuandum, purgandum, ob-  
struenda liberandum: propter quam aloë Gallica dicitur: à illiricorum rege inuenta, & dicta, ut ipse Dio-  
scorides testatur.

## Aristolochia.

## Cap. III.

**A**ristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optimè puerpe-  
ris opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ foemina uocatur, fo-  
liis hederaceis, præstanti odore, cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab  
una radice germinibus, prælongisq; palmitibus, floribus candidis, pilei similitu-  
dine, in quibus quod rubrum est, grauiter olet. Longa, mascula appellatur, non  
nullis dactylitis, longiore quam rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus:  
flore purpureo, grauiter olente, qui marcescens in pyri similitudinem turbatur.  
radix rotundæ, in orbem conglobata, rapæ modo, longæ uerò radix digiti crassitu-  
dinem, & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem, ambæ  
colore intus buxæo, gustu amaro & graui. Est etiamnum tertia longa, quæ clema-  
titis uocatur, ramulos habens tenues, refertos foliis subrotundis, minori semper-  
uiuo similibus: flores rutæ: radices longiores, tenues, crasso cortice odoratoq; ue-

stitas, priuatim unguentorum spissamentis conueni-  
entes. Rotunda ceteris uenenis resistit. Longa uerò  
aduersus angues & uenena, drachmæ pōdere ex uino  
bibitur, & illinitur. pota cum pipere & myrrha, men-  
ses, partus, et omnia uuluarum onera efficit, eadem effi-  
cit subdita in pello. Rotunda ad eadem pollet, insuper  
singultibus, suspiriis, horroribus, lieni, conuulsis, late-  
rum doloribus, pota cū aqua, singulariter auxiliatur.  
aculeos & spicula extrahit. ossium squamas illitti adi-  
mit, ulcera putrida exest, & sordida expurgat, caua cū  
iri & melle explet, gingiuas et dentes extergit. Clema-  
titis ad eadem pollere creditur, uiribus tamen inferio-  
rior est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aristolochia, quia sit *ἀρίστη λοχούσας*, id est, parturientibus  
optima & salubris. Dioscoridi & Galeno triplex, radice figura  
præcipue distincta. Quæ primo generi est tuberum modo rotunda.  
Græcis *Αριστολόχια σπογγύλη*. Latinis malum terre ob id dicitur.  
tamen non est ea quæ sic officinis & Germanis dicitur: secunda ba-  
culi crassitudine, digitos quatuor longa: unde (opinor) dactylitis diei  
tur lib. 2. comp. ph. guer. & lib. 7. comp. ph. part. in *Αριερίαι*  
Andromachi 16. Græcis *Αριστολόχια μακρά*.

R 3





198  
298

D I O S C O R I D I S

Arist. rotunda officinarum.



Plin. lib. 25.  
ca. 8.  
Gal. lib. 10.  
com. ph. put.

Tertia longissima, quasi uitium nouellarum, ob quam elem-  
titis, id est, sarmentosa dicitur. Huius fructus putatur quibus-  
dam nonkoi orientis, uulgo Gallorum coques deleuant. Germa-  
nis Fisch & Siner dictus, stupefaciendis piscibus efficax, quam  
uim Plinius tribuit rotunda, hac Grecis Apisodoxia κλημα  
τίτις. Officinis longa, Germanis Osterlucet dicitur.

Quartum genus ostendit Plinius Pistolochiam seu Polya-  
rhizon omnium tenuissimum, densis radices capillamentis iuncti  
plenioris crassitudine; hanc Euchsium falso putat officinarum es-  
se rotundam aristolochiam, longe deceptus, cum prorsus nulla  
in ea nota cum hac conueniat, quae potius Capnos Chelidonia,  
seu Capnos Phragmitis fuerit, ut Cordus iunior, harum rerum  
expertissimus, asserit.

Omnes ualent tantum radice amara & subacri, sed rotunda  
omnium est substantia tenuissima: longa uero terget moderati-  
us: clematidis quia odore est gratiore, et cortice carnosio, ad un-  
guenta (nardina Plinio) est, quam ad medicationes aptior. Prae-  
fertur Ponica, & huic Cretenensis li. 10. comp. ph. parti. Effodi-  
enda est mensibus, & desquamato terreno seruanda.

Dulcis radix.



Cap. V.

**D**ulcis radix plurima gignit in Capa-  
padocia & Ponto: fruticosa est, ra-  
mis binum cubitorum altitudine assurgē-  
tibus: folijs lentilci, densis, pinguibus, ta-  
ctūq; gummosis: flore hyacinthi, fructu pl-  
lularum platani magnitudinis, asperiore,  
qui siliquas lentium modo habet rufas &  
paruas: radicibus longis, ut gentianæ, co-  
loris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ  
densantur in succum, lycij exemplo. Isin  
arteriæ scabritia efficax habetur. uerum  
oportet ut linguæ subditus eliquescat. &  
stuant i stomacho, thoraci, ac iecinori com-  
uenit. sanat uescicæ scabiem, & renum do-  
lores, cum passo potus. idem eliquatus si-  
tim sedat, uulneribus illitus accommoda-  
tur: commanducatus ori prodest. recen-  
tis radices decoctum ad eadem conuenit.  
eiusdem farina pterygij commodissimè  
inspargitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γλυκύριζα.  
Latine Glycyrrhiza, & dulcis radix.  
Officinis corrupte Liquiritia.  
Germanis Ledritz, & Süßholz.  
Gallis Reclisse, Raygalisse.  
Hispanis Alcanix dicitur.

Lib. 7. com. Glycyrrhiza Actuarius saepe Glycyrrhizon, γλυκύριζα, & absolute γλυκύριζα, lib. 7. comp. ph. part. Galeno dicitur. Radice sola & succo ex hac recenti expresso, dulci & leuiter astringente ualeat, tepida, temperato proxima, modice humida, unde quia sitim sedat, & dolores quoq; dicitur. Asperitatem lenit arteriæ & uescicæ scabra. Melior nigricans & lenta, quam buxæ & fragilis. Hac hodie abundat ager Pabenbergensis, ubi copiosissime prouenit.

Centaurium.





## Centaurium magnum. Cap. VI.

**C**entaurium magnum folia habet iuglandis, oblonga, viridibrassicarum colore, serrata in ambitu, caulem, ceurumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papaverum, in rotunditate oblonga: flos coeruleus: semen cuius simile, ceu laneis floccis quibusdam inuolutum: radix crassa, grauis, solida tripudialis, succo praegnas, cum ad strictione aliqua & dulcedine acris, & rubescens. Amat solum pingue & apricum, ac sylvas & colles. copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide et Messenia, pluribusque locis circa Pheloen, Lyciam, & Symirnam. Radix conuenit ruptis, coeulsiis, pleuritidis, spirandi difficultati, ueteri tussi, sanguinem exuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua: ceteris in uino, item ad tormina, & uuluae dolores ramenta eius in collyrij forma uuluae subdita, menses atque partus extrahunt. succus eadem praestat. uulneribus prodest, nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniungit, carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur: In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio utuntur.

Græcè Κενταύριον τὸ μέγα. Latine Centaurium maius.

Officinae perperam Rhaponticum.

Germani errore officinarum decepti, ut Galli reupotic appellat.

Centaurij magni radix acris, astringens, subdulcis, et subamarum: uel cera glutinat, sanguinem reicientibus prodest: à Chirone centauro sagitta Herculis uulnerato inuentum, et nominatum Centaurium. Annis decem seruatur Theophrasto.



## Centaurium minus.

## Cap. VII.

**C**entaurium, limnesio aliqui uocauere, quoniam rigulae amet loca, herba origani aut hyperici similis, caule anguloso, palmum excedente: flore lichnidis, è puniceo in purpuram uergente: folijs rutae, prelongis & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, laui, & superuacua, quae gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa, suo illitu uulnera coaglutinat, uetera ulcera purgat, & cicatrice obducit, bilem crassosque humores per aluum exigit, si decocta deuoretur, ius decocti ischiadicis conuenientissime infundit: trahit enim sanguinem & dolorē leuat, succus oculorum medicamentis perque utilis: siquidē cum melle caliginem oculorum expurgat. in uellere appositus, menses & partus extrahit, epotus peculiariter neruorum uitij succurrit. Succus extrahendi ratio: Legitur herba semine pregnans, et dieb. quinque madefacta, decoquitur donec superemineat aqua, mox ubi refluxit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidamque contundunt, atque succum sicili non picato exprimunt, & in sole, lignea rude assidue mouentes, inspissant, quod si quid concretum faucibus uasis adhærescat, deradunt, reliquosque humori permiscet, noctu diligenter operiunt,

R 4



nam quos nocturnus liquores coalescere non sinit. Quæ autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut in gentiane mentione retulimus, præparantur. sed quæ ex corticibus humidis, aut confusis herbis factitantur, in sole, uti antè dictum est, coguntur. sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisque similibus succus, sic ex acerbis uvis melligo elicitur. lycium tamen, & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κενταύριον τὸ μικρόν, κενταύρις. Latine centaurium minus, sel terre, febrifuga Theodoro Gaze. Officina latinum nomen seruant. Germanis Taupent gülden frant, aurin, cetero gallien. Gallis fiel de terre nuncupatur.

Radicem inutilem, ramos, magisque, folia & flores ualere scribunt Dioscorides et Galenus. Si centaurium paruum Gal. amarissimum ac subastringens est, magnum autem acre, astringens, subdulce, quasdam utriusque centaurii qualitates & uires Mesuen confudisse, nihil miri est, cum etiam maius subamarum, & minus subdulce sit, dum recens est, cum etiam Galeno quibusdam conueniat. Succus enim minoris suppositus, menses foetumque educit: maioris autem radix, menses prouocat, mortuo: foetus extrahit, uiuos corrumpit, deijcit Galeno. Eadem pota, torminibus medetur, & sputum cruentum sanat cum uino, si febris abest: cum aqua si adest, Dioscoridi. Minoris etiam astringens qualitas ex hoc patet, quod uulnera glutinat, præsertim si recens tusa adhibetur: minor quoque uirens uulnera etiam magna glutinat Diosc. Gal. Maioris herba, adhuc recens, ulcera antiqua ad cicatricem difficillime eumtia, purgat, & ad cicatricem adducit Diosc. & Gal. quod Mesue minoris pulueri recte etiam tribuit amaro, ob id tergemini & siccanti, & quatenus astringit, glutinat, & cicatricem inducit. Cum etiam Galenus scribat minorem siccantem siccantibus & glutinantibus misceri, quæ sinus, & fistulas, & maligna ulcera sanent, & durities molliant: quamuis potionis non meminerit, nisi quod succum à quibusdam bibendum dari scribit in nervorum passionibus, seu siccantem, & absque molestia uacuante: eundem cum melle illitum oculis purgare ea, quæ luminis claritati obstant. Diosc. Gal. ad spirandi difficultatem, & tuum autem quæ lateris dolores, maius salubre faciunt ambo. Malus ad drachmas duas datur Diosc. & Gal. cum ad drachmam unam & dimidiam coctum ad dimidias in aquæ cotila Paulò. Mesue uero datur à tertia parte unc. unius usque ad sesunciam. Decocto autem ab uncia una ad uncias tres.

## Chamaeleon albus.

## Cap. VIII.

Chamaeleon albus ixia ideo aliquibus uocatur, quod quibusdam in locis uisum circa radicem eius inueniatur, quo pro mastiche utuntur mulieres. folia habet silybo aut carduo similia, asperiora, acutiora, nigroque chamaeleone ualidiora, caulem non promit, uerum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. flores purpureos, ueluti papporum lanugines emittit, semen cnici simile: radicem in lætis collibus crassam, in montosis uero graciliorem, in profundo albā aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabuli mensura, latis interaneorum tineas pellit, bibitur autem in uino austero, cum origanifer uel facti succo, hydropicis commodissime drachma in uino datur, etenim eos extenuat, contra difficultatem urinæ decoctum propinatur. hausta in uino, serpentium uenenis resistit. occidit canes & sues, mures item necat, subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hunc album chamaelonem nec herbarij nec medici, pace semper eruditorum dixerim, norunt, cum ipsam non ex caulem, sed longo prædita thyrsos demonstrant, ab hoc plurimum abhorrentem. Si quidem in terra serpit, in erinacei modum aculeos erigens, caule prorsus deficiente, sed è medio foliorum complexu statim à radice caput exerit, breui pediculo sultum, et spinis densioribus echinatum, in quo flores emicant capillati, purpurascens, qui se in lanugines uocatos pappos dissoluant, & tandem in auræ abeuntes uolitent: foetu cnico non dissimili, radice candida dulci. In neglectis agrorum limitibus, & montium glabretis passim inuenitur. Quo nihil temere nobis occurrit frequentius, & iter agentibus obuiam offert, nullum tamen apud nos, quod demuror, aliud nomen retulit vernaculum, uulgoque in solo cœsus spinarum reputatur, & wegdistel, miederdistel appellatur.

## Chamaeleon



## Chamaeleoniger,

## Cap. IX.



**C**hamaleo niger, folijs scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta uiderentur. caulem emittit dodrantalem, crassitudine digitali, subrubrum & in umbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores; radice crassa, nigra, dēsa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, commanducata mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito atramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axūgia, scabiem abigit. eadē cum sibi sulphur & bitumen asciuit, & cocta in acetato illinitur, impetiginēs absterget. decoctum collutione dentium dolorem mitigat. cum pipere & cera oblita radix, dolenti denti auxiliatur. radice concisa, & in aceto decocta dentes fouentur. eos quoque frangit, si scriptorio stylo ferat.

Crocodilium.

mens ad moueatur. uicta cutis in facie, uittiliginēs cum sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur. phagedænas, tetraçq; ulcera illitu sanat. Quare chamaeleo uocetur, à uarietate foliorum euenit, mutant enim cum terra colorem: hic uiridia, illic albicantia, aliubicoculea, nonnusquam rubra inueniuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chamaeleo niger Latinis. Grecis Χαμαλέον ὁ μέλας.

Officinis Cardopatium & carduus suarius. Germanis Eberwurz.

Recentiores radices cardui suarij siue cardopatij drachmā pōdere in uino sumptū contra pestilentie contagia pōdesse tradunt. Eandē etiā in aceto decoctā. Contra scabiem, impetiginem, & omnes cutis fœditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decocto lauentur, idem dentium etiā dolori succurrit. Euchsij hanc radicem Chamaeleonem album facit.

## Crocodilium.

## Cap. X.

**C**rocodilion chamaeleotis nigri figuram habet. Nascentur in siluosis, radice longa, leui, aliquantum lata odore





odore, ut nasturtij, acuto. Feruefacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per nareis pellit, datur lienosis, eos euidenter adiuvans. Semen ei rotundum inest, duplex uti scutum, quod suapte ui urinam ciet.



#### NOMINA ET EXPLICATIO

Græcè Κροκόδ' ἰλιος. Latine Crocodiliō, uel crocodiliæ. Officinis. Germanis Weiß oder schwarz garten distel. Ruellius omnino arbitratur eam esse, quam hodie Carlinam uocant. Cuius picturam exhibemus. Chamæleontis enim nigri figuram habet, cui adeo similis est, ut huius temporis uiri multi eruditi hanc ueram chamæleonem nigrum esse credant.

Dipsacum, siue labrum

Veneris. Ca. XI.

**D**ipsacum aculeatarum generis est, caulem habet altū, spinis horridum, folijs laetue, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, cōcauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur: unde diplaci, quasi sitientis, nomen traxit, in cacumine caulis: singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta, candida spectantur, dissecta quæ medullatenus, uermiculos ostendunt, Sannat rimas sedis, fistulasque, si tusa & decocta in uino radix, usque dum sit crassitudo cere, immitatur. Medicamentum græa pyxide recondendum. A iunt fornicationibus, uerrucisque pensilibus re medio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, prodūtur quartanis febribus remedio esse.

#### NOMINA ET EXPLICITIO.

Græcè Δίψακος. Latine Dipsacum, Labrum Veneris. Officinis uirga pastoris, fistula pastoris. Germanis Karden distel, weberkarden. Gallis chardon à cardir nuncupatur.

Dipsacos caespina est, quæ rudes pannos, uelut echino quodam expoliunt, detractisque floccis fibrisque, quæ uocant crocydas, concinnant quæ etiam detrita uestes mangonio fullonum interpollantur, & in uillum muricatis orbibus restituantur. hinc fullonius carduus cepit appellari. Germanicè weberkarden dicitur, quod lamsficia unctis uerticibus aculeorum pectantur. Dipsaci singuli echini è rotundo in oblongū quadam tenuiturbinantur, inter quorum spicula pumceus flos emicat. his disiectis, in medulla uermiculos identidem nobis licuit inuenire: qui non offenderunt, parua admodum uidentur impen disse diligentiam. hoc uermiculo aliquoties sanauimus uulgaris experimento panaritium, quod a pollema Germani den wurm am finger appellant, malignum quidem ac omnem curam nisi mitigetur omnino respuens. Seritur hodie multis in locis magno colentium prouentu, ut pote cum echini fullonum mangonio & complendis pannis oppido quam utiles: in syluestri dipsaco inutiles ac planè inualidi, & ut ita dicam, nullius usus.

Spina alba.

Cap. XII.

**S**pina alba nascitur in montibus & syluosis. folia fert albi chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata. caulem supra bina cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine, albicantem, intus cauum, in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum, flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extulsiunt, efficax est. urinam cit. tumoribus



Spina alba.



bus illinitur. decocto eius dentes in dolore collui prodest. eorum semen couulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. gestatū pro amuleto, serpētes abigere traditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē ἀνάδρα λευκή. Latine spina alba. Germanicē Vchdistel / Mariēdistel / frawē distel. Gallis espine blanche. Italis spinus albus dicitur.

Nobilior officinis Pæno quā patrio nomine, quæ mihi videntur sponte vel gratis in hanc gentem defecisse: Bedegar hodie uocant spinam illam. Quandoquidē hæc Bedegaris spinis infusa heret, folijs Chamæleonis albi, castigatoribus candidioribusq; caule tripedaneo, pollicari crassitudine & inani, ovali super uerticē echino, flore purpureo, enici sætu, sed totūdiore & c. Spina alba semen potum recentioribus contra incipientem pleuresim & laterum dolores, remediū est.

## Spina Arabica. Cap. XIII.

**A**rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat. ipsa siquidē strigit. ad sanguinis reiectiones, mēlium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix etiānum

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ualet. Prouenit in asperis.

Spina Arabica uel Aegyptia, Syria, similis esse creditur albæ spinæ quæ in fruticem assurgit. Duo habet genera, candidum & nigrum, hodie nobis incognita. Arbor tota præterquā caudice spinis horret. Semen in siliquis est. Flos medicamentis utilis, & coronis iucundus, gūmi profundit, non cortice sed in uasculo. Hæc ferè eadem de arbore acaciam fundente. Plinius de Arabica & spina acacia seorsim, ut differentium tractauit. Galenus & Paulus eandem & Arabicam & Aegyptiam appellant.

## Carduus.

## Cap. XIII.



**C**arduus, Greci scolymon uocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ nigriora, & crassiora. caulem longū addit foliosum, capite spinoso, radici nigra & crassa, quæ illita, graueolentiā alarū totiusq; corpis emendat. itē si decocta in uino bibatur, copiosam aut urinā foetidāq; expellit. herba cū recēs tenere scit in olera asparagi modo transit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecē Σκόλυμος. Latine carduus. & Strobilus. Columella Cinara dicitur. Officinæ Arcocum corrupto nomine uocant. Germanis Strobildora. Gallis artichault dicitur.

Romani hodie carchiopos nūcupāt, q; ut herba ita & nomen ab Italis petiitum est. Adhibentur conuiuijs cinara asparagi modo iuribus incocta, & ex oleo, sale & aceto. Folia quoq; incūte hyeme obruant humo non nulli, sic candorē ascescere & amaritudinē exuere promittunt, ut in hybernos cibos gratius admittantur.

## Poterium. Cap. XV.

**P**oterium, Iones neurada uocant, large fruticat, cortice obductū tenui. spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tra-



DIOSCORIDIS

Ribes.

Schlehen dorn.



gacanthę proximis  
folijs paruis, rotun-  
gis: flore exiguo, cā-  
didi coloris: semine  
nullius usus, sed gu-  
stu acuto & odora-  
to. Nascitur in aquo-  
sis, & collibus. radi-  
ces demittit binum  
ternumue cubitorū,  
neruosas & firmas.  
quę proxime terram  
recisā, dant succum  
gummi similem, tu-  
se, præcisus neruis &

uulneribus glutinandis illinūtur. decoctum quoque eius  
neruorum affectibus prodest,

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ianus Cornarius doctissimus atque excellentissimus Medicus, Galeni  
ca lectionis summus restaurator, de Poterio ita scribit.

Huius fruticis cuiusque fructus meminerunt & quidem diligenter Diosco-  
rides, Galenus, Paulus, ac Plinius, cūque is (nisi penitus fallor) quem hodie  
Germani Schlehen dorn. fructum uero Schlehen appellant. Sed Ga-  
lenus quidem & Paulus de fructu penitus silent. Dioscorides autem fru-  
ctum ferre acrem & inutilem dicit, eumque nullo nomine insigniri. Pla-  
nius uero semen pro fructu conuertit, itidemque nullius usus esse, sed ta-  
men gustu acuto & odorato præditum esse, testatus est, palam ostendens  
se non scire quæ res sit Poterion quam describit, ut etiam plerisque o-  
mnibus, maxime Dioscoridis interpretibus ansam dederit putandi, her-

bam ab ipso, non spinam & semen describi. Ex Græco autem authore aliquo & fortassis ipso Dio-  
scoride, uel etiam inde, unde etiam Dioscorides sua transcripsit, hæc nobis conuertit, in quibus reddens  
dis quam felix fuerit, ut eumque patere possit utriusque Dioscoridis uidelicet & Plinij uerba apud u-  
trumque authorem legat. Quod igitur ipse quid esse Potirion ignorauit, non difficile est iudicare:  
Græca Dioscoridis uerba, cum ipsius uerbis conferenti. Verum tantum abest, ut nos dubitemus Po-  
terium eum esse fruticem quem Schlehen dorn Germani uocamus, ut si stomachicum pharmacum præ-  
paraturus essem aliorum potiorum inopia, eius fructu uti non dubitarem. Neque auertor aut ex eo  
quod Galenus & Paulus de Poterio asserunt, aut ex eo quod Dioscorides inutilem dixit, cum ad stom-  
tici medicamenti confectionem, commodissimus sit, & ne esse quidem alius possit, quam is quem indica-  
ui. Poterij fructus alio nomine Brabyla dicitur Galeno lib. 6. comp. ph. part. & lib. 2. de aliment.  
Iacobus Syluius arbitratur eum fruticem qui hodie Officinis barbaro nomine Ribes appellatur; Po-  
terium esse Dioscoridis, de quo alij iudicent.

Acanthium.

Cap. XVI.

**A**canthium albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, & lanugine  
Araneoſa obductis, ex qua collecta & neta, uestes bombycinis similes textūt.  
Folia uel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Inuenitur in agris propter limites & uias spina candicantibus folijs, albæ spinæ non dissimilibus,  
quæ per ambientem oram tantum aculeos erigunt, & spissa pubescunt lanugine, quæ facile quidem in  
flocculos depecti posset, sed usque eo fragiles, ut inde nec telas ordiri, nec si la ducere quis ualeat. Acan-  
thium sit, nec ne, asserere non auiſim,

Acanthium



## Acanthus,

## Caput XVII.

**A**canthus, Romani pæderoram  
 Auo cāt, nascitur in hortis, petros  
 sis, & riguis. folia habet multo lactuca  
 ceis latiora, & longiora, erucæ diuisu  
 ra, nigricantia, pinguis, læuia: caulem  
 binum cubitorum, digitali crassitudi  
 ne, læuem, propè uerticem ex interual  
 lis circumdatum foliolis, ceu nucamen  
 ta quædam oblonga referentibus, spi  
 nofis, è quibus flos prodit albus: semē  
 oblongum, luteum: caput thyrsi spe  
 cie. radicibus nititur longis, mucosis,  
 rubris, & glutinosis: quæ uis igni &  
 luxatis artubus illitæ subueniunt. pos  
 tæ urinam ciēt, sed aluum cohibent.  
 ruptis, conuulsis, tabem sentientibus,  
 mirè profunt. Nascitur & syluestris a  
 cāthus, scolymo similis, aculeatus, bre  
 uior quàm satiuus, & is qui in hortis  
 prouenit. cuius radix ad eadē ad quæ  
 superior efficax.

NOMINA ET  
explicatio.

Græcè ἀκανθῶς. ἢ ἀκανθα.

Latine Acanthus siue Acantha.

Officina à similitudine, quæ eius folia cum  
 anterioribus urforum pedibus habent. Brancam  
 urfinam uocant. Ad quam etiam similitudinem  
 Germani respicientes, Beren Flaw/ Beren ia



pen/ Welsch beren Flaw/ nominant, Galli brantæ ursine.

Dioscoridis designatio (nec fallor) omnino eam noscitur explicare, cuius nomenclaturam & pictu  
 ram dedimus, siquidem quinis senisue folijs extenditur, lactuca longioribus, multo latioribus, ut quæ  
 nonnunquam cubiti longitudinem æquent, pinguibus, carnosis, erucæ ritu laciniosis, nigro colore nitenti  
 bus, caule tripedaneo, digitali crassitudine, læui, cuius uertex foliorum in aculeos molles exeuntium  
 cingitur uallo, & uelut in æchiscentem paniculam nucamentumue fastigatur. Summatim scapus e  
 rumpit thyrsi figura, flores candidi, semen oblongum, luteū, radicibus oblongis, pinguibus, lenis. Hæc  
 folijs liras urcorum, puluinos & porcas obuclat: nec alia nobis adhuc uisa fuit, cui descriptio ad amu  
 sim magis respondeat.

Hæc non ita esset in aculeatarum censu, nisi foliorum extrema per caulem in spinulis occalesce  
 rent & cet.

Acanthus uel acantha, folijs modicè digerit, radice siccatur, incidit, est tenuium partium, emolliend  
 alio iniectionibus hodie destinata.

## Anonis.

## Cap. VIII.

**A**Nonis, quam aliqui ononida appellant, ramos habet fruticosos, dodrante  
 maiores, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus ro  
 tundis, folijs lenticulæ pusillis, ad rutæ aut pratensis loti folia accedentibus, sub  
 hirsutis, odoratis, non iniucundè olentibus. Muria conditur antè quàm spinosa  
 fiat, cibus gratissima, rami acutioribus spinis, & ueluti spiculis firmioribus hor  
 rent. radicem mittit candidam, quæ ex calfacit, & extenuat. huius cortex ex ui  
 no potus urinam ciet, calculos comminuit, margines ulcerum erodit. radix cum  
 decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat, decoctum eius post  
 hæmorrhoidas sanare creditur.

S



DIOSCORIDIS

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὄνωις, uel ἄνωις.

Latine Ononis, aliter anonis, ut Theophrasto de Galeno.

Officinis acutella, resta bouis, remora aratri.

Germanis Zahweddel, Stallfrant, Ochsenbrech, Katzenper, Weisstein frant.

Gallis Bugraues, Bugrundes dicitur.

Nihil in aruis hac peste frequentius occurrit, sed cultus maxime gaudet. Hac uiret post menses restibilis aer, quæ non modo ingredientium pedes offendit, sed aratrum remoratur, illi se tam pertinaciter inuoluit, ut uix possit explicari. Latior tamen in profcisso, iter atq; solo cõsurgit, plurimum alieno frugum labore proficiens.

A salgamarijs olim sale condecabatur, ut Dioscorides testatur, sibi gratissima, qui modus hodie prorsus obsoleuit.

Leucacantha. Caput XIX.

**L**euacantha prædita est radice cyperi, ualida & amara, quæ manducata dolorem dentium fedat, ueteri laterum dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex uino potu, eadem ruptis & conuulsis medetur, radice epotus succus eisdem præbet effectus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Λευκάκυνθα Græcis, Latinis alba spina. Eius radix cypero similis, amara solidaq; differt ab ea quæ diuissim ἄκυνθα λευκή, id est, spina alba nominatur, hodie incognita.

Tragacantha.

Caput XX.



**T**ragacantha radix lata & lignosa, summo cespite nititur, unde furculos humiles, robustos, latissime fundit, in quibus minuta folia, multa, nonnunquam tenuia exoriuntur, quæ sub se spinas albas, rectas & firmas occultunt. Est etiam nuda tragacantha lachryma, quæ uulnerata radice manans concreuit. Præstat pellucens, gracilis, læuis, syncera & subdulcis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas uoc-

ces, ceterasq; destillationes, cum melle in delinctu. subdita quoq; linguæ liquefcit. in passio madefacta drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & uesicæ roliones, mixto cornu cerui uiso & eloto, aut scissi aluminis momento.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Lib. 8. simp. Herbam utpote peregrinam Germanis, & prorsus exoticam nostrates herbarij nõ norunt, lachry-  
Lib. 7. sim. mam tamen nullæ non cognoscunt Officinæ, interpellato nomine dragantum gummi nunc appellantes,  
in cancano. cuius innumerus propemodum inoleuit medicis usus. hæc lachryma tragacanthos, tragacantha, uel tra-  
Lib. 7. com. gaganton, radicibus incisis Dioscoridi, sponte Theophrasto profluens: uim habet similem gummi em-  
pharm. par. plasticam quandam siccantem, acrimoniam leuiorem, arterie asperitatem lenit cum uino macerata &  
leuigata, ut cancani radix, uel in aqua die uno. Tragacantha fructus, lib. 10. composi. pharm. part.  
Tragacantha alba Actuario sepe.

Eryngium.

Caput XXI.

**E**ryngion a culeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale cõdita, in ci-  
bos recipiuntur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromati-  
ca. Eryngio, cum adoleuerit, complures ramulorum striæ rubet. in quorum sum-  
mitatibus globosa capitula, durarum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circũuallantur, quorum colos aliàs uiridis, aliàs albus, interdũ cœruleus inue-  
nitur





nitur. radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfactoriam. pota menses & urinas pellit. tormina inflationesq; discutit. contra iecinorum uitia, serpentium morsus, & hausta uenena, cum uino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacæ drachma una. appesa illitaue, tuberculâ discutere præditur. pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἔρυγγιον.

Latine Eryngium.

Officinis cœcum capita, quibusdam falso Secacul.

Germanis Brachen dystel/ Wallen dystel/ Wanstrew/ Rä-dendystel.

Gallis panicault dicitur.

Dioscorides una Eryngij specie contentus est. Plinius albi & atrî discrimina fecit, eryngem statuens duram, fruticosam, spinosis folijs, caule geniculato, cubitali & maiore aliquando, aliam albicantem, aliam nigricantem, radice odorata. Satius, ut inquit, quædam est, sed & sponte nascitur in asperis & saxosis: in littoribus maris durior, nē

priorq; folio apij. Ex ijs candidum Latini dicunt cœcum capita uocari.

Eryngij radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida, ad primū ordinem, sicca ad secundum: tenuium partium, ciet menses & urinas, moribus uenenatis resistit, status dissipat.

## Aloe.

## Caput XXII.



**A**Loës folium scille similitudinem habet, crassum, pingue, modicè latum, rotundum, retrorsus pandum. folia utrinque gerit ex obliquo spinosa, rariusculè striata, breuia & curta. caulis emittitur nō dissimilis antherico. flos albus, fructus hastulæ regię cognatus. graui tota est odore, & gustu amarissima radice una, ceu palo, in terrâ depacta. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adfertur. Nascitur etiā in Asia & Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis, ut in Andro. non ualde succo extrahēdo idonea, sed ad glutinanda uulnera sanē quā utilius, si detrita illinatur. Duo succi genera, quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse uidetur, alterum ad iecinoris imaginem uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, niti-

da, calculorum expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, facile liquefcens, eximiæ amaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax. Gummi eam adulterant. quod deprehēditur gustu, amaritudine, & ualido odore: eoq; argumēto, quod digitis friata nō ad minima usq; frustra resoluitur. Nec defunt qui acaciam immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnū allicere, & corpora densare, aluum resoluerē. stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut egelida pota. sanguinis reiectiones sistit. regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. deuorata cum resina, aut cum aqua, uel melle cocto sumpta, aluum soluit, purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumitur. alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat us-



minus stomachum infestent. sic caglutinādis uulneribus inspargitur, ulcera ad cicatricem perducit, cohibetq; eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. disrupa puerorum præputia iungit. condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. pterygia ad cicatricem ducit. liuores & insignita, ex melle tollit. priuatim scabras lippitudines, pruriginēsq; angulorum permulcet, dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum uino. tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulceribus, cum melle & uino proficit, oculorum medicamentum torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torrerī. Lauatur, ut quod sit arenosissimum, tanquam inutile sublidat, & leue ac pinguiissimum assumatur.

Græcè ἄλoῃ. Latinè Aloë.

Officinis genuinum nomen seruaui. Germanis *Aleptic/Bitter Aloes*.  
Gallis *Aloës, & perroquet*.

Aloe herba semper urens, nunc in multis Gallie occiduae domibus, ad ostentationem appendis-  
lita, & eius herbe succus calidus in fine ordinis primi, aut initio secundi, siccanz ordine tertio, us-  
que lemper amara est, astringit modice, idq; sine morbo, eecoproctica est, id est, stercoz diutius, &  
eustomachos, precipue elota: repellit, digerit, terget parum, quantum scilicet ulceribus puris non sit  
molestum, seriuz gluinat, ulcera dyspepologica, praeterim sedis. tuendi oris, gluinat: & hlegmo-

Lib. 5. Simp. *nas harum partium sanas, aqua subacta. Sumpta sepe hemorrhoides uenas aperit, uel a tota substat,*  
 cap. 13. *uel quia calida: crasse effrenit, & pro modo tersionis mordax, quamuis anasomatia sint: acris, &*  
 Aph. 47. li. *rea, admota autem sanguinis florem cohibet, quia effringit, & emplaistica est, ob id emphrastica, id*  
 6. *est, obstruens dicitur. cap. 11 lib. 5. simp. nihil enim sumitur, & adpotum uires habet assem lib. 5.*

Lib. 5. simp. Tem de sinapi, & lib. 8. methodi de mulsfa. Aloë ut rose, melle est facultatis : nā amara subfiantia tē-  
cap. 11. gunt, astringente ubera contrahunt, & cicatrice legunt. Opima est bilis eius & Indica. Velut etiam

Lib. 4. com. ex Cæloſyria, & Arabia. Ex magna Syria humidior, Arabicam tamen tanquam omnium uiliſſimam, phar. part. & ſolis mulomedicis uſurpandam damnavit Meſues: Et inde de caballinam uocant, nigram, obſcuram,

Lib. 6. simp. feci simillimā, a mari sumā, odore tetro, arenosā ut optimā sedimentū, tertiā Armeniacā, u. d. citr.  
Lib. 8. comp. Primā succotrinā, secundā hepaticā seu Persicā, quartā bonitate Arabicā statuum, Mesues et alij. A

pharm. part. Aloë lota minus alius ducit: multum enim uirtutis medicamento se lauando deponit, magis tamē uēre<sup>ro</sup>  
Li. 7. metho. borat, Aloë etiā lota his maximè aduerfa est, quæ citra paucos humores intēperie calida sicca laborat.

Lib. comp.

phar. part.



Abſinthium. Caput XXIII.

**A**bsinthium, aliqui bathypicon, herba uulgo cognita. Præstantius in Ponto & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & astringendi. bilem expurgat, quæ & stomacho & uentri inhaeret. urinam cit. crapulam præsumptum arcet. ad inflationes uentris, & stomachi dolores prodest, cum seseli & nardo galli copotum. fastidia discutit. arquatos sanat. made facti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum. menses cit potum, aut cum melle appositum. Contra fungorum strangulationes conuenienter ex aceto bibitur. aduersatur ixiæ uenenis cum uino. item cicuta, & muris aranei morsibus, & draconum marino angina eo cum melle & nitro perungitur, & epinyctides ex aqua ad fugile lata & oculorū caligines ex melle illuntur: item auribus, si manat sanies. dentium auriumq; dolores decoctum uaporis suffitu compefcit. decoctū in passo dolentibus oculis oblinitur: item præcordijs & iccinori, tritum cum cerato. cyprino: stomacho quoq; longa ualitudine laboranti, cum rosaceo



rosaceo. cum ficis autē, aceto & loliacea farina, aquæ inter cutē lienosisq; subue-  
nit. Vinū ex eo fit, quod absinthiten uocat, præsertim in Propontide & Thracia,  
quo ad antē dicta utuntur, cū febris carēat: alioquin in æstate propinat, & acceptā  
huic uino incolumitatē referat. In sparsum arcis absinthii, uestes ab erodentium  
iniuria uindicat, culices ex oleo perunctum abigit, & à corpore ardet. atramen-  
tū librariū diluto eius temperatū, literas à muriu erosione tuetur. Existimatur li-  
quamentū eodē præstare effectus. Atramē portionibus improbat, quoniam  
stomachum malè habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta amurca, liquamen-  
tum adulterant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè & ἰδιότ. Latine Absinthium. Officina Latinum nomen seruant.

Germanis Wermitt, & Elz. Gallis alcyne, absince dicitur.

Absinthium triplex, forma, sapore, facultate planè diuersum, ut interim natales omittam. Primū ge- Lib. 2. Me-  
neris nomine dicitur, quale præstantissimum est Ponticum. Id folio et lore est multò minore, quàm cetera thodij.  
ra absinthia, & odore non insuauis, sed aromaticum quid præferre, qui reliquis omnibus plane cædus:  
quæ propter hæc fugienda. Utendum autem semper Pontico, ad uentriculi, & hepatis phlegmonas, ad Lib. 8. com-  
tergendum, purgandum, subducendum prauos humores stomacho hærentes, roborandum dictas partes pharm. part.  
contrahendo & astringendo. Cum enim omni absinthio duplex sit facultas & qualitas, in Pontico a- Gal. 6. simp.  
stringens quidem plurima est, amara uerò exigua: ob id calidum est excessu primo, siccum tertio. In cæ-  
teris absinthijs, ut abrotano, amara est uehementissima, astringitio autem obscura, aut prorsus nulla gu-  
stus sentitur, ob id hæc stomacho sunt inimicissima. Ponticum præterea terget sordes tunicarum uetri Lib. 6. Sani-  
culi, non tamen si quid altius in eo inbitum est foras extrahit, aut expellit: aut saltem parum id præsta-  
re ualeat, ob iunctam insignem astringendi facultatem. Hiera autem picra propter id excogitata salu-  
briter, illud ipsum potest. Ponticum autem uidetur esse, quod Romanū Mesues uocat, quodq; passim ho-  
die uisitur, & cuius picturam exhibemus. Diuersus enim Mesues Galeno tantum est, quod siccum ter-  
tio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in alijs simplicibus  
multis est inter medicos etiam doctissimos: quorum unus in fine, uerbi  
gratia, primi uel secundi, alter in principio secundi uel tertij intelli-  
git: quæ ambiguitas etiam Galeno ipsi est in anetho, prasio, ruta agrestis,  
& alijs permultis. Nam quod succum eius dicit Mesues obnitrosam qua-  
litatem nocere stomacho, ipsi Galeno id nō aduersatur scribent, succum  
longè ipsa herba esse calidiorē. Nostrum autem uulgare absinthiū sar-  
mentosum, folio & flore multo maiore, quàm cetera tria absinthia: uete-  
ribus inter absinthia comprehensum non uidetur, nisi esse uelis absinthiū  
primum Dioscoridis, quod uulgo aloina dicit, & Βαλβύρινος, uel po-  
tius Βυρβύρινος uocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui subscri-  
bitur. Dioscoridi à qua uulgo Gallorū aloinum appellat. Id autem si pri-  
mum in Dioscoride recipias, quæ nam alia in eo statues? Tamē id ad lum-  
bricos, uti & santonicum, est efficacissimum, sumptum & admotum.

Accipitrima.

## Marinum absinthium. Cap. XXIII.

Absinthium marinum, quod aliqui seriphum uocat,  
copiosissimū in Tauro mōre, iuxta Cappadociam,  
& in Taphorisi Aegypti gignitur, quo Isiaci pro oliuæ ra-  
mo utuntur. Herba est tenuis, abrotoni parui similitudi-  
ne, repleta minutulis feminibus, sub amara, stomacho ini-  
mica. Ea grauiter olet, & cum quadam calfactioe adstrin-  
git per se aut cū oryza cocta, interaneorū animalia, te-  
retesq; tineas, adiecto melle, enecat. aluū leuigat. cū edu-  
lio\* autem uel lenticula decocta, eadem præstare potest. \*De fructo.  
pecora maximè pinguescūt hoc pabulo. Tertium genus  
absinthio assignatur, quo Gallia alpius finitima scatur:  
id patrio nomine Santonicum uocant, regionis in qua na-  
scitur cognomento, absinthio non dissimile, uerum suba-





marum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ seriphium potest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Marium Absinthium aliqui, Dioscoride teste, Seriphium uocāt, herba est fruticosa, prætenibus cirris, paruo similis abrotono, exiguo semine, prægnansq; subamara, stomacho mimica, graui odore, linguam astringens, et leniter exalaciens. Huius semine medici tinctis, uermibus, nec moluntur, ob id semē cōtra lūbricos uocant, Ger. Wurm samē. Galli Barbotine appellant, nōnunquā uerō moriē uer miū. Officinæ ipsi norūt appellationib. ea uerō herba cuius picturā

Euchsius falso pro Seriphio absinthio exhibet, accipitrima herba est, à graui odore herba foetida, Ger. Babich samē nuncupata.

## Abrotonum. Caput XXV.

**A**brotonum duorum est generum, scemina quādam arboris specie fruticans, candicat, circū ramulos folijs, seriphi modo, minutim incisis. floribus referta est, comātibus in summo, fulgore auri, corymbis, quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cum graui tate quadam, & amaro gustu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas uocatur, sarmentolum, gracilibus ramulis\* uti absinthium. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syriæ Hierapoli. Crudum semen tritum & feruefactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, urinæ angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus, in uino potum exitialium uenenorū antidotum est, horribus ex oleo illinitur, serpentes & substratu & nidore fugat. contra ictus eorum cum uinoporum prodest, priuatim efficax contra scorpionū & phalangiorum uenena, oculorū inflammationibus cōmodē illinitur, cum cotoneo cocto, aut pane, tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit, irini cōpositionibus admiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀβρότον. Latine abrotonum.

Officinæ genuinum nomen retinuerunt.

Germanis Stabwurz, Schofwurz, Gertwurz.

Gallis Auron, auronne.

Abrotonum scemina folijs seriphio, & cypresso proximis aliorib. Mas uero abrotonum generis nomen tenet, calidum sicū tertio recessu à medijs, admodum amarum, coma cū floribus utile, ut absinthium, & cineribus suorū sarmentorū ad pilos reddēdos. Sum qui arbutur chamæcyparissū abrotoni specie esse, uidelicet sceminā, qd affirmare nō ausim.

## Hyssopum. Caput XXVI.

**H**yssopum, herba nulli nō cognita, duum generum est, montanum & hortense. Optimum est Cilicium. Vim habet extenuandi & calfaciendi. decoctum cum finicis, aqua, melle, & ruta, potumq; peripneumonicis, diuturnæ tussis, suspiriosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur tinea, enecat, idem facit, si cum melle delingatur, crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto multo eorum, ad subducendam aluum, cum ficis uiridibus detritis manditur, uehementius, addita iri, cardamomo\*, aut irione, deicit, colorem in corpore fouet, lieni, & aquæ inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex uino illinitur, cum feruente aqua impositum, sugillata discutit, cū decocto ficorū, optimē anginis garga



\*tenui semine.



Lib. 6. simp.

\*aliq. nasturtio.



gargarizatur decoctum cum aceto, dentium dolorem in collutione sedat, inflammationes auricularum uaporis suffitu discutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὕσσωπος. Latine Hyssopus.

Officinae genuinum nomen seruant.

Germanis Kirchhyssop/ Flosterhyssop. Gallis de hyssope dicitur.

Hyssopum calidum siccum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta ex pulmonibus extrahit, humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions tergit: montanum est efficacius bortenfi: Cilicium præsert Dioseorides, Creticum uero commendatur Archigeni, lib. 8. comp. ph. part. Gal. lib. 8. c. 80. le. in Chrysocome, & origano Heracleotico. Quædam à Dioscoride Hyssopo tribuuntur, quæ in nostro desiderari uidentur. Cum florum spica legendum est, aut cum semine turget.

Gal. lib. 8. c. 80.  
ph. ph. part.



Spica. Lauendula.



## Stoechas.

## Cap. XXVIII.

Stoechas, iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massiliæ gignitur, unde cognomen tum accepit. herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris uitia efficax est antidotis miscetur. uiscera omnia & uniuersum animantis habitum extenuat. ab obstructionibus & farctuliberat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Stoechas nascitur multa ubiq; terrarum, copiosissima in Cretæ insula, & dictis Stoechadibus insulis, in mari iberico, à quibus appellata est: nascitur & in Arabia, unde & Arabica uocatur. prouenit etiam hodie in multis Germaniæ hortis. Amara est, modicè astringit, proinde tenuat, terget, obstructa liberat, roborat uiscera, & corpus reliquum, putredinem arcet. Habitatior atque melior nutrita & præstantior ex insula Creta petitur lib. 1. antid. Gal. li. 1. antid.

Est in Gallia narbonensi & multis Germaniæ locis stoechas Cretica uulgo dicta, à coma & corymbi floris colore luteo. Dioscoridis Heliochrysium, et Galeni Amaranthus uidetur: à terra autem flore purpureo, de quibus plura in sequentibus.

Hic locus postulat ut de nostro Germanico narado, quæ omnino Stoechadis speciem esse arbitramur, differamus, quæ ubique nascens fruticat, folio crassiore, carnosio, angusto, colore lauido in candidum uergente, frequentibus spicis in aristas parvis, flosculis purpureis. Gaudet apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, ut omnes flores odoris iucunditate prouocet, qua dote uestibus inseritur. Duum cernitur generum, Vnum procerius adolefcit, & maiorem spirat odorem: quod quia non minus quam nardum placet, sibi spica nomen apud nos arrogauit, Germani spica nardi, Galli aspice appellant. Alterum cum amplitudine, tum odore minus. quod quia balneis, & hominum lauacris expetitur, elotaque omnia, si permisceatur, odoris suauitate, commendat, & lauanda uulgo uel Lauender coepit nominari ceterum similima.

Veraque perpetua coma canescit, exitu ueris, Iunio & Iulio mense spicatur. Vis ei calfactoria & resiccans abscessu secundo, tenuibusque constat particulis, nec multo à natura & forma Stoechadis distidens.

Hallucinantur qui pseudonaradum arbitrentur, falsi quædam nominis cognitione.



## Origanum.

## Cap. XXVIII.



**O**rganum Heracleoticum, quod & cunilam uocant, folium habet hyssopo non dissimile, umbellamque non in rotæ speciem orbiculatam, sed ueluti multifidam, semine in summis uirgis haudquaquam denso. Ex calfacit, unde decoctum cum uino potum, demorsis à serpente conuenit. si cicutam aut meconion hauserunt, ex passo: si gypsum aut ephemerum, ex aceto mulso propinatur. ruptis, conuulsis, hydropicis, cum fico esui datur. aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit. menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest. Succus urentis tonsillas, uuam, & oris ulcera sanat. & per nares, ex oleo irino infusum, trahit. aurium dolores cum lacte mulcet. conficitur ex eo, & ceptis, & rhois frutice quo ad obso-  
nia utuntur, uomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo uase per dies bis uicenos insolatis, dum canicula sydus flagrat, herbae autem substratu serpentes fugantur. Quæ onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen ueluti coniunctos corymbos habet. Vis ei organi heraclei, sed multo inefficacior. Syluestre origanum, aliqui panaces heraclion, alij cunilam uocant, ex quibus est Nicander Colophonius: folijs est origani, ramis tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbellæ anethi insunt, flores candidi: radix tenuis, superua cua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex uino poti auxiliantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὀρίαννον. Latine Origanum.

Officine genuinum nomen seruauit.

Germanis wol gemüt / roth dosten / Costeng. Gallis de lorigan, dicitur.

Organi Dioscoridi hoc loco plura produntur genera, omne uero genus calidum sicū tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganum etiam substringit: præfertur montanum, uel Creticū, uel Heracleoticum.

## Tragoriganum.

## Cap. XXIX.

**T**ragoriganum tenuis frutex est, syluestri serpyllo aut origano similis, folio & ramulis, quibusdā in locis lætius uirentiusq; inuenitur, latiorib; folijs, <sup>\*Gymosum.</sup> satis glutinosum. \* alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui præsum uocauere. Optimum est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Chooq; proueniens. Omnia ex calfaciunt. urinam cient. aluo accommodantur. decocto poto bilem deiciunt. lienosis ex aceto bibere prodest. contra pota ixiæ uenena in uino bibuntur. menses trahunt. peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur, grata ac mitis eorum potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acida ructanti, imbecillōque traditur. item si à marina iactatione nausea, & æstus præcordiorum excitetur. tumores uero cum polenta illita discutiantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Tragoriganū Dioscorides in duo genera dispecit, quæ à Plin. tribuuntur Heraclio. Ruellius suspicatur hanc Gallis mastichinam herbam dici, quoniam lentore quodam interdum madescit, aut quod iucundum mastices spicet odorem, studiose nuper in hortis ceptam ferri, frutico serpylli uel origani, eolicis ramisq; non dissimilibus, folijs sampsi, flore paruo, odorato, in umbella, in qua propendunt incani hircorum uilli: unde ductum Tragorigani nomen existimo. Odore sampsi non cedit. Gero manis adhuc incognita, Herba masticha officinis Gallicis appellatur,

Pulegium



## Pulegium.

## Cap. XXX.



**P**ulegium herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit, menstrua, secundas ac partus eiecit. pulmonis vitia ex melle & aloë potum extrahit. conuulsis auxiliatur. nauscas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. atram bilem per aluum exigit. bibitur in uino utilissimè contra serpentium morsus. defectos animo re-creat, cum aceto naribus obiectum. gingiuas arefacti cinere corroborat. illitum cum polenta inflammationes omneis sedat. podagris per se subuenit, impositum usque dum rubescat locus. cum cerato uaros extinguit. lienosis cum sale utiliter illinitur. decoctum eius ablutas pruriges mitigat. conuersas uulvas corrigit. contra inflationes duritiasq; uulua, in deflectiones conuenienter adijciatur. Vocant aliqui blechona, quoniam dum floret gustatum à pecoribus, balatum concitat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πύλεγιον*. Latine pulegium poleum.

Officinis nomen retinet.

Germanis poley / Hertz poley.

Gallis du poultot dicitur.

Pulegium nota herba est. Huius natura ut lib. 19. testatur Plinius, in carnarijs res florens est. Vnde idem libro 18. dixerat: miretur hoc qui non meminit ipso brumali die pulegium in carnarijs florere, ideo nihil esse occultum natura uoluit. Et lib. 2. ait: floret ipso brumali die suspensa in testis arentis herba pulegij. Est autem calefaciens, & concoctiones adiuuat.

Efficax ad recreandos defectos animo cum surculis suis in ampullas utreas aceti dicitur. Quæ de eaussa dignior è pulegio corona uertigini quam è rosis cubiculis nostris pronunciata est. Nam & ea pius dolores imposita dicitur leuare. Quin et olfactu capita tueri cōtra frigorum assusq; iniuriam.

## Dictamnnum.

## Cap. XXXI.

Dictamnnum officinarum.



**D**ictamnnum, aliquibus syluestre pulegij uocatur, Crete his herba est, acris, læuis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodā spissaq; lanugine pubescunt. florem nullū aut semen profert. Præstat omnia quæ satium pulegium, sed efficacius multò, non potum modò, sed appositum quoq; aut suffitū, defunctos partus eiecit. Prodeunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbae pastu eas excutere, purgandum.



diuim habet succus, illius, aut cum polenta tritus. herba impactos pedibus reli-  
quæ corpori aculeos, illitu refigit. ad lienis dolorem efficax habetur, siquidem  
ipsum imminuit. Metunt æstate & autumnu. Radix eius gustu talsacit. partus ac-  
celerat. succus cum uino potus, contra serpentium morsus præsidio est. tanta her-  
bæ facultas est, ut olfacta abigar bestias quæ uenenato ictu sæuiant, appensa; cõ-  
tactu exanimet. uulneribus ferro illatis, & uenenatis morsibus, infusus succus  
præsentaneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assumatur. Quod  
pseudodictamnium uocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed mi-  
nus quàm illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multò. Defer-  
tur à Creta alterum dictamni genus, folijs sisymbrii, ramis maioribus: in quibus  
flores syluestris origani, nigri, molles. odor foliorum inter sisymbrium & saluiã  
iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. miscetur emplastris et me-  
dicaminibus quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca uocant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Veri dictamni descriptioni Dioscoridis ad omnia respondens hodie in magna copia ad nos defer-  
tur. Quæ autem uulgo circumsertur dictamni radix est potius pseudodictamni aut Peroniæ maris, ut  
uir doctissimus Hieronymus Trigaui testatur. Creticus laudatur potus & appositus. Metitur æstate  
& autumnu.

Dictamnium quod è Creta deferitur, Dioscoride teste, folio sisymbrii, ramis maioribus, flore sylue-  
stris origani, nigro, molliq. id hodie Galli tum diptamnũ, tum hortensem gigeberim appellam, quod  
& suo saui statim os adurat, & linguam uellicet &c.

## Saluia.

## Cap. XXXII.



**S**alvia siue ele-  
lisphacon, fru-  
tex est ramo-  
sus, longus, uirgas  
habens quadran-  
gulas, & canas: fo-  
lia mali coronei  
effigie, sed longio-  
ra, asperiora, cras-  
siora, & quæ sen-  
sum attritã quali-  
uestium scabritiẽ  
referant, hirsuta,  
subalbida, perquã  
iucundo odore, sed  
grauis. semen sum-  
mis in caulib. syl-  
uestri ormino si-  
mile gerit. In aspe-  
ris nascitur. Men-  
ses cit et urinas, de-  
coctum foliorum  
ramorumq; potũ  
partus extrahit.  
pastinacæ maris  
ictibus auxiliatur  
capillos denigrat,  
uulnerũ sanguinẽ  
cohibet. tetra ula

cera purgat. testium pruritus sedant rami foliaque, si  
decoctoeorum foueantur,

NOMI



Græcè ἡλιόφανος. Latine Salvia.

Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis Salbey. Gallis Saulege dicitur.

Salvia quod ad multa, præcipuè fecunditatem sit salutaris, ἡλιόφανος Græcis, quasi filuestris lens dicitur, folio est maiore, squalidior, scabriore. hæc Germanis bauren salbey dicitur: Sphacelus uero breuiore & tenuiore. Quæ Theophrasti uerba nostram Saluiam feminam. Germanis edel salbey, drecht salbey uidentur exprimere. Calfacit euidenter, & adstringit ἡλιόφανος.

Mentha.

Cap. XXXIII.

Sisymbrium.



**M**entha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi uim habet. Siftit sanguinem, potio ex aceto succo, tineas in uentre teretes enecat. uenerem stimulat. singultus, uomitões, choleraeque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. suppurationes discutit, si cum polstra illinatur. imposita fronti, capitis dolores mulcet, mammas, si tendantur, aut lacte turgent, compescit cum sale canum moribus illinitur. aurium doloribus cum aqua mulsa subuenit: uulua ante coitum admota, conceptionem

Scarwenmintz.



reficit. linguae scabritiem confecta laungat. coire lac, densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. in summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Syluestris mentha, Latini mentha firum uocant, hirsutior est folio, & prorsus maiore quam sisymbrii, grauiori odore: quare minus ad sanorum usus expetitur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἡλιόφανος μινθῶν.

Latine mentha.

Officinis nomen seruat.

Germanis Mintz, balsamkrent.

Gallis de la mente dicitur.

Menthe in uniuersum duo sunt genera. Una enim satiuæ & hortensis est, altera syluestris & færa. Satiuæ iterum quatuor præcipua sunt genera una est quam Germani deymment, apliceiter, uel, fraus deymment uocant.

Alia



210  
117

DIOSCORIDIS

Balsam münz.



Bergmünz.



Altera quam iidem Draufs Balsam.  
Tertia quæ iisdem Balsam münz appellatur, & vnser Frauen münz, uel spitz münz, à nostris  
etatis herbarijs Romana, uel Saracenicæ.

Quartam Germani quidam hertz Kraut, nonnulli Balsam Kraut uocant. Per me tamen licebit hæc  
species, quandoquidem facultatibus similes sint, ut cuius placuerit nominare. Nobis autem ut cer-  
tius discernerentur prædictis nominibus appellare placuit.

Nō ignoramus plures esse menthe species, nos tamē eas duntaxat quas uidimus, pictas exhibemus.  
Syluestris mentha Græcis ὀλίσκος uos ἄγριος.

Officinis Latino nomine Menthastrum. Germanis / wild münz / fisch münz / bach münz /  
roß münz / wantzen Kraut / nam habet & hæc plures species. Gallis de la mente saulage dicitur.

Menthe nomen, ut Plinius tradit lib. 19. suauitas odoris apud Græcos mutauit, cum aliqui mintā  
uocaretur: (Hædiosmo illi nomen est) unde ueteres nostri nomen declinauerunt. Omnis mentha spe-  
cies tam hortensis quàm syluestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine exaltationis  
tium. Infirrior tamen est hortensis, minusque calefacit. Exiccat autem in secundo ordine: illi enim ex  
cultura aliquid humiditatis accedit. Grato mentha menses odore percurrit in rusticis dapibus ne

Plinius scribit lib. 2. quod Mentha odor animum excitet, & sapor auiditatem in cibis. Celsus eam  
inter urinam mouentia nūerat iniquiens: Vrinam autem mouent quæ cunque in horto nascuntur boni  
odoris sunt, ut apium, ruta, acetum, ocimum, mentha.

Calamintha



## Calamintha

## Cap. XXXIII.



**E**X calamintha generibus quedam montibus familiaris, folia ocimi habens, incana, furculos aridos, & caules angulosos, purpureum florem. Altera pulegio similis est, sed maior: quam sylvestre pulegium ideo appellant, quod odore ipsum emuletur. nepetam Latini uocitant. Tertia menthastro cognata est, folijs oblongioribus, caule & ramis maiorib. quam superioris, sed uirib. inefficacior. omnium folia gustu impense feruentia & acris, radix superuacua. Nascitur in caepitribus, asperis & aquosis. Potu aut illitu demorsis à serpente opitulatur. decoctum potu menses & urinas expellit, ruptis, cōuulsis, orthopnoe, torminibus, choleris, horroribusq; auxiliatur, regium morbum expurgat, presumpsa in uino uenenis resistit. tineas ceteraq; interaneorum animalia, cum sale & melle pota, enecat, nec secus cocta crudae si teratur. elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in uellere subiiciantur menses extrahunt, & partus enecant. accensa aut substrata, serpentes fugant, nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita, sugillata tollunt. Calamintha ischiadidis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens, uermes necat succus auribus instillatus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Calamintha, uel cum Nicandro Calamentum, Galeno duplex est: domestica, & co efficacior mō. lib. 6. comp. ph. part. & Thymum. uocari in suatheriace, cum cetera Graecè appellarit. Dioscoridi triplex lib. 7. simpl. lib. 1. aotid,



est, prima montana, uulgare calamentum: secunda pulegium sylvestre, Germanis Wilder poley. Gallis du pouliot sauage. Tertia herba cattaria, Officinis Romanum nomen retinens, Nepita: Germanis Nept & Katzenminz. Gallis de l'herbe au chat dicitur, ut Ruellio uidetur. Musc uero contrā, tertia uulgare calamentum, secunda cattaria putatur. Ob imperfectum omnium historiarum in hac sententiarum uarietate iudicium difficile, nec aequi uerborum addit Aduarius. Galeopsis, que uulgo herba cattaria putatur esse, urtica foetida purpureis floribus uidetur. Calaminthe calida sicca gradu tertio, acris, parum amara, tenui substantia, cui in caliditate mordet, sugit, postremo ulcerat: tamen eius succum uulnericium cerebri meningas diuidenti infusum, nulli farina sicca superiecta glutinare affirmat Archigenes apud Galen. lib. 2. comp. phar. part. lib. 7. simpl.

## Thymum.

## Cap. XXXV.

**T**Hymū ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso provenit. Vim habet hanc, ut cum sale & aceto potū, pituitam per aluū detrahat. decocti ius prodest orthopnoeis, & anhelatoribus. tineas uentris exigit, menses, partus, & secundas pellit, urinas ciet, cum melle et elegmate faciles facit excreationes, recētes tumores discutit, cum aceto

T



318  
27  
litum, concretum sanguinem dissoluit, uerrucas thymi colorem reddentes, pen-  
silesq; tollit, ischiadicis cū uino & polenta impositum subuenit, heberib, oculis in  
cibo prodest, perquā utile pro cōdimento, duntaxat ad usus corū qui rectē ualēt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè θυμ. Latine Thymus. Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis Thymian  
Edelbalsamkraut/welscher quendel. Gallis duthym, maiorana Anglica dicitur.

Thymum cōmendatur maximē Atticum, aut ex locis siccis & editis: calidū siccum ordine tertio, in-  
cidit, menses & urinas mouet, crassa & lenia ex pulmone & thorace expectorat. Epithymum Græ-  
corū est flos thymi saturæ similis, calidus siccus gradu tertio, omnia potest que thymus, sed efficacius,  
ob id illius penuria hoc uti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithymū drach. quatuor cum sero la-  
ctis uel mulsæ, ad educendū humorem melancholicū. Hortū loco si Arabū Epithymo, hoc est, casuta thy-

mo innata, ut saturæia seu thymbræ epithymbrū Actuario dictū, & hyssopo  
et maiorana, epysopū: et orobo orobāthe: & lino linanche, uti libet, quia uires  
cū thymi flore easdē illi Plinius ueterū solus tribuit, dabitur cū Mesue ob imbec-  
cillitatē à drachmis 14. ad drach. 20. Epithymus aut Arabū, ut thymus, est duo-  
plex. hortensis, & hoc calidior, siccior montanus.

Satureia.

Cap. XXXVI.

Satureia triuialis notitiæ est, gignit in asperis locis, & tenui  
solo, thymo similis, minor tñ & tenerior, defert spicā florum  
plenā, coloris herbacei. Eadē potest que thymū, si modo cōsimi-  
li sumptetur. Aptus senis usus. Est etiam nū quēdā fatiua, syl-  
uestri prorsus minor, quæ propter mitiorē acrimoniā, com-  
modius in cibos recepta est.

EXPLICATIO.

Græcè θυμ. Latine Satureia, hortensis thymbra. Mart. in plurali men-  
tro est usus. Improbā nec prosum iam satureia tibi.

Officinis latinum nomen retinuit. Germanis Gartenhyssop/zwibel hyssop/saturey/sadaney. Gallis sarrieta, quasi satureia. Satrea.

Satureia herba est fragrantis odoris, & alio nomine thymbra uocata, & in-  
ter cunilas numerata. Columella lib. 9. cap. 4. Tum etiā thymbræ, uel nostratīs  
cunilæ, quam satureiam rustici uocant: & paulo post, Nostras cunila, quā dixit  
satureiam. Pli. lib. 19. 8. Thymbra uerō quæ sit cunila, hoc apud nos habet uoca-  
bulū, & aliud satureia dictam condimentario genere. Columella tamen thymbrā  
à satureia discrepare semit hoc senariolo.

Et satureia thymu referens, thymbræq; saporem.

Columella itaq; thymbrā à satureia discreuit, et nostratē cunilam esse docuit  
quā rustici uocant satureiā colore floris purpureo, thymbrā uerius herbaceo.

Serpyllum.

Cap. XXXVII.

Serpyllum duorum generum est, Hortense odore famplū-  
schū imitatur, atq; in coronas addi solet, cui à serpēdo nomē  
inditū est: quoniam si qua eius particula terrā attingat, inibi ra-  
dices demittet, folia & ramulos origani habet, sed candidiores  
sin maceris multo procerius assurgit, Syluestre, zygis appella-  
rū, non serpit, sed in altitudinē increfcit, ramulos ædens tenues  
surculosos, folijs refertos longioribus quā rutæ, & duriori-  
bus, angustis, flores iucundē olent, gustati acres, radicis nullus u-  
sus. Nascit in petris, satiuo efficacius, atq; magis ex calfaciens,  
& ad medēdi usum aptius, Menses trahit, urinā potu ciet, tormi-  
nib, ruptis, uulsi, & iecinoris inflammationibus auxiliatur, & ad  
uersus serpentes potu illitūue, capitis dolores mulcet coctū, ad-  
iecto rosaceo, & madefactum in aceto, maximē uerō phreniti-  
cis & lethargicis conuenit, cruentos uomitus sedat succus, dra-  
chmis quatuor ex aceto potus,

NOMI-





## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ἐρπύλλιον*

Latine Serpillum.

Germanicè Quendel/hünerkül.

Gallis Serpouillet, pillolet.

Officinis latinum nomen servauit.

*Ἐρπύλλιον* Græcorum, & inde serpillum Latinorū, dictum est à serpendo, tum quia per terrā, quā illud contingens radicatū, serpit: tum quia iuxta sepes plantatū, aut ex altiore loco deorsum demissum adiecto illi pedamento, in longum protrahitur, ut hoc loco Dioscorides & libr. 6. de plantis Theophrastus testatur. Serpillum gustu acre est, ob id calidum ualde. ita ut menses & urinam moueat.

Sampsuchum.

Cap. XXXVIII.



**S**ampsuchum in Cypro et Cyziceno laudatissimū. secundum sibi locū uendicauit Aegyptum. Amara cū gens Sicula & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repēs, folijs eius calaminthe quæ tenui folio constat, leptophyllos appellatur, hirsutis et rotundis, suauissimum odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius exalfaciens, succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos urine difficultas, aut tormina excruciant, illita ex melle arida folia, sugillata tollunt. menses subditi in pessio trahunt. contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinuntur. luxatis tumoribusq; cerato excepta imponuntur. aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest, acopis malagmatisq; cactacene digratia, commiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ἐκφυλλιον* & *Ἐκφυλλιον*.

Latine Sampsucus, uel sampsychon, amaracus.

Officinis Maiorana. Germanis Meyeron. Gallis Mariolaine dicitur.

Melilotus Italica.



Maiorana, Amaracus, sampsychus, Dioscoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt herba: unguentum tamen amaracinum à sampsychino cur diuersum sit Dioscoridi, suprā ostendimus libr. i. Calida est herba & sicca ordine tertio, & tenuium partium sampsychū, Gal. li. 8. simpl. Amaracum uerò calidum ordine tertio, sic eum secundo, idem lib. 6. simpl. Ex qua temperamenti uarietate, & quod seorsim de his agit, Amaracum Galeno, & post eum Paulo esse dictā uulgo Matricariam suspicantur Hermolaus, Manardus, quæ ipsi eadem auctorib; & Parthenum; sed Amaracū Galeni nō esse Matricariā uulgarem odore aspernabili, sapore amarissimo, conuincit quæ de Majoro & Amaraco. Cap. 40. sequenti profereamus. Ad hæc Amaracum se uidisse in Italia crescere scribit Galenus, lib. 1. antidot. tanquam plāta esset: talis rara, cum tamen Romæ familiarem esse Matricariā Musa Ferrariensis affirmat. Nec satis ad confirmandam ipsorū sententiam est, Galenum bis de eadem re non scripsisse, cum bis de absinthio, de aslere, seu bubonio, de chalici scripserit. Parui præterea est momenti uarietas ordinum siccitatis, quod scilicet amaracus sit siccus ordine secundo, sampsuchus autem tertio: ille enim completo, hic incipiente esse possit, ut in absinthio dixi. Quo fit ut ex his plantis esse uarietas nemo possit colligere.

Gal. li. 8. simpl.

Gal. li. 9. ant.

Melilotos, siue sertula campana.

Cap. XXXIX.

**S**ertula Campana laudatissima in Attica & Cizio & Chaleedone nata, cuius odor uicinus est cro-

T 2



DIOSCORIDIS

co, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum langue  
sciente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam, inflammationem omnem emol-  
lit, praesertim quae in oculis, uulua, sede aut testibus erumpat, si ex passo cocta il-  
linatur: interdum autem addito oui luteo affato, aut foenigræci farina, lini semine  
aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue. recentes meliceridas per se cum aqua  
& ulcera manantia in capite, illita cum creta Chia, uino aut galla sanat. Stomachi do-  
lores & cruda & cocta cum aliquo ex antedictis leuat. doloribus aurium mitigan-  
dis cruda ex passo instillatur. in aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolor lenit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hanc, utpote trivalem, non depinxit, circa Nola tamen Italiae gigni, coloris lutei, o-  
dore languido tradit. Verum tria eius inueniuntur rei herbariae prudenter fastigia, uulgare statim  
ab radice fruticosum, cubitale, flagellus exilibus, coma trifolij, minuta, ac lenec simbriata, flosculo melino,  
odoris eiusdem cuius & herba, nempe suavis, tereti ac per ramos diffuso semine. Alterum aspectu ca-  
no, croci odore, ac flore, pinguisimis ac breuissimis folijs. Tertium, cuius picturam tanquam ueri ac ge-  
nuini meliloti damus, simile foenogracio, folio raro, semine in lunata filiqua, glauco, rotundo, infra sin-  
pis amplitudinem, flore luteo, odorato. Nascitur ubiq; Graeco nomine Officinis nobilior, ac Latino.  
Germani, Welsch, oder Italienisch steinflee. Galli patellum, & coronam regiam appellant.

Melilorum coquit, digerit, & parum astringit, ut crocus, largior enim est in eo substantia calida  
quam frigida.

Marum.

Cap. XL.

**M**arum herba cognita uulgo, surculosa, flore origani, folijs multum longioribus,  
flore odoratiore. Vim habet sisymbrio confimilem. Substringit enim  
& modicè calfacit. qua de causa illitu serpentia ulcera sistit, & in calidas illitiones  
additur. iuxta Magnesiam & Tralleis copiosissima gignitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Acinas.

Marum herba surculosa, flore origani, sed odoratiore, planta est uehementer odorata & amara, amara  
raco proxima, quo tamen est multo odoratior & amara-  
rior, minus tamen coest acris. Unguentum amaracino fortè  
dicto, quod amaraci plurimum olim reciperet, nunc so-  
lum marum immutunt: satius tamen est, aequalem amara-  
ci & mari portionem imponere, ut hedychoi composi-  
tioni. qua mistione minus quidem odorum, non tamen mi-  
nus efficax erit. Hec Galenus. Suspicio nobis est uehe-  
mens Marum esse herbam apud Gallos Mastice uulgo dictam,  
Matoranae simillimam, flore tamen muscoso in pappos abeunte.

Acinos.

Cap. XLI.

**A**cinos aut aconios à Graecis dicitur, re-  
nui sicco gramulo herba, ocimo simili-  
lis, odorata, sed hirsutior, qua coronae facili-  
tantur. à nonnullis olitoribus colitur. Men-  
ses & aluum pota sistit. illita panos ignemque  
sacrum sanat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Graecè ἀκινός

Latine Acinus herba.

Officinis incognita

Germanis Kleine basilien

Gallis basilic menue.

Acinos

lib. i. antid.





Acinon Paulus ocimo consimilem prodit, mediocres astringendi vires possidere, quare uentrem et menses potu sistere. Ad panos et ignem sacrum utiliter illinitur. Differt acinos ab acano, quod acinos ocimastrum est, cuius picturam exhibemus: acanos uero spinosa, breuis, et lata herba, eringo qui busdam contributa, spinis latioribus etc.

## Bacharis.

## Cap. XLII.

**B**accharis herba fruticosa, quæ in coronas additur, cuius folia aspera sunt, media uiolæ & uerbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis: flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus ueratro nigro similibus, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperum squalidumque solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, uulsi, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. item diuturnæ tussi, & urinæ difficili, menses pellit. contra serpentium morsus utilissimè datur in uino. recens radix apposita, partum extrahit, puerperis eius decoctum in defensionibus prodest. in diaphanata utiliter inseritur, iucundi odoris gratia. folia uirpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu profunt. oculorum inflammationibus, mammis tumentibus à partu, ægilopijs incipientibus, ignibusque sacris auxiliantur, odor somnum gignit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nostrates officinæ Baccharim non norunt. Rura apud Gallos diuæ Mariæ chirotecæ. Germanicè Unser frauen hnedtschich appellant, eamque neclunt in coronas. Baccharim esse facile potest intelligi, cum fruticosa sit herba, cuius folia quandam referunt asperitatem, media uiolæ uerbascique magnitudine, caule anguloso, cubiti altitudinem petente, agnatis appendicibus quadamtenus scabris, flore purpureo, subalbicante, radicibus nigro ueratro similibus, Cinamomum subolentibus, asperum squalidumque solum amat. Paulus odoratam esse tradit herbam, odore cinamomum imitantem, quæ coronis decorari solet. Bacchare fuscium depelli Virgilius author est, ita canens.

Bacchare frontem

Cingite, ne uati noceat mala lingua futuro.

## Ruta.

## Cap. XLIII.



**R**uta mōtana syluestrisque, satiuæ et hortensis acrior est, et in cibis dānata, satiuæ uerò quæ sub ficu arbo re enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraque urit, calfacit, exulcerat, urinam ciet, menstrua pellit, alui sistit potu cibique, letalium medicamentorum antidotum est, si scemen ex uino, acetabuli mensura, ebibatur. folia per se præsumpta, aut cum nuce iuglandæ, aridisque ficis, inefficaces uenenorum vires reddunt. contra serpentes simili modo sumere conuenit, genituram cibo potius extinguit, cum anetho sicco decocta, tormina sedat. facit ad pectoris laterumque dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumque cruciatus & horrores febrium circuitu repetentes, pota ut antè dictum est. item ad inflationes colicæ, uulue, rectique intestini, cum oleo decocta & infusa. foeminas uulue strangulatu liberat, si à generali sedetenus cum melle subijciatur. feruifacit ex oleo, & pota, uentris tineas excutit. articularum doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. eisdem in potu auxiliatur, decocta in uino ad dimidias partes et oblita. cruda conditaque cibo, uisus aciem excitat. dolores oculorum illita cum polenta lenit. doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur. profluentem naribus sanguinem sistit, trita & indita, testium inflammationibus cum lau-



reis folijs imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cerato prodest. Cum pipere autem uino & nitro affricta, albæ uirilgini medetur. cum eisdem illa fornicationes tollit, & uerrucas quæ thymi florem representant. contra impetigines cum alumine & melle utilissimè imponitur. succus in mali punici calce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum foeniculi succo ac melle peruncti iuuantur. ignem sacrum, ulcera quæ serpunt, aut in capite manant, cum aceto rosaceo & cerusa per sanat, mansa, aliorum ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit. dum florè promit, & ad murias colligitur, cutem inflat, & rubore quodam inficit, cum pruritu ac uehementi inflammatione. oportet itaq; eam unctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum feles arcere. Adiciunt eam quæ in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interimere. Montosus autem is locus, uiperis scatet. Semen eius potum contra intestina uicia efficax est, in antidota commodè additur. contra incontinentiam urinæ tostum, semen septenis diebus potui datur. Radix huius montanum moly uocatur. Syluestris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicū doloribus, menstrua mouet. partus enecat. acrior est uiribus quàm hortensis, et ualidior. syluestris, utpote noxia, cibis abdicatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ῥύτιον*. Latine Ruta.

Officinis latinum nomen seruit.

Germanis *Weinraut*, & simpliciter *Raut*.

Callis *Rue* appellatur.



Ruta hortensis est imbecillior agresti: hæc enim calida ordine quarto (tantum tertio dicitur lib. 6. comp. phar. part. in stomachica Diabesasa) illa tertio: utraq; acris amara, tenuium partium, ualenter siccat, incidit, digerit ualenter crassos & lenes humores, urinas mouet: flatus & ueneris appetitum cohibet.

## Syluestris ruta. Cap. XLIII.

**V**Ocant etiamnū sylvestrem rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiae finitima moly dicitur. Frutex est qui ab una radice multos emittit cauliculos: folijs multo quàm alterius rutæ longioribus, tenerioribusq; odore graui: flore candido: capitulis in cacumine paulo maioribus quàm satiuæ rutæ, quæ tribus maximè partibus constat: in quibus triangulum semen, subrufum, gustu amarum recluditur, cuius est usus, semen autumnno matu rescit, quod cum melle, uino, croco & foeniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem.

Sunt qui eam harmalam uocent, Syri befasan, qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido: In collibus es læto prouenit.

ROMB



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè τριφυλλὸν ἀγριοῦ. Latine Sylvestris ruta, Moly, Besanum, Besasa: Officinis & Syris Harmola. Germanis Wild Rauten. Gallis Rue sauvage dicitur.

Ruta sylvestris cuius picturâ exhibemus, Hieronymo Trago viro in simplicium recta cognitione ex arcitatisimo fide dignissimoq; è monte Pessulano ab amicis transmissa, adeo legitimæ huius delineationis ei per omnia respondet, ut ueram ac genuinam sylvestrem rutam esse, nemo sanæ mentis dubitare possit. Moly, quod nonnulli rutam sylvestrem, alij Zarmalam dicunt, tertio caleficiendum ordini antumescatur, substantia tenuis, hinc crassos humores viscososq; incidit, discutit, & urinam promouet.

Nomenclationes quæ contra Dioscoridis morem in calce huius capituli, quod sylvestri Ruta dicatur, subditæ sunt, ad sequens moly magis uidentur pertinere.

Moly.

Cap. XLV.

**M**oly folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ uiolæ similem, sed minorem, lactei coloris: caulem candidum, quaternum cubitorum, in cuius cacumine inest aliquid quod alij speciem referat, radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum ualeat ad aperiendas uulvas, si trita cum irino unguento, in pelso subijciatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Moly Galenus Dioscoridis uerba citans μύλλω appellat. Ruta etiam sylvestris (ut supra ostendimus) idem nomen habet. Molon quoq; non alia uidetur, quàm Moly. Laudatissima herbarum fuit, Homero teste, cuius inuentionem Mercurio assignauit, contraq; summa Circeis ueneficia demonstrauit, de cuius Olyssæ herbapodia. Hodie & medicis & officinis planè incognita.

Panaces.

Cap. XLVI.

**P**anaces nonnullis heracleum dicitur, ex quo opopanax colligi solet. plurimum in Boeotia & in Phocide\* Arcadiæ nascitur: ibiq; compendij & quæ-  
stus, qui ex eo liquore facitur, gratia studiose colitur. folijs est asperis, in terra iacentibus, herbaei coloris, multum ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinque par-  
tito diuisis; caule, ut ferule, altissimo, qui lanugine quadam incanescit, folijs etiam  
minutioribus obsitis, muscarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & semine o-  
dorato feruentep. radices habet multas ab origine una, candidas, graueolentes,  
crassi corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia.  
Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu, ea candidum succum e-  
mittit, qui siccatus, in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem au-  
tem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili  
modo caule mellebus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radici-  
bus, albæ, rigentes, distenteq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruen-  
tes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab  
usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur quàm amarissimus,  
internè albus, aut subfuluus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, fria-  
bilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore, niger improbatur, ac mollis.  
Adulteratur ammoniaco aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in a-  
qua friatus resoluat, & lactescat. Ex calfacit, mollit, extenuat, horribus febris-  
um circuitibusq; uulsi, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio urinæ con-  
uenit, contra uescicæ scabiem ex aqua mulla aut uino bibitur, menses trahit, foe-  
tum enecat, inflationes quæ uulvam malè habent, duritiasq; ex melle dilutus, di-  
scutit, ischiadicis illinitur. acopis & capitis medicaminibus admiscetur, carbuncu-  
los rumpit, podagricis cum una passa illitus subuenit, dolore dentium liberat, ca-  
uis inditus, oculorum aciem illitu excitat. ex eo & pice optimum fit emplastrum  
contra bestiarum morsus quæ in rabiem efferantur. Radix in ramenta confissa,  
uulvæ admodum, partus extrahit, ad uetera ulcera efficax est, nudata ossa, corpore o-  
perit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit.  
cum aristolochia, prodest aduersus animalia quæ uenenum eiiculantur. contra  
uulvæ strangulatus in uino bibitur.



# D I O S C O R I D I S

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Panaces (πᾶνες) nomine statim morborum omnium remedium se pollicetur. Communis est pluribus herbis nomenclatura, Centaurio, Ligustico, Tithymallo, Origano Heracleotico. Dioscoridi tamen priuatim sic nominantur tria solum genera, proximè sequentiā primum de quo presenti capite agi, Graecis πᾶνες ἱπποκρίτειος, Latinis Panaces Heracleum, id est, Herculeum dicitur. Oppopanax liquor è Panacis Heraclij radice incisa emanans, cum caulis primum erumpit, aut uulnere o caule incisus; calidus ordine tertio, siccus secundo, emollit, digerit, modicè terget, ob hoc ossa nuda uestit carne, ulcera maligna & contumacia sanat. Recens est candidus, ubi aruit, colore foris est croceo. Nostrium quod habemus, aliqua amaritudine insignitur, non tamen amarissimum est, & graui odore sentitur. Propterea cum nostro aliquid mixtum arbitror, quod intensam amaritudinem tollit, uel opus est quantitas tem notatu dignam mandere, si intensa amaritudo sentiri debeat: in reliquis notis penitus conuenit.

Panaces Asclepij.

Cap. XLVII.

**P**anaces Asclepij, caulem à solo emittit tenuem, cubitale, geniculatum, maioribus quàm foeniculi folijs, hirsutioribus, odoratis aureo flore, acris, odorato, ex muscarijs dependente, radix parua est & tenuis. Auxiliarem uim habent flores & semina, contra ulcera, phagedaenas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex uino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Alii qui Panaces syluestre origanum uocant, alij cunilam, de qua in origani mentione diximus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Panaces Asclepion dictum aiunt, quoniam filium Aesculapius Panacium uocauerit. Huius radicem Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit, quod quidem priori generi à Dioscoride tribuitur. Ligusticum.

Est & haec Medicis cum officinis hodie incognita.

Chironium Panaces. Ca. XLVIII.

**C**hironium Panaces in Pelio monte maximè prouenit, folium eius amaro co\* simile, flos aureus, radix parua, quæ non altè demittitur, gustu acris. Pota radix ferè pètium ueneno resistit, illita coma, eadem praestat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Et hoc ab inuentore nomen retinet, cui folium rui micis Theophrastus et Plinius reddunt, maius tamen, hirsutius, radice parua. Nascitur pinguibus, flore ad supradicta efficaci, nobis hodie incognita.

Ligusticum. Cap. XLIX.

**L**igusticum, quod alij panaceam, alij panaces uocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino, Alpibus co termino, unde nomen traxit. Panaces incole non ab re appellant, quoniam & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & uiribus eisdem praeditum. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac umbrosis, maximè iuxta fluuenta, cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulae campanae, molliora, odorata, prope uerticem graciliora, et longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, solidum & oblongum, foeniculo proximum, guanti acris, sit & aroma

\*Lapathos  
Theoph.





& aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminaque vis excofactoria, concoquens, prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones, item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgat, & contra serpentium ictus, urinas & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur, ori perquam utile, quare pro pipere utuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen foeniculi aut felis admiscentes ligusticum dolo utiuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Λιγυστιδόν, Λιβυστιδόν.*

Latine Ligusticum, Galenus Libypticum.

Officinæ corrupto uocabulo Leuisticum.

Germani Liebstüchel vocant. Gallis Leuistic appellatur.

Ligusticum à Ligusticis alpibus, in quibus frequens nascitur, Galeno & Actuarius unius literæ mutatione Libypticum, sylvestre, hodie rarum, semine solo usum Manardo, radix imperatoria vocatur Leoniceo & Musæ. Hoc autem accipiendum in compositionibus Arabum pro Keisin seu Liusitico, aperte docet Diatrion pipereon, & dia Calamantes, à Nicolao & Mesue ex Galeno paucis admodum mutatis descripta. In quibus & alijs non paucis Arabum descriptionibus, ut diacymino, diamoscho, lybisticum reposuit Actuarius. Vulgari autem Leuisticum, sativum est, ob id minus efficax: nec Smyrniacum est cum Ruellio, aut apij, vel dauci genus, cum Manardo, Smyrniacum putante petroselinum Alexandrinum vel Macedonicum, nam quod folia latiora aliquamulum, radixque foris non adeo ater, cultura ad scribendum nam cetero simillima est.

## Pastinaca.

## Cap. L.

## Pastinaca vulgaris.

Pastinaca Gallica sylvestre genus, cuius semine pro Dauco utuntur officinæ

Pastinaca Gallica, Germanis Sammozen, Rot & Gelbrüden appellata.





**P**astinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, sub amara: caulem rectum, seabrum: umbellam similem anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum, radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum uel impositum, menstrua mouet, ips conuenit in potione, quos urinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor ex cruciat, aut si aqua cutem subijt. serpentium moribus ictibusq; prodest. presumentes id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur. conceptus adiuuat. Radix urinam pellit, uenerem stimulat, partus apposita eijcit. Folia trita, & cum melle imposita, phagedænas ulcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cilio aptior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Pastinacæ duo generatraduntur unum satium *ἑταφύλιον* & *κνίαν*, Græcis: pastinaca satium Latinis: Pasteney, dicitur Germanis. alterum agreste, quod Daucus etiam appellatur, auihore Galieno et paulo Aegineta hoc græcis *σαφύλιον* & *αγριον*, Latinis semper cum addito pastinaca erratica. Wild pasteney / Vogels nesten / Gallis uero Cariores sauuage appellatur. Est & alterum genus in eodem similitudine pastinacæ quam Gallicam pastinacam uocant, Germani Geib & Rot Râblin / uel Moren. Galli Caryottes, prædulci radice, odorata, rufa: uel interdum purpurea, cuius genera etiam quatuor fecere. De quibus etiam Dioscorides agit sub dauci nomine infra cap. 67.

Pastinacæ omni calens natura est. Efficacior sylvestris, magisq; in petrosis nata.

Seseli.

Cap. LI.



**S**eseli Massiliense folia Fœniculi habet, crassiora: caulem uegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre. radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix ex calfacienti uim habent. potu stranguriæ & orthopnœæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusq; profunt. menses & partus trahunt. ad omnia interna mala pollent. tussim ueterem sanant. semen cum uino potum, concoquit, & tormina discutit, epialis febribus utile. contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & uino bibitur. capris, cæterisq; pedibus datur in potu, quod facilius suos foetus enitantur. Aethiopicum Seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: semine in tritici morem denso, nigro, amaro, Massiliensi odoratiore, & acriore, multum suauis. Peloponense folia habet cicutæ, latiora, & crassiora: caulem supra Massiliensis magnitudinem, ferulaceum, & latum: in cacumine umbellam, in qua semen

latius odoratum, & carnosum pendet. Eisdem uiribus præditum est. nascitur in asperis, riguis & collibus. inuenitur etiamnum in insulis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *Σέσλι μασιλιαντικόν*. Latinis Seseli Massiliense. Officinis Siler montanum. Herbarijs quibusdam maior saxifraga. Germanis Sesel / Welscher Steinbrech. Gallis Ser montan apud Allobroges.

Sil siue file herba est alio nomine Seseli appellata, cuius radice uel semine olim uina condiebant, quæ aut meridiano tempore sumebant. Vnde silatum ueteres dixere, quod nunc romaculum uocamus.

Seseli



Seseli fructa & radice, id est, semine, ualde calet, ac tenuium est partium, quare urinam mouet, epilepsia & orthopnoea confert: laudatur Massiliense. Et alterum etiam Aethiopium, & tertium Creticum de quo in capite sequenti. &c.

## Creticum seseli.

## Cap. LII.



Sison.



**T**ordylum, quod aliqui Creticum seseli uocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula furculosa, semine duplici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra urinæ difficultatem bibitur. potu cit menses. succo seminis caulisque uirentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Top. Ἀνίσον, Tordilium uel Tordylon, & Seseli cretica cum Paulo Gordylon: & Tortilen aliqui semen Seselis esse dixerunt, alij herbam per se, quam & Syreon uocauerunt, de qua nihil aliud proditum inuenisse scietur Plinius quam quod in montibus nascitur, ambusiam citere menses &c.*

*Item est Tordylon quod latius hoc loco à Dioscoride representatur in Amano Cilicie monte, breuis & fruticosa herba, semine paruo orbiculato, duplici, clypeolis similes, modo dicē acris, & aromatum modo odorato. hodie herbarijs (in fallor) incognita. quod Fuchsius falso exhibet pro Cretico Seseli, cuius picturam damus, M cum est.*

## Sison.

## Cap. LIII.

**S**ison exiguum semen est, in Syria natum, sapio simile, nigrum, feruens, oblongum. Contra lienis uitia bibitur urinæ difficultatem potu emendat. remoratos menses citat, quo in condimentis, cum cucurbita, & aceteto, indigenæ utuntur, in cacumine granula multa gerit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σίσον.

Latine Sison.

Officinis falso semen Amomi.

Germanis Frembder petersilien dicitur.

*Officina eius herba cuius picturam damus semine habet. Acnus pro uero Græcorum Amomi usi sunt, non tamen sine errore, cum hæc herba cum Amomi planta nihil habeat commune, ut facile indicum feret qui utriusque historiam conferre uoluerit, & uerum esse Sison cemperiet si quoque diligenter, & huius delineationem examinauerit.*

## Anisum.



Cap. LIII.

Gal. li. 6. sim.

Carum.

Cap. LV.

A detailed botanical engraving of a plant, likely a species of carrot or a similar root vegetable. The plant features a thick, gnarled, and somewhat bulbous taproot at the base. From this root, several upright stems emerge. The leaves are compound, with multiple leaflets that are deeply lobed or serrated. The stems are topped with clusters of small, round fruits or flowers, which are arranged in a somewhat terminal, umbel-like pattern. The entire illustration is rendered in a fine-lined, engraved style on a light background.

Cari semē calidum siccum ordine tertio, mediocriter acre, urinas mouet, flatum discutit: plama etiam reliqua ab hoc utilis à Caria regione laudatissimum afferebatur: unde illi nomen multiplex, Carum, Carion, Careon, Caraon, Carota, siue ut nunc pronunciant careota, Cari siue Cari, unde nomen traxit, radix est: quam Aethiæus digno sophistarum lib. 9. celebrans, maiorem pastinacam falsò appellat, uulgari & cotidiana illa meliorem: quæ etiam elixa Pastinacæ modo estur, ut hoc loco Dioscorides quoque testatur, licet seorsim etiam sub sifari nomine de eadē agere quibusdam uideatur supra ca. 104. lib. 2. his uerbis. Suauis in cibo ori elixa sifari radix est, stomacho utilis. Urinam cit, & cibi appetentiam excitat.

Præterea Paulus Agneta lib. i. cap. de ijs que edendo sunt radicibus, hanc tanquam congruam  
asti naca & dauco simul iungit, inquiens: *σάπωνες δ' ἔλαι δ' ἄνικα καὶ κάρφαι καὶ μέν γιζα*, id est,  
Staphilin



Staphylini uerò, quæ pastinaca est, & dauci & cari radices. Vbi cari radice, si ser transferunt inter pretes, errore manifesto: nã hæc genera nos ita distribuimus ut pastinaca, quæ Staphylini Græcis dicitur, sit nostra vulgaris pastinaca, Germanicè pasteney dicta. Dauci uerò radix sit vulgaris illa radix, Germanis Maren / Gel oder rot rüben dicta. Sifer autem, cuius Plinius meminit lib. 19. Germanorum Geyerlein / & Carota Cari radix Germanicè Matt Fymmel wurz: quod multi docti uiri nõ animaduertentes, has radices magno errore confundunt.

## Anethum.



Cuminum satium.



## Cap. LVI.

**A**Ridi anethi comæ seminisq; decoctum, potulac euocat, inflationes, & tormina sedat. aluum, uomitionesq; sistit urinas ciet. singultus lenit, oculorum aciem hebetat, geniturâ retinguit, assidue potum, sceminis uulua malo opportunis, ad defelsiones utile, condylomata illitus eius cinis tollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀνέθον. Latine Anethum.

Officinis latinum ac genuinum nomen seruauit.

Germanis Dyll. Gallis Anete dicitur.

Anethum calidum secundo ordine, siccum primo, tenuium partium, digerit, ex oleo decoctum dolores sedat, somnum conciliat, crudos humores coquit, præsertim uiride, quia minus calidum & humidius est. Vñum autem calidum siccum gradu tertio fit, ulcera præhumida, præcipue pudendorû et præputij cicatrice tegit. Coma florum odoratissima, & semine nobis consuetissimum est.

## Cuminum satium. Cap. LVII.

**C**uminum satium ori gratum est: sed multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regi um appellauit. secundum locum tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Prouenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia, & plerisque alijs tractibus. Excalfacit, adstringit, exsiccat. ad tormina inflationesque conuenit, coctum & cum oleo inditum aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in uino. testium collectionibus auxiliatur, impositum cum uua passa, aut lolij farina ceratoue. mensum abundantiam inhibet. contritum autem in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit, colorem bibentiũ aut perunctorũ mutat in pallorem.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κύμινον. Latine Cuminum.

Officina Romanum cognominant.

Germanis Römischer Fymmel / pfeffer Fymmel.

Gallis Comin dicitur.

Cumini semine utile magis, calfacit ordine tertio, siccatur, astrim gere addit Dioscorides, urinã mouet, statũ extinguit: satium est ac syluestre, idq; Dioscoridi duplex: laudatur Aethiopicũ, deinde Aegyptiũ. Aethiopicũ Hippocrates regiũ appellauit. Siccã di calefaciendiq; uires habet. Plin. li. 19. Condimentorum tamẽ, omniumq; fastidij cuminum amicissimum. Idem lib. 20. In eo magnus usus in stomachi præcipue remedijs. Discutit pituitas & inflationes, tormina quoq; & intestinorum dolores. Verum tamen omnem pallorem bibentibus gignit.



2  
730

128

DIOSCORIDIS

Sylvestre cuminum.

Ritter sporen.

Cap: LVIII.



S. Catharinen blumen.



**S**ylvestre cuminum plurimū effi caciūsq; in Lycia  
& Galatię Asia, atq; Carthagine Hispanię gigni-  
tur: frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quater-  
nis aut quinis folijs tenuibus, ueluti ferratis, & gingi-  
dij diuisura. in caumine capitula quina, aut sena, ha-  
bet, mollia, rotunda, in qbus est semen a cerosum, gu-  
stu satiuo acriore: nascitur in collibus. Bibitur semen  
ex aqua, aduersus rormina inflationesq; item contra  
uenenatas bestias, ex uino. singultus ex aceto sedar:  
stomacho utile, quem humor uexat. fugillata tollit, si  
manducatum cū melle & uua passa illinatur. restium  
inflammationibus, adiectis eisdem illitum medetur.  
Est & aliud sylvestris cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis floribus  
pensū



penfilia promit cornicula in quibus semen est melanthio simile: quod potum omnium serpentium moribus praesidio est calculosis & ijs qui urinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen feruefactum postea bibendum est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cumini sylvestris primum genus Græcis *κύνινον* & *αἴνον*. Latinis *sylvestre Cuminum*.

Officinis *Consolida regalis*. Germanis *Ritter spörlin*.

Gallis *cornucuta*, dicitur.

In segetibus inuenitur, caule singulari, ramoso, folio prope fœniculi, semine nigro in corniculata filiquula concluso. hodie in hortis seritur & Germanis *S. Catharinen blümen* dicitur, herba ad descriptionem primi generis generis *sylvestris cumini* ferè propius accedens, Germanis alioqui peregrina herba, ac nuper ex Italia allata, eius figurâ præcedēs pictura ostendit.



*Coriandrum.*



Alterum *Cumini sylvestris* genus Græcis *κύνινον* & *αἴνον* & *εἰρεπον*. Officinis nig. *illa sylvestris*.

Germanis *wild schwarzer Coriander* nominatur.

Folia acethi habet, flores nigelle sativæ similes, nisi quod colore sint elegatiores. Capitulum planè aquilegiæ respondet, atque in se semina nigra & odorata continet.

## Ammi. Cap. LIX.

**A**mmi Aethiopicum cuminum appellatur. plerique hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgo notum est semen ex illo, multo minus cumino, origanum respiciens. Eligendum est purum, minimè furtuosum. Vis ei excofactoria, feruens & exiccans. facit ad tormina, urinæ difficultatem, serpentium ictus, cum uino potum, menstrua ciet, miscetur derodentibus cantharidum medicamentis, quæ eccloria uocant, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat sugillata cum melle tollit. colore potu aut illitu mutatur in pallorè, suffitum cum uua passa aut resina, uulvas purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἀμμή*. Latine *Ammi*. Romanis *Cuminum Alexandrinum*, quidam Aethiopicum cuminum id esse putant, alij regium cuminum appellant, plerique alterius naturæ in totum existimant Aethiopicum cuminum ab eo quod uocatur ammi.

Officinis *Ameos* corrupte.

Germanis *Ammeysamen* dicitur.

Ameos semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuium partium, album, subamarum, acre, digerit, urinam mouet. Ami commendatur. Illiricum, lib. 9. cōp. Lib. 6. simp. ph. part. alij Aegyptium laudant. Nasceitur & hodie Lib. 9. cōp. in Germania nostra, & magna copia prouenit, sicut ph. part. deinceps extirpari uix queat.

## Coriandrum. Cap. LX.

**C**oriandrum aut corianum uulgaris est notitiæ, uim refrigeratorem habens. Quare illitum cum pane aut polenta, ignibus,



facris, & ulceribus quæ serpunt, medetur. epinyctidas cum melle uel uua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. cum faba fresa, strumas & tubercula discutit. tinea interaneorum expellit semen, cum passo potum. genituram adauget. largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo & copiosiore usu abstinendum. Succus cum cerussa spumaue argenti, nec non aceto & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κόριον, κορίαννον. Latine coriandrum, corianum, corium.

Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Coriander / Coleander.

Gallis coriander dicitur.

Coriandrum essentia amara habet plurimum, parum humiditatis aqueæ tepentis, pauxillum astrictionis, à qua refrigerat, ut ab amarore calfacit, terget, digerit, tenuium est partium, lumbricos necat, sed largius sumptum mentem mouet non sine periculo, ob id aceto maceramus, post siccamus. Officina coriandrum præparatum uocant ita emaceratum.

## Hieracium.

## Cap. LXI.

Dens Leonis. Hieraceum minus.



**H**ieraciū magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex internodiis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi. unde illitum, stomacho æstuanti, inflammationibusque prodest. succus erosionem stomachi

forbitione mitigat. herba cum radice illita, uibrætis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculis teneros, uirentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hieracium Dioscorides in duo genera distribuit, maius scilicet & minus. Hieracium maius nusq; non in pratis emicat, officina & herbarij Cichoream luteam aut croceam appellant. Germani ad Græcam alludentes appellationem, habichkraut uocant. facie tota, præterquam flore, qui luteus conspicitur, cichoream æmulatur, namque caulem emittit asperum, subrubrum, spiculis horrentem, intus cauum, folia ex interuallis

raresculè laciniata per ambitum flore in oblongis capitulis luteo. Hieracium Græci uocant, quoniam accipitres scalpendo eam, succoq; oculos tingendo obscuritatem cum sensere discutiant. Hieracium paruum Græcis ἰσπόκρυπτον. Officinis dens leonis, quod solum sinuatim per laciniis denticulatum sit. Sunt qui Barbara uoce Taraxicon & Altaraxacon uocant, & morachi caput.

Germanis Röslein kraut / psaffen röslein / psaffen blatt dicitur. Hæc Fuschius falsò pro Hedypnoide pingit. folijs multis constat, utriusq; denticulatis in terra se siliibus, cauliculis dodrantalibus, còcauis leuibz & nodibus, flore luteo, stipantibus in circuitum foliolis coronato, qui senescens euanescebat in lanuginem, quæ cum aura rapim fertur &c.

Apium



## Apium.

## Cap. LXII.

Apium hortense.



Hortensis apij herba ad eadem ad quæ corianum conuenit. inflammationibus oculorum, cum pane aut polenta illinitur. æstuantem stomachum mulcet, mæmarum duritiæ ex lacte concreto cōtractam reprimi. urinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. decoctum eius radice; potum, uenenorum noxæ resistit, quum uomitiones excitet. aluum cohibet. semen uehementius urinam pellit. contra serpentium uenena, aut epotam argenti spumâ auxiliatur. inflationes discutit. admiscetur medicamentis quæ dolorum leuamenta præstant, theriacis quoque, ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur, satiuo grandius, & ad eadem efficax. Oreoselinum, caule est dodrantem alto, ab radice tenui exeunte: per cuius ambitum rami & capitula ci cutæ, multò tamen tenuiora: semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. nascitur in petrosis & montibus. Vrinam ciet, semine ac radice in uino potis, menses trahit. antidotis, nec non medicamentis urinam cientibus & ex calfactorijs inferitur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in faxis prouenit. aliud enim est petroselinum. Petroselinum in Macedonia prouenit, in præruptis locis: semine ammij, odoratiore, saporem in Macedonia prouenit, in præruptis locis: semine ammij, odoratiore, saporem acri, aroma olente. Vrinam citat menstrua. cōtra stomachi & coli inflationes, & tormina prodest laterum, renum, & uesicæ doloribus in potu subuenit admiscetur antidotis urinam cientibus. Hipposelinum, Latini olusatrum appellant, aliqui smyrnion, quauis aliud sit quod propriè smyrnion dicitur, ut paulò post referemus. Est autem maius & satiuo apio candidius: caule alto, cauo, molli, habente ueluti lineas: folijs latioribus, in puni ceum uergentibus: coma roris marini, si florum plena, dependentibus in cacumine corymbis, antè quàm deflorescat, ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis & palustribus nascitur. oleum generis, ut apium radix cruda coctæ uesit. folia cū caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur, crudaque muria condiuntur. Vim hanc habet, ut potio semine ex mulso uino menses ciet, argentes calfacit potu aut illi liqu. urinæ stillicidio auxiliatur. radix eosdem præstat effectus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Apium satiuum est, cuius gratia uulgo est, cuiusque rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent. Quæ Plinij uerba nostrum uulgare petroselinum magis indicant, Germanis peterlin & peterfilien, Gallis persill appellatum: atque idem σάδιον εὐροστῶν, id est, odoratum. Theophrastus 3. ἐλάδιον, uocat.

Nostrum uerò uulgare apium est Dioscoridis & Galeni Eleoselinum, hoc est cum Saza, paludapium, quia in paludibus & secundum aquæ ductus nascitur. Græci ἐλαδιον, Latini apium palustre, uulgo simpliciter apium, ut aliqui sentiunt. Italiam tamen Maceroneum, aut Cannicam uocare scribit Ruellius, Germani epfich & eppen. Galli Esgrur persil uocant, ut Ruellius arbitratur.

Petroselinum autem uerum ex Macedonia asperis & præruptis petendum ut Galenus docet lib. 1. de antidotis his uerbis. Petroselinum, id est, apium petrosum omnibus notum, in regione Macedonia præcipiti nec magna laudatissimum nascitur, hoc est, acerrimum & amarissimum, maxime si recens fuerit, sed paruum, à qua Estreaticum dicitur & Macedonicum. Plurimum uero in Epiro gignitur, ex qua in Macedonia comportatum, & propè totum in Thesalonicen, inde tanquam Macedonicum à mercatoribus deuenit: alioqui uniuersis gentibus non sufficiat. Quomodo mel Atticum melle ex Cycladiis locupletant, proque Attico uendunt: & uinum salernum in parua quadam Italia regione paruum geniū, sic ab indigenis adulteratur, ut in omnem Romanorum imperio subditam regionem feratur.

Si autem Estreaticum Macedonicum petroselinum desideras, nihil peior sed minus amara erit theophrastice, & alia antidotus, si alterum iniicias. Non enim deleterijs pharmacis, aut uirulentarum bestiarum moribus adeò aduersatur, quod principalissimum est theriacis promissum: sed id hydropicis, imbecillibus, & alijs quibusdam similibus affectibus succurrit.



2  
334  
134

DIOSCORIDIS

Eleoselinum: apud Vulgare.

Ostrutium. Weyster wort.



Pimpinella. Bibinel.



Hodie de petroselino etiam inter doctissimos poris constat. Conrado Gesnero Medico peritissimo id videtur quod hodie Ostrutium, alij imperatoriam uocant, in montibus & Saxosis nascens, figura apij, amarissimum acerrimumque inter omnia apij genera, quod Galenus de petroselino Macedonico & Estracico scribit, quod sane nomen etiam ad Ostrutium accedit. Alij Astrantiam, quidam magis corrumpendo Magistrantiam uocant. Ea dem omino uires uulgi nostrum de eo pollicentur, quas de petroselino ueteres. Alpini ad omne morborum genus quasi panacea utuntur. Germanis Weyster wort dicitur.

Hieronymus Tragus in uera cognitione simplicium nulli secundus, aliam herbam pro ueterum petroselino nobis ostendit, uidelicet nostram uulgarem piminelam, quam Germani Bibinel uocant, & hac sane non longe a legitima ueterum petroselini delimitatione abscedit, quid uero in tanta sententiarum uarietate statuendum sit, doctioribus & quibus plus otij fuerit iudicandum relinquo.

Leonhardus fuchsius imperitis nouam erroris ansam praebeat, eam scilicet herbam, quae semen illud profert, Dioscoridi cap. 53. huius libri Sison appellatum, omnibus tamen reclamantibus notis, errore manifestum nobis obtrudens,

Quod



Quod uero Macedonicum petroselinum uulgo dicitur, est hiposelinū, quod olus atrū, seu pullum à Latinis appellari Hermolaus, Ruellius, Marcellus in Dioscoride inscripserūt, quod meus codex Græcus nō habet, Galenus autē uerū Smyrniū ὄλεος ῥοσόν Romæ uocari iam consueiū scribit lib. 2. Alimēt. Græci ἵπποσελίνο. Latini Hipposelinū, olusatrū ut diximus. Officinæ petroselinū Macedonicū. Ger. à magnitudine Groß eppich, uel Groß eppf. Galli Meicherō Alexandri uocant. Paludapium Wassermeck.

Hipposelinon.

Est & aliud genus apij, ἡλεοσέλινο, ἢ ὄλεος ῥοσόν Græcis. Paludapium & palustre apium (ut uulgare apium) & Rusticū apium Latinis. Germanis Wasser eph, & Bauren eph dictum, nascitur in paludibus, & ipsa aqua, Apio hortulano maius, caule tenero, concavo, folio molli, raro nec hirsuto, simile apio sapore, floribus, semine & radice. Sunt tamen qui genera

apij ita distinguūt, uidelicet, ut primū apij genus, quod Dioscorides hortense appellat, nostrū uulgare apium sit uulgo Eph & Eppich appellatum.

Eleoselinum uero de quo ultimo egimus, scilicet palustre apium. Germanis Wasser & Bauren eppich dictum.

Oreoselinum uero arbitrantur hortulanum nostrū apij. Germanis Petersilien, Gallis persil dictum.

De Petroselino nihil certiconstat.

Hipposelinū quartū genus apij erit, quod Officinæ petroselinū Macedonicū appellari falsō, supra monuimus.

Omnia hæc Selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, & in his præcipuè Macedonicū calidū siccū ordine tertio &c.

### Smyrniū. Caput LXIII.

**S**myrniū, quod in Cilicia petroselinū uocant, passim in Amano monte gignitur. caulē habet apij, & stiones multos: folia latiora, subpinguia, ad terrā infracta, robusta, odore medicato, cū quadam acrimonia, iucunda, colore in luteū laguefcente. capitibus caulium orbiculatis, ut anethi, semine brassicæ, rotundo, nigro, acri, myrrhæ sapore, ita ut alterū alterius loco cedat, radix quoq; odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. cortex eius foris niger, intus uiridis, aut subalbidus. Nascitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus

terrenis. Vis radices, herbæ & seminis, ex calfacere. folijs muria maceratis ad obsonia utuntur. aluum sistunt. radicem contra serpentium ictus bibere conuenit. rufes & orthopneas mitigat. urinæ difficultati medetur. recētes tumores, collectiones, duritiasq; discutit. illita, uulnera ad cicatricē perducit. partus abortui uiuat, si feruefacta subijciat. Semē, lienis, renū & uesicę uitij prodest. menses & secūdā pellit. cōmodē dat ischiadicis in uino. inflatiōes stomachi lenit. sudores ciet, & ructus. peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Proximē ad sententiā Dioscoridis Plinius Smyrniū depinxit. folia apij tradēs habere, latiora, & maximē circa stiones multos, quorū à sinu exiliunt pinguia, ad terrā infracta, odore medicato, cum



quidam acrimonia iucunda colorem in luteum languescere capitibus, caulium orbiculatis, ut ap<sup>h</sup>  
semine rotundo, nigro, qui arescunt incipiente estate. Si cuiq; tam celebres notitia libeat explicare,  
facile perpendet, eam esse herbam quam nostri herbarij, Angelicam & sancti spiritus radicem, à sua  
uissimo eius radice odore, quem spirat: aut ab immensa contra uenena facultate, appellent. Germanis  
Angelica, Heylig geysst wurtz, & Baist wurtz uocatur. Duo huius plantae inueniuntur genera, unum  
Wild angelic. Sam angelic.



in hortis, hac spec  
cie uisitur & sam  
angelica uocatur,  
radix crassa est, et  
multa, foris nigro  
cans, intus candida,  
da, tuber in ea qua  
super terram emi  
net. Caulis ei foenis  
culaceus, folium co  
pium in aurei colore  
languescens, semen  
foliaceum, latum, um  
pe quod figura exi  
le foliolum expri  
mit, in umbello co  
pio simili aut anea  
tho: hoc mira fra  
grat iucunditate.  
Altera sylvestris  
in montosis proce

niens, odore illo suauis cum radix tum semen caret. Satius angelica  
quam uerum esse Smyrnum non dubitamus, unice ueneris aduersa  
tur, quam uim illi Dioscorides quoque tribuit, cum radicem eius contra  
serpentium ictus bibere docet. Pestilentiae populi uim sciens arce  
contagia. Corpora ab hac pestifera uindicat, si tantum, ut adfirmant  
in ore teneatur. Per hyemem cicoris magnitudinem in uino, per aesti

sem exstilitio rosarum liquore sumpsisse satis est. Nec sensurum ea die contagionem pollicemur  
qua quis ducit, nam urina et sudore uenenum abigit.

Weyßhitz wurtz.

### Elaphoboscum. Caput LXIII.



Elaphobosco foeniculaceus caulis est, aut rorima  
rino similis, geniculatus, folijs duum digitorum la  
titudine, ut terebinthi, praelongis, aliquantulum asperis, cir  
cū fractis adnata multa habet, feretia umbellas anethi  
similes, & semina eiusdem: flore sublateum: radice ternu  
digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, candida  
dulci, esui apta. Caulis tener pro olere maditur, contra  
serpentium ictus, datur semen in uino. Fama autem est,  
hoc pabulo ceruas serpentium moribus resistere.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Paucis hodie cognoscitur elaphoboscon, et si frequens ubiq; repe  
riatur, Romani Cerui ocellum appellant, officinae Galliae simul  
herbarij, ut rei ipsius nouae, nouum indiderunt nomen, gratiam dei uo  
cantes. Suefionensis ager, herbam copariam nominat, quod ea utan  
tur ad uulsa, rupta. Nempe gratia Dei, caule proflit foeniculaceo,  
geniculato, folijs ferme duorum digitorum latitudine, praelongis sub  
asperis, infractis. Adnata multa caulis spargit, umbellas anethi simi  
les ostendunt. Semina eiusdem, florem sublateum, radice ternu  
digitorum longitudinis, & crassitudinis unius, candida, dulci, apta  
ei: bo



cibo, Dioscoridis pictura ad ungum profectò representat, nulla reclamante nota, herbanquam modo diximus tam insigni nomine gratià dei uocari. fortè ea quam hodie Weiss hirtz wurz Ger. uocat.

Foeniculum.

Caput LXV.

Hippomarathrum.



**F**oeniculum si herba edatur, aut semē cū ptisana bibatur, mamas lacte replet. comae decoctū in renū dolorib. subditū proficit, quippe quod urinā excitet. cōtra serpentium ictus in uino cōueniēter bibit. mēses ciet. in febr. nausē & stomachi feruorē, ex aqua frigida potū sedat. cōtritæ radices & cū melle illitæ, morbis canum medent. Succus caule & folijs exprimit, & in sole siccatus, in medicamēta adiicitur, quæ ad excitandā oculorum acie cōmodè tēperantur. Extrahitur succus ad eadē ualens, etiā semine uiridi, ramulisq; & radicibus prima germi natione incisis. In lberia quæ ad occidentē spectat, succū reddit gūmi simile. Caulē medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq; admouēt, quò facilius uī caloris exudans gūmi remittat: qd efficacius succo est, ad medicamēta oculorū.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *μαράθρον*. Latinis *foeniculum*, *Marathrum*. Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis *Fenchel*. Gallis *du fenail*.

Foeniculum



## DIOSCORIDIS

338  
Fœniculus validus ordine tertio, siccus primo, semine magis quàm radice, minus folijs, quibus læ-  
gignitur illis urina, & menses magis ciet. Cortex radicis in usu est frequenti, lib. 8. comp. pbar. par.  
μαλαδ ποσσ' αγω per Arabiq; scribit Actuarius, id est, marathri semen.

Fœniculum erraticum, siue hippomarathrum.

### Caput LXVI.

**E**st & sylvestre fœniculum, magnum, fert autem semen cachryi simile, cuius  
radix iucundè olet, potaq; stranguriæ medetur. menses imposita ciet. uen-  
trem sistit, radice aut semine poto. contra serpentium morsus auxiliatur. calculos  
comminuit. regium morbum expurgat. lactis abundantiam facit. decoctum fo-  
liorum haustum, fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus,  
longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odorato. Excal-  
faciendi naturam habet, & uiribus fœniculo respondet ad omnia infirmius.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἵππομαράθρου*. Latine fœniculum sylvestre.

Officinis incognitum. Germanis Wilder fenchel.

Gallis fenol bastard dicitur.

Satio procerius est, brachiali crassamento, folijs etiamnum maioribus, semine miliaceo, radice al-  
ba, odorata, in apricis, & petrosis inuenitur.

Diocles alterum sylvestris fœniculi genus, Dioscoridi *ἵππομαράθρου ἑτέρου* dictum longo &  
angusto folio, semine coriandri representauit. Medicinæ cum eo genere priore communes, uerum infe-  
rioris operæ.

### Daucum.

### Caput LXVII.

**D**aucum aliqui Daucium uocant. Creticum folijs fœniculo simile, minori-  
bus & tenuioribus: caule dodrantali: umbella coriandri: flore albo: semine  
acri, candido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo. radix digitali crassitu-  
dine & dodrantis longitudine adolefcit. in faxosis nascitur, & locis sole illu-  
stratis. Aliud eius genus sylvestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, fer-  
uentis gustus. Probabilissimum Creticum. Tertium assignatur genus folijs corian-  
dri, floribus albis, capite & semine anethi, muscario pastinacæ: semine oblongo,  
ceu cumini, acri. Omnium semen ex calfacit potum. urinam, menses, & partus ex-


Daucus.

trahit. torminibus liberat. ueterè rufsim mi-  
tigat. phalangiorum moribus potum in ui-  
no auxiliatur. tumores illitu discutit. Semi-  
nis duntaxat in alijs generibus inualuit u-  
sus. in Cretico, etiam radicis, quæ maximè  
contra uenenatorum iniuriã in uino bibitur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Dauci genera tria Creticum Latine, Gallica pas-  
tinaca dicitur, uulgo (falso tamè) sylvestris carota, in offi-  
cinis principè retinet appellatione, ea namq; caule as-  
surgit pedali, folijs fœniculi, sed candidiusculis minori-  
busq; coriani muscario, in quo semen hispidum, mili se-  
re capacitare, albu, feruens, acre, odoratum, radice digi-  
tali crassitudine, bipalmu longa, in apricis petrosisq;  
nascitur, Germanis Vogels nesten, Veld moeren dicitur.  
Alterum ubiq; prouenit, præcipuè in terrenis, li-  
mitibusq; & pingui solo, apio simile, feruens, acre, &  
gustanti odoratum.

Tertium genus pastinacæ non dissimile, opacante sa-  
pigum anethi umbella, semine oblongo, odoratu graui,  
sapore, ut cumini acri, utruq; genus asininu daucu herba-  
rijs audio uocari. Galen et Paulus daucu nihil aliud esse  
uoluerunt, q̃ staphilinũ sylvestre. Hippocrates daucum  
Aethiopicum





# LIBER TERTIVS.

Athiopium laudat. Daucum refert Galenus agrestem pastinacam nonnullis nominari. Euchsus et Sylvestre, et sativum genus pastinacae, Dauci, cui radice sisari, et cari confundit.

## Delphinium.

## Caput LXVIII.

**D**elphinium surculos emittit à radice una sesquipedales, aut maiores, à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quae delphinorum effigiem repraesentant: unde tractum nomen est. flos uiolae albae non dissimilis, purpureus: et semen in siliquis milio proximum, quo non aliud utilius bibi potest ab scorpio. ne percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiões resolui, atque ignauos torpescere: semota uero ea, sese recolligere. Prouenit in asperis et apricis. Alterum est delphinium, quod Romani buccinum uocant, superiori simile, sed folijs et ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Herbarij quidam Delphinium esse putant, quam filium ante patrem, uulgo appellant, quod siliqua et intus semen ante floris exitum ostendat, rectius si partus ante conceptum, ab eis appellaretur. A maudio aptius ab teretis siliquulae per extremum in expansum florem exeunte, buccinaria quadam similitudine dici, siquid ea surculis à radice una pedibus funditur, folijs paruis, tenuibus intersectis, incuruis longiuscula delphinis effigie, flore uiolae matronalis, suppurpureo, semine in ualuis teretibus exiguo, milio non dissimili. Inuenitur frequens in asperis, et locis totius diei solem accipientibus.

## Pyrethrum.

## Caput LXIX.

### Sylvestre Pyrethrum.



**P**yrethrum saluarem uocant, folia caulibusque emittit ut daucum sylvestre et sceniculum: umbellamque anethi, circinatae rotunditatis. radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituita elicit, ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. mansa pituitam extrahit, sudores citet, peruncto ex oleo corpore. diuturnis horroribus efficac. contra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximie conducit.

\*capillacea,  
alij.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πύρεθρον*.

Latine pyrethrum à fernido sapore dicta.

Officinis genuinum nomen seruauit.

Germanis Bertram.

Gallis pes Alexandrinus dicitur.

Pyrethrum ab ignea, et caustica urereque dictum, quia mansu saluam potentius, quam pro caloris

modo elicit: unde et saluare quoque; Latine dicitur, ut Dioscorides testatur: in Apennino frequens, annis quinque seruatur: affectibus omnibus frigidis efficax.

Rosina



## Rosmarinus.

## Caput LXX.

**D**Vo rosmarini genera. unum fecundum frugiferumq; cuius semē cachrys uocatur. folia sceniculi habet, crassiora & latiora. in rotā speciem, humi sparsa, iucundē olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis in cacumine umbellam, in qua semen copiosum, candidum, sphōdylo simile, rotundum, angulosum, resinaceum, quod in mandendo linguam exurit. radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum uti sphondylion, odoratum, minimē exurens, radice foris nigra, intus si frangatur, alba. Verum id quod sterile dicitur, illorum planē similitudinem refert: sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promittit. nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium herba communiter hæmorrhoidum profluua sistit. sed inflammationes & condylomata mitigat. concoquit strumas & abscessus qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle ulcera purgant, torminibus medentur cum uino potæ: & contra serpentium morsus conueniunt. mens & urinas cient. ueteres tumores illitu discutiunt. Tam radices quàm herbæ succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semē ad eadem pollet. si comitiale malum sentiatur, aut uetus pectoris uitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum uino & pipere datur. sudores mouet, cum oleo perunctum. ruptis & conuulsis prodest. podagris, cum loliacea farina & aceto tritum, illinitur, purgat uiliginis, addito aceto quàm acerrimo. Semine in potionibus utendum, eius quidem quod Cachryn nō ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactucæ syluestris amaræ asperioribus, cādidioribusq; radice breui, Theophrastus autor est, potuq; id ipsum alterutra parte purgare. Cachrys uim habet ex calfaciendi, & uehementer excitandi, quare abstergentibus medicamentis inferitur. contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita ut tertio die soluiatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Schwarz hirtz wurz.



Libanotidis siue rosmarini Dioscorides tria genera facit, unum sterile, hodie nobis planē incognitum, alterum fecundum, quod duplex est. alterum est cuius semē cachrys dicitur. sceniculi folio, crassiore, orbiculato, in terram iacente, caule cubitali, aliquando etiam maiore, foliis multis, quorum à capitibus umbellæ constantur, seminis plene candidi & sphondylii similis, rotundi, angulosi, gustu acuto, resinacei, accendentis os cum manditur. Radix alba magnitudinis iustæ, thus redolet, & hoc genus, quod equidem sciam, hodie prorsus nulli cognitum. Alterum simile superiori per omnia, sed lato semine atq; nigro, sphondylion imitante, odorato, neq; feruenti, radice foris atra, intus si frangatur alba. hæc est quam Germani Schwarz hirtz wurz appellant, à radice nigra. hanc Fuchsius falsò inter Dauci genera numerauit, eius picturam hic exhibemus.

## Rosmarinum coronarium.

## Caput LXXI.

**R**osmarinum quo coronarii utuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minora, densa, longa, exilia, subter incana, supernè uirentia, graui odore. Excalfactoria uipeditum est. regium sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur; & ubi laborans exercitatione se crediderit.



## Rosmarinus.



Spondylium.



derit, in balnea descēdat, & merum potet. ac opis, gleu-  
cinoꝝ unguento admisceri solet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ῥοσμάρις seu ῥοσμάρινα.

Latine Libanotis coronaria.

Officinis rosmarinus. Germanis Rosmarin.

Gallis rosmarin dicitur.

Libanotis ea quā Romani appellant Rosmarinum, & quā nectena-  
tes coronas utuntur, in exilibus uirgis folium fert tenue, crebrū, oblon-  
gum, & gracile, intus cādicās, & extrā uiride, odore graui, quo Nar-  
bonēsis provincia tractus adeo scatet, ut haud temere lignū aliud urāt.  
Apuđ nos areæ hortorum, elegantē & topiario conueſit opere, utilis fo-  
lio et flore, quem uulguſ absolute ῥοσμά male uocat. nec antidotus dicitur  
ἀνδρῶν Ἀσuarij folius Rosmarini florem recipit, sed aliorum.

## Spondylium. Caput LXXII.

Spondylium folia quadamtenus platani & panacis  
habet. caules sceniculaceos, cubitali altitudine aut  
amplius aſurgentes, in quorum cacumine semen du-  
plex, ſefeli ſimile, ſed latius, candidius, & magis palea-  
cum, grauiſ odoris. flores eius albi, aut pallētes: radice  
raphani, candida. naſcitur in paluſtribus & aquoſis.  
Potum ſemen pituitam per alium extrahit, mēdetur  
iecinoris uitijſ, regio morbo, comitialibus, ortho-  
pnoicis, uuluarum ſtranguſationi. ueternoſoſ ſuffitu  
reuocat. cū oleo cōmode infunditur capitiſ phre-  
niticorum, & lethargicorū. item capitiſ doloriſ.  
cum ruta illitum, ſerpentia ulcera cohibet. Datur ra-  
dix contra regiū morbum, & iecinoriſ uitia circum-  
raſa eadem & iniecta calloſ ſiſtularū derodit. Recen-  
tiſ ſloriſ ſuccuſ exulceratiſ auribuſ, purulentiſq; ac-  
commodatur: qui ceterorum ſuccorum more expri-  
mi, dein recondi ſolet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σπονδύλιον. Latinis ſpondylium & ſpondylium.

Officiniſ Oſtrutium, Aſtrens, Maſſiſtrantia.

Germaniſ Weſſter wurz. Galliſ b auſtruce. dicitur.

Hanc plantā quā uerum ſpondylium eſſe non dubitamus, etiā

uiri docti miſere diſtraxerunt, ut tandem inuenirent, cui capitulorum Dioſc. recte aptari poſſit. Alij  
enim, ut ſuprà oſtendimus, hanc uerum eſſe petroſelinum Macedonicum contendunt, alij Leſerpitium  
Germanicum, alij pro uero Smirnio habent. Sunt & alij, qui hunc ad Panaceſ Dioſcoridiſ referunt, ex  
Panacis adprobateſ deſcriptionibuſ, ex odore, ſucco & gummi, quæ omnia Panacis radicibuſ cōue-  
niunt. ſed ſacile erroris conuincuntur, ſi ad legitimam delimitationem Spondylii conſertur, nulla peni-  
tuſ reclamante nota. Adde quod eaſdem omneſ uireſ uulguſ noſtrum de hac pollicetur, quæ de ſpondy-  
lio uetereſ, atq; hoc loco Dioſcorideſ deſcribit.

## Ferula.

## Caput LXXIII.

Viridi ferula medulla pota utilis eſt ad cruentæſ ex creatiōeſ, cœliacoſq; cō-  
tra uiperarum morſuſ in uino datur. erumpentem naribuſ ſanguinem indi-  
ta ſiſtit. ſemen potum torminoſiſ auxiliatur. ſudoreſ ciet, uncto ex oleo corpore.  
Cauleſ, ſi edantur, capitiſ doloreſ faciunt. muria cōdiuntur. Ferula itaq; caulem  
profert ternum ſēpe cubito rum: folia ſceni culi, longē aſperiora & latiora. quæ ab  
imo caule uulnerata ſagapenum efficitur.

Calidiſ ferula naſcitur lociſ, atq; tranſ maria, hodie planē incognita.



Peucedanum.

Cap. LXXIII.



**P**eucedanum caulem emittit tenuem, gracilem, sicuti feniculi similem, comā habet statim à terra foliosam, spissamq; flore luteo, radice nigra, crassa, plena, graui odore, succosa. gignitur in montibus opacis. Tenuis radix cul-  
tello conciditur, profluensq; è plaga succus um-  
bra mandatur: in sole siquidem cōfestim euane-  
scit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo  
perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sen-  
tiatur. affationi radix inutilis fit. Tam lac quā  
succus radice & caulibus extrahi solet. sicuti è  
mandragora: uerum inefficacior succo lachry-  
ma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiā  
concreta inuenitur lachryma, thuris similitudi-  
ne, caulibus radicibusq; adhærens. Præfertur  
succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo,  
odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo  
illitum peucedanum prodest lethargicis, phre-  
niticis, uertiginosis, comitialibus, & longis ca-  
pitis doloribus. resolutis, ischiadicis, conuul-  
sis, omnibus in uniuersum uitijis neruorū, ex o-  
leo & aceto illitū, prodest eius olfactu respirā-  
tū uulnē strangulatus, & ueternosi reuocātur. in-  
censum serpentes abigit aurium doloribus cō-  
uenienter ex rosaceo instillatur. cauernis deno-  
tium inditum, mitigat dolorē. cōtra tussim effi-  
cacissimè ex ouo aliumitur. suspirijs, torminib.

& inflationibus subuenit. uentrem leniter emollit. lienem absūmit. difficiles par-  
tus mirè adiuuat. facit ad uescicæ cruciatus, & renum distentiōes potum. uulnam  
aperit. Radix ad eadē utilis est, sed inefficacior. eius decoctū bibitur. farina eius  
fordida ulcera purgat, & uetera cicatrice obducit. squamas ossium extrahit. in ce-  
rata & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem nō  
fenserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta aut pae-  
ne calido aut anetho resoluitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πεννέδιον*. Latine *peucedanum*. Officinis genuinū nomen seruauit. Germania  
Cal. li. 8. sim. *Barstrang* dicitur. Peucedani radix calida ordine secundo, sicca tertio: incidit, tenuat, digerit.  
effectibus neruorum frigidis, lieni indurato, pulmōi sarto, pituitæ crassæ, leniæ, ulceribus contumaci-  
bus auxilio est. Succus ex hac expressus uiolentior est.

Gith, seu Melanthium. Caput LXXV.

**G**ith exilibus surculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens. folijs ut fe-  
netiōis minutis, sed multo tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo,  
ceu papaueris, oblongo, intercurfantibus intus membranarum quibus semē includi-  
tur nigrum, acre, odoratū, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum  
fronti, subuenit. discutit recētes oculorum suffusiones, tritū ex irino, & infusum  
naribus. rollit lepras, lentigines, duritias, tumoresq; uetustos, cū aceto illitū cir-  
cumscarificatos clauos excutit, cū uetere urina impositum. dentiū doloribus, de-  
coctum cum aceto & tēda, prodest. teretes uentris tinea expellit, peruncto ex a-  
qua umbilico destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo & olfactū. urinā  
& menstrua ciet, multis diebus sumptum. & lac extrahit. difficultatē spirandi cū  
uino potum leuat phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere haustum  
auxiliatur. incenso serpentes fugantur, Tradunt largius epotum enecare.

NOMINA



Nigella Damascena.

Nigella vulgaris.



Pseudomelanthium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.



Grecis μελάνθιον. Latine Melanthium, gith, nigella.  
 Officinis nigella Romana. Germanis Schwarz Römisch  
 wolriechend Coriander. Schabab. Gallis poiurette, à piperis  
 sapore Nielle, ou nigelle poiurette.

Melanthium est gith, quamvis flore sit ex ceruleo albicante, se-  
 mine nunc nigro, nunc rufo, calidum siccum tertio gradu, tenuium  
 partium, amarum, asiduo olfactu catharos sanat, orthopnoeam iu-  
 uat, lumbricos necat, lepras tergit, menses obcrassit, & lemo-  
 rem retentos mouet. Quæ uerò in segetibus alius adolescit, Ni-  
 gella uulgo dicta, Germanis Ratten/modora, pseudomelanthium,  
 & Githago uocari possit, hæc à Fuchsio falso prololio pingitur.

Laserpitium, &amp; Laser.

Caput LXXVI.

**L**aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferula ceo,  
 quem maspetum uocant: folijs apio similibus, lato semine. Radix ex calfacit,  
 incubis ægrè concoquitur, uellicæ noxia, fugillatis illita cū oleo, & strumis, ac tu-



berculis cum cerato, medetur. ischiadici conuenit cū irino aut cyprino cerato, ex crescentibus circa sedem tollēdis illinitur, cū putamine mali punici, & aceto decocta. uenenis pota resistit. os cōmendat, cibis aut salī permitta. Lafer ē radice atq; caule scarificatis colligitur prāfertur autem rufum, translucēs, myrrhæ æmulum, non porraceū, odore ualens, suauī gustu, quod dilutum facīle albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorē toto corpore ciet. blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicū & Syriacū minus uiribus ualēt, & magis uirosum reddunt odorē. Lafer omne antequā siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, quod maleficiū deprehēditur, gustu, odore uisu, & dilutiōe. Caulem aliqui silphion, radicem magudarī, & folia maspeton uocauere. Efficacissimum lafer, mox folia, postremo caulis. Acrem uim habet. inflammationes facit. perunctas cū aceto, pipere & uino alopecias sanat. o colorū aciem ex acuit. in cipiētes suffusiones, illitū cum melle, dissipat. cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circūligatur, aut cum hisso, ficis coctis in posca, os colluitur. ijs prodest quos bestia in rabie efferata momorderit, uulneribus immisum. ualet aduersus uenena telorū, & animalia omnia, quæ uirus eiaculantur, potum aut illitum. scorpionum plagis oleo dilutū circūlinitur. gangrenis præcoēctis immittitur. & cū ruta, nitro & melle, uel per se, carbunculis, clauos callosq; prius circumrafos uellit. cerato aut aridorum ficuum carne premolitur, recentes lichenas ex aceto sanat. & ex crescentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento futorio, aut ærugine illinatur. extuberantia cū forficē extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur. grauē, subitoq; irrauescentem uocē, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit. uulū illitum cum melle reprimat. anginis ex aqua mulsa utilissimē gargarizatur. uescentes lætiore colore māgonizat. tussi cōmodē in sorbili ouo datur, & pleuriticis, in sorbitionibus: in pēre, & thure potum. neruorū cōtractionibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandum, hærētes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. ad lac intus coagulatum bibitur. comitialibus ex aceto mulso proficit. menses ciet, cum pipere & myrrha potum. celiacos adiuuat, in acino uicē sumptum. cum lixiuicibus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. cum aceto mulso manditur, ad expediēdam arteriā, maxime cum uox retunditur. eo cum lactucis utuntur, exitq; in uicem erucæ. Fertur & altera magudarī in Libya nasci: radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum laferē facultatis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ὄπρος liquor est, crassum illud & lentū, quod ex uulnere effluit, uel radice incisa, qui inde p̄s̄as dicitur. uel caule etiam usq; ad medullā secto, terebrato, castrato, qui λαυλίας dicitur, altero puriore, & perlucidiore, specialius tamē, & per excellentiā ὄπρος, Cyrenaicus et Medicus, & Syriacus intelligitur, qui omnes caliditate & tenuitate exuperat: ob id omnium maxime digerit per haliū, quanquā reliqui liquores sint multū calidi, & spirituiosi, & plurima horū pars essentia aeris, & ignis. ὄπρος tamen, λαυλίας, ὄπρος, Græcis sepe cōfunduntur, & Latinis succus, lachryma, liquor. Præstantissimus autem ex Aphrica est Cyrenaicus Galeno, Indicus & Armenius Mesue: imbecillior Medicus & Syriacus: uterq; enim uirus, & putrilagnem respiciens, ut & Parthicus, & Persicus. Est autem laseris seu laserpitij, seu Silphij herba liquor. E Tabrobana maris Indici, insula omnium maxima conuecti hodie præstantissimū, Belzoy uulgo dictū, scribit Ludouicus Romanus patricius. Opus Cyrenaicus est saluberrimus phlegmōe Gargareonis, & aliorum partium, non incipienti, sed ueterata, & in scirrū durefcenti. Est enim acerrimū & maxime calfaciēs medicamentum.

## Sagapenum.

## Caput LXXVII.

Sagapenum ferulacea herba succus est, quæ in Media nascitur. Optimū est, translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter lafer & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus uetustis, cōuulsis & ruptis, crassam pulmonis pituitam expurgat. datur comitialibus



bus, opisthotonicis, lienosis, item contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & februm circuitus\* in potu, in unguenta probe admittitur. mentes pellit, sed fce \* Alij, perfrictum exanimat, cum hydromelite potum. prodest ex uino haustum, serpentium etiones, quas ictibus, olfactum ex aceto uuluarum strangulatus excitat, oculorum cicatrices, februm circuitus, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, cuitus facit. aqua, & amaris nucibus, aut melle, aut calido pane.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sagapenum est frutex ferulaceus, seu ferule similis planta, lib. 8. sim. seu ferula quædam panaci similis, lib. 1. antid. in Media regione, & abusiue ex ea succus: qui etiam οτρος & γαργυρος dicitur, lib. antid. calidus, tenuium partium, ut alij opi, seu liquores: modice terget, oculorum cicatrices purgat, & terget, suffusiones, & oculorum hebetudines à crasso humore leuat. Laudatur præ lucidum, foris rufum, intus candidum, acre, odore porri, seu medio inter laseris liquorem, & galbanum, quibus adulteratur. Opopanacium nihil est simile, sed galbano albiore. Nam spumosa coherens, albiore, leuiusq; pars galbani in Sagapenum degenerat: pars altera densior, & multò quàm aliud galbanum constrictior, fit Galbanum optimum, Sagapenum respiciens, eaq; tanquàm præstantissima utendum lib. 1. antid. Si uerum est, uino aut aqua statim dissoluitur, adulteratum non liquefit.

## Euphorbium.

## Caput LXXVIII.

Euxia Mauritaniam, inuenitur. ea acerrimo succo terget, cuius eximium feruorem expauescentes in colæ, ouillos uentres eluros arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, cõfestimq; è plaga, perinde atq; uase quodam, in uentriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum, uulnus eiaculatur. Duo succi genera, unum orobi magnitudine, sarco collæ modo emicat: alterum in uentriculis concreuit, atq; uitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre, Euphorbium adulteratur sarco collæ & glutini mistione, sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os ascensum diu detineat, adeò ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium respiciat. eius inuētio tempore lubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit, potus tota die exurit, quare melli collyrijsq; pro acrimoniarum ratione admisceri debet. coxarum doloribus prodest in odorifera potionè haustus. squamas ossium eadem die eximit. uerum eo utentes, necesse est linamentis aut ceratis cõmunire corpus quo ossa cõuectiunt. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpēte nihil molesti passuros, si incisa ossa tenus capitis cute, intritus succus infundat, uulnusq; postea cõsuatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Euphorbium & Euphorbia arbor, unde liquor emanat, qui ex occiduis regionibus affertur, ut Sagapenum ex orientalibus, lib. 3. comp. phar. gener. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spumosa in Maurusiorum terra prouenientis, in uentre ouium reponitur, quoniam hunc solum non erodit. Bi. Gal. lib. 9. mum aut trimum mediocre uiribus adhuc est (taliquè utitur Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in alopec. com. ph. par. cia) interdum & quadrimum. Quarto autem uel sexto anno exoluitur, deinde procedente tempore intotum elanguescit, Gal. ne putes cum uulgo annis decem posse seruari: etiam cum milio, leuibis, fabis: Adulteratur lacte caprimo, sarco colla, glutino, id igni iniectum odorem edit fastidiendum. Pituita purgat Euphorbium, a luba rege inuentum, ab Euphorbo suo Medico, Antonij Musæ fratre, uocatum, sed magis aquam. Euphorbium cum Mastiche, & tragacantho coctum, in pane dedit in morbo Italico Manardus, & sine manifesta noxa iunat. Cum melle tantum Dioscorides cum melle cocto Paulus præbet. Paulus dat si quis quinque, uel septem, imò drachmam unam, ad quam Dioscorides quoq; accedit, Auicenna tres obolos. Serapion duos.

## Galbanum.

## Caput LXXIX.

Galbanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopiū uocant. Maximè laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigie præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis & ferulæ, graui odore, neq; ualde humidum, neq; nimis aridum. Adulteratur faba fresa, relina & ammoniac. Galbanum ex calcia urit, extrahit, discutit. mentes ac partus trahit. appositum uel suffitum, lentigines aceto & nitro perunctas tollit. deuoratur ad tussim ueterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa, aduersatur toxicis, potum



cum uino & myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit. impositus lateris doloribus, & furunculis. comitiales & uulnæ strangulatus, & uertiginosus olfactu suscitatur. si uratur, fugat nidore serpentes, & perunctos feriri non patitur. serpentes cum oleo & sphōdylo circumpositum, necat. dentium dolorē oblitum aut cauernis iaditum, mitigat. urinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad portiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsaue: aliās meconio, ære uiso, aut felle liquido. Si purgare galbanum uoles, in feruentem aquam demittito. namq; cum liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raroq; alligatū in fictili aut ærea pyxide ita pendeat, ut imum uasis ne tangat: opertoq; uase in feruidam aquam demittito: sic enim syncerum, ueluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Galbanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secundi, aut principio tertij, siccus initio secundi: mollit, digerit, addit Dioscorides, trahit, urit. De hoc pauca supra in sagapeno. Laudatur purum ligno, aliquid tamen seminis mistum habens, odore graui, sapore abominabili, humidi & sicci medium, pingue, & in hammoniaco aut thuris similitudinē cartilagineosum. Eius obolos tres muscet Andromachus arteriacæ. 12. alteri drach sex. lib. 7. comp. pharmaco. ph. par. cōp. part. Purgandi eius sordibus ratio Dioscoridi traditur. Vitiatur resina, saba fracta, Hammoniaco, ut idem Dioscorides testatur.

## Ammoniacum.

## Caput LXXX.

Ammoniacum ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agasyllim uocāt. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sordē spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod uerò terram & calculos collegit, phryama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arborē. Mollit, extrahit, calfacit. tubercula duritiasq; discutit. potum, aluum soluit. partus extrahit. lienem consumit, drachmæ pondere\* hauitum. articulorum coxendicūq; doloribus liberat. auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pisanæ succo forbeatur. cruentam urinam pellit. albugines oculorum absterget. genarum scabritiam absument. tritum autem cum aceto, & impositū, iecinoris lienisq; duritias sedat. discutit tofos, qui in artubus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines & coxendicum dolores eo perungi utile est, cum nitro & cyprino oleo, uice acopi.

## EXPLICATIO.

Hammoniacum seu Ammoniacum. Galbanum, emolliū, mitigant emplastica sunt: ut opopanax, sed illis ualentiū Gal. lib. 10. simp.

## Sarcocolla.

## Caput LXXXI.

Sarcocolla, la chryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, rufa, gustu amara. Vulnēra glutinat. oculorum fluxiones inhibet. emplastris inferitur. Adulteratur admisto gummi.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Sarcocolla quod carnē glutinet, Græcè dicta, tanquam sit carnis colla. nā vulnēra glutinat, & sine morſu siccatur. Albam rufæ præfert Plin. & annis nigrescere scribit. primo gradu aut circiter calida uidetur, nam Dioscoridi sub amara, Plinio cum quadam acrimonia dulcis. Gal. emplastica, & parum amara dicitur. siccans sine morſu. Ophthalmias discutere expertus est Manardus, ubi hæc constitit, in tio enim cum uino fluxiones oculorum sistit, Dioscor. & Plinio. Sarcocolla ueteres tantum foris usi sunt: purgatricem uim, ut Medici Arabes, nō dederunt, quæ etiam hodie parum est cognita. Si purgat & ueniculo est noxia calido, impinguare uidetur tantum per accidens: uacuat scilicet excrementis. probam nutritionem impediētibz, id quod alijs purgantibus est commune: sed dum correctæ est lacte asinino: calida humida euadit, ob id semen augere, & promouere potest. Hanc dies quinq; asinino lacte indies mutando macerant. post aqua rosarum dissoluunt, ut castigent.

Glaucium



## Glaucium.

## Cap. LXXXII.

**G**laucium, succus est herbae quae ad Hierapolim Syriae nascitur, folijs ferè corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris terri, gustus amari, tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semisrigidis clibanis calfaciunt indigenae, usque dum flaccescant, deinde confusis succum exprimunt: cuius est usus ad oculorum medicamenta, utpote cum inter initia refrigeret.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quantum hic succus differat à succo Papaueris corniculati hic docet Dioscorides, & succum ex trahendi rationem. Graecis in usu multo & Arabibus, nunc ignoratur: ualenter astringit, & insigniter refrigerat. Officinae Barbaro nomine Memithe appellant.

## Glutinum.

## Cap. LXXXIII.

**G**lutinum, quod xylocollan, alij taurocollan uocant, praestantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur, id candidum est & translucens.

Nigrum uerò minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasque cutis delet. ambustus igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. uulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Glutinum siue gluten, Germanicè Leym. Gallicè non aliter quàm Graeco uocabulo colla dicitur. Praestantissimum est ex auribus taurorum & genitalibus, sed adulteratur nihil & què, quibusuis pellibus inueteratis & decoctis, Rhodianum uerò Dioscoride teste fidelissimum, eoque medici & pictores utuntur. Lignosum improbat. Contexti par est & reliqua glutinum genera, Auro glutinum est sancteria, ferro argilla, erismas cadmia, laminis alumè, stagnum eramentis, stagno argentum, marmori & plumbo resina, plumbum nigrum albo, album ipsum sibi. Est & glutinum auri cum inducitur ligno Leucoporon siue leucophaon Germanis goldt grundt uocatum, habetur & glutè librarium ex similia & polline Bäch binder bapp, Germanicè appellatum &c.

## Glutinum piscium.

## Cap. LXXXIII.

**I**chthyocolla, gluten piscium, uenter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrum, & quod celerimè liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothris, quae cutem faciei erugat & extendunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc Galli collam buccae, hoc est, colle de la bouche appellant. Germani mundt leym, quod oris salina diluere glutinandis rebus soleant. Alij collam Moruae, ita enim cetaceum uocant piscem. Germani hausen blasen, piscem uerò em hausen, quo frequentissimè uescuntur, cuius glutinoso uentre & corio glutinum fieri inter omnes conuenit.

## Viscum.

## Viscum. Cap. LXXXV.

**V**iscum optimū est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperi nihil, aut furfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio, contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquant, sunt qui commanducando ipsum efficiant, gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus, quinciam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula,





caterasq; collectiones ad maturationem perducit. cum resina autem & cera pari, epinyctidas in splenio sanat. uetera ulcera abscessusq; quos cacoethes uocant, ex thure mollit. lienem cum calce, gagate, aut alio lapide coctum & impostum absomit. cum sandaracha, aut auripigmento illitum, ungues extrahit. mistum cum calce & uini fece, suam uim intendit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἰσχυρ.

Latine Viscum, de planta intelligitur cuius picturam damus, uel eius granis expresso glutino.

Officinis uiscum quercinum dicitur, & non sine graui errore interdū ad emplastra puluere ligni pro uisci glutino utuntur. Germanis Mystel, Affotler. Glutinum uerò vogelleim.

Gallis du guy appellatur.

Quidam putant lignum uisci ē robore aut ilice si terram non attigerit comitalibus mederi, conseptumq; sceminarum adiuuare, si omnino secum habeant. uulgo eychen mystel dicitur: de uisco uide plura lib. 1. Fit & uiscum in Syria ex acinis, quos ab Augusti, ut arbitror, honore, sebastos appellauerunt, & hodie quoq; officinis adhuc Sebeste ubiq; dicuntur: ueteribus fuisse myxa coniectio, quæ & per diminutionem quoque myxaria recentioribus Græcis nominantur ἰσχυρὸν φυτόν, id est, a multo lento ē naribus fluere: cum simili hi fructus abundant, bilem detrudere, & sitim sedare dicuntur. humida primo gradu, calido frigido temperata.

Iuile. rot baust berle.

Sebeste, schwarz baust berle.



Iuibe, Zizypha Græcis, Zizipha etiam Actua-rio, fructus Myxarijs affinis facultate, nam calidus humidus primo gradu, etiam pulmonarius: id duplex. sericum, id est rufum, Gallia frequens, & candidum adhuc ignotum, ad fluxiones calidas, acres, tenues, in pectus salubre: ut alimentum uerò a Galeno damnatur lib. 2. alimentorum, quem locum Auicenna. Sauanorola citant in suis iuibis. horum picturā libuit hic exhibere cū in usu officinarū sine frequentissimo, nulla uerò eorum apud Dioscoridem fiat mentio.

Aparinae.

**A**parinae ramis multis & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per interval- la orbiculato foliorum ambitu, ut in rubia. flos albus: semen durum, rotun- dum,





dum, concavum, album, umbilici figura, asperitas teuestium tenaci. Ea pa stores coli uice uritur, ad eximendos è lacte pilos. seminis, caulium, ac foliorum succus, potu contra uiperarum phalangio tumque morsus auxiliatur. infusu aurium dolori medetur. Herba cum axungia trita strumas discutit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀμαρίν.

Latine a parine.

Officinis & Herbarijs Aspergula. alijs Ruella.

Germanis Fleb Kraut / Liddogeng.

Gallis grateron dicitur.

Ramosa est herba, quadrangula ex intervallis orbiculato, foliorum ambitu, & ueluti stellatim decussato, ut in rubia. Flos albus, semen durum, rotundum, concavum, album, umbilici figura. Omphalocorpon inde dici putatur Dioscoridi, ab umbilici similitudine, quâ semen præfert. Et philantropos à nonnullis dicta, (quia uelut amicus solent)

uommementum lacinijs adhaereat. Hippocrates, ut Galenus putat, philonon & philuceron appellat &c.

Alyssum.

Cap. LXXXVII.

**A**lysson fruticosa herbula est, unicaulis, subaspera, rotundis folijs: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen quadamtenus latum in montibus & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febre, potu discutit. Idem efficit si quis eam aut teneat, aut odoretur, cum melle trita, ut ita cutis in facie, & lentigines emendat contusa in edulio rabiei canis mederi putatur domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum, purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀλυσσόν.

Latine Alyssum.

Officinis & herbarijs mater Sylua.

Germanis Waldmeysser, Waldmännlin.

Gallis rubra minor.

Alysson



Alyſſon.



Aſclepias.



Atractylis.

**A**tractylis, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis uirgis, magna parte nuda, aspera q̃; qua foeminae pro fusis utuntur, capitula in cacumine

Alyſſon Plinio distat à rubea, folijs tantum ramisque minoribus quippe nomen accepit, quod emorsos à cane rabiem sentire non patitur potum ex acetō alligatumq̃. In montibus & asperis emicat, inuenitur etiam in pratis, locis humidis & opacis. Dioscoridis uero Alyſſon propius accedere uidetur ad eam quam rusticam cannabim uocant Herbarij. Siquidem styptica folia berrula est, unicaulis, folijs per initia satis rotundis, ubi adoleuit oblongis, & per ambitum leuiter serratis, fructu duplicum scutorum effigie, in quo est semen quadamtenus latum, in montibus & asperis emicat, inuenitur quoque in pratis frequenter.

Aſclepias.

Cap. LXXXVIII.

**A**ſclepias, ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas. floris uirus graue. semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex uino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus uulnè mammaramq̃; ulcera, quæ cacoethe uocant, illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀσκληπιάδα. Latine Aſclepias.

Officinis Vincetoxicum, hirundinaria. Germanis Schwalmen wurz.

Gallis Hederæ apud aliquos appellatur.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mensum prouocationem utuntur & ad rabidi canis morsum, uenenisq̃; potenter resistere assident, unde etiam haud temere uictrix toxici ab iisdem appellata est.

Hydropicis etiam radicem in uino maceratam & subinde coctam, mrisicè auxiliari tradunt. Flores præterea foliaque siccata, mox tritis, uulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida enim ulcera purgat, & ad cicatricem perducit, genitaliūq̃; uitij et rupturis egregiè mederi docet. Quæ in uniuersum oēs facultates cū ijs quas Aſclepias obtinet, pulchre quadrat ut eandē esse Hirundinariā officinis, Gema. uero schwalmen wurz uocatam herbam, nullus deinceps dubitare debeat.

Carduus Brnedictus.



Cap. LXXXIX.



cacumine spinis horrent. flos luteus: quibusdam in locis purpureus inuenitur. radix tenuis, superuacua. Coma, semen & folia cum pipere & uino teruntur uti-  
lissimè contra scorpionum ictus. percussos tradunt quamdiu ea teneatur herba,  
nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀτράκτυλις ἑρπῆα. Latine atractylis alter. Officinis carduus benedictus.

Germanis Carden benedicten. Gallis chardon benoyt.

Carduus à nostris benedictus, ob singularem plantæ totius amarissimæ facultatē aduersus pestilen-  
tes, putresq; alios affectus. præterea contra serpentium & scorpionū morsus ualere omnib. in confesso  
est. reiectiones contra capitis uehementissimos dolores, uertiginem, memoriā anussam, in cibi aut po-  
tu sumptum ualere tradunt. Idē ad putrescentia ulcera, mammarū potissimū, si in puluere redactus in-  
spargatur. Atractylis spinae mico similis canō est q̄ Euschiu falsō depingit omnib. reclamantibus notis.

## Polycnemum.

## Cap. XC.

**P**olycnemon, frutex est furculosus, folijs origani: caule, ut pulegij, geniculis  
multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni  
odoris & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum cum aqua,  
efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad urinæ stillicidia ruptaq; cum uī  
no bibitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæc herba hodie incognita adhuc, Plinio cum le bubale appingitur similis, semine pulegij, surcu-  
losa, multis geniculis, corymbo odorato, acris & dulci odore, quæ ferro factis uulneribus commanda-  
cata imponitur, quinto die soluitur.

## Clinopodium.

## Cap. XCI.

**C**linopodium frutex est folijs serpyllo similis, furculosus, duum dodrantum  
altitudine, nascitur in petrosis. flores, marrubij modo, ex interuallis distin-  
cti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba & succi eius decoctum, ad con-  
uulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus, menses & partus pellit, & peniles uer-  
rucas, quas acrochordonas uocant, eiicit, aliquot diebus potum, aluum sistit de-  
coctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin ex uino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κλινωπόδιον. Latine Clinopodium, herba orbiculata.

Officinis pulegium montanum, lecti pes. Germanis wirtel doß, dicitur.

Folij est serpylli, floribus per interualla furculos coronantibus, ut in marrubio, altitudine frē  
pedali, passim in Saxonia in petrosis nascens.

## Leontopetalum.

## Cap. XCII.

**L**eontopetalon caulem emittit dodrantalem, aut altiozem, plurimis alis con-  
cauum, & in cacumine semina parua duo aut tria, in siliquis, cicoris modo:  
flores anemonæ similes, punice coloris: folia brassicæ, sed papaueris diuifura:  
radicibus nigris, rapæ similibus, strumosis, nascitur in aruis & fegetibus. Radix  
auxiliatur serpentium ictibus, ex uino pota. nec alia res celerius dolorem finit,  
miscetur ischiadicorum clysteribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Leontopetalon Italia papauerculum, & leoninum semen appellat, caule semipedali, aut etiam  
maiore, alis numerofo, quarum cacumine in siliqua semina cicoris modo bina ternaq; continentur. flo-  
re puriceo, simili anemonæ, folio brassicæ, diuifo, papaueris forma, radix nigra similis rapæ, strumosa  
stuberculis quibusdam cœu nodis articulorum eminentibus: nascitur in aruis frumentario agro. Pa-  
ta leonis officinis & herbarij. Germanis Lewen tapp/lewen tapp. Gallis pate de lyon dicitur.

## Teucrium.

## Cap. XCIII.

**T**eucrion, siue at alijs placet teucriis, herba est uirgæ referens effigiem, trisa-  
ginis similitudine, tenui folio, non multum à cicere alieno. hæc in Cili-  
cia iuxta Gentiadem Cissademq; ubertim prouenit. Recens cum posca, aut aridæ  
seruefacte ius, potu lienem potenter absumit. lienosis cum aceto & ficis illinitur.  
item serpentium moribus ex aceto solo, sine ficis.

## NOMI-



DIO SCORIDIS  
NOMINA ET EXPLICATIO.

Teucrium.



Græcè *τεύκριον*. Latine Teucrium.  
Officinis incognitum.

Germanis *Gross bathengel* dicitur.

Teucrium uocatū est Græcis pariter & Latinis, quod Teucer Atacis frater hoc inuenerit ut Plinius refert, (De Hemionitide, quam Teucer quoque inuenit, & ideo Teucrion cognominata, scribendum alibi nobis erit) Recentioribus planè uulneraria herba est, ui no incocta & epota. Hieronymus Tragus uir in re herbaria exercitatus fide dignissimusque, aliam herbam Herbarijs & Officinis Veronicam, Germanis uero *Erenpreis* appellatam, uerum esse Teucrion Dioscoridis scribit, quæ sua descriptione Teucrij faciem, non malè exprimit, sed nihil definitio, eruditioribus iudiciū in hac relinquens. Hæc mirificè ad crenta ac uetera uulnera & ulcera sananda confert.

Scabiei denique & omnibus cutis uitij medetur. Tumores etiam in quacunque parte corporis fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius usum unicè commendant in febribus pestentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum uero pulmonis exulcerationibus. Ob mirificam sanandi ulcera & uulnera facultatem, Germani *Grunde* heyluoant.

Veronica. *Erenpreis*.

Trifago.

Cap. XCIII.

\*chamærops



**C**hamædrys Græcis, alij chamædrops\*. Latine trifago dicitur. sunt qui eam teucrion appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis & asperis, frutex dracentalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus: flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lieni, urinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur. citi menfes partus extrahit. liem ex aceto pota confusumit. aduersus serpentium uenena ex uino, potu illitumq; efficacissima. trita digeritur in pastillos ad supra dicta. purgat ulcera, cum mel

le. cum oleo illita caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *χάμειδρος*. Latine Chamædrys. Trixagratula. Germanis *Fleyn bethonis* gamander. Gallis *petit chesne*, gelimander.

Chamædrys



Vera Chamaedrys.



Chamaedrys, id est, quercula, amara, subacris, calida secca tertio gradu, sub calidior paulo quam sicciior. Ex Creta (quae nunc Candia) Caesari adferebatur ad theriacis compositionem, tamen ubique nascitur, etiam in Romae suburbijis, odore & gustu quam Cretica uchemenior, praesertim si multo imbre non fuerit irrorata, quamuis hac campestris sit melior. Praegnantis semine cum Dioscoride, aut succo cum Plinio, aut etiam flore cum Galeno capitur.

Leucas. Cap. XCV.

Leucas montana, latioribus quam urbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quam sativa habetur. Vtraque ex uino contra animalium uenena, praecipue marinarum opitulatur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Leucas cui eadem Leuce uidetur hodie incognita. In quo genere apparet grandior quae in syluis emicat, a triplicem rusticam Herbarij uocant.

Tunica.

Donderneglin.

Lychnis coronaria.

Mergen rößlin.

Lychnis. Ca. XCVI.

Lychnis coronaria, flore est albae uiolae simili, quo corollae factitantur. Contra scorpionum ictus semen in uino potum auxiliatur. Lychnis syluestris, omnia urbanae similis. Bilem per aluum detrahit, semine duabus drachmis potu. ictus a scorpione subuenit. Aiumt huius herbae appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

NOMINA ET EXPLI.

Graece Λυχνίς, sepaeu uocant.

Latine Lychnis coronaria, Gaza lucernulam uocat, Plinius Rosam Graecam, uel Graeculam.

Officinis herba Tunica.

Germanis Donderneglin/ Wild neglin/ Felt neglin/ Blütsrößlin.

Callis Giroffles saunages dicitur.

Folia habet porracea, oblonga, stamina quo medium diuiditur puniceo ac rubente cum resto calamo triangula,





floribus in uertice purpureis alba uiole similibus: syluestris Lychnis meminit Hermolaus in corollario in herba Lychne, sibi tamen ignota. Eam uenetijs hepatica nomine in litioribus passim nasci scribit, olitorio sive ieiuniorum tempore quo nascitur uenalem. hæderaceo serè folio, flore purpureo, lilij pusilli effigie. Conuoluit herba sese quibus appropinquat. Ciet aluum cocta et cruda oleris modo accepta. Hæc Hermolaus uerba Lychnis eandem esse liquido coniectantur. Plinius quodam loco Lychnis flammæam cognominat, et omnino ea uidetur esse, quam Germani uocant *Fräwen rößlin*, flore alba uiole simili, inodoro, nec nisi coloris gratia coronamentis additus. Nam æstiuus is flos, cauliculis incanis, calice quadrangulo, purpureo flore, betonica aculeatis apicibus, folijs circa terram frequentius, semipedali longitudine, sesquiunciali latitudine, mollibus ac lanuginosis, radice numerofo capillitio fibrato: hanc ego potius Lychnis coronariam satiuam seu hortulanam crediderim quamuis et altera superius descripta à legitima delineatione non longe abscedat.

Lilium album.

Lilium rubens.

Lilium. Cap. XCVII.



Lilia coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam uocata. E quib. unguentum tēperatur quod aliqui lirinum, alij fusinum appellant, neruos et priuatim uulug duricias emolliens. Folia herbæ illa contra serpentium ictus auxiliantur. feruefacta, ambustis proficiunt, aceto condita uulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in ergreo uase coquitur, conuenienti medicamēto uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat uuluam emollit, menses ciet, uleeracicatrice obducit, cum melle detrita neruis præcis, luxatisq; medetur, utiligines, furfures & lepras emendat, ulceraq; in capite manantia expurgat, abstergit faciem & erugat, teritur in aceto cum hyosciami folijs, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur.

ignibus sacris semen & folia cum uino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphylia, efficacissima unguentis nascuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κεϊνον.

Latine Lilium, lunonia Rosa.

Officinis genuinum nomen retinuit.

Germanis Gilgen, Lilgen.

Gallis Fleur de lis, lyß, dicitur.

Lilium uero rubens apud nos frequens, flore tantum ab albo diuersum, alias simile, Græcis Κεϊνον, γοδρον, Germanis Rot lilgen, Gallis Rouge lyß appellatur.

Gale. lib. 7.  
simpl.

Lilij radix terget primo ordine, digerit moderate, emollit, menses ciet, uulnera glutinat, etiam in capitibus musculorum cum melle mista. Eadem præstat folium, sed imbecillius. Flos uero substantia constata mista ex tenui et terrea, et aquea: coctus ex oleo mollit, et citra morsum digerit &c. Plura Lilij genera uide apud Theophrastum cum nostris in eundem annotationibus.

Ballote.

Cap. XCVIII.

**B**alloten, nomine alio nigrum Marrubium uocant. caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex una radice: folijs maioribus, quam marrubij, hispidis, intercedente spacio, subrotundis, graueolentibus, apiastro proximis: unde aliqui apiastrum eam uocauerunt. candidi flores uniuersi uerticillato ambitu caulē coronant.



Ballote.



coronant. Vis eius efficac̃ aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. feruenti cinere flaccescunt folia, ut condylomata reprimant; purgant & sordida ulcera cum melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βαλλοτὴ.

Latine Ballote, Marrubiastrum.

Officinis Marrubium nigrum.

Germanis Schwarz Andorn dicitur.

Ballotem alio nomine melanprason Græcis appellari Plinius tradit, herbam fruticosam, angulosi caulibus, nigris, hirsutis, folijs uestientibus, maioribus quam porri, et nigrioribus, graueolentibus. Sed deceptum hic Plinium constat similitudine nominis prason pro prason legemem, nam Marrubio folia sunt non porri sed Marrubij albi, aut apiastrum.

## Apiastrum. Cap. XCIX.

**M**elissophyllon siue Melitæna, id est, Apiastrum, id sibi nomen usurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. cauliculi & folia ballote, de qua paulo ante diximus, similia essent, nisi maiora, tenuiora, nec ita hirsuta spectarentur. citreum malum olent. Folia cum uino pota aut illita prosunt contra ictus

Melissa. Citrago.



Apiastrum.



phalangiorum, scorpionumq; item aduersus canis morsum. decocto eorum dem gratia, fo- ueri prodest. de sessionibus feb- minarum ad ci- undos menses conuenit. den- tes eodem in do- lore colluuntur. dysentericis in- funditur. Fun- gorum strangu- lationibus fo- lia; addito ni- tro, potu auxili- antur: tormina- bus & ortho- pnicis, delin- cti illita cum sale strumas discuti- unt, ulcera pur- gant, articuli- os dolores illita sedant.

Y z



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μελισσόφυλλον.

Latine Melissophyllum, Citrigo.

Officinis Melissa.

Germanis Mutterkraut / Wangen Kraut.

Gallis De la Melisse poniceade.

Duo Melissophylli genera exhibemus depicta, unum passim in hortis colitur, alterum nascitur in suis odor multo, suaviori: hoc genus uerè Melissophyllum, id est, apū folium, quod herba hac præsertim florentes apes plurimum gaudeant, unde Apiastrum Latinis dicitur: alterum uero à citri odore Citrago. Folia & cauliculi sylvestris Melissophylli (quia in sylvestribus nascitur) Balloti seu Marrubium

Gale. lib. 7. 2<sup>o</sup> similia sunt, maiora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, iam etiam in hortis scri cæpit. Melissophyllum uiribus est Marrubio simile, sed imbecillius, ob id etiam usu rarus.

Gale. lib. 7.  
simpl.

## Marrubium:

Ca. C.



**M**arrubium, frutex est ab radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis, folium pollicem æquat, subrotundum, hirsutum, rugosum, gustu amaro, semen in caulibus, & ex interuallis. flores uerticillato ambitu, asperi. Nascitur propter ædificia, ruinas, & ruina. huius folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus datur cum melle suspensio, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. crassam è pectore pituitam, cum sicca iri ejcit. mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpente demorsi sunt, uesticam renesq; lædit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis. pterygia nomasq; sistunt. laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet. cum uino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ράριον.

Latine Marrubium.

Officinis Marrubium album, Prasium album.

Germanis Andorn / Gottes vergeß / Lungen Kraut.

Gallis Du marrubium dicitur.

Marrubium seu prasium album, sapore amaro, calidum ordine secundo, siccum tertio: lienis & hepatis obstructions soluit, pulmonem & thoracem purgat, menses ciat, ad motum terget, digerit, & cum melle oculorum aciem claram reddit.

Marrubium nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera. Colligitur herbam æstate Iunio & Iulio potissimum mense, dum semine est prægnans.

Theophrastus duplex genus constituit, unum folio herbaceo, et incisuris altioribus serrato, unguentis, ut idem ait, ad quædam quæ sita: huius picturâ supra exhibuimus, alterum folio rotundiore, uehementer squalido, ut salvia, & obscurius serrato: hoc candidum interpretor, de hoc capiti præfermi agitur Dioscorides.

stachys



## Stachys.

## Cap. CI.

**S**tachys frutex est marrubio simili, sed longior: folia fereis numerosa, hirsuta, rara, praedura, cana, odoris iucundi, & complures uirgas ab radice exeuntes, marrubio candidiores, nascitur in montibus & asperis. Vim habet exsiccatoriam & acrem. foliorum decoctum potu pelit menstrua & secundas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece *Στάχυς*.

Latine *Stachys*.

Officinis nomen nullum inuenit.

Germanis *Niechender Andorn*.

Gallis *salina mollis* appellatur.

*Stachys marrubio* similis, paulo tamen longioribus folijs pluribusq; modice hirsutis durisq; iucundi odoris: uirgulis ab una radice pluribus, quam marrubij candidioribus: montes & aspera diligit. *Stachys* gustu acris & amara est, tertijq; ordinis exsiccacium.

## Phyllitis. Ca. CII.

**P**hyllitis, folia promiscue rumici similia, longiora, & uiridiora, sena aut septena, recta, quae parte anteriore laeua cernuntur, a tergo autem pensiles, quasi uermiculos tenues ostendunt, in umbrosis & opacis horarum locis emicat, gustu acerbo, neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in uino pota serpentium moribus aduersantur, quadrupedibus per os infusa auxilio sunt. & si dysenteria aut resoluta aluus exercet, potui datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Phyllitis Euritio* Cordo, quam uulgo *linguam Ceruinam* dicit, esse uisae est, *Ruellius* uero *Hemionium* linguam cerui facit, cui *Gesnerus* subscribit, sed de hac re copiosius in annotationibus nostris, mca. 128.

## Phalangium. Cap. CIII.

**P**halangium a quibusdam phalangites uocatur, ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresue, in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habens. semine nigro, lato, ad lenticulae dimidatam figuram, multo tenuiore. radice parua, tenui, herbacei coloris dum a terra eruitur, prouenit in collibus.

Huius folia, semen, flos cum uino pota, auxiliantur contra scorpionum phalangiorumq; ictus, rormina quoque discutunt.

*Phalangium* uel *Phalangis*, herba hodie incognita.

Y 3



Lingua Ceruina.





## Trifolium.

## Cap. CIII.



Album.



**T**rifolium, Græci Triphyllon, alij oxytriphylon, alij menyanthes, alij asphaltion uocant. frutex supra cubiti altitudinem attollitur, uirgas habens tenues, iuncas & nigras, unde ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus terna singulis germinationibus exeunt folia, loto arborisimilia. hys recenter enatis rutæ odor inest: ubi autem adoleuerunt, bitumen olent, florem edit purpureum, semen quadamtenus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum, antennæ modo corniculum gerens. radix tenuis, longa, ualida. Semen & folia in aqua pota pleuritidis, urinæ difficultati, comitialibus, & hys qui aquæ inter cutem principia sentiunt, foeminis quoque uulvæ uitio opportunis, auxiliantur. menses ciunt. ternæ drachmæ & semine dari debent, & folijs uero quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radices, foliorumque decoctum soti dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. qua autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum uino potu dedere, & in quartanis, quaternana, ut quæ febrim circuitus discuterent. Radix antidotis inseritur.

## EXPLICATIO.

## Luteum.



## Purpureum.





Greci Τριφυλλόν. Latine Trifolium odoratum. Officinis inusitatum.  
Germanis Siben gezeit, propterea quod singulis diebus septies odorem (ut aiunt) suum habeat,  
et toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerptum autem et exiccatum, odorem suum  
perpetuo retinet. Qui certe pluuiosa temporis constitutione, ac tepestate instante multo uehemētior,  
oxytriphylon, sic sanè ut totas aedes, in quibus herba reposita est, odore suo cōpleat.



Potest etiam imitatione latina cōmodissime adpellari wolkechender  
Flee. Sponte sua in Germania non promittit, facum uerò nulla difficulta  
te prodit. Calidū est et siccum in tertio ordine. Debet autē huius tri-  
folij odorati usus esse subinde in omnibus officinis, quod mirificè aduer-  
setur uenenis, et ad ulcera malefica sananda perquam utile sit. Cete-  
rū ad huc tria apud nos passim in pratis proueniencia cernuntur trifo-  
lij genera, quorū primum a florib. purpureis. Trifolium pratense purpu-  
reum, germanicè brauner wysen Flee, braun fleisch blümen. Gallicè  
treuifle incarnat, alterū itidem a floribus suis candidis Trifolium pra-  
tense album, Germanis weiß wisen Flee, weiß fleisch blümen. Gallis  
treuifle blanc: et tertium luteum, Germanicè gel wysen Flee. Gallis  
treuifle iaulne appellatur. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum  
differunt: quoduis enim horum generū tribus constat folijs, quae in pri-  
mo sunt latiora et herbacea, in secundo autem longiora et angustio-  
ra, magisque pallescentia candidantiaue in tertio sunt parua et rotun-  
da, adque foeminae folia accedentia. Adstrictiorie cuiusdam qualitatis

sensum in gustu praese ferunt, non tamen multum admodum, nihilominus sunt tenuium partium et ex-  
icatoria, quandoquidem etiam exigua acrimonia praedita uidetur. Trifolium acutum, quod oxytria-  
phyllon appellatur (ut Scribonius Largus scriptum reliquit) nascitur in Sicilia plantatum, nam Ita-  
liae regionib. nunquā eam uidit herbā, nisi in Luciae portu cum Britannia peteret cum Claudio Cesare.  
Quod uerò apud nos oxyrys siue oxytriphylon dicitur, Officinae, herbarij panem cuculi et alleluia  
uoce barbarā uocant. Germani Gauchbrot, saur Flee, büch ampffer, hasen ampffer, gauch Flee ap-  
pellant, humile, longis tantum pediculis, trifolium praefrens acetoso sapore, flore candido, rufo in luna-  
tis siliquis foetu, radice intransuersum longa et fruticosa. Hoc in acetarijs utuntur iucundo sapore, id  
quod ab acido sapore Plinio oxyrys dicitur, folia habet lenta, unde illi trifolij nomen apud Ger. Officinis.



#### Polium. Cap. CV.

Duo genera polij montanū, cui theu-  
trio nomē est, & cuius est usus, tenuis,  
frutex est, candidus, dodrātalis, semine refer-  
tus: capitulo in cacumine quandā corymbo-  
rū speciē prefeferente, puo, canis hominis si-  
mili, grauiter olēte, nō sine quadā suauitate.  
Alterū fruticosius, nō usq; adeo ualens odo-  
re, & uirib. infirmis. Potū feruefacti ius au-  
xilium serpentium ictib. hydropicis, morbo re-  
gio, & lienosis ex aceto. stomachū malē ha-  
bet, caput dolorib. afficit, aluum et menses  
ciēt, substratū suffitūue serpētes abigit, uul-  
nera conglutinat.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Polium montanum, quod odore effectūq; praefertur,  
in Narbonensi prouincia Galliae frequēs, unde ad nos de-  
fertur, surculis palmcis, teretibus, canis, per interuallā  
foliatis, thymi carnosiore mollioriq; coma, et ea quoq; in-  
cana, flosculo pallido, capitellis corymborū effigie, fru-  
tū plenius, huic delineationi adanūsim respōdet nostrū  
germanicū polij cuius picturā dāmus, Germ. Je lenger  
ye lieber weible appellatum. Fuchsis falso Chamepi-

oxy prima dicta, Polium astringit et cohibet uulnera, prohibetq; serpere.

X 4



## Scordium.

## Cap. CVI.

\*duum



tur: hanc ut permulta alia Valerius Cordus doctissimus iuuenis et restauranda prisca medicina strenuus indagator, primus nullo demonstrante in Germania nostra inuenit. Scordium autem ab odore et acrimonia scorodii, id est, allij dictum est: subamarum, acre, acerbum, calfacit, purgatque viscera, obstructions liberat, urinas et menses mouet: uiride magna uulnera glutinat: seculi autem scordida purgat, contumacia cicatrice tegit. Optimum ex Creta petiitur, quale etiam Andromachus ueneris sue theriacae miscet: non malum tamen in alijs regionibus possis inuenire. Putrisferis animalium uenenis et phar macis deleterijs succurrit. Que uis eius inde est contestata, quod quae in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta super Scordium iacuerunt, minus putria sunt inuenta: quod a uiris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. i. antid. Nobis hodie in Germania locis riguis est largissimum uerum scordium, Valerio Cordo, ut diximus, primo demonstrante.



Scordium in montibus & palustribus nascitur, folijs trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuisis, aliquantum allia redolentibus, gustu amaris & astringentibus: quadrāgulis caulibus: subrubro flore. Herba uim exalfactoriam habet. urinam cit. cocta recēs, aridaue cum uino, aduersus uenenatos serpentium morsus bibitur. ad stomachi quoque rosiones, dysenteriam, & urinae difficultatē, binis drach. cum hydromelite, crassamen purulentū pectore expellit. facit aridē farina ad ueterem tussim, rupta, conuulsa, si cū nasturtio, melle & resina misceatur in eclegmate, inflāmata modicē praecordia, cerato excepta, recreat. cum aceto aut acri aut aqua, podagris conuenienter illinitur. menses imposita mouet, uulnera conglutinat, uetera ulcera purgat, et ex melle cicatricem perducit. sicca excrecētias in carne cohibet. Succus ad eadem uicia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Σκόρδιον. Latine Scordium. Trixogo palustris. Officinis longo tempore incognitum. Germanis aliusiue quādam ad Romanam appellationem aptē Wasserbateng/ & Enoblochys Erant nominabatur.

Gallus Chamarā, uoce à chamædryos similitudine deflexa appellata inuenit. Scordium autem ab odore et acrimonia scorodii, id est, allij dictum est: subamarum, acre, acerbum, calfacit, purgatque viscera, obstructions liberat, urinas et menses mouet: uiride magna uulnera glutinat: seculi autem scordida purgat, contumacia cicatrice tegit. Optimum ex Creta petiitur, quale etiam Andromachus ueneris sue theriacae miscet: non malum tamen in alijs regionibus possis inuenire. Putrisferis animalium uenenis et phar macis deleterijs succurrit. Que uis eius inde est contestata, quod quae in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta super Scordium iacuerunt, minus putria sunt inuenta: quod a uiris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. i. antid. Nobis hodie in Germania locis riguis est largissimum uerum scordium, Valerio Cordo, ut diximus, primo demonstrante.

Falsi sunt hactenus officinae et herbarij, qui Scordium esse putauerunt herbam cubiti proceritate, folijs urticae, parcius sumbriatis, à pediculo latioribus, allij cum teruntur odoratu, flosculo lacteo, exiliis pelluculis semine, radice oblonga, eiusdem cum folijs odoris, ideo alliariae nomen sibi uedicauit. Germani uero Lauchfunder/lauch, hoc est, allium sine allio uocant. sed haec est terete cauliculo, illa quadrato: huic flos candicat, illi subrubet: huic folia urticae sumbriata, chamædryos siue trixaginis querna, quae olfacta suboleant allia, huius non nisi terantur.

Tussilago.



## Tussilago. Ca. CVII



**T**ussilaginis folia sunt maiuscula quam hederæ, sex aut septē à radice, subalbida à terra, supernè uirentia, in plures angulos exeuntia, caulis palmū altus, flos luteus in uere, flore & caule cōfestim exiit: inde nonnulli his uacare existimauerunt. radix tenuis est et superuacua, nascitur in amoenis & riguis. Folia ex melle trita ignisacro & omniaibus inflātionibus illitu medentur, aridæ fumus per infundibulū hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atq; orthopnæa infestantur, pectoris uomicas rūpit. Eundē effectum præbet suffita radix, decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βάσις. Latine Tussilago. Bechium.

Officinis Vngula caballina, alijs farsara nonnullis populago. Germanis Ross hüb/brant lartich/esels hüb/häff lartich. Gallis pas d'asne: in montibus supra lacum Lemannum tacouete dicitur.

Plinius hanc aliter atq; Dioscorides describit, folia ei tribuens maiuscula quam hederæ quinque aut sex tem, sublata à terra, superne pallida, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. Quidam eadē esse bechiō & alio nomine chameleuten putant. Sed hic obseruandum diligenter, caulem & flores Tussilaginis esse figatissimos, ipsi; enatis breui uigor uitæ; durat, longissimāq; mora (quantum nihilicuit deprehender) biduum post quod illico tempus flaccescere euanescent, &

caduci marcent. Quare non nisi ipsi, qui uere medio sese fortuna serunt obuiā, & flos et caulis cernitur, namq; die uno locū uniuersum caule & floribus pubescere uidebis, post ridie prorsus eos concubuisse, frondēq; sola uirescere. quapropter sine caule & floribus nasci plerisq; qui tam citam caulis iacturam non conspexerunt, creditum est.

## Artemisia.

## Cap. CVIII.

**A**rtemisia magna ex parte in maritimis nascit, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; huius quidem genera duo, unum lætius habitiusq; folijs uirgiscq; latioribus, alterū tenuius, flore paruo, tenui, cādido, graueolente. æstate floret. Sunt qui in mediterraneis unicaulis nomine appellēt, tenuē herbulā, simplici caule & minuto, florib. scatente, flauo colore. hæc iucundiorē quā præcedens efflat odorē. Vtraq; exalfacit, extenuat, seruæfactæ cōuenienter in muliebres desessūs adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq; item ad præclusiores uulua, & eiusdem inflammationes, calculos committunt, remorata urinam cient, menses pellunt pubi illitæ. Succus uulua inditus ex myrrha, eadem quæ infessio trahit, Coma tribus drachmīs eorundem eductorū gratia bibitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀρtemisia. Latine Artemisia. Officinis Latinum nomen seruauit.

Germanis Baisus. Rot oder weißbuck. Sancti Johans gurtel.

Gallis Armoise dicitur.

Nūcupata autē est artemisia herba, ut aliqui uolunt, ab Artemisia Mausoli regis cōiuge, quæ ipsam ad opitādō cognominē sibi fecit, in herbe & nonnis & gloriæ sue memoriā & monumentū naturæ æqueuū ad posteros



Rot buck.



Weiß buck.



ad posteros transmitteret. Sive ut alij uolunt, non ab hoc, sed à Diana, quæ Græcè artemis dicebatur, no-  
men hoc adeptæ est, eò quòd ipsa primò eam repperisse & uirtutes eius demonstrasse dicitur. Et quem-  
admodum prægnantibus & parturientibus, ut foetum sine aliqua interiorum locorum noxa facillè in  
lucem edere liceret, auxilio & adiumento esse credebatur dea illa uotis & præcibus inuocata: sic  
etiam eiusdem deæ beneficio idem præstat hæc herba, & foeminarum malis, menses, secundas, foetusq; tra-  
hendo, & matricis conclusiones inflammationesq; sanando, priuatim medetur. Arthemisia alia monoclota  
nos est, alia polyclonos Germani tantummodo colore distinguunt, hæc Rot buck oder beyßß, alteram  
weiß buck oder beyßß appellant. hodie quidè & tertium arthemisia genus addunt id simplici caule  
còsurgit, folijs minutim scissis, colore sub pallido, flore luteo, odore nõ ingrato, gustu amaro. hæc officio-  
nis athanasia, quòd immortalis flore nec citò marcescente fastigetur, alijs tanacetum Germanis Reinsart  
dicitur. Flores copiosi erumpunt cum uua maturæ sit, medijs ambemdis floribus non dissimiles. coman-  
tibus auri fulgore bullis, ideo diligenter ad hybernas referuntur corollas.

## Ambrosia.

## Cap. CIX.

**A**mbrosia tenuis frutèx est, ramosus, trium ferè palmorum: folijs rutæ, circa  
anum caulem exiguis: cauliculi seminibus. perinde quasi racemulis graui-  
di, qui nunquam florem pariunt, odore uinoso, suaui: radice tenui, sesquipedali.  
Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illius adstringe-  
re humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Non est Ambrosia quæ ab Officinis ita & herbarijs demonstratur, ramis exilibus, patulis, folio ne-  
petæ, multo rutila aut sanguinaria longiore ac maiore, in quorum cacuminibus corymbi dependent, ni-  
gro semine, radice cubitali, subalbida, & radicle hoc est struthio simili, inuenitur in montosis ac macris.  
inuenitur autè apud nos uel copiosa inter exiles & madidas segetes, quæ mulieres se coronant, ut in so-  
luta diu capita iucundo & uinoso simul odore recreent, & sic frondosa coma sese uindictent ab æstu.

Pueris



## Botrys.



Geranium rubrum, quibusdam  
Behen rubrum.



Pueris rusticis optime cognita, qui uertices racemosos lanugine molli per initia resitos, minones uocant. Vinosa herbarum rusticis dicitur. Alio a quibusdam uinaceam rutam, Germanice Weinrauten, quod folio rutam, et odore uinum imitetur, nominari. Siquidem eadodranti assurgit frutice, ramoso, folijs rutaceis, circa inum caulem minoribus, cauliculis seminibus racematim collectis, grauidi nūquam florē pariunt, factu in uertice racemoso et odore uinoso, radice tenui, nec sesquipalmo longiore. Superior longa radice nititur, hac breui illa floret, hac minime illa ramis uiget, hac inualida sese, ut fertur, adminiculis quibusque inuoluit: hac uinum, illa herbaceum uirus olet.

## Botrys. Cap. CX.

**B**otrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa. semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia. tota suauem odorem spirat: quare uehementis interponitur, inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopneceas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam uocant, alij amissiam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βότρυς.

Latine Botrys.

Officinis ignota.

Germanis Trauben Kraut / Frotten Kraut.

Gallis Pymen, Sabaudis la mirame.

Botrys Parisiensibus matronis, melius quam officinis aut herbarijs noscitur. Hanc odoris gratia, uentimentis, pannis, et linteis curiose nimirum interponunt, ut odoris suauitatem contrahant. Describitur Augusto et Septembri mense uenalis per urbem, pymen, magno clamore denunciant, portantes corbibus rustici, inde nomen hoc pymen manauit in uulgu. nam hac facie conspicitur, fruticosa herba, luteis ramulis ex interuallo brachiatis, folijs cichorii, odoratis, erumpente passim semine in racemulos collecto, quod per maturitatem gumoso lentore pellucet, coeuntibus fulgore auri simul acinulis, unde nomen Græcis ductum. Pymen, uel potius pygmen uulgo Gallis putauerim nominari, quod ex se pigmentarij insitioris uice faceret unguentum. nam si pregnans suo liquore premeretur, in gummi lente sceret.

## Geranium. Cap. CXI.

**G**eranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci: Quæ drachmæ potere in uino pota, uulue inflationes discutit.

Geranium alterum, caulibus minutis & pilosis, sesquipedalibus: folijs maluarum: in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina usus.

## NOMINA



Acus pastoris.

Herba Roberti.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo Geranij Dioscorides tradit genera. Primum quod longioribus rostris, & in mucronem acuminatis constat. Hoc hodie officinis & herbarijs Acus pastoris et Muscata, Germanis uero Storchschnabel dicitur. Alterum quod malae folia habet, Pres-

corinus uulgo nominatur, & Officinis Germanicè Krachfuß, & Schartenkraut appellatur: praeter haec duo alia adiecimus genera, inter quae unum folijs Cherephylo simile existit, herba Roberti & Robertiana. Gallis de l'erbe au chancre, germanicè Rapprechts Kraut.

Quartum folia obtinens laciniata, germanicè pro certiori discrimine Kranchhals uocari potest.

Quintum quod folia ranunculi habet, gratia dei nominatur. Germanicè Gottes gnad.

Sextum quod forma quarti generi simillimum est, nec fere ab illo nisi sola magnitudine foliorum, florum & radice distat. Germanicè Blät wurz, à rubro colore aut mirifica in sistendo sanguinis profusa uio siccitate uocatur.

Omnium folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis est quodammodo, atq; discutendi & deo ui prae diti, adstringunt & siccant.

## Gnaphalium.

## Cap. CXII.

Gnaphalij folijs mollibus minutisq; pro tomento utuntur. Bibuntur efficer ceter folia in uino austero ad dysenteriam.

NOMINA



LIBER TERTIUS.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Moss Folben.

Gnaphalium.

Burkraut/matten flachs



Græcè γναφάλιον.  
Latine Gnaphalium, tomentum.  
Officinis Centunculum, centuncu-  
laris herba.

Germanis rür Kraut/ Matten  
flachs/ wysen wollen.

Gnaphalium uocata est hæc her-  
ba, Galeno autore: à candidis molli-  
busq; eius folijs, quibus c̃vri γναφά-  
λιον, hoc est, pro tomentis utitur. Gna-  
phalia itaq; dicitur quasi tomentitia.  
Centunculum autem dixerunt, quod  
centonibus cum tomento maxima sit  
cognatio. Germanicam priorem no-  
menclaturam ab eius facultate ad-  
sus dysenteriam illi inditam esse ne-  
mum non notum est.

Typha. Cap. CXIII.

Typha folium ædit cype-  
ridi simile: caulem albū,  
leuem, æquabilem: florem in  
cacumine ambientem, den-  
sum, qui in pappos soluitur,  
quod in paniculam aliqui no-  
minant. Huius herbæ flos,  
suillo adipe eloto exceptus,  
ambustis medetur. Gignitur  
in palustribus & aquis sta-  
gnantibus.

NOMINA ET EX-  
PLICATIO.

Græcè τύψα, ἡ τύφα.

Latine Typha apud Theophras-  
tū aquaticus frutex, nec radice nume-  
rosa coherens, sine geniculis, et folio  
scirpi modo prosiliens, Orchameneō  
circa lacum, parte caudici proxima,  
esui præcipuè pueris tenera. Sunt qui  
soliis literæ mutatione à cereali ty-

pha putet differre, typhā scribentes. Germanicè, ut Eurius Cordus tradit, moss Folben/ narre Folbe/  
Detetel colbe/ liesenospen Gal. mache, uel masse, ab similitudine insignis illius clauæ argenteæ, uel au-  
rea, quæ ante primos magistratus gestatur, dicitur. Nāq; in paludib. et stagnantib. agserūpit, folio cy-  
peridi proximo, caule alto, leui, plano, enodi, cuius cacumē dēsa florū cōgerie stipatur, et ueluti spissa  
capitur lanugine, quæ in pappos tandē euanesceat. Galli masas apposite dixerūt, qđ scepra regū,  
machas uulgo dicta perpolitus caulis lanosa floccorū densitate summam fastigiatum emuletur.

Circea.

Cap. XCIII.

Circea, quam & dirceam aliqui uocant, folijs est horuensis solani, agnatis  
cerebris: flore nigro, pusillo copioso: semine milij, nascente in quibudā uelu-  
ti corniculis: dodrantali radice, triplici fermē aut quadruplici, candida, odora-  
ta, ex calfaciente nascitur in apricis, saxis, & uento perflatis. Radicis tusē pōdo  
quatuor. in sextarijs tribus uini dulcis, per diē & noctē maceratur, potuq; triduo  
uulvas expurgat. Semen in sorbitionib. datum, lacte mammas nutricum explet.

Circea hodie incognita, sorte à Circe dicta.

Z



## Oenanthe.

## Cap. CXV.

Filipendula.

Conyza.



Conyza.

## Cap. CXVI.

\*Addit Mar  
cel. amarigu  
stus.

**C**onyza duo genera. quæ parua uocatur, odore præstantior est. maior uero frutice altior & folijs latoribus, graui odore. utriusque folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. in maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. in minore pedæ æquat. flos fragilis, lutei aut fului coloris\*, qui in pappi abit. radices superua cuæ. Suffitu substratūq; frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulueribus. Flores & folia cum uino ad menses partusq; eiciendos bibuntur. item contra urinæ stillicidia, arquatū morbum, & tormina comitiales pota ex accento adiuuant. Decoctum in deflectionibus medetur uulua malis. Impositus succus abortum facit, ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertium conyza genus, caule crassiore, ac molliore, folijs quàm parua maiusculis, minimè pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & inuicundioris, sed inefficacior. Prouenit locis non riguis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinio ut Dioscoridi duo conyzae in coronamentis. differentia in folio: tenuius femine confectius angustiusq; rubricatim maris & ramosius, flos quodq; magis splendet, eius, serotinus, utiq; post Arcturum, mas odore grauior: femina acrior, & ideo contra bestiarum morsus aptior. Folia femina mellis odorem habent. Mascule radix à quibusdam libanotis appellatur. Theophrasto maior dicitur mascula, torosiore caule magisque ramoso, folio ampliore ac pinguiore, nec non splendidiori flore. femina tenuiori folio; & compressiore. Manipulo eius abiecto omnes etiam à tota domo blattæ conueniunt ad eam. In coronamentis folio uenit & flore, maior & minor appellata, qui odor



odorus sentitur, cuius audissima sunt apes. Germanis Geelen wurtz: & ut Trago placet durt wurtz appellatur.

*Hemerocallis.*

*Leucoium luteum*  
keiri.

*Leucoium purpureum*  
Negel blämlin.



*Hemerocallis, siue lilium sylvestre.*

Cap. CXVII.

**H**emerocallis folium & caulem habet lilij, porraceo colore. flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuifura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquàm pallido. radix magna est atq; bulbosa: quæ pota, aut cum melle & lana in pectus apposita, aqua meducit & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis utilissimè illinuntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ημεροκαλλίς. Latine *Hemerocallis*. Officinis falsò *Asphodelus*.

Germanis Goldt wurtz / heydnisch lilien dicitur.

Hanc suschsius communi errore ductus, falsò pro uero *asphodelo* depinxit, omnibus reclamantibus notis, nam radix huius nec amara nec acris est, ut Dioscorides, Galenus & Plinius de *asphodelo* scriptum reliquerunt. Desinant ergo Officinae quæ hætenus communi errore huius radice pro uero *asphodelo* usi sunt, et alterum cuius picturâ suo loco dedimus, quod legitime delineationi ad omnia respondet, in uarios usus suis pharmacopœijs recondant. Inde *hemerocallis* nomen traxisse uidetur Græcis, quòd flos fugax pulchritudinem suam interdum tueatur, appetente nocte languidus efflucescat.

*Leucoium, siue uiola alba.*

Cap. CXVIII.

**L**eucoion uulgaris est notitiâ, sed in floribus differentia quædam namq; aut cœrulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea uerò præcipui

Z z



Leucoium album.



Leucoium Theophrasti, Weissbohungsblüm.



in medicina usus. Huius aridi flores seruefacti in deflectionibus valent contra uulux inflammationes, & menstrua expellunt. sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas fedis. semen duum drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle indutum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum a ceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

λευκοϊόν. Latine Leucoium. Viola matronales.

Officinæ, keyri, quod flore aureo est.

Germanis Gelb Violē, braun/weys/rodt/leibfarb/neglin / Straßburger negel blüm  
lin. Gallis Violettes giroffles, dicuntur.

λευκοϊόν quamuis uiolam albam significet, ad omnes tamen uiolas, præsertim eas, quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, siue purpureæ fuerint, seu nigre cum Hippocrate, seu ceruleæ, ut quidam Dioscoridis codices habent (quod expungendum putant plerique, præsertim Plinius lib. 20. & Paulus de oleo toto, id est, uiolaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extenditur. In his efficacissime sunt luteæ, keiri Arabibus dictæ. Tamen cæteræ tres aut due cario-phyllatæ, à floris figura caryophyllū imitantes nobis dictæ, nō sunt inefficaces: linguam enim ualenter calfaciunt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis flore, qui in his colore plurimum uariat, arte oporinor quæ sita, ut in floribus alijs. λευκοϊόν uero Theophrasti, quod florum primū se ostendit, etiam nondum exacta hyeme: radice bulbosa, an sit ea quæ nobis circa natalem Christianum florem album pulcherrimū trifolium intus uirentem ostendat, Germanis homungs blüm dicta, ab alijs malo diuinari, quàm à me rem non satis compertam pro uera pronunciari. De quo multa Masarius in librum nonum Plinii.

## Cratægonum.

## Cap. CXIX.

Cratægonum, siue ut alijs placet cratægonon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex una radice emicantibus, multorumq; geniculorū, semine, myli.



Cratægonon.



mylij. nascitur in opacis & fruticosis, sum-  
mopere acre. Traditum est quibusdā, hoc  
si bibat ieiuno ore, ter die post menses pur-  
gatos, tribus obulis, in cyathis aquæ duo-  
bus mulier, ante conceptum quadraginta  
diebus: & uir modo confimili, totidem die-  
bus ante coitum hauriat, uirilis sexus par-  
tum futurum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κραταγόρεον.

Latine Cratægonum, Hippocrati Polycriton:  
uel ut aliis legitur Polycarpon.

Officinis Persicaria. Germanis fischkraut.  
Gallis Rasel, Curaige appellatur.

Dioscorides Cratægonon melampyro similem so-  
lio demonstrat. Plinius spica tritici, Theophrastus li-  
no pyrimo, id est, lino triticeo, intelligens fuisse  
quod Plinius culmum siue spicam tritici. Sed suspicor  
melampyron in Theophrasto, unde id Dioscorides ui-  
detur sumpsisse, legendum, cum statim adiungat fru-  
ctum tanquam milium ferre, uimq; genitalem robora-  
re: nisi quis linopyron, id est, lino triticeum scribendū  
putet pro melampyro, quod linū folio satis immitetur.  
Et reuera Gallicum uulgo chamelinum melampyrō  
solet uocare, quo oleum Gallia ad lumina lucernarum  
exprimit. Sed ad rem ipsam accedamus. reuera om-  
nes persicariæ notæ uidentur cratægono suffragari,  
quod ex una radice multis calamis, multorūq; genicu-  
lorum profilit, breuibus internodijs, foetu quasi Mi-  
lij in uuis pendente, aspero gustu, quod etiam opacis  
gaudeat. Ista Persicariæ maiori, quam germanicè  
fischkraut. Galli curaige uocant, mihi uidentur asti-  
pulari: sed quod caput totius rei est, persicariæ folium  
tam simile est melampyro, ut alterum pro altero sal-  
lat. Quod ad saporem pertinet, admodum asper in ali-  
quo persicariæ genere sentitur, in altero lenis sit.  
Hæc femina, illa mascula. Quod si quis per impruden-  
tiam sedi confricat, rabiosos solet mouere cruciatus.  
Cratægonum Græcis creditur appellari, quod ge-  
nitalem uim roboret, ita ut diu presumptum mares  
figurare prodatur.

Phyllum.

Cap. CXX.

**P**hyllum, quod elcophyllon uocatur, in saxosis nascitur. duum generum est.  
quod autem thelygonum appellant, uuas habet floribus oleæ humiles, palli-  
diores tamen. folijs itidem oliuæ est, caule tenui, breui, radice exili. florem  
album profert: semen papaueris maiusculum. Sed arrhenogonum cætera huic si-  
mile, solo fructu distat: habet enim racemosum quiddam deflorentibus oleis non  
dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, ut thelygonon fœ-  
minei, proditur. horum Cratægas autor est. sed huiusmodi historia tenuis, mihi  
produxisse uisum est.


## NOMINA ET EXPLICATIO.

Herba hodie planè incognita. Phyllon Libycum & Aethiopicum Hippocrati silphij semen est.  
solet etiam pro malobatro accipi, de quo plura in lib. 1.



## Testiculus.

Orchis.



Cynosorchis.



## Cap. CXXI.

**T**esticulus, quæ Græci cynosorchin uocant, folijs circa caulem mollis oleæ similibus, in terra stratis, longioribus, angustioribus, lauibis: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est: inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, ut bulbi. ex quibus si maiorem edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem fœminæ, alterum sexum. Addunt, in Thessalia mollē mulieres in lacte capri no bibere, ad stimulos coitus: aridam uerò, ad inhibendos: & alterum alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis. Testiculus alio nomine serapias, Andrea autore, uocatur, quoniam radix ad multa utilis sit: folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum si

nu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis, radice testiculis simili. quæ illita tumores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur. abolet fistulas. & illitu inflammationes lenit. aridæ radices nomas inhibent: sanantq; putredines, & oris ulcera cacoethe. aluum sistunt è uino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo canis, produntur:

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis duorū generum est: unus qui cynosorchis dicitur, qui folia habet circa caule, & in ima eius parte per terrā strata, molli, oleæ similia, angustiora tantū longioraq;: siue ut Theoph. tradit, folia habet scyllacea, minora tamē, et minore leuore nitentia: caule dodrantalē, in quo purpureus flos pādatur: radice bulbosam, oblongā, duplicē, mutuo cōtactu coherentē oliuæ figura, superiore alterā quæ maior, uegeta et distenta est, alterā uerò inferiorem quæ minor, languida & rugosa est. Nascitur planta hæc petrosis et sabulosis locis, Germani uiszer frawen trāhen / Stendel frant / Ragenourz dicunt. Alij



Alter autem, quem Serapiadem uocant, & triorchin, folia habet porro similia, oblonga, latiora tantum, pinguiusque, ex alarum cauis emicatia & inflexa: coliculos dodrantales, & purpurascens flores: radix est illi minimis testiculis similis. Germanice ut prior, Gallice du coullon de chien appellatur: est autem Latine & Græce sic appellata herba, à Sarapi Aegyptiorum deo, propter lasciuia impudendam, qua is deus Canopi, ubi templum, & cultu & religione excellens habebat, colebatur, uti Strabo tradit Geographiæ lib. 17. Radix eius maior calida, & humida est, gustatibus dulcior ap-  
paret. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciusque tendit.

## Satyrium.

## Caput CXXII.

Satyrium Bassifemina.

Satyrium basilicum mas.

Satyrium.





\*al. multū.

272.

# DIOSCORIDIS

**S**atyrium aliqui trifolium uocant, quoniam tria fert folia, ad terram\* infra-  
cta, rumici aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caulem cubitalem, nu-  
dum: florem lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, ful-  
uam, intus ut otum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingratam, quam in ui-  
no nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. utendum ea dum con-  
cumbendi incessit cupiditas, siquidem ea proniores ad uenerem fieri affirmant.

Est & alterum satyrium erythronium siue erythrai con, id rubrum, semine li-  
ni, maiore, duro, leui, splendente, quod fertur non secus atq; scincus, libidinem  
excitare, cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur: sapore dul-  
ci, non ingrato ori, in montosis & apricis enascitur. Venerem, ut produnt, si om-  
nino manu teneatur radix, stimulat: eoq; magis, si bibatur in uino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Satyrium duū generū est. Vnū quod à foliorū numero triphyllū, id est, trifoliū uocat tribus plerūq;  
folijs fractis uiret, rumici, lilioe similibus, minorib. tanū & rubentibus: caulem habet glabrū, cubitāle:  
flores lilij figura et cādidi: radicē bulbosam, pomo similē, foris ruffo, intus cādido oui colore, gustu sua-  
uē, & in cibo ori grātā, Ger. ut Orchis Stendel wurz, & Rag wurz dicitur. Alterū uero quod  
erythron dicitur, lini semine aequale semē habet, maius tamē firmitusq; cū leuore splendēs: radice cor-  
tex exterior tenuis & rufus, interiora uero cādida sunt, grata in cibo, & dulcia uescētibus. Nasctur  
apricis montanis locis. Et utriq; horum generis sunt radices geminae, sed priori inaequales, nam maior  
semper altera: posteriori uero aequales, & sibi inuicem pares. Habent bodie & Syri herbam similē es-  
sectu. Bucheidemq; nominant, & Indicum Satyrium, radice candida & dura, cōmendatiore, quo cras-  
sior, rugosior, & albius fuerit, podagris utili. Graeci ferē herbas omnes libidinem stimulantes satyri  
uoce cognominarunt. Non est omittendum genus hoc, quod Basilicon Graeci, Officina Christi palmam  
dicunt, folijs nigra Plumbagine maculosis, reliqua superficie cynosorchi similis. Radix subest lutea,  
Horminum satium. Syluestre, ac instar manus effigie  
ramosa.



Postremo quod ad  
nominis Satyri ratio-  
nē attinet, dictum est  
satyriō à Satyris dijs  
syluestribus in Vene-  
rem propēsis, eo quod  
primi ad libidinē con-  
citandam eam inuene-  
runt & ostēderint. Si  
ue quod quēmadmodū  
ipsi natura sua in eam  
uoluptatem sunt po-  
tētiōres, sic herba haec  
homines etiam ad eam  
durem, & concia-  
tatiōres firmioresq;  
reddat.

Horminum.  
Ca. CXXIII.

**H**orminum  
herba est  
folijs marrubio  
similis, caule se-  
micubitali, qua-  
drangulo, circa  
quem eminentiae  
folijs similes proe-  
deunt.



deunt, quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur: siquidem in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur: in altero, nigrum, & oblongum, cuius est usus. Ad uenerem stimulam, cum uino bibi uolunt, purgat cum melle argemas albuginesque. illitum ex aqua tumores discutit. eo etiam extrahitur aculei ex corpore. idem effectus est illitæ herbæ. Syluestre magis uiribus pollet: quæ unguentis, præsertim gleucino, permiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hortense *ἡλιόχορον*. Latine orminum, & Geminalis

Officinæ Gallitricum. Germanis Scharlach.

Gallis oruala dicitur. Syluestre autem Græci *ἡλιόχορον*.

Latini & officinæ saluam agrestem. Germani Wild salbey.

Galli Brodon, oruala, toutes bone, appellant.

Ne quæpiam nomenclationis aucupium remoretur, est notandum aliquod esse cereale orminum, de quo Theophrastus, Galenus, & item Plinius inter fruges differunt, quod amarum nigrumque est, nec cumino penitus ab simile, doctriantem Plinio altitudine. de hac supra quædam annotauimus inter segetes.

Ormini calidum & sicci mediocriter est, id quod amaritudo atque astrictio in gustu satis monstrat.

Recentiores easdem facultates suo Gallitricum attributum, quas illi ueteres ascripserunt. potissimum autem conferre ad albugines, & oculorum caliginem tradunt, ut hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminon Dioscoridis esse, quamuis nonnullis legitime delineationi in quibusdam repugnare uidetur.

## Securidaca.

## Caput CXXIII.

**H**edyfaron, unguentarii pelecium, id est, securidacam uocant. fruticosa est, folijs ciceris. semen rufum in siliquis fert, corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, unde nomen accepit. amarum gustu. Stomacho utile in potu. additur in antidota, cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem adimit. Nascitur in segetibus & hordeis.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Græce *ἡδυφάρων*, ἡδυφάρων. Latine Pelecium securidaca, hedyfaron.

Officinæ incognita. Germanis Vntraut der linsen.

Gallis faba lupina, alijs herbum, uulgo graua, quod (ut existimo) tritico & hordeo, cum quibus altius suo complexu grauis sit & molesta.

Ab una radice multis flagellis emicat, ciceris similitudine, quam & folijs æmulatur. Siliquæ corniculorum modo aduncæ curuantur, in quæis flauum, pallidumque, & amarum semen concipitur, quod ancipitis securicula speciem gerit &c.

## Onosma.

## Caput CXXV.

**O**nosma, oblonga folia habet, ad similitudinem anchusæ, longitudine quatuor digitorum, & unius latitudine, mollia, in terra iacentia, sine caule, sine semine, sine flore, radice nititur longa, tenui, infirma, rubescere, gignitur in asperis. Folia in uino pota partus extrahunt. Prægnans si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

## EXPLICATIO.

Onosma hoc tempore incognita, Plinio folia habet ferè ad tres digitos, in a terra iacentia, tria, ad similitudinem anchusæ incisa, sine caule, sine flore, sine semine.

## Nymphæa.

## Caput CXXVI.

**N**ymphæa nascitur in paludibus & stagnatibus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lilio simili, albo, & in medio crocos habente, cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaueris caput, extuberat nigro semine, denso & lato, lenti gustus, caulis est leuis, niger, minimè crassus, ciborio cognatus. radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum uino pota coeliacis, dysentericisque auxiliatur. lientem absorbet. Radix stomachi ac uentriculi doloribus illinitur. uirilignes ex aqua emendat. imposita cum piçe, alopecijis medetur, eadem contra ueneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit.

pota



*Nymphaea lutea.*

*Nymphaea alba.*



potra assidue aliquot diebus, genitale infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphaea nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet. plurima inuenitur in Elide, in Anygro amne, & in Bceotia Aliarto. Est & altera nymphaea, cuius flos blephara dicitur, folijs antedictæ, radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix contra fœminarum profluvia efficaciter ex uino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia, amne Peneo.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Νυμφαία, καὶ ῥοδαίς. Latine Nymphaea, quædam luteo, quædam albo flore est.

Officinis uocem Arabicam Nenuphar adhuc retinuit.

Germanis Gelb & weisse see blumen / Sar wurz.

Gallis Nenusar iadue & blanc. Italis turco, nel tarte azo de aqua.

Lusitanis Gelpiano dicitur.

Nymphaea, quod aquosa amat, dicta: una est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba Vtriusq; radix & semen frigidum, siccans sine morfu, parum parum detergens, proinde alui profluvia, & dysenterias cohibent: semen inmodice profluens, siue per insomnia, siue aliter, ro-

cinis



Vincet ex uino nigro austero pota: in id efficacior lutea, adeo ut medeatur muliebri profusio, ut ad tergendum alba prepollet, quæ aqua macerata albos, pice liquida alopecias sanat. Autumno radices exciduntur: uerum facultatis florum, quibus hodie fere solis utimur, non meminerunt ueteres.

## Androsaces.

## Caput CXXVII.

**A**ndrosaces herba est amara, tenues spargens iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis habens, in quibus semē continetur. gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in uino pota, copiosam hydropicis urinam ciet, idem effectus est semini pota, & herbæ decocto. podagris utiliter illinitur.

## EXPLICATIO.

Plinio androsaces herba est alba, amara, sine folijs, folliculos in cirris habens, & in ijs semen. Nascitur in maritimis Histrie, Germanis planè incognita.

## Asplenium.

## Caput CXXVIII.

Lingua Cerrina.

Citerach.



**A**splenū, aliqui scolopendrium uocāt, alij splenion, alij Hemionium: folijs est multis, scolopēdræ animalī similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, faxisq; filiceis, & opacis, nec caulem, nec florem, nec semen habet. folia filiculæ

modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq; supernè uiridia. Vim hanc habēt folia in aceto feruefacta, ut per dies quadraginta pota lienem absument. quibus etiam contritis lienem ex uino illini oportet. straguriæ & regio morbo prodest. singultum sedat, calculos in uesica comminuit. conceptum adimere creditur, per fesc aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia ef-  
fodiendam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Asplenium idem cum Scolopendrio continentur, Musa & Massarius in librum nonum Plinij: tamen Galenus ait, maiores lienis obstructiones uehementiora postulare remedia, capparidis corticem, tamaricis radices, scolopendrium, & scillam, & eam herbam, quæ asplenon appellatur, effectum id nomine re presentans. Vbi apertè scolopendrium ab aspleno separat, licet postea in censu simplicium aspleni uires describat, scolopendrij nō meminerit. Libro tamen methodi, 13. scolopendrium quoq; lienī cōueniri scribit, nulla mentione aspleni facta: quamquā ibi alia quoq; eius remedia attingat. Diuersas etiam herbas facere uidetur in spleneticis lib. 9. comp. pharm. part. μύρρινος λαγώου, βοτάνης ἀσπληνίου λεγόμενης σκολοπενδρίου, ἢ ἡμιονίτιδος ἀνὰ: tamen paulo antè in Andromachi spleneticis scribebat, ἡμιονίτιδος & βοτάνης, ἢ οἱ μὲν ἀσπληνίου, οἱ δὲ σκολοπενδρίου λεγόμεναι. Ex quibus colligere possis, herbas esse affines, non uiribus modo, sed forma & habitu, unde nomina hæc incertitudo nata sit. Quod & in Dioscoride passim obseruabis, & in Aspleno quoq; qd hoc capite statim ab initio ab alijs quibus σκολοπενδρίου, ab alijs ἡμιονίτιδος uocari ait, non tamen ἡμιονίτιδος dixit, quod hæc folio sit diuersissimo, quā tamē ἀσπληνίου, quoq; uocari scribit. Vnde Massarius & ex Theophrasto affirmat, Hemioniciū uel Hemionii esse uulgatū nobis Ceterach: Asplenon uerò suū scolopendrium plantā esse aliam, ex foliorū & radicū pictura persuadere conatur. Quæ autem uulgo est Scolopendria, Germanis

hirs



hirciung appellata. Dioscoridis est *quadrifida*, a multis lingua ceruina iustius appellata, quam à Gæza Scolopendrium Theophrasti, quem rectius centipedariam uertisset. Siue autem Ceterach sit Asplemon aut Scolopendrium, siue Hemionitis dicta, quod mule hac herba plurimū delectamur, parui est momenti, quā hæ omnes lienem diminuunt, & liquant, & substantia tenui sine calore lapides etiam in uesica frangant: phyllitis cum acerbis sit, diarrhæas & dysenterias pota iuuat.

## Hemionitis.

## Caput CXXIX.

**H**emionitis, quam aliqui splenion uocant, folium emittit dracunculi, lunatum, radicibus cohaeret multis, tenuibus. nunquam flores, neq; semen, neq; caulem gignit. in petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

Vide Annotationes nostras in caput proximè præcedens.

## Anthyllis.

## Cap. CXXX.

**A**nthyllis duplex est. quædam enim lenti simillima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nascitur in salsis terris, & à sole illustratis, non infuso gustu. Altera est folijs ramulisq; aiugæ similis, hirsutioribus tamē, breuioribus & asperioribus: flore purpureo, odoris admodū grauis: radice cichorii. Pota drachmis quatuor urinæ difficultati, renibusq; plurimum prodest. trita, uulua pituitas\* emolliunt, cum rosaceo & lacte impostæ, nulneribus medentur. quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso comitiales sanat.

\* Inflammatio  
res.

Chamomilla satia.

Chamomilla uulgaris.

NOMINA ET  
Explicatio.

Anthyllis Dioscoridi duorū generū est, primū hodie incognitum. Alterum Græcis ἀνθύλλης est.

Latins Anthyllis altera.

Officinis lina non muscata.

Germanica appellatione adhuc caret.

Gallis lina non muscata dicitur.

Alterā quæ chamæpitios, hoc est, aiugæ similitudinem refert, Panlin in tumore pedum utitur macerata. Eam ex iuarū genere putant esse quæ pinum non oleat, arthriticam inde dictam, quod tumenibus articulis medatur.

## Anthemis. Cap.

## CXXXI.

**A**nthemidis genera tria, tantum flore distantia: rami dodrantes, fruticosi, alis multis concaui: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: rotundis capitulis: florib. in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut putpureis, magnitudine foliorum

rum rutæ, nascitur in asperis, & iuxta semitas. colligitur uere. Vim habent radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandi q; potu, & in fectione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosq; aduersus inflationes, & ilei tormenta bibuntur, bilem suffusam expurgant, iecinorum uitia sanant. decocto earū uesicæ fouentur.

Ex





Chrysanthemon.



Parthenium.



Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. hæc propriè heranthemò uocât. Ea cui leucathemo nomen est, itè quæ chrysanthemò dicitur, uehemētius urinam ciunt, ægilopijs illitæ medentur. cōmandu catæ ulcerum eruptiōes in ore sanāt. nōnulli in clysteribus ex oleo utuntur. teruntur in farinā, ad abigēdos febriliū circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeriri: radix quoq; ficcari, dumq; ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modo floris aut radicis pars una, modo contrā, floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus. bibere autem oportet in uino mulso, diluto.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀνθεμῖς, χαμαίμελον. Latinis Chamamelon, anthemis. officinis Camomilla. Germanis Camillen. Gallis Camomille dicitur.

Anthemidis tria genera Dioscoridi flore tantū distant, palmū nō excedentia paruisq; floribus, candidis, melinis, aut purpureis, quæ foris in orbem cādida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθεμον, et uulgo hodie Camomilla uocatur. hæc duplex est una hortensis odoris mali maturi suauissimi hybernū frigus illæsa perferens, & ad nouū uer ex radice repullulascēs in hortis colitur: altera uulgaris Camomilla, palmi altitudine, furculosa cauliculis exilibus, capitellis primum uirentibus, mox luteis, in aspero, sicco, macroq; solo, & iuxta semitas atq; itinera proveniens. Quæ uerò luteis per ambitum folijs constat, ea haud dubie est, quam priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθεμον nominat. Germani autē pulchrè ad Græcā appellationem alludentes Goldtblām / Gell Camillen / Schreich blām / appellāt. Tertia species, si Hieronymo Trago rei herbariæ diligentissimo indagatori credimus, nulla alia est nisi ea quam hodie uulgo Schartenkraut appellat, & Scharten blām, eius historiam & delineationem uide in Commentarijs Tragi. Tenuiū partium est anthemis, quā obrem digerēdi, rarefaciendī, & laxandī facultatem obtinet.

## Parthenium. Cap. CXXXII.


**P**arthenium, aliqui amaracon uocant, folijs est coriandri, tenuibus: flore per ambitū albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatum, cum a ceto mulso aut sale potum, non secus atq; epithimum, & bilē & pituitam detrahit. suspiriosis prodest & melancholicis. herba sine flore à calculosis & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctū ad insidendū in duritia uuluarū, & inflammationib; illinis sacro igni, & collectionib; cū flore.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Parthenium aliqui amaracū uocant, folijs coriandri, tenuibus flores per ambitū albo, intus melino, odore graui, sapore amaro, officina simul & herbarij hodie matricariam & febrifugam. Germani Wettram matrenā uocāt. Nasitur in sepibus & alijs permultis locis. Matricariam in de dictā putauerim, quod mulierib; uteri causarijs, & strangulationi uulue oportuni suo uiro o odore medeatur. Nec aliter à Galeno, Pauloq; quā amaracus uocatur, quod & parthenion aliquibus amaracum dici testatur.



Cotula foetida.



Celsus apud nos muralem herbā parthenion ex perdition appellat perhibet, ego de alio parthenio muralem herbā dixisse autumo, quā nō in sepibus, sed in muris parietibusq; nascitur, ob id parietaria uulgo nominata. Hallucinatur qui cotulam uulgo dictam Partheniū esse putant, cum folium ei foeniculi, parthenio coriandri tribuatur. Sapore etiā dissident, qui in parthenio amarus est, non in cotula.

## Bupthalmum. Caput CXXXIII.

**B**upthalmum, quidam cachlam uocant, tenues emittit cauliculos, mollesq; folia foeniculi: luteū florem, anthemide maiorem, oculi similitudine, unde

**Bupthalmus.** nomen traxit. circa oppida nascitur, & in campestribus. Flores cū cerato tritū, tumores duritiasq; discutiūt. Aīūt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis colorē tractu tēporis reddere.

Græce Βούφαλμος. Latine Bupthalmus.

Officinis inusitatū. Cotula nō foetida quibusdā.

Germanis Bu dyll / Rmds aug / Bue aug / dicitur. Hæc herba cuius picturā damus delineationi bupthelmi adamusim responderet. si flores ut chrysanthemi lutei essent, quare intelligendum est, Dioscor. ad discū mediumue floris respexisse, qd luteū est, nō ad ambitū, in quo folia radiata candida, ut in Chamemelo, exiisūt, aliq; flos à Diosc. pictura dissentire cognoscetur. flores bupthelmi acriores sunt Chamemeli florib. ob id calidiores.

Peonia fœmina.

## Pæonia. Cap. CXX XIII.

**P**æonia siue glycyfide, Græcis aliquibus pentoboron dicitur. sunt qui idcos dactylos, radicem pæoniam uocāt. caulis altitudine sesquipedis adolefcit. comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. mas folia iuglandis habet: in fœmina uerò smyrnij more diuiduntur. summo caule filiquas emittit, ueluti græcas nucas: in quibus, quū dehiscunt, multa granula rubra acinis puni corum similia inueniuntur, & in medio nigra, quinq; aut sex, purpurea, radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba: fœminæ radicibus ceu glandes circiter septē aut octo inhaerent, ut in hastula regia. Fœminis à partu non purgatis sicca radix datur. ciet menses nucis græcæ magnitudine pota. sic utrīs doloribus cum uino auxiliatur. ualet contra regium morbum, & renum ac uesicæ dolores. decocta in uino aluum sistit. Rubra grana rubenteis





Peonia mas.



Lithospermum.



bentis menses sistunt, decem uel duodecim pota in uino austero & nigro, stomachicis & erosionibus ea esse prodest. à pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulvae strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsâ, aut uino\*. Nascitur in altissimis montibus & præruptis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πικρία. Latine Peonia. Officinis Latini nomen seruauit. Germanis Beningen rosen / Venedische rosen / Gicht wurz / Pfingst rosen / Benedicten rosen. Gallis Penoeise dicitur.

Peonie maris radix longa alba amula, ea Hieronymo Trago creditur quæ hodie officinis falsò diptami radix, Germ. Weiss diptam. dicitur, cui siquidem notæ omnes quibus peonia mas apud Dioscoridem & alios ueteres Græcos delineatur, ad amissum respõdem, quare eandem esse neminem dubitare credimus. Contra epilepsiâ Peonia radix, & Melancholiam recens collo appendenda. Luna autem decrescens hanc legi uoluit, marem quoque femina præstantiorem: leuiter astringit, subamara est, cum quadâ dulcedine et acrimonia, si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

## Lithospermum. Caput CXXXV.

Lithospermon à seminis duritia nomen accepit. folijs est oleæ longioribus, & latioribus, mollioribus: iacent humi, quæ ab radice exiliunt, ramulis furculosis, rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, in quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. folijs longis\*, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & aridis locis. Vim hanc habet, ut semine cum uino albo potu calculos frangat, pellatque urinam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λιθόσπερμον.

Latine lithospermum.

Officinis milium solis.

Germanis Weithix, dicitur.

Dicitur autem ab omnibus tum officinis tum medicis hodie milium solis, quòd, ut reor, semen cædore solaris ac lucis splendore fulgeat. Superantem astringentiam qualitatem, adeoque exiccatoriam uim obtinet.

## Phalaris. Caput

## CXXXVI.

Phalaris cauliculos emittit zæ culmis similes, minutis, ac nullius usus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut uino succus ad uesciæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

\* Hæc clausula, est addititia.

\* Paruis, aliquid.



## DIOSCORIDIS

## EXPLICATIO.

Phalaris Germaniæ peregrina, ac nisi hortis sata, ea forma qua depinximus prouenit, thirsulos tenues, fundens à radicib. frequentes, geniculatos, bipalmesq; calamos similes xæ, graciliores tamē, atq; dulces, folia quoq; similitudinem eius habent. Semē amplitudine milij oblongum. nomen apud Germanos nondū inuenit.

Phalaris.

Rubia.

Rubia. Cap. CXXXVII.

Rubia. Cap. CXXXVII.

**E**Rythrodanū radix rubra est, qua tinguntur lana. u. na sponte prouenit, altera feritur, ut in Thebana Galliæ, & Ra uenna Italiæ. in Caria inter oleas, ut in aruis, solo creditur. hanc nō sine quæstu ferunt: nāq; maximum ex ea sentiunt prouentum. asperi caules & quadranguli, longi, aparina non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: folijs per interualla certa circum articulos stellatim de cussatis. Semen eius rotundum, inter initia uiri de, mox rubrū, postea cum ematuruit, nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa itē ischia dicis & resolutis. crassam, copiosamq; urinam pellit, nonnunquam & sanguinem. bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ red

\* Alij. Succū ex uino.

duntur differentiam spectare. aduersus serpentium morsus, ramulos cum folijs uino bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasq; albæ uutiligini illita ex aceto medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἐρυθρόδανον. Latine Erythronium. Rubra.

Officinis rubra tinctorum. Germanis Serber rött.

Gallis garence dicitur.


Dioscoridi Rubia altera sponte prouenit, altera feritur, in primis tingendis lanis & corijs necessaria. Serpit humi ut gramē. locis umbrosis conspiciēda. Semen eius rubrū est, & radix rubra, altitudinis tantæ, ut raro tota queat effodi. Rubra satiuæ radice acerba, & amara, lienem et icterum expurgat, urinas crassas, multas, sepe etiam cruentas, & menses mouet, albos cum aceto terget. Cortex rubie recipitur in Antidoto ad lienem. Actuario.

## Lonchitis.

## Caput CXXXVIII.

**L**onchitis folia habet porri, latiora, rubentia, plurima, ad radicem circumfracta, ueluti in terram procumbentia, pauca in caule, in quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis personis similes, nigri, & è ritu albam exerentes uelut linguam, quæ ad labrum inferius spectet: semen in uolucris clausum lanceæ simile, triangulum, unde sibi cognomentum arrogauit. radix dauci. Nascitur in stentibus & asperis. Radix ex uino pota urinam ciet. Altera est lonchitis, quam aliqui



*Lonchitis aspera.*

aliqui asperā lonchitin dicunt: folia scolopendrij emittit, sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in eisq; inflammationes excitari non patitur. pora ex aceto lienem absūmit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lonchitis Dioscoridi duplex est, prima habet folia porri, ut Dioscorides tradit, rubentia ad radicem, et plura quam in caule, caputula personis comicis similia, parum excrentibus linguam, radicibus prelongis. Nascitur in sitientibus, sepe in aridis & petrosiss inuenitur: sed nullum succurrit nomen dignum quo inscribatur. Pueri qui montibus oberrant, nigros capillos, quasi Galeos. Germanicè Schwartz Pappen/ nominant. Altera lonchitis cuius picturam damus, quam asperam cognominant, Romani longnam aut colubrinā. Germani Stein facen/ Spicant/ folijs scolopendrij scabrioribus, amplioribus, diuisuris quoq; maioribus, vulneraria herba, plagsq; inflammationes abigit, nec eas cingere uel morsu patitur, at Dioscorides quoq; affirmat. Pota cum aceto lienem absūmit. Hanc hodie quidam uerum esse scolopendrium falsò contendunt.

## Althæa.

## Caput CXXXIX.



**A**lthæa, quam alij lbiscum uocant, in syluestrium maluarum genere est, cui folia ut cyclaminum, rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba. Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, & pluribus polleat remedijs. Decocta enim in uino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tu sa, effica est contra uulnera item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflammationes, neruorum rigores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. cocta ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinaue, ut malagmatis lentor fiat. facit ad uulnæ inflammationes, præclusionesq; in pestis subdita. decoctum eodem fungitur munere. onera uulnæ, reliquiasq; à partu extrahit. decoctæ succus ex uino potus, succurrit urinae difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumq; tritum, uitioligines in sole perunctas emendat. eodem cum oleo & aceto peruncti, a uenenatis non feriuntur. ualet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profluuium. in posca aut uino decoctum bibitur, contra omnes uespærum, apum, similiumq; aculeatos ictus. Folia cum olei momento, morfibus, & igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita, sub diuo addensari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Grecè ἄλθα. Latine althæa. lbiscus.

Officinis Eufiscus, bismaalus, maluaniscus. Germanis Bilsch.

Gallis de guimauues dicitur.

Althæa siue Eufiscus est malua agrestis, folijs ut cyclaminum rotundis, radice lenta, intus alba, subastrim etc. Partibus suis omnibus digerit, laxat, phlegmōe leuat, mitigat, coct abscessus coctum difficiles, adhibuit in cocta & subacta. Radice autē & semine tenuiorū est partium, magisq; tū siccata, tum terget.

*syluius to me saige*



Alcea.

Caput CXL.

**A**lcea sylvestrium maluarum generi assignatur. folia habet diuisa, uerbena  
ca proxima: caules treis aut quatuor, cortice cannabino uestitos: florem ro  
sa, paruum: radices albas, lata, quinque aut sex, cum plurimum cubitales, quæ cum  
uino aut aqua potæ, dysentericis ruptisq; medentur.

Herba Vngarica.

Alcea.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀλκαία. Latine Alcea. Officinis bismalua,  
seu althea sylvestris, herba Simeonis. Germanis Felsitz/  
Lewenzan-/Hochleuchten-/Sygmars wurz, Simons wurzell. Italis herba Vngarica.

Gallis Bimauue, ou guimauue sauvage. Alter apud nos inuenitur in syluis, caulibus foliosis, cano  
bino cortice, minutis, fronde maluæ quasi circumdata, et strigmentis uerbeuacæ profundioribus laciniâ  
ta, flore rosea, paruo, radicibus obliquis, quinque sensus cubitalibus albis. Hic notandū quod ea herba  
quam Itali herbā Vngaricā uocant, et Manardus uerā Alceam esse putat, à nostra uulgari Alcea di  
uersa est, ut præcedens ipsius pictura clare ostendit. Hæc nisi malua hortensis fuerit, nusquam eā apud  
nos sponte proueniēte uidi, sed ex Italia allatam in hortis cultam, omnino uerā esse Alceā, et Diosco  
ridis delineationi proximè accedentem, arbitramur, cuius usus esse debet in medicinis.

Cannabis.

Caput CXLI.

**C**annabis fatiua planta magni in uita usus ad robustissimos funes factitan  
do, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente, conueniente  
aurium doloribus instillatur. Sylvestris cannabis uirgas fert althææ similes,  
minores, nigriores & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio fatiua, nig  
riore & asperiore. flore lychnitis, subrubro: semine & radice althææ. Decocta  
radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, tofos articulorum dissipa  
t. Huius cortex torquendis funibus accommodatus.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κάνναβις. Latine Cannabis. Officinis Latinum nomen seruauit.


Germania



Canabis.



Anagyris.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Anagyris recentioribus malua terrestris, quod humi malua modo iaceat dicitur, rusticis putidum lignum. Arboris instar fruticat, folijs et ramis amerinæ, fædo odore, flore brassicæ, siliqua terete, qua semen continetur reibus simile, cum mæsisibus maturescens &c.

## Cepæa.

Cepæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicem tenuem. Folia in uino pota, urinæ stillicidio, & uescicæ scabie laborantibus opitulantur.

A4 4

Germanis Hanff. Gallis chanure appellatur.

Canabis legumibus assignatur. Huius semen, ut Galenus est author, magno negotio concoquitur, stomacho & capiti aduersatur. prauos creat humores. Sunt tamen qui hoc quoque totum insitumque cum bellarijs, quæ secundis mensis præbentur, usurpant. Admodum excoalscit, & caput æstuoso halitu sursum misso tætat. Syluestris Canabis nascitur in syluis, uirgulas Altea fundens diuersam ab hac quam Germ. Wilden hanff appellât.

## Anagyris.

## Cap. CXLII.

Anagyris, frutex est arboris instar, grauis odore: folijs agni, uirgisq; flore brassicæ. semen in corniculis nō breuib; gignit, subrotundū, firmum, uerficolori faciei, simile renibus, quod

Cepæa.

durescit uua maturescen-  
te. Tena fo-  
lio trita tumo-  
res illitu re-  
primūt. si par-  
tus hæreat, &  
secundæ men-  
sesq; moren-  
tur, drachme  
pondere bibū-  
tur in passo.  
sic & suspirio-  
sis dantur, &  
contra capi-  
tis dolores in  
uino difficul-  
ter parientib;  
adalligantur,  
ita ut à partu  
statim auge-  
rantur. Radi-  
cis cortex\* cō  
coquendis di-  
scutiēdisque  
adhibetur. Se-  
men comman-  
ducatum uo-  
mitiones ue-  
hementer  
ciet.

\* Alij succuba



maximè id præstat, si cum decocto radicum asparagi eius quem myacanthos, hoc est corrudam uocant, bibatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Καταὰ Græcis: Latini Cepæa quibusdam ea putatur quam Germani Bachbungen uocant, scitur in aquis et littoribus arenosis.

## Alisma.

## Cap. CXLIII.

Plantago Italica.

Plantago aquatica.



**A**lisma, alijs damasfonion appellatur. folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, la ciniofa, conuexa que in terram: caule simpliciter tenui: cubito altiore: capitibus thyrso: si flore tenui, candido, pallens: ter radicebus tenuibus, ut uera tri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus, aquosos amat tractus. Radix, si drachma una aut altera bibatur, his conuenit qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi sunt, aut opium hauserunt torminibus

atque dysentericis, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Coughis, & contra uitia uulgu prodest. Herba sistit alui, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Muli hactenus pro uera Alisma plantaginem aquaticam, quæ et barbasyluana, et Germani Wasserwegrich, dicitur, alij uero eam herbam quam Herbarij et Officina pastorum fistulæ, Germani hyrtien pseyff appellat nobis obtrusere. Sed harum neutra legitime Dioscoridis delineationi respondet, quare noster tiam, scilicet uera Alisma per amicum quendam ex Italia adferri curauimus, cum in Germania quod equidem sciam non proueniat, cuius picturam damus nomine Plantaginis Italicae. Hanc restitit Italianis et wegrich Germanicè dixeris. folio arnoglossi est, sed angustiore, et semper in terram demisso, caule unico, sesquipedali, in cuius fastigio uiride alabastricolū in caule cōcoloris floris dehiscit, radicibus et bris, ut ellebori nigri tenuibus, acribus, pinguibus, flore tenui in madidum pallescente: aquosos amat sitis.

## Onobrychis.

## Cap. CXLV.

**O**nobrychis, folia habet lentis, longiora paulo: caulem dodrantalem: florem purpureum: radicem paruum. nascitur in uliginosis & in cultis. Herba sua pteui, si trita illinatur, tubercula dissipat, cum uino pota, stranguria sanat. illita ex oleo, sudores mouet.

Nec herba que sit non constat.

Hypericum



## Hypericum.

## Cap. CXLVI.



**H**yperici, alij androsæmō, (alij coriō, alij cha-<sup>\*Hæc abund-</sup>  
mepityn\*) appellant, quoniā semen odore resi-  
nam imitatur, surculaceo frutice, dodrantali, ruben-  
te, folio rutæ: flore albæ uiolæ, luteo, qui digitis tri-  
tus sanguineum succum remittit, qua ex causâ andro-  
sæmon cognominatur: sub hirsuta siliqua, & tereti,  
hordei magnitudine: semine intus nigro, resinosi o-  
doris. gignitur in cultis & asperis. Vrinam cit. men-  
strua pellit appositum. tertianis, quartanisq; cum ui-  
no potum liberat. Semen quadraginta diebus hau-  
stum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita,  
ambusta sanant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ὑπερικόν. Latine Hypericum.

Officinis perforata. Gallis mille pertuis.

Germanis S. Johans Kraut dicitur.

Hæc herba cuius picturam damus omnino Dioscoridis deline-  
ationi respōdet, ut nemo nisi talpacior Hypericum esse deinceps  
reclamare possit. Siquidem surculosa est herba, dodrantalis, sub-  
rubens, folio rutæ, flore luteo, quem si digitis libeat terrere, ma-  
nus profectō sanguineo succo cruentantur. Siliqua deniq; tere-  
te, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo  
itq; in hac herba inueniuntur, quæ esse hypericum manifestè con-  
vincunt, cruentus nēpe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus.

## Ascyron.

## Cap. CXLVII.



**A**scyrum siue ascyroides, hyperici genus est, ma-  
gnitudine distans, fructu ciliis, majores habens  
ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores lu-  
teos, & fructū resinofum, hyperico non abfimilem. cur-  
ius attritu digiti ferè cruentantur, qua de causâ andro-  
sæmon uo cauere. Vfus feminis ad ischiadicos. potū  
hydromelitis sextario, biliosa recrementa amplissimè  
detrahit. sed assiduè dare oportet, donec sanitati resti-  
tuantur. illinitur & ambustis efficaciter.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀσκύρον, ἢ Ἀσκυροδῆς.

Ascyron Latine.

Officina & Galli cū cæteris, Hypericonis speciebus cōfundunt.

Germani Saxtheu appellant, pulchrè ad Græcā appellationem  
alludentes. Græci enim à contrario, huic herbe nomen imposuisse  
videntur, Ἀσκύρον enim illis asperitatem significat.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maiori-  
bus ramis fruticosius, puniceo colore, rubens. Flores fert luteos, se-  
men Hyperico simile, odore resinæ, quod cum atteritur digitos fe-  
rè cruentat.

## Androsæmum.

## Cap. CXLVIII.

**A**ndrosæmon ab hyperico, ascyroq; differt, q̃  
fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubenti-  
tib. uirgis, & folijs rutæ, triplo aut quadruplo maiorib.  
quæ trita uinoso succo manāt. cōplureis alas habet in cacumine, utrinq; expāsas,  
pinnatasq;: circa quas flores pusilli, lutei: et in calyculis semē papaueris nigri,  
insigne



## Androsamon.



\*Omnia hæc  
ad finem usq;  
capitis à qui  
huiusdã omisa.

## DIOSCORIDIS

insigne lineis. huius comæ trita resinofum odorem red-  
dunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliofa al-  
ui excrementa pellit. ischiadicis maximè medetur: sed à  
purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis  
illita medetur. uulneribus sanguinem cohibet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis ἀνδρόσαμον. Latinis Androsamum.

Officinæ & Gallicum uulgus cum hypericone confundunt.

Germanis Rânradt dicitur.

Dicitur Androsamon, quod aut coma, aut floribus eius tritis, homi-  
nis sanguinem refrat. Differt ab Hyperico & Ascyro Androsamon.

Frutex est prætenubus ramis, surculosis, puniceo colore rubentia  
bus uirgis, folijs triplo quadruploque maioribus quàm rutæ, quæ con-  
trita sanguinem succum remittunt. Alarum caua habet plura, in  
summo alarum auium modo pennata expensæ, circa quas flosculi pu-  
silli lutei. Semen in calice, nigro papaueri simile, ueluti punctis depictum  
destinctumue. Coma trita resinofum odorem reddit.

## Coris.

## Cap. CXLIX.

**C**Oris, quod aliqui hypericon uocant, frutex est fo-  
lio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior  
dodrante, suauis, odoratus, acris. Potum semen menses  
trahit & urinas. contra phalangiorum morsus ischiadi-  
cos & opisthotonicos ex uino potum auxilio est. horro-  
ribus ex pipere, sed opisthotonicis ex olco, aptissime il-  
linitur\*. Radix uino decocta potaq; defectis opem fer-  
re creditur. sed laborantem inter potandum quàm opti-  
mè cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex  
qua re pristinam agilitatem recuperabit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius supradicta genera hyperici appellatione complectitur, duo  
bus tantum fastigijs contentus, cum tradat aliud hypericon esse, quod  
alij corin uel corion appellane, folijs tamaricis, & sub ea nascitur,  
sed pinguioribus, et minus rubentibus, odoratum, palmo altius, suauis,

leuiter aculeatum. Dioscoridi uerò Coris, quam hypericon, ut ipse tradit, quidam uocant, frutex  
est folio ericæ, sed minore, pinguiore ac rubente, palmum altus, sapore grato, acris, odorato. Hippo-  
crates Corè hanc uocauit, ut Galenus inquit, argumento seminis quod pupilla oculi similitudinem re-  
presantat: quæ sit hodie eius facies, aut quo nomine appelletur hodie, nemini cognitum.

Sunt qui Officinarum Carpobalsamum unum genus Hyperici maximum scilicet faciant, ita quod  
duo genera constituentes, quemadmodum & Dioscorides distinxit &c.

## Aiuga, siue Chamæpitys.

## Cap. CL.

**A**iuga herba in terra repens, incuruæ similis: folijs semperuiui minoris, mul-  
to tenuioribus, hirsutis & pinguioribus, circum ramos densis, odore pi-  
nus: floret tenui, luteo, uel candido: radicibus cichorii. Folia septem diebus in ui-  
no pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischia-  
dicos sanant. dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iecinoris & renum uitijs.  
torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto con-  
tra aconitum utuntur, bibentes decoctum. ad antedicta illinitur, cum polenta iu-  
re decocti subacta. trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit.  
excepta melle, cum aris squama & resina deijcit. apposita ex melle, uulnæ uicia  
extrahit. mammarum duritias discutit. uulnera glutinat. ulcera quæ serpunt,  
cum melle illita, cohibet. Alterum est genus aiugæ cubitalibus ramis, in ancho-  
ræ speciem incuruatis, prætenubus, coma supradictæ: flore candido: semine  
nigro. hæc etiam pinum redolet. Tertia mas nominatur, paruula folijs exilibus  
albis



LIBER TERTIUS.

Chamepitys



albis, scabris: caule aspero, candido: luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit & hæc pinum. Hæ duæ uim superioris obtinent, sed non usq; adeo efficacem.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χαμαίπιτυς.

Latine parua pinus, Chamepitys.

Officinis lue arthetica.

Germanis Re lenger ye lieber, quamuis hoc nomen huic herbe à Euscho falso attribuitur, potius ad amaram dulcem aut unam speciem eufragie pertinet.

Galli lue arthetices cognominant.

Chamepitys, id est, pinus pumila, quod odore ex folijs eamimitatur, Aiuga Idea Scribonio dicitur, alijs Abiga, Officinis lue, calida secundo gradu, sicca tertio: amarior quàm acrior, terget, purgat, obstruendi iccur liberat, ictericis, ischiadicis cum mellicrato pota succurrit, menses, urinas, ciet, uiridis uulnera magna glutinat, ulcera putrescentia sanat, mammarum durities discutit. Huius radicem usurpat Ascleapiades succo tamen decocto, semine, puluere, idem pollet, Galenus libro octauo comp. pharma. part.

Hæ herba cuius picturam exhibemus hic nomine Chamepitys foemina, uerum polium montanum est, cuius loco perperam superius posita fuit uera Chamepitys.

Chamepitys foemina.



Finis Libri Tertij.



285  
PEDANII DIOSCORI  
DIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MA-

teria Liber Quartus, Ioanne Ruellio Suefsionenſi interprete. Cum figura  
rum debita appoſitione, & annotationibus in ſingula capita. Per  
Gualtherum. H. Ryff. Argentinum. Medicum, ex doctiſſ.  
uironum lucubrationibus adiectis.

PRAEFATIO.



RIEVS antè libris, amantiffime Aree, tradidimus odoramen-  
ta, olea, arbores, unguenta, animalia, frumenta, olera, radices,  
succos, herbas, ſeminaquæ. In hoc autem quarto diſſeremus de ra-  
dicibus, & eis quæ reſtant herbis.

Betonica.

Cap. I.



CEſtron pſychotrophon uocitatur, quoniã fri-  
gidis locis inueniatur. Latini betonicam ap-  
pellant herba eſt caulem ferens tenuem, cubiti alti-  
tudine, aut maiorẽ, quadratum: folia quercus, mola,  
lia, longa, in ambitu diuiſa, odorata, prope radicem  
maiora. in ſummis caulibus ſemen ueluti ſatureiæ  
ſpicatum ineſt. decerpta huius folia ſiccantur, plu-  
rimos aduſus, radicibus nititur, ut ueratri, tenui-  
bus, quæ ex hydromelite in potu, pituitofam uomi-  
tionem euocant. Folia dari debent ruptis, conuul-  
ſis, mulieribus uulua malo opportunis, & ad laxan-  
dos uteri ſtrangulatus, denarij pondere cum hydro-  
melite, tres in uini ſextario drachmæ, contra ſerpen-  
tium morſus ebibuntur. Herba magna utilitate illa  
tis à ſerpente uulneribus illinitur. aduerſus etiam  
uenena drachma ex uino pota cõuenit. præſumpta  
ea, ſi uenenum hauriatur, nihil nocebit. urinam  
ciet, aluum ſubducit, medetur comitialibus & inſa-  
nis, pota ex aqua: & iecinoris, lienisquæ uitij, dra-  
chmæ pondere in aceto mulſo. cõcoctionem adiu-  
uat, ſi quis eam fabæ magnitudine ſecundum cenā  
cum melle cocto deuorarit. modo conſimili acida  
ructantibus propinatur, ſtomachi cis eam mandu-  
care et ſuccum deuorare proderit, ſi poſtea dilutum  
uinum ſorbeat. datur ſanguinem excreantibus,  
tribus obolis, cum diluti uini egelidi cyatho: iſchi-  
adicis, renum & ueſicæ doloribus, ex aqua. aquæ in  
tercutem binis drachmis ex hydromelite, ſi febrici-  
tant: ſin aliter, ex mulſo. regio morbo laborantes  
recreat. menſes pellit, drachmæ pondere cum ui-  
no pota. aluum purgant drachmæ quatuor potæ, in  
hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad  
tabem & purulentam excreationem. Folia ſicca tri-  
taque ſictili uafe reconduntur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κίσπος, ψυχότροφον. Latine Betonica.

officinæ





Colubrina.



Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis Betonien/  
bium betonien/ & weis betonien. Inuenitur enim etiam flo-  
ribus candidis. Gallis de la Betoesne.

Betonica seu Vetonica herba est nota, satis ab autore descri-  
pta, et quotidiani ac laudatissimi usus nostro tempore contra  
capitis morbos. praesertim flosculi ipsius saccharo conditi. Dicitur  
autem est Vetonica ab inuentoribus, ut Pli. lib. 25. cap. 8. testatur,  
inquiens: Inueniunt Vetones in Hispania eam quae Betonica dici-  
tur in Gallia, in Italia autem serratula. a Graecis cestron aut psy-  
chotropho, ante cunctas laudatissima. Cestro uero uocata est grae-  
cis à uarietate et copia remedium, uarijs enim & plurimis mor-  
bis accommodata est. Psychotropho autem causa ab autore satis reddita  
est. Betonica amaruluscula, subacris, incidit, calculos renū rumpit,  
pulmonē, thoracē hepatis, purgat ac tergit, menses mouet, epilepsi-  
cis, acidū ructantibus, ischiadicis, pota prodest, ad mota autem ulcers,  
omnibus bestiarum moribus. Betonica, de qua praesentem cap. Diosco-  
rides agit, Σαφύρα γὰρ γρᾶκῶν esse inde patet: κες πορὺ λυχ-  
πορ πορ (quod locis asiosis gaudet) πορὰσι δὲ Βετονικῶν, a-  
maruluscula est, ac subacris, incidit, calculos renū rumpit, etc. lib.  
7. simp. & hoc loco apud Diosc. ἡ δὲ τῶν ἰσθμίων, καὶ τῶν  
τοῦ κισσοῦ, πῶς αὐτὸν πορὰ, & κες πορὺς πᾶσι τοῖς κελ-  
τοῖς γινώσκουσιν, καὶ ὁδοῖσι δὲ τῶν βοτάνων τῶν τῶν σαφύ-  
ρα γρᾶκῶν, li. 5. sanitatis tuende in sene calculoso. nisi quod hic Be-  
tonica à cestro uidetur separare, si pura lectio, aut & pro siue  
uel id est, accipiendū. Hac opinor causa Ruellius etatis nostrae  
doctissimus medicus ex hoc 4. li. Dioscoridis caput de saxiphaga  
diuersum à capite de Betonica expunxit. Est aliud et Betoni-  
ca genus ut Pli. li. 22. ca. 8. abunde docet, & in aliquibus Diosco-  
ridis codicibus huius quoque secūda Betonica mentio fit, haec Be-

tonica siue Vetonica altilis aut coronaria dicitur. Germanis Graß blü-  
men/ Tegel blümen/ graß neglin. Gallis girophles. ocyelles. hanc tamen  
officine quam herbarij, medicij, tuncam detractis, à Betonica duabus  
literis prioribus, nominare. Siquide ut eius pictura ostendit, folijs est por-  
raceis, oblongis, per extremū mucronatis, concoloratu caespis, teretibus  
cauliculis, sequecubitalibus, geniculatis, coeuntibus pyxidatim internodijs,  
floribus omnium speciosissimis, cariphyllorum odoratu, sed longè sua-  
uissimo, quandoquidē alius cocco rutilat, alius saturata nitet purpura,  
alius emaculato blāditur colore, alius uersicolore uariatur cōmisti. Om-  
nibus teres longiusculusq; calyx spectatur, orbiculo superiore dēticula-  
tus, à quo quina senāue folia prodeunt, lente quidē fimbriata. Nonnulli ta-  
men flores frequentiore coma stipantur, geminis utrinq; emicantibus sta-  
minaceis apicibus radice promissa, simplici geniculata. Vius eorū in coro-  
nis propēnimus. Vires habet primae Betonicae. Sum qui Pauli Aegre-  
netae Betonica eam herbam esse arbitrantur, quā Germani Brenpreiss,  
& a mura sanandi uulnera facultate, Grundahey appellane.

Britannica.

Cap. II.

**B**ritannica aut uetonica, folia habet syluestris lapa-  
thi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia: ra-  
diem tenuem & breuem; caulem paruum emittit. Folijs  
exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet  
adstringentem, priuatim depascentibus oris & tonsilla-  
rum ulceribus accommodatam. ualet etiam ad reliqua,  
quibus adstrictione est opus,

Bb



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Britanicam hodie Italia piata manam appellat. quidam Lapathum acutum, quod folia rumicis habeat. Ceterum & longiora sunt & nigriora, carnosiora & lanuginosiora, radice nigra & uesca. Sunt qui putant eam esse herbam quae officinis bistorta, Germanis *Wasser wurz*, *Gensampfer* dicuntur, cuius picturam supra damus.

Etenim folio est rumicis, à terra cefio, superne uiridi, flore rubro, radice concolori, contorta, nigrescente, cui eadem quae Britannica uires à medicis tribuuntur, sed nihil definitio.

Purpurea.

Lysimachia.

Cap. III.



**L**ysimachia, quam aliqui *lytro* appellant, caules emittit cubitales altiores uè, fructuosos, tenues, prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus flore rufo, aut aureo. gignitur in aquosis & palustribus. foliorum succus adstringente sua uis sanguinis reiectionem supprimit. dysentericis potui datur, aut infunditur. mensium abundantiam sistit, in pessore sanguinis pfluuiio subuenit, si nares ea herba obturentur. uulnerum cruorem cohibet, acerrimum nidorem suffusa reddit, qua de causa serpentes fugat, et muscas interficit.

NOMINA ET EXPLICATIO.  
Græcè Λυσιμάχια.

Latine Lysimachia, uel Lysimachium.

Officinis Salicaria.

Germanis Rot &amp; gelb weyderich appellatur.

Lysimachia duo esse genera ex Dioscoride hoc loco & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureum florem habet, hinc nos illam purpuream appellauimus. Germanice *Braun weyderich*. Dioscoridis uero rufos, hoc est, aureos, ut metipse interpretatur, flores obtinet, ideoque luteam nominauimus. Germanice *Geel weyderich*. Et hæc quidem altera magis astringit, inq[ui] usu medico hoc nomine eidem præferenda.

Sanguinaria, seu Polygonum.

Cap. IIII.

**P**olygonum mas ramos habet teneros & molles, frequētib[us] geniculis cinctos, & per terrā, ut gramē, repūt. folia rutæ, sed molliora longiora q[ue] semine sub folijs



Hyppurū.



Polygonatum.



quinetiam maculas in facie delet.

Polygonum. Weggras.



turgescere: unde ma-  
rem appellari uolunt:  
flos eius candidus, aut  
punicus. Vis epoti  
succus est spissare, ac re-  
frigerare prodest cru-  
entę excretioni, cho-  
lere, alui fluxionibus,  
& urinę stillicidio. u-  
rinam apertę ciet. cū  
uino potus, contra ser-  
pētium morsus auxi-  
liatur. datur in febrī

bus per horam ante significationes. foeminarum profluvia im-  
positu sistit. idem succus purulentis auribus instillatur. facit exi-  
mię ad genitalium ulcera, cum uino, adiecto melle, decoctus  
Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, ulceribus quę ser-  
punt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus  
uulneribus folia illinuntur. Sanguinaria foemina fruticat uno  
caule, arundini tenerę simili, densis geniculis, & in se tubarum  
modo factis. articulos in orbem cingunt apices foliolis piceę  
similes. radicis nullus usus. nascitur in riguis. Huic quoque  
spissandi refrigerandique natura, ad eadem ualens, sed ineffica-  
cior.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gręci πολύγονον.

Latine Polygonum. Sanguinaria, Seminalis.

Officinis Corrigolet & Centum nodia.

Germanis Weggras, Weggras, Demgras.

Gallis de la corrigiole dicitur.

Vim adstrictoriam quandam obtinet Polygonum, ita sanę nunc in eo aque  
um frigidum, ut uidelicet secundū sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut  
etiam quodammodo in initio tertij. Et etiam exicatoriam.

Polygonum foeminam rura Gallię aquaticam pinam nouerunt nominare, nā  
quę ea in humidis fruticat uno caule arundini teneri simili, de his geniculis in  
se tubarū modo factis, quorum torulos folia pinus in orbem cingunt, radice nul-  
lius usus. inuenitur in riguis. Germani uocant Klein Vagen wädel, & Rant-  
ten Kraut.

Hinc quoque spissandi refrigerandi que natura ad eadem quę superior, sed ino-  
fficacius pollens.

## Polygonatum.

## Cap. V.

**P**olygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altio-  
re: folijs lauri, latioribus & lauioribus. sapore mali coto-  
nei, aut punici, cum quādam adstrictione. flores per singulos  
foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, ince-  
pta à radice supputatione, radicem habet albam, mollem, lon-  
gam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum  
crassitudine æquantem: quę uulneribus efficaciter illinitur.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολυγόνατον. Latine Polygonatum.

Officinis & herbarijs Sigillum Salomonis.

Germanis Weißwurz. Gallis Geniculiere, quasi geniculata.

Nomen traxit, quod radix frequentibus geniculorum nodis interuallata tumet. nam caulis nullis cingitur articulis, sed enodis attollitur nullis brachiatus ramis. Galenus prior, & eo posterior Paulus, odorem qui quendā asignant sine gustu fastidiendo, qui ne explicari quidē recte possit. Duo eius genera damus. Vnū uerū, latioribus folijs: alterū multo angustioribus. Valerij Cordi inuentum. A folijs utriq; nomina sunt indita.

Clematis.

Cap. VI.

**C**lematis humi serpit. læto, pinguiq; solo provenit. Cuiticulas spargēs crassitudine iunci, exiguas: folio laurifigura & colore, multo minora. Ea cū caulib; in uino pota, alui, pfluuii & dysenterias sedant, subdita in pello cū lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatib; uulū medent. Dolores dentiū cōmanducata finit, imposita serpentū morsibus, iuuamentū prestat, ferriur etiam contra aspidū iūius ex aceto pota opiulari. Gignitur in terrenis. Est & altera clematis, quæ uiticulosum emittit ramulū, rubescētē, lentū: foliū gustu admodū acre, ac exulcerans. repit p arbores, ut smilax. Semen tritum, pituitam bilem q; detrahit, in aqua aut hydromelite potum, folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.



Clematis altera.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κληματὶς δαφνοειδής. Latine Clematis daphnoides.

Officinis Vincaperuinca.

Germanis Ingerin / Streyt / Todten violen.

Gallis du petit lyseron, peruinca dicitur.

Clematis daphnoides si quis imaginem, naturam effigiem ex qua sitius exploret, ea censebitur esse quæ officinis & herbarijs uincaperuinca nominatur. nāq; p longos spargit iūcos, folia lauri colore & figura, multo minora, pingui lætoq; provenit solo, geniculatis reptās flagellis, gracili & in terrā sparso iunco. floribus uiolaceis. colore hyacinthino, interdū sed rarō suppurpureo, obuiā queq; uincens, unde uincæ peruinca nomen ductū putatur. Ea semper uiret, in modū lineæ folijs geniculatim circūdata, topiaria herba, inopiam tamen florū aliquando supplet. Siccitas in clematide. Paulo Aegnetate teste, ceteris qualitatibus praeualet, id quod gustus etiam ostēdit: gustanti enim adstrictionem quandam & amarorem habere uidetur. Adstringit autem modicē, sed fortiter amara est. Siccit itaq; at citra mordicationem.

Altera Clematis cuius Dioscorides meminuit. Græcè κληματὶς ἑτέρα. Latine Clematis altera. Germanis Zelen / waldreben. Gallis Viorna, hardea dicitur. Eius picturam hic damus.

Clematis altera mihi omnino ea uidetur cuius nomenclaturam posuimus, quod ramorum fuscis ea peinde quasi uinculo ligantes distringant nāq; uiticulis paelongis asperisq; cernitur et lignosis, rimoso cortice, folijs hortensi solam longioribus ac latioribus, flore muscoso et capillaceo, fructu exiguis, uitis simili, post maturitatē rubesceme, acinis ferē pūici mali, quadamtenus rotundis &c.

Polemonia.

Cap. VII.

**P**OLEMONIAM aliq; philæteriam, Capadoces



Behen album.



Behen rubrum.



padoces chiliodynamin appellat, ramis exilibus, utrinque pinnatis, folijs paulo  
quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sanguinariæ proximis, qui  
bus in summis uelut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante  
radiculæ simili. nascitur in montosis & asperis. Bibitur in uino radix contra ser-  
pentes et dysenteriam, & ex aqua, aduersus urinæ difficultatem, & coxendicum  
cruciatu. datur ex aceto drachmæ pondere lienosis, eadem scorpionis plagæ al-  
ligatur. Tradunt, eum qui radicem gestauerit, à scorpione non feriri: eumque si is-  
tus sit, nihil molesti passurum. dentium dolorem mansa mitigat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολέμωνιον Latine Polemonia, uel polemonium herba.

Officinis Behen album.

Germanis Druben Er opff (sed à sumaria diuersa) Lidweyeh, wider Koss, splyß pettel.

Sabaudiclag, uocant.

Polemoniam à certamine regum inuentionis appellant, radix eius alba oblonga, flos albus, folliculo  
inclusus, folia polygonum multo maiora. huius radice hodie in officinis frequentissimus usus, nā hanc aneido-  
tis cōfectionibusq; suis miscem. Loco Behen Arabū, quod Serapioni duplex, albū & rubrum, magnitu-  
dine radicis caryotæ, calida, humida, odora, semen augens: ex Armenia defertur. Eius loco ego, si id so-  
lum possunt, Etingij radicem substituere potius, quàm hanc polemonij radicem. Alterum becn rubrū  
Serapioni dictum.



Symphytum petreum.

Symphytum, siue alus. Cap. VIII.

\* Alij addunt  
rutaceis simi-  
les, præter  
rem.



**S**ymphyton petræon, id est alus, nascitur in petris, ramis  
tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: sur-  
culosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: lon-  
ga radice, subrufo, digitali crassitudine. Decoctum in aqua  
mulsa & potum pulmonis uitia purgat, sanguinem reijci-  
entibus, & renum malis, ex aqua datur, ad dysenteriam, ru-  
braque foeminarum profluuiâ, in uino decoctum: ad conuul-  
sâ uerò & rupta, ex aceto mulso bibitur. quin & comman-  
ducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit. uulnera re-  
centia enterocelasque cōglutinat, & illitu cohibet. carnes au-  
tem cum symphyto decoctæ coalescunt. Est & alterum sym-  
phyton, quod aliqui pecton uocant: id caulem emittit bicu-  
bitalem, aut maiorem, crassum, leuē, angulosum, ut sonchi-  
inanem, circa quem breui interuacante spacio, folia exeunt  
angusta, linguae bubulae proxima, oblonga, hirsuta: caule  
secundum angulos quosdam striato: folijs tenuibus ex alarū  
sinu prodeuntibus, in quibus flores lutei & circa caule uel  
ut herbasci semina emicant, tam caulis quam folia, aspera  
lanugine horrent, tactuque pruritū cōcitant, radices demit-  
tuntur foris nigrae, intus candidae, uiscosae: quarū est usus.  
Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt.  
recentia uulnera illitæ cō-  
glutinant. carnes quoque  
sic concoquantur, cogunt  
addite, inflammationibus  
praesertim sedis, cum sene-  
cionis folijs, utiliter illi-  
nuntur.

Symphytum maius.



Holoostium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci Συμφύτον πέτραιον.

Latine Symphytum petreum.

Officinis Prunella.

Germanis Prunellen dicitur.

Vulnerariam herbam esse euidentissimū est, quare etiā si  
non uerum Symphytū petreum fuerit, tamen illi uiribus o-  
mnino simile. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, ue-  
bementes capitis dolores sedare recentiores uno cōsensu tra-  
dunt, si tēpora ex eo inungantur. Aphthas & oris ulcera,  
faciumque uitia succus eiusdem sanat.

Symphytum alterum. Graeci Συμφύτον ἑρπαιον.

Officinis consolida maior.

Germanis Schwarz wurtz / Wallwurtz. Schmer-  
wurtz / Beynwell.

Sunt qui in Gallia oreille dasne, id est, a fini auriculam  
uocant. Apud nos Symphytum frequentius flore subrubro,  
uel leuiter purpurascēte, aut candido quam luteo Sym-  
phytum conspicitur: quamuis & melino nonnunquam inue-  
niatur, hoc, ut reor, facit soli diuersitas.

Modicē ordine scilicet secundo, calfacit, exiccat & con-  
trahit.



## Holoſtium.

## Cap. IX.

**H**oloſtium quadrantalıs herbula eſt, humi repens: folijs uiticuliſq; coronopo  
aut graminĩ proximis. guſtu adſtringentibus: radice alba, prætenui uſque  
in capillamenti ſpeciem, longitudine quatuor digitorum. naſcitur in collibus ter-  
renis. Uſus eius ad rupta, in uino potæ. nam & carnes coguntur, decoctionibus  
addita.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sine duriciã herba eſt holoſtreon ex aduerſo appellata, ſicut ſcilicet dulce, tenuis uſq; in capillamenti ſpe-  
ciem, longitudine quatuor digitorum ceu gramen, folijs anguſtis, adſtringens guſtu: naſcitur in collibus  
terrenis. hodie prorsus incognita.

## Scabioſa.

## Stœbe.

## Cap. X.



**S**tœbe uulgaris eſt noticiã. cuius ſemen & folia ſtrin-  
gunt, quapropter decoctum dyſentericis infunditur.  
auribus quoq; purulentis inſtillatur. illita folia oculis  
ab icu cruentis profunt. erumpentis ſanguinis impetus  
cohibent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Stœbe herba quæ apud nos naſcitur, fruticoſa eſt, calida, acris, ado-  
ratum quippam reſpiens, ad uini conſeruationem ne acceſcat, aptiſi-  
ma, ſi calor huius folijs admotus ignis calore excitatus, una crudiora  
percoxerit.

Stœbe, quæ & Phleôs dicitur, ſpinam habet in folio & caule Plinio  
lib. 21. cap. 15. lib. autem 22. cap. 11. omnia ex hoc Dioſcoridis capite mu-  
tuatur, quod adſtringat folijs & ſemine, ob id hæmorrhagiæ, dyſente-  
riæ, oculis cruentatis, auribus purulentis conueniat, quæ uires Galeni  
Stœbe acris & calide non conueniunt, neutratamen harum noſtra eſt  
Scabioſa uulgo & officiis dicta (cuius picturam damus) quod ſcabiei ſa-  
nandæ ſit idonea.

Folio eſt cruciæ cùm adoleuit hirsuto, aculeis tamen non horrentes, flo-  
re ceruleo, quæ pulmonĩ purgando & hepati conſert, et carbunculum re-  
cens admota horis tribus perrumpit.

Psoram autem Actij non eſſe noſtrã Scabioſam hinc apparet, quod hu-  
ius uſtæ ſumo arborum cruciæ non moriantur, imo non moueri eas magis  
quàm ſtipularum ſumo expertum ſe ſcribit Syluius, quam tamen ſaculta-  
tem Actius Psoræ tribuit.

## Clymenum.

## Cap. XI.

**C**lymenum caulem fert fabæ, quadratum: folia plantaginĩs, folliculis ſupra  
caulem in ſeſe inflexis, ut in polyporum cirris. Probatiffimum eſt è monti-  
bus. E frutice toto cum radice ſuccus exprimitur, qui ad ſanguinis reiectiones in  
potu efficax eſt. cœliacos, rubraq; ſexminarum profluuiã, refrigerando infrenat.  
ſanguinem naribus erumpentem ſupprimat. Trita folia, aut ſiliquæ recentibus  
uulneribus impoſitæ, ea ad cicatricem perducunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Clymenon Ruellius eam eſſe arbitratur, quam officinæ & herbarij partim cypriam, partim ſapo-  
nalem, argumento, quod elota pinguitudinem quandam in aqua ſaponis modo remittat. Vulgus Gallo-  
rum Duſtege appellat, non ignotam ijs è uulgo qui uetuftis ulceribus medentur, extremam oram leuiſi-  
me ſimbriatam, folliculis ſupra caulem in ſeſe inflexis, ut in iride, & crebro irretientibus inuicem poly-  
porum cirris &c.



## Periclymenum.




## Cap. XII.

**P**ericlymenon, simplex fruticat, ex intervallis parua folia habens ipsum amplectentia, subcandida, hederacea, inter folia surculi exeunt, in quibus baccæ, hederæ similes: flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in folium procumbens: semen durum, & quod difficile euellatur: radice rotunda, crassa, nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter assiduitibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatum, si drachmæ pondere detur in uino quadragenis diebus, lienem absomit, lassitudinem discutit, sed urinâ ciet statim à sexto die cruentam, orthopnoeæ & singultui prodest, parum accelerat. Folia sunt eisdem uiribus prædita, que tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur, perunctis ex oleo, febrim algores abigunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Περικλῦμενον. Latine Periclymenum. Officinis Caprifolium, mater sylua, licet confundatur hoc nomen à multis. Germanis Gilgen consort, multis corruptæ uocatur, Zeunling / Speck lilgen / Waldelilgen. Gallis Vimboscum dicitur. Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se adminiculis quibuscumque, eminuerit ea amplexi caulibus suis, ramulis lignosis, rufis, geminis per intervalla, umbilicatis folijs, à terra cæsijs, superne herbosis, mollibus, baccis sylvestris myrti, uel quod idem est, rusci, in cæuamine duobus folijs tunicato, ita ut difficulter eruatur, ra-

Tribulus marinus.



dice crassa. Porriclymeni fructus & folia subamara, tandè acrida, adeo ualenter calfaciunt, & incidunt, ut multò usu cruentas urinas educant, liuosos, aggrè spirantes, ex oleo ad mota inuat. Vides quàm fœdè labantur, qui Lycium ueterum ex hoc fructu representant. Nunc flore ferè utimur, et ex eo uel flore ligustri aqua capitello desiliata, ad oris & faucium aphthas & nomas colluendas.

## Tribulus. Cap. XIII.

**T**ribuli genus unum terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus uitticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris, iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comam exerit, ac culeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa quàm ima crassiori, capitula lamenta quædam indidem exorta spicantur, semen durum, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerantis & inspissantis est naturæ: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat, ulcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq; per sanat. Succus ex his colligitur ad ocelorum medicinas. Semen dum



duum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitatur, ictos à uipera recreat. contra uenena cum uino apertissime bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, uirenti tribulo equos saginant, & è dulci semine & esculento panem quo uescuntur faciunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Terrestri tribulo ut Dioscorides tradit, folia sunt portulacæ, tenuiora, et rami iacētes in terra exiunt, iuxta quos spinae difficiles, prædurae. Germani Weggom appellant, secundum fluuios & in rudibus prouenit.

Alterum genus Aquaticum, Græcè Τριβύλλιον & Ψευδύλλιον. Officinis tribulus marinus. Germanis, Wasser nüssle. Gallis Macors dicitur.

Hoc genus uulgu nostrum satis nouit, quod sit apud nos palustribus & residibus saquis familiare, si quidem cubitorum quinum & amplius in uado consurgit, ulmeo super aquas extante folio, longo pediculo, capitulis sub aqua mersis, caule per summa crassiori, inferne graciliori, qui capillamentis quibusdam spicaceis fruticat, semine atro, duro, nucis si re magnitudine, retusis aculeis aliquot cincto, cuius nucleo accolæ non secus atq; castaneis uescuntur &c.

Ex hoc etiam in farina molito per inopiam annonæ, fiunt panes, ob id Ferrariensem castaneam Galiam Padanam audio uocare. Terrestre quibusdam esse uidetur quod uulgu Weggom, officinæ calceatrippam uocant, quod cacumen ueluti muricibus muricatur, & spinarum aculeis insigniter armetur, ramis humi procumbentibus, siliqua spinarum uallo muricata, in qua semen rotundum, nigram, rudera, sepe uillarum obsidens &c.

## Limonium.

## Cap. XIII.

**L**imonium folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura; caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum, & ex uino acetabuli mensura epotum, dysentericis coeliacisq; prodest. rubra foeminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

\* Μικρότερον  
non μικρότερον  
τερον, λεγόμενον  
forte ex  
Plinij lib. 20.  
cap. 3.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λιμόνιον.

Latine Limonium.

Officinis pyrola.

Germanis Wintergrün dicitur, & Waldmangolt.

In umbris & syluestribus locis prouenit, folia & semen gustu uehementer adstringunt, ita ut in tertio ordine siccitatis illud recte recentiores collocent qui eius decocto ad interna & externa uulnera potandum utiliter præbent.

Semen acetabuli mensura dysentericis prodest, hæc uires à Limonio uiribus non discrepant, adstringit enim et uulneraria herba est, ut Limonium, pyrola: floribus & folijs quoq; huic omnino similis, quare citra ullum discrimen Pyrolam cuius pisturam damus Dioscoridis esse Limonium asserere licet.

## Lagopus.

## Cap. XV.

**L**agopus herba sistit alium in uino pota: aut in febris, ex aqua, eadem inguinalligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

## NOMINA





## Lagopus.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λαγώπους, Λαγώπυς.

Latine pes Leporis, Lagopus, Leporina herba, Lagopyros

Hypocrati. Officinis inusitata,

Germanus Katzen Fle / Katzen pfötlin.

Gallis Lherbe de la trinite, ou pied de lieure dicitur.

Anullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia lato trifoliatæ quæ in pratis gignitur similia, semen in paniculis mucosis lanuginosisq; leporino pedi similibus admodum, adstringentis gustus, exico candi uim obtinet. Galeno teste.

## Medium.

## Cap. XVI.

**M**edion in faxis & opacis nascitur. folia habet iridis: caulem tricubitalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum: semine cnici, minuto, radice dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinam, & ex melle decocta, rubros menses foeminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in uino potum, menstrua pellit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Medion Plinio folia habet iridis sativæ, caulem tripedalem, & in eo florem grandem, purpureum, rotundum, minuto semine ad imaginem cnici radicem semipedalē. Exemplaria sunt in quibus ei folia iridis redduntur. Verum cum Plinius iridis fronde scripsit, cū sativæ adiecerit, non de iride quam nemo sativam legit esse, sed de seride putatur intellexisse, cuius constat duo esse genera, sativum & sylvestre. Nam auctore Theophrasto, iris nullum desiderat. Medium hac ratione plantæ incognitum est.

## Epimedium.

## Cap. XVII.

**E**pimedium, caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neque florem, neq; fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu satuo. nascitur in humidis. folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas incrementum non sinunt. Radix conceptum admittit. Folia trita quinis diachymis, post menstruas purgationes quinq; diebus in uino pota præstant mulieribus ne concipiant.

Forsan idem Epimetron Theophrasti fuerit, hodie incognitum est.

## Gladiolus.

## Cap. XVIII.

**X**iphion, alijs Phasganon, alijs machæronion, Romani gladiolum uocant. Nomen inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. iridi simile erat, nisi minus & angustius uideretur, & gladij modo mucronatum, nervosumq; in caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, una, bulbosorum modo, super alteram insidente: quarum inferior gracilis est, superna uberior, nascitur in aruis. Superior cum thure illita, admisto uino, spicula & aculeos è corpore extrahit. panos cum lolij farina & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inferi solet, menses imposita trahit. superior radice ex uino pota, uenerem stimulari, & inferiore sumpta sterilescere tradunt. superiorum quoq; utiliter infantium enterocolicis, cum aqua potui dari præcipiunt.



## NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἐρίφω*. Latine *officinis Gladiolus*. Germanis *Fleinblae Schwertel*.

Gallis *Glais ou glaitel* dicitur.

Folia *Xiphio* ut *Theophrastus* scribit lata, ad ensis effigiem exeunt, unde nomen herbe inditum. *Scolopendrea* in eam herbam frequenter conuertunt, mirumque in modum gaudere huius consuetudine frui. Floret cum uiola nigra, hodie nullius usus.

Sparganium:

Cap. XIX.

**S**parganium, aliqui *Xiphidion* uocant, folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia, in summo caule ueluti pilulæ prominent, in quibus semen. Contra serpentis uenena, radix cum uino datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui cotulam scetidam sparganium esse arbitrantur, sed errant, sparganium enim adhuc inco-

gnitum.

Xyris.

Cap. XX.



**X**yris, folia habet iridis, latiora, & in turbinem mucronata: quorum medio caulis erumpit crassus, cubitalis, ex quo filiquæ triangulares dependent, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semen in folliculis, simile fabis, rotundum, rubrum, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis uulnera, fracta & efficax est, aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radices centaurij ac mellis quinta. tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicium dolores, strangurias & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam uehementius impellit: & cum aceto, lienem absorbit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ξύρις*. Latine *Xyris*. Officinis *spatula scetida*. Germanis *Wandelstein* frant dicitur.

A necandis cimicibus appellatur, circa sepes & dumeta nascitur, Itali a frequens, nusquam tamen in Germania, nisi sata, prouenit, uehementer acriorem qualitatem obtinet, adeo ut gustata, fauces quasi urere uideatur: proinde calidum & siccum admodum esse constat.

Anchusa.

Cap. XXI.

**A**nchusa, quæ alio nomine calyx, aut onoclia appellatur, folia habet lactuce, in acumen fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo uersum humis sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. læto solo nascitur. Radix adstringit, ad ambusta & uetera ulcera, ex oleo & cera efficax est. igni sacro cum polenta medetur, lepris & uulnibus illinitur ex aceto. par tus extrahit, uulnæ indita. eius decoctum renum uitij, lienis, & bile suffusus datur: & si febris sit, ex aqua mulla. Sistant aluum folia in uino pota. Radice pigmentaria utuntur ad unguentorum spissamenta. Est & altera, quam aliqui *alcibiadion*, aut *onochiles* appellarunt. hæc à priore distat, quod minora habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in puniceum uergentem: radices rubras, oblongas, quæ mellebus sanguineum succum fundunt, in sabulosis nascitur: uis ei folijsque inest, quæ contra uirus cum reliquorum serpentum, tum maxime uiperarum, auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu, nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuat, eum necabit.

Est &



Lycopsis.

\* Alycarda-  
monno.



Est et alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. radix acetabuli mensura cum hyssopo & nasturtio \*pota, latus uentris tineas excutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Αγχούσα. Latine Anchusa. Officinis buglossarubra. Germanis Rott Ochsenzung. Gallis Orchanette dicitur.

Mulieribus non ignota, quæ colorem faciei natuum fūco meminitur, quæq; uernaculum genarum pallorem, genitiuaq; uultus maculas hoc insectu occultum: rectè malas eleganti commendat purpurisso.

Nam hæc caulem habet erectum, folia lactucæ, in acumen exeuntia, hirsuta, aspera, nigra, copiosa quoquo uersum humi sparsa: spinis horrida: radicem puniceam, digitali crassitudine, per æstatem manuum inficiemem sanguineo colore, lato solo prouenit. Sunt & alia anchusæ species, sed hodie incognita.

## Lycopsis.

## Cap. XXII.

Lycopsis, quæ à nonnullis anchusa uocatur, folijs lactucæ longioribus, asperioribus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis multis, cubitalibus. flore paruo, purpureo: radice rubra, & adstringente, nascitur in campis siccis. Cum oleo radix illita uulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris. sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

## EXPLICATIO.

Multi Lycopsis hanc esse putant. nec ab re, quæ uulgius barbariorum appellat linguam canis. Germani, Linde. Sundt zung / nam longioribus quàm lactucæ folijs, crassius, sub hirsutis, ad radicis caput recidentibus, caule longo, scabro, recto, cubitalibus, adnatis, flore paruo, purpureo, semine in lappacis umbilicis rufo & exili, radice rubra.

## Echium. Cap.

## XXIII.

Echion folia habet prælonga, hirsuta, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamē, subrubra, & pigra, spinulis tenuibus, horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutaq; utroq; latere folia, expansa, pinnataq; nigra, in summo

Echion domesticum.

Syluestre.





summo caule minuscula: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capi ti uiperarum similia insunt, radix nigricat, digito tenuior, quæ non percussis modo à serpentibus ex uino prodest, sed eos qui anteabiberint, feriri non patitur. fo lia & semen idem præstint munus, lumborum dolores sedat, in uino aut sorbitio nesumpta, lac extrahit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἔχιο*. Latinis *Echium*. Officinis *buglossa* uulgaris. Germanis *gencin* *Ochsen zung*. Gallis *buglosse* *sauuage* dicitur.

Hac officina ferè omnes pro uera ueterum *Buglossa* utuntur. planè relicto *echij* nomine, non tamen sine graui errore, ut per amplius in capite de *echio*, & uera *buglossa*.

Ocimastrum.

Cap. XXIII.

**O**cimoides, Latini ocimastrum uocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantes, hirsutos, siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith, nigro prægnantes. Vm habet semen in uino potum, qua uiperarum cæterarumq; serpentium mor- sibus medetur, datur ischiadicis cum melle, uino, myrrha, & pipere. Radice ni- titur tenui & superuacua.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Ocimoides, quod & ocimastrum: uulgo *iacia* alba, & *pocularia* quod *pecillorum* similitudinem pe- ricarpia gerunt, ex Ruelli sententia. Mihi enim certas ob coniecturas esse uidetur ocimoides herba, quam hodie multi *been rubrum* uocant, ob floris colorem, quamuis & albus inueniatur: non autem lo- quor de radice, quam falso sic uocant, ab Arabum descriptione longe diuersum. Sed erinon quoq; oci- moides aliqui uocant, de quo in capite sequenti plura.

Erinus.

Cap. XXV.

**E**rinus nascitur apud fontes & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte su- perna diuisis, quinis, senisue, dodrantalibus furculis: flore candido: semine nigro, & acerbo. folia & caules lacteo succo turgent, Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphu- re & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

\* Addunt qui- dam uino.

NOMINA ET EXPLICATIO.

A recentioribus herbarijs *herba lactis* appellatur, à quibusdam *lacteis*, & *militaris*, alijs *ocimum* & *quatile*, trientalibus ramulis, quinis senisue folijs ocimo longioribus, parte superna diuisis, albo flore, semine atro, pusillo, acri, duro. Herba succo manat lactis, tum colore, tum dulcedine, unde *lactaria* no- men apud uulgos inuoluit, Secus fontes & fluuios inuenitur.

Gramen parnaei.

Gramen.

Cap. XXVI.



**G**ramen geniculatis serpit ramulis, à quibus crebrò radices spargit dulces, articulis præcinctas. folia dura, & ut a- rundinis parua, lata, in exilita- tem fastigiantur, eaq; iumenta & boues pascunt. Tritaradix illitu uulnera conglutinat, de- coctum eius in potu, tormini- bus medetur, & urinae difficul- tatibus, calculosa etiam uesciæ excrementa comminuit. Est et arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumeta ne- care traditur, præsertim in Ba- bylone: idq; iuxta uias nasci- tur. Quod in Parnaso monte



gignitur, densus fruticat: folijs hæderaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutuli: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, & admodum dulcibus. Succus si in uino cum melle pari, & myrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis, idem quod herba præstat. Semen uehementius urinam impellit, aluum uomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ cinnam appellant, boues inflammat, si eo uirenti sæpe pascantur.

\* Alias sag-  
mas sue op-  
plet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gramen pecori esculentum radice est modice frigida & sicca, parum mordaci, substantie tenuitate exiguum sortita, qua calculos potu interdum frangit. Germanè Rech gras, Juncfern grâfle. Quod uero in Parnaso gignitur, ea forte est herba quam Germanicè unifolium appellamus.

Sideritis tertia.

Sideritis.

Cap. XXVII.

Alem Bathengel weible.



Sideritim aliqui heracleam uocant. folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondē quercus aut saluæ accedentia, minora tamen, & aspera. caules ædud quadratos, palmum sæpe excedentes, non inuicundi gustus, aliquantūq;

substringentis, in quibus per interstitia orbiculatæ uertebrae, uti in marrubio, spectantur, & semen in eis nigrum, nascitur in petrosis. Illita folia, suapte ui, uulnera sine inflammationis periculo iungunt. Altera Sideritis binum cubitorum, ramulis exilibus: folio filicis, numeroso, utrinq; per oras diuiso: pediculo longo, prodestibus è summo alarum sinu surculis, longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, quàm betæ rotundius aliquanto, ac durius. Huius uis, foliorumq; ad uulnera præcipua est. Sideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas heracleam uocat, in macerij & uineis nascentem, folijs corini, à radice numerosis: do drantalib. cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus: flore purpureo, paruo gustantia: maro & lento. Huius ea uis est, ut quamuis recenti uulneri impo sita, sanguinem supprimat.

NO



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sideritis prima Latinis, Græcis Σιδιρις dicitur: magna officinarum pars, hac herba pro chamæpitæ uera utitur, non sine errore, cum satis ex forma ipsius delineationi collata constet, non esse chamæpitæ. Germanis Glidtrant appellatur. Sideritis uerò nominata, quid glutinandis uulneribus apta, precipuum in bello habeat usum. Alterius Sideritis historiam ac nomenclaturam quære lib. 3. cap. de Geranijs. Tertia sideritis Heraclea, dicta à Fuchio falsò Chamedrys uera scemna, Germanis Flein Bathengel weible dicitur.

Sideritis habet quandam abstergerendi facultatem, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est & mediocriter frigida: phlegmonam sedat, & glutinandi uim obtinet.

## Achillea.

## Cap. XXVIII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dodrantales aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere foliorum sectionibus, coriandri similitudine, sub\* fuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato & glutinoso, umbella in cacumine rotunda, floribus candidis, purpureis, & aurum æmulantibus. prouenit læto solo. Irita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tue tur. erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta uulnæ profluuiâ, in uellere, decocto quoq; insident sceminae fluxione uulnæ laborantes, ad dysenteriam bibitur.

\* Alij huc addunt, amaris.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ἀχιλλέα.

Latine Achillea.

Officinis Millefolium manus.

Germanis groß Garben Kraut / Gerwel / Schaffripp.

Gallis Mille feuille grande dicitur.

Millefolium hæcenus Achilleæ appellationem apud multos etiam eruditos retinuit, cuius delineationi tamen ad singula respondere non uidetur, quare haud immeritò quidam arbitrantur Achilleæ speciem esse eam herbam quam Germani groß Garben Kraut / Galli uerò carpemariam appellant, nam huius etiam usus glutinandis uulneribus prope nimius.

## Rubus.

## Cap. XXIX.

Rubus, notitiæ uulgaris. Vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum potu aluum sistit, & sceminarum profluuiâ, presteris morsui accommodatissimum, gingiuas firmat. Oris uitij folia commandu cata medentur, cohibent ulcera quæ serpunt, ulceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus remedio sunt. condylomatis & hæmorrhoidibus folia illinuntur. cardiâcis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quàm optimè maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. sistitur aluus præmaturi cibo, necnon flore in uino potio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ῥόσος. Latine Rubus, frutex spinosus. Officinis generinum nomen seruauit. Germanis ein Römber staud.

Gallis Ronce dicitur.

Cc 4





Rubi, seu Semis, Græcè Βάτος genera Theophrasti tria sunt; magnus seu rectus, humilis & medius. Batus magnus seu rectus est Dioscoridis & Galeni κνύος βάτος, fructu oblongo, per maturitatem rubente, cythno simili, in quo ceu lana flocci arteriam si deuorentur infestant, hunc Germani Bechrosen on geruch / Galli Englantier sans odeur appellant: huic folijs, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Germanis woltrich: ad Bechrosen / nam ipsa planta quoque in diffinitionem alterius odorifera, Gallis Englantier de bon odeur appellatur, Huius generis Rosa omnis, nisi quod ferè gerit folia florum magis multiplici & maiora, arte opinor adiuta: sed Cynobatos spinis hamatis horridior, rectior, et altior assurgit, odore caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum, ut supra diximus, Rosa uero fructu flore solo est adorato, nunc albo, nunc rubeo, nunc amborum medio (Germani Leibfarb / Galli Ino carnat appellant) nunc etiam moschato, qui Germanis Rosen von Damasco / Gallis uero Rosas de Damasc appellatur. Χαμαί βάτος autem, id est, humilis rubus, Dioscoridi hoc loco & Galeno absolutè tantum βάτος dicitur, folijs multo maioribus quàm Cynobati, bicoloribus, per nodos ternis, larmicis longissimis & firmissimis, qua parte terram attingunt, radicem iterum faciētib, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedunt mora grandia, racemosa, multis granis coagmentata, per maturitatem nigerrima, Βάτις Galeno dicta. Germanis Bromberen / media denique est βάτος ἰδαῖος de quo plura capite proxime sequenti.

### Rubus Idaeus.



Helxine maius.



### Cap. XXX.

Idæus rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proueniat. Est autem longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrens, quanquam & sine spinis inueniatur, insuper eadem præstat quæ supradictus. Ceterum flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur, ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Βάτος ἰδαῖος. Latine Rubus Idaeus. Officinis inusitata. Germanis Bromberen. Gallis Framboiser dicitur.

Βάτος ἰδαῖος Dioscoridis longa tenerior est rubo, qui simpliciter βάτος dicitur, ac minoribus spinis horrens, quamq; sine spinis inueniatur: frequens is est in soluis, folia habet chamaebati, sed paulo minora, rectus ferè surgit, ad duo aut tria cubita, sepo gracili & infirmo, & minimum spinoso, flore simili, & fructu, sed minore, & granis quinque aut sex coagmentato, & per maturitatem rubro aut nigerrimo, sed in ceruleum inclinante ob aerum quoddam testorium, nigris uuis & prunis, & alijs multis fructibus in uasci solita: astringunt, siccant, refrigerant omnia rubi generà maius & minus. Ad rubum Idaeum docti hodie reduciunt hortensum (cuius picturam damus) rubi recti, breuis, parum spinosi speciei, quæ Germanicè supra diximus Bromberen appellari, folijs bicolorib, fructu dum maturuit olfactu & gustatu iucundissimo, fragri rubri (est enim etià albus) emulo: quæ fructum herba trifolia et bicolor ferè acrem, præsertim semine.

#### Helxine minus.



### Helxine. Cap. XXXI.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus completur quodecunque contigerit adminiculum, nascitur in sepibus, uinetis, & segetibus, foliorum succus potu deiecit aluum. NO.



Elatine.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ελατίνη κισσάμελος. Latine Helinx, cissampelos.  
Officinis uolubilis. Germanis Winden & Zaunglocken. dici.

Hic nota, etiam multos doctos uiros eam herbam quæ officinis peritaria dicitur, cum hac, cuius picturam damus, non sine graui errore, confundere.

Elatine.

Cap. XXXII.

**E**latine folia habet helinxæ minora, rotundiora, pilosa: dodrantalibus ramulis, quinque senisue, a radice foliosis, gustu adstringentibus, nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impositis, Eadem cocta sorbitionis usu dysenteriam sistit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ελατίνη.

Latine Elatine.

Officinis filio hædera terrestris.

Germanis Grundtreben.

Gallis Raue sauuaige dicitur.

Officina omnes hactenus hac herba pro terrestris hædera usi sunt, omnibus reclamantibus notis, sed qui hanc cum legitima Elatine descriptione contulerit, facile iudicabit eandem esse.

Agrimonia.



Eupatorium.

Cap. XXXIII.

**E**upatorium fruticosa herba est, unicum est ferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem: folijs per interualla quinque folijs, aut cannabis magis similibus, quinque partito aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum ferratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum uel stibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, ulceribus quæ agere cicatricem trahunt, medentur herba aut semen in uino potum, dysenteria, iecinoris uisus, & serpentium ictibus liberat. Nec desunt qui aberrantes, argemonem hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, uti exposuimus.

Co 3





Græcè Εὐπατορίον.

Latine Eupatorium.

Officinis Agrimonia.

Germanis

Agrimoniën.

Gallis Aigremoine dicitur.

Eupatorium uel Hepatorium, uel Hepatitis, omnino agrimonia uulgaris uidetur Dioscoridis, hos Eupatorium cum Serapionis Agrimonia, & Mesue Eupatorio conferemi.

Corruptum uero nomen ex Argemone apparet, quam falso Eupatorium quidam (ut Dioscorides quoque testatur) putarum: incidit, terget, tenuum est partium sine manifesto calore, sub. & stringit, iccoris ob id obstructions aperit, ipsumque roborat, unde & nomen inuenit: uel cum Ciccone ab Eupatore rege: hanc etiam Pentaphyllum uocari, quod folio sit quinq; partito, scribit Gal. lib. 5. comp. ph. part. Eupatorii nunc folia nunc radicem Actuarius misceat.

Pentaphyllum.

Quinquefolium.

Cap. XXXIII.



Heptaphyllum.



**Q**uinquefolium ramulos fert furculaceos, tenuis, dodrantes, in quibus semen. folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem ex luteo pallefcetem, auri æmulum. nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. subrubram habet radicem, oblongam, ueratro nigro crassior. Plurimis pollet remedijs eius radices decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. putrida oris ulceræ, collutione sistit. arteriæ scabritias, gangarizatu læuigat. contra alui profluvia, & dysenterias auxilia.

tur. item articulorum coxendicumque cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentina

ulcera cohibet. strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit. ignes sacros, reduuias, condylomata, psorasque sanat. Teneæ radicis succus, contra tæcinoris, pulmonumque uitia prodest. item aduersum uenena. Cum hydromelite autem, uel diluto uino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum; in tertiana uero, ternum; in quotidianâ, unius. ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. illita cum melle & sale, tam uulneribus quam fistulis remedio sunt, enterocelici auxiliū præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

**Phoenix.**

Græcè *πενταφυλλον*. Latine quinq; folium.  
Officinis genuinum nomen seruauit. Germanis *Sünstinger Kraut*.  
Gallis quinte feule dicitur.



Pentaptychii radix siccatur ordine tertio, sine morfu, & minū est partium, minium acris, & calida. Tormentilla quæ Germanis Tormentill, & blätwurcz. Gallis Tormentille dicitur, putatur Leoniceo, Manardo, Ruellio, quæ nunc quinq; folia, nunc septem folia, his & nubi sepe uisa est: uti & uulgare quinq; folium etiam septem folium frequenter est: uti & Eupatorium de quo supra, quod etiam pentaptychon Galeno dicitur, lib. 5. comp. ph. part. Hæc radix in theriacen recipitur, & nostra Tormentilla uenenis & pesti resistere experientia multa est certissima: minime si non sit eadem, eius loco usupari possit.

**Phoenix.****Cap. XXXV.**

**P**hoenix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasue spicas. In aruis tectisq; recenter illitis nascitur, harum uirium compos, ut in uino austero pota, alui profluuium, & emanantem uulua sanguinem sistat, urinæ impetus infrenet. Sunt qui ad alligatam in puniceo uellere & suspensam, sanguinem suppressimere prodant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Est herba Phœnicea Plinio appellata à Græcis, à Latinis hordeum murinum, Avena sterilis à multis hodie dicitur, Germanis Taub Korn, quandoquidem ea sterilis avena, folia habet hordei, sed breuiora & angustiora, spicam lolio similem, culmos digitorum senum radici in orbem obuolutos, septenas octonasue spicas in subactis coctisq; recenter illitis inuenitur.

**Idea radix.****Cap. XXXVI**

**I**dea radici folia sunt ea quæ rusco. adherent his ueluti exigui pampini, in quibus flos. radix spissandi naturam habet, his conueniens quibus adstrictione opus est pota, citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Græcè *ἰδέα ῥίζα*. Latine Idea radix, uel Idea herba, folijs ruscis, acerbæ gustu, miseri solita lustrantium in palestra ad ea quæ reperire tantū oporteat, ut Paulus Aegi. scribit hodie planè incognita.

**Rhodia radix.****Cap. XXXVII.**

**I**gnitur Rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, iniquabilis, quæ cōtrita, rosas redolet. utilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Fuchsius in herbario suo hanc facit, quam Germani radicē uocant rosarum. Rose wurcz, ab odore rosarum, quem spirat præsertim uiridis, & cum eruitur.

Recetior suauis olet. Ex Austria & Pannonia ad nos adfertur uirens, & uegeta diutissime seruatur. Inæqualis est, cortice albefcente, sapore acerbato, ut bistorta, acorus uulgaris, & ben rubeum Saptasia rorum, quibus omnibus ut sapore, ita ferè crassamento etiam & colore ruscus omnibus comparari potest. Folia sunt portulacæ quodammodo, aut telephij, in mucronem exeuntia, fumen crenata, caules ab una radice plures exeunt.

**Rhodia radix.**



Ceterum ex illo nono repertarum insularum orbe, Liburnicarum remigatu, lustrato, delatum nuper ad nos lignum crasso cortice et hiulco multis tuberibus et nodis inaequale, ponderis simi, ita ut immersum aquis possum eat, nec sedens rursum emergat, tanta pollet gravitate, buxiq; colorem, crassitudinem et duritiam inuitatur, hoc tritum uel in iocobem dera sum rosas odoris suauitate prouocat, quipotius de paritate certans, uincit iucunditate. Hoc rosaceum lignum appellamus, cum barbarum rogonis noaen audire non potuerimus.

## Equisetum.

## Cap. XXXVIII



\* Addidit  
fuit.

Equisetum in riguis et scrobibus nascitur, cauliculi prodeunt inanes, geniculati, in se fracti, rubescentes scabri, et inter circa eos folia, crebra, exilia, in sublime equisetum attollitur uicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, ut equorum cauda, radix lignosa, dura. Vis herbae spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit, prodest dysentericis in uino potus, urinam cit. Sanguinolenta uulnera glutinantur, tritis folijs, et illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaq; adiuvat. Folijs in aqua potis, dissectiones uelicae et intestinorum, enterocolicq; in unum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanis, comis per inter ualela breuioribus, candidioribus, et mollioribus. Id cum acetotritum uulneribus remedio est, eademq; fungitur facultate.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece ἰσώπος. Latine Equisetum.

Officina uerbum uerbo reddentes, cauda equina.

Germanis Schaffthew, Katzen wadel.

Gallis Queue de cheual, ou prela dicitur.

Quae hic a Dioscoride pingitur, uulgo Schaffthew dicitur proprie, non ignota materiarijs fabris, qui ligream pectinū et aliorum minorum operum rudimentum huius herbae scabritia in nitorem expoliunt. Namq; ea in sublime scandit, et uicinos arborum fruticumq; caudices improbo errorum reptatu complectitur, proxima quaeq; uiciniens, ab ramisq; dependens instar equinae caudae, calamis geniculatis pyxidatim cornutibus, capillamento potius quam folijs articulo, iuncea cuspide, in riguis et fossis inuenitur. Alterum hyppuris uel equiseti genus, quod equisetum cognominant Germani Katzen wadel, recto caule, aequali, cubitum excedente, uacuo, grauioribus per interualla et candidioribus comis mollioribusq; assurgit. Faciunt et aliam Graeci Hyppurim grauioribus et mollioribus comis, inuenitur haec in pratis, nec sepe frequētius occurrit inuisa foeminae: hanc polygonij foeminae esse, ut supra ostendimus, multi arbitrantur.

## Coccum infectorium.

## Cap. XXXIX.



Coccum quo infectores utuntur, frutex est furcatus, paruius, cui grana ceu lentes adherent, quae electa congeruntur. Optimum gignitur in Galatia et Armenia, deinde Asia et Cilicia, ultimum ex omnibus Hispanicum. Vis huius spissandi, uulneribus neruisq; praecisis, conuenienter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoq; in Cilicia, et quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, et coccum uocitant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece Κόκκος βαφικός. Latine Coccus Baphica.

Officinis Granatimorum et Kermes et Albernes cum Mauris.

Germanis Scharlach ber. Gallis Vermillon dicitur.

Coccus baphica, uel coccum baphicum, bacula est asparagema, folijs innata fruticis a quofolia illic. Theophr. Pli. aringens amara, sicat.



ficcat sine morfu, ob id ad uulnera magna etiam neruorum congruit, roborat partes sue his qualitatibus manifestis, siue tiam (ut quibusdam placet) lotus substantie similitudine, quam dicunt habere cum corde precipuam.

Tragoceram.



Tragoceram.



Tragum.

### Tragium.

### Cap. XL.

**T**ragium nascitur in creta tantum insula, lentissimo semine, folio et ramis simile, singulis tamen minoribus. Succus ei lacteus, gummi non dissimilis. Semen, folia, lachrymaque, illius spicula e corpore eijciunt omnia quoque corpori impacta uocant, pora straguriae medentur, calculos uesicae frangunt, menses trahunt, modus in sumptione est, drachma una. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbae pabulo spicula excutere. Est et alterum tragium, quod tragoceros aliqui uocant folia scolopendrii habet, et radicem syluestris raphani, tenuem, candidam, quam crudam uel coctam esse dysentericis prodest, folia autem no hirci uirus olent, exinde sibi tragi nomen adoptauit. \*Prouenit in montibus & precipitijs.

\*Addititia  
clausula.

#### NOMINA AT EXPLICATIO.

Plinio lunipero similis, et semine et folio, et ramis, hodie ut pote quam sola Creta insula gignit, passim incognita. Alterum tragium quod tragoceram aliqui uocant Dioscoride teste, huius non nulla consentirent quae uulgo bursa pastoris, Germanice Teschel frant, uel Sedel frant appellatur, quod et folia ferè scolopendrii ferat, radicem syluestri raphano non dissimilem, candidam, quam in dysenterijs salubriter utuntur, nisi natales reclamarent, namque haec nascitur propter uias et in parietinis, illa montibus et precipitijs. haec in folliculis in exiguae uulge similitudinem compressis, turbinata cordis effigie, semen gerit minutum, quod non temere fuisse pretermisum a Dioscoride, diiudicem peritiores.

### Tragum.

### Cap. XLI.

**E**st etiam herba tragos, quam aliqui scorpion aut taganon uocant, maximè in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex uino poti, coeliacis, & foeminis fluxione uuluae laborantibus auxiliantur. Tunduntur a pleurisy, & in pastillos digesti asseruant, quibus utuntur cum opus est.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci Τράγος.

Latine Tragos.

Officinis uermicularis.

Germanis Ragen treuble. Fuchsius falso Klein haußwurz, weible.

Tragus herba nascitur in muris et petris, macerisq; uinearum et parietibus prouenit. Maio et Iunio mensibus, pallidis seu candidis floribus. Desiccat modicè, uehementer autem refrigerat, ideo ad Erisipilata, herpetas, et a fluxione nasas phlegmonas prodest.

### Iuncus.

### Cap. XLII.

**I**unci duo genera, unum laeuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera, unum sterile, reliquum fert semine nigrum, rotundum, et crassiore constat calamo, carnosioreque.

Tertius




Scirpus.



\*Euripici.

Iunci palustris genera.



Tertius est iuncus qui uocatur oloschoenos, prioribus carnosior, asperiorq̃, is similem su-  
pradicto fructum in cacumine parit. Semen  
utriusq̃ tostum, ex diluto uino potum, sistit al-  
uum, & rubra foeminarum profluvia, urinam  
cit, capitisq̃ dolores facit. Quæ proxima sunt  
radici folia tenera, conuenienter illinuntur ad  
uersus phalagiorum morsus. Aethiopici \*iunci semine somnus  
allicitur. sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ξυῖνος. Latine iuncus. Officinis latinum nomen seruauit. Germanis Bingen.  
Gallis Iunc dicitur.

Tria genera iunci apud nos inueniuntur, unus in aquis, crassitudine et magnitudine, fungosusq̃; medulla  
insignis, Latinis mariscus, Græcis holoschoenos dicitur. hic ut molli-  
simus, ita ad uitilia præferunt. Al-  
ter acutus à nostris, Græcis oxyschoenos nominatur, sterilis idem. Omnis, qui regenerat se quotannis,



ex quo cepit  
radix denuo pullulat. Tertius melancra-  
nis, quasi atriceps dicitur, fructum gerit  
nuarum coherentium modo, in quibus  
cuspidatum semen clauditur. hoc nihil in  
uliginosis occurrit frequentius. vide-  
tur autem palustris iuncus idem cum scir-  
po esse. Nec in fruticum, inquit Plinius,  
nec in ueprum cauliumue, neq̃; in her-  
barum aliudue ullo quam suo genere nume-  
rentur iure. Leniac enodi stilo in exile  
cacumen fastigato, fungosa medulla, qua  
ad lucernarum utuntur lumen, ut plâta  
tota ad operiendas tegetes, neq̃; non con-  
textus natarum, quallorum, aliorum  
tilium nexus.

## Lichen. Cap. XLIII.

Lichen qui saxis est familia-  
ris, aliquibus bryon appel-  
latur. asperginosis petris adhae-  
ret, ut muscus. Is illitus sanguine  
nis profluvia sistit, inflammatio-  
nes arceat,



## Pulmonaria.



nes arcet, impetigini medetur. iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus. oris & linguæ defluxiones inhibet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λευωδία.

Latinis Lichen, & bryon.

Officinis Hepatica. quamvis id cōmune cū alijs quibusdam nomen habeat.

Germanis Leber Fesut / Stein odder brunn lebertraut.

Gallis Hepatique, pour coreau dicitur.

Lichen nomen inuenit ab eo, cui peculiari

ter medetur, impetignis morbo: aut etiam ut puto à re ipsa nomen ducit. quoniam saxa quibus hæret lingua modo lambat: hodie omnibus tum officinis tum herbarijs hepatica dicitur, quod iocinerum fibris similis conspiciatur. Abstergentem ac modicè refrigerantem facultatem, utramq; uerò resiccantem habet. Abstergentem quidem atq; exiccantem à petra, refrigerantem autem ab aquo humore. Est & aliud genus hodierni temporis Medicis & herbarijs pulmonaria, Germanis uero Lungen Fesut appellata, in quercu arbore ac saxosis locis proueniens. Folia mollia habet, inuicem incumbētia leniter laciniata, in quædam prædita, superiore parte uiridia, inferiore in luteo albicantia, ac ueluti punctis aut punctis in quibusdam notata, atq; hoc uoniam aliquam pulmonis humani formam referentia, unde etiam pulmonariam dictam esse conijcimus. admodum adstringit et desiccet, quamobrem uulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis &c.

## Paronychia. Lunaria italica.



## Paronychia.

## Cap. XLIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita paronychijs atq; duritijs, remedio est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Paronychiam esse conijcio eam cuius picturam damus, quam itali lunariam à noctu lucentibus folijs uocant, herbam odoratam, in montium saxis nascentem, folijs poplij radice hirsuta.

## Chrysocome. Cap. XLV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat, coma specie corymborū, hyssopo simili, radice hirsuta, ueratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex austero dulci, in petrosis opacisq; nascitur. Radix exca facit, & adstringit, his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet, contra purgationes uuluar, decocta cum hydromelite assumitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chrysocome alijs chrysanthemon, et amarantū chrysitis Plinio. Latinam non habet appellationem. Palmi altitudine est, comanibus fulgore auri corymbis in petrosis opacisq; emicat. Proximè ad eam accedit quam herba

nostrī palegium montanum uocitant, siquidem ea herba palmi altitudine consurgit, comanibus hyssopi forma corymbis, radice hirsuta, ueratri nigri modo tenui, cyperi magnitudine, gustu non iniucundo ex austero dulci, in petrosis opacisq; emicat.

## Chrysoconum.



Chrysogonum.

Chrysogonum. Cap. XLXI.

**C**hrysogonum dense fruticat, quernis folijs: flore coromarij uerbasci, radix ut rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χρυσόγονον. Latine Chrysogonum.

Officinis Chariophyllata & herba benedicta.

Germani Benedikten wurzel appellant.

Radix eius luto & sordibus clota siccatur & imbre aceti resperfa areis & uestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & eruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentum idem ex uino decoctiones eius menses ciere. Contra uenena tritam cum uino sumptam ualere. Concoctionem præterea roborare, dolorem uentriculi & intestinorum à frigidityte aut flatibus ortum decoctam in uino sanare ait. Mirificè etiam ad interna uulnera huius herba decoctum confert. Externa uero ex ea collui debent.

Elichrysum.

Cap. XLVII.

**E**lichryson quidam chrysanthemon, nonnulli & idama ranton uocant, quo deorum simulacra coronant: ramulū habet candidum, uirentem, rectum, firmum: folia intercedētibz spacijs angusta, abrotano similia: comam aurea lucis, in orbem, umbella rotunda ueluti siccis corymbis dependentibus: radice tenui, nascitur in asperis, & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, urinæ stiticia, ruptaq; coma ē uino pota opitulatur, ciet menses. Sanguinem concretum uētris ac uelicae ablumit, pota cum multo, ieiunis, trium obulorum pondere, sistit destillationes, data in uino albo diluto, uestibus inseritur, ut eas ab erodentiū iniurijs tueatur.

## Elichryson. NOMINA ET EXPLICATIO

Ελὶχρύσον Dioscoridi, Galeno & Paulo Amarantus, officinis & imperitis Stiches citrina, uel ut ipsi loquuntur, sticados citrinū. Germani Rheinblumen, mattenblumen.

Helichryson uero dictū, quod ad foliore percussū comantibus in orbem florum folijs, fulgorem auri præ se ferat. Alter (duplex enim Amarantus est) purpureus qui hodie flos amoris, et Germanis blümen le von der lieb/ Floramor & Samet föbble dicitur, quibusdam etiam Tausent schön. Amarantus autem dici ceperunt duo hæc genera, quod flores eorum nunquam marcescunt. Recentiores purpureum amarantum uehementer siccare tradunt, ideoq; cum uino sumptum maxime uero semen, alui fluxiones sistere scribunt. Lutei floribus in uino decoctis, ad lumbricos educendos utuntur, & ad pediculos emecandos in lixiuo coctis.

Chrysan-





## Chrysanthemum.



## Cap. XVIII.

**C**hrysanthemū aut caltha, nō nullis buphthalmos. herba est tenera, fruticosa, leues proferēs caules, & multifida folia: flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitātes, unde buphthalmi nomē traxit, propter oppida nascitur, cuius caules oleris utēce manduntur. flores cum ceratō triti, steatomata discutere produntur, regio morbo correptis, colorē breui reddunt, si sequente lōgo balnei usu, post exitum ebibātur.

## EXPLICATIO.

Grecē χρυσάνθεμον. Latine Chrysanthemum. Officinis incognitum.

Germanis Schmalzblüm a pinguedine, quae contrito digitis flosculo apparet et Dattblüm et dotterblüm nominatur. Chrysanthemum a flosculis auri splendorē et colorem pra se ferentibus, dictum est. nascitur prope urbes, in pratis humidis, et alijs locis aquosis. Calidum est siccum.

## Verbenaca.



*De reserpius*

## Ageratum.

## Cap. XLIX.

**A**geratum fruticosa herba est, palmari longitudine assurgens, simplex, humilis, origano maximē simili. umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditū est, quoniā diutissimē flos in sua coloris specie conseruetur. Vis decocti feruens. huius ustae nidor urinam cit, & uuluae duritias emollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sunt qui Ageratum arbitrantur eam esse herbam, quam supra capite de Heliochryso descripsimus, et amaranthum luteum appellauimus peritioribus indicandum reliquo cui delineationi propius accedat.

## Verbenaca.

## Cap. L.

**P**eristereon, siue uerbenaca nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse uidetur, quod columbe circa hanc perquam libenter uersari soleant. dodrantis altitudine & interdum amplius adolescit. folia e caule prodeunt in cisa & subalbida, ea singulari ramo, radiceq; sola constans.



\* Verere.  
\* reprimunt  
et c. ad her-  
bā referenda.

re saepius inuenitur. Folia cum suillo adipe recentia aut rosaceo impōita, uulua-  
rum dolores finire putantur. ignem sacrum illita ex aceto reprimunt\* putrida ul-  
cera cohibent. uulnera glutinant. ueteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ωεπισεπεδύ ο σίος* Latine Verbenaca recta,  
Officinis Verbenā simpliciter. Germanis *Eisen kraut* Eisen hart.  
Gallis Veruaine appellatur.

Verbenaca recta, id est, *ωεπισεπεδύ ο σίος*, præsertim uiridis et recens, sed enim sicca, cum radici-  
bus oleo incocta, perfrictaq; capiti, dolorem eius omnem diuturnum à frigore, aut crassīs humoribus o-  
mnium maxime digerit, et caput roborat.

Gal. li. 2. cōp.  
ph. part.

## Sacra herba.

## Cap. LI.



Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos  
emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quib;  
ex interuallis folia quercus, sed minora angustioraq; eisdem  
diuisuris in ambitu, colore aliquatenus cæsisio. radix  
lōga, tenuis, flores purpurei, graciles. Folia cū radice in  
uino pota, illitæ uē, aduersus serpentes possent. eadē dra-  
chmæ pondere cum thuris obolis tribus, in uini ueteris  
hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra reglum  
morbum bibuntur, ueteres tumores & inflammationes  
mitigant. sordida ulcera purgant. Tota in uino decocta,  
tonsillarum crustas abrumpit, oris nomas gargarizati  
cohibet. Aiunt, si aqua spargatur trichinium, quæ madue-  
rit, lactiores conuictus fieri. Datur potandū in tertianis  
febris, tertium à terra geniculū, cum folijs circumdanti-  
bus; quartanis, quartū. Sacram uocant herbam, quoniam  
multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἱεροβοτάων*. Latine Verbenaca supina, siue herba sacra.

Officinis consolida media. Germanis *Gilden günsel*, Consolen. Gallis *Consolle* dicitur.

Caulē habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per interualla folia bina ex singulis geniculis in  
extremitatibus laciniata quernis similia, sed minora, angustioraq;, colore cæsisio, à medio caulis ad su-  
stigmum usq; ex singulis foliorum alis flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi sub-  
est lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram late serpentes, prope-  
gat. Gustu astringit, et amara est, ut calidam et siccam esse nemo dubitare possit. Vulnera, ut receptio  
res tradunt, glutinat. Sanguinis grumos ex casu, uel contusionibus coactos in corpore dissijcit et dis-  
solvit. Præsens remedium est aphthis, et ulceribus in ore serpentibus. Decoctam eius tumoribus  
illitum eos dissijpat. Vfus etiam eius ad intertrigines, ulcera puendorum, et intestinorum exulcera-  
tiones prodest.

## Astragalus.

## Cap. LII.

\* Pharus.

Astragalus, paruus à terra frutex, folijs & ramis ciceri similis: flore purpu-  
reo, paruo: radice rotunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices  
firmas habet, nigras, præduras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringē-  
tes, nascitur in uentosis, opacis, & in niualibus. eo Memphis\* Arcadiæ scætet. Al-  
uum sistit radix in uino pota, urinā mouet, uetustis ulceribus, sicca efficaciter in-  
spargitur, sanguinem suppressit, ægrè propter duritiā, tunditur.

Astragalus qui à Dioscoride describitur, frequens est in Gallia, rura cicero montanum uel rusticum ci-  
cer, eorū uerò idiomata Cices sauages, ou cices de mont aigne nominant, fruticē folio et ramis ciceri simi-  
lē, flore purpureo, paruo, tereti radice, raphani modo grādi, quæ ueluti adnatas habet appendices, præ-  
duras, ueluti cornua inter se implicatas, gustu adstringentes. Inuenitur in petrosis, et locis uento pro-  
flatis, cicerculā esse diceres, nisi radix lēra subesset, Germ. *Ed moren*, alij Christiani *wurz* appellant.

Hyacinthus.



## Hyacinthus.

## Cap. LII.

Medius.



Minor.



Maior.



**H**Yacinthus folia habet bulbi: dodrātatem caulē, minimo digito tenuiorem, herbaei coloris: comā procumbētem, florū purpureorum plenam, incurtam: radicem bulbaceam, quē, ut creditur, pueris cum uino albo illita, pubertatem coērcet, & non patitur erumpere, sistit aluum, pota urinam impellit, phalangiorū moribus auxiliatur. Semen adstringentiū est, theriacis expetitum, regium morbum emendat, cum uino potum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὕακινθος. Latine Hyacinthus, & ut quidā uolunt, uacciniū. Officinis incognitus. Germanis Grosse bloemetzen blümlin. Gallis uaccietum dicitur.

Duplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, ut ex hoc Columella carmine colligi potest. Necnon uel nivosos uel cœruleos hyacinthos, albos uerò non intelligas prorsus candelos, sed eos potius qui si cū cæteris cœruleis cōferas, pallefcere uidētur, quemadmodi pictura affabrē tibi demonstrat. Sunt qui ad etatē hanc differentiā coloris referre uolunt, quorū ego sententiā ueriorē esse existimo. cū enim adolefcunt, pallefcere incipiunt. Cœruleum autē Hyacinthum nostra triplicē producit, maiorem scilicet, minorē, & medium: in illo enim maiores ac patentiores, in hoc autem minores et quasi orbiculati sunt flores, ut ex eorū pictura cernere licet. Vere mensibus nimirū Februario & Martio, cum uio la purpurea. Theoph. li. 6. de sirpiū historia cap. ult. testē, erūpit. hinc Martium florē Germanis dictum esse conijcimus. Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi uerò completi aut incipietis in refrigerando. Semen autem tertio quadante nūc ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.



## Papauer erraticum. Cap. LIII.

**P**apauer erraticum, quod rhœada uocant, uere quidē in aruis cū hordeo nascitur, flore p̄tinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. folia eruce, aut origano, aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed lōgio ra, diuisa, scabra, iunceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris anemones, puniceus, interdū albus: oblongū caput, sed quā anemones minus: semen rufum, radix lōga, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in uinicyathis trib. ad dimidias decocta, potui dabis quib. somnus exercēdus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mullāpora, aluū leniter emolliunt. ad idē prestandū mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cū calycib. illita, inflāmationes sanant. eorundē fotu & perfusione, somnus allicitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcē Μήντωρ ἢ πόδες. Latine Papauer erraticum, rhœas.

Officinis Papauer rubrum. Germanis Wild mo. n. glazen/  
Forn rosen, Klapper rosen. Gallis coquelourdeis.

Nos Rhœadis picturas damus. Vnius atq; adeo primi quod eruce folia habet, alterius quod cichorij. florem proferunt puniceum et aliquando candidū. Nascuntur in auenis et segetibus, passim refrigerant ut alia genera papaueris. Recentioribus sacro igni medetur. Mulierum mensura profluvia cōpescit. Sanguinē enaribus fluentem iccori impositū sistit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudendorum tumores detumescere facit. Temporibus illitum, phreneticis somnū cōciliat. Calidos oculorum dolores luteo impositum mitigat.

## Papauer satium. Cap. LV.

**E** satium papaueris genere, quod hortense est, semen in panē densatur, qui sanis in usu sit, eo etiā ex melle pro sesama utuntur, thylacitū uocant, capitulū habet longū, & semen candidum. Syluestre uerō, caput insidens demissumq; & nigrum semen, quod pithitis nominatur, nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis syluestre, & ad medicinas ualentius, multo his lōgius, productiore capitulo. Omnium in cōmune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa et folia decoquantur in aqua, somnū fotu cōciliabunt. bibitur decoctū cōtra uigilias. Calyces cū polēta triti, & cataplasmatibus admisti, ignibus sacris, & inflāmationibus presunt, triduntur quoq; utrides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum recondunt. Capita quoq; per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dū humor coeat in eclegmatis lentore. id medicamentū intusli, arterie fluxionibus, et coeliacorū affectu, doloris leuamentū prebet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Papaueris nigri semen tritū cum uino bibitur contra citā aluum, & foeminarum profluvia, inperuigijs fronti tēporibusq; illinitur, ex aqua. Opium eius magis refrigerat, insipissat, siccaturq; sumptū erum magnitudine, dolorem finit, conco-



Papauer satium.





nit, concoquit, & somnū allicit. tussi atq; coeliacorū ualitudinē auxiliatur. uerūm si copiosius hauriatur, nocet, cū lethargicos efficiens interimat. ad dolores capitis cū rosaceo perfusum efficax est. aurī doli, cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur. inflāmatiōib; oculorū cū torrefacto \* oī luteo proficit: igni sacro et uulnerib; cum aceto. podagris, cū lacte mulieris & croco. somnū accerlit, subditū sedi pro balano. Optimū habetur graue, & densum, gustū amarū, odoratu sopori ferū, quod facile aqua diluitur, laxue, candidū, neq; asperū, neq; grumosum, quod inter colandū non ut cera coeat, & in sole diffundatur: dein admotū lucernis, nō atra luceat flāma: extinctū deniq; odoris uim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactuca succo, adulterant. Verū glaucio fucā tū in dilutione croci colorē reddit: lactuceo succo fictum, exiliter spirat, et asperius spectatur: gummi uitiatū splēdescit, et infirmū est. Nec desunt quī eo demētiē deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamētā, dū mollius atq; rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus autor est, usum eius dānauit, oculo rū lippitudinibus & aurium uitijis infundi uetans, quonā uisus aciem hebetaret, et soporē gigneret. Addidit Andreas, illitōs eo, ptinus excoecari, si nō adulteretur. Mnesidemus usum duntaxat olfactandī probauit, quonā ad conciliandū somnū cōueniret, alioquī nobis ut noxiō interdicit. Quē cōmentitia esse, experimēto deprehēduntur. siquidem effectus, uiriū huiusce medicamenti fidē faciūt quare non alienū fuerit scriptis mandare, quonā modo is excipiat succus. Alii quī capita ipsa & folia tundunt, & praelo exprimūt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos, id meconiū uocāt, multū opio ignauius. Porro opij faciūdi ratio hęc est. Cū ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cūtem incidere oportet, lachrymam exeuntē digito in concham abstergere, nec multo post redire, ut concreta inueniatur. etenim quē tū, aut postero die etiā offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. Cū tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcē *Μῆλον κιννάδον*. Latine Papauer satium. Officinis Papauer.

Germanis *Miasamen* / *moen* / *Slmāg*. Gallis *du pauot* dicitur.

Plura Papaueris genera hoc capite Dioscorides recenset, sed quo clarius horū generū discrimen habeatur, sciendū est papauer prima sui diuisione secerni in satium & agrestia. Et satium iterum tria genera esse; unū propriē, per se & uerē satium appellatū, quod Dioscorides ab utris forma thylacite, id est utriculariū, Plinius candidū, Apuleius usuale & folliculosum uocat, cuius semē in sanitatis usu panis inspersum cōpimēbatur, & cū melle in secunda mensa apud antiquos edebatur. Dioscoride tesie et Plinio: quē causa etiā est, ut usuale sit uocatū ab Apuleio, quemadmodū a uasculi ipsius in follis sine utris modū formati effigie, folliculosum. Alterū genus est quod Dioscorides syluestre et a dolij forma pithite, id est, doliare et rhœada. Plin. nigrū, Apuleius agreste, syluaticū & rhœada uocat, & ex hoc opion fiebat et meconiū. Tertiū genus est hys syluestrius & medicamentosius, quod Plinius contrā quā Dioscorides & Apuleius tradiderunt, rhœada a Græcis, a nostris erraticū uocari dicit. Et hęc duo posteriora genera, natura quidē agrestia sunt, humano tamen opere, studio & usu tantū satia fiunt, quale est ceratites, id est corniculare, & aphrodes, id est spūmēu beracleūq; uocatū. Inter quē tamē omnia satia, et agrestia mediū genus est, ut tradit li. 20 Plin. quod nisi in aruis esset, spōte nasceretur. Rhœa uocauimus & erraticū, quod quidā decerptum protinus cū toto calice mandunt. Et hoc est quod inter satia tertio loco numeratū est, ceu ex descriptione & historia ipsius apud authores manifestū patet, omnibus in hoc concordantibus & de ipsa consimiliter tradentib; Diosc. cap. præcedenti antequā hoc loco de satio ageret. quare inter satia non opus erat Diosc. descriptionē ipsius repetere. Theophrasto quidē li. 9. de plantarū historia. Itē Plinio naturalis historie li. 19. cap. 8. & Apuleio cap. 53. Qui uolet habet loca unde illa requirat. Sed de his nunc satis.

Opium est lachryma ex inciso papauere nigro defluens, hodie etiā ex albo distillat. Ex Apulia defertur: refrigerat, siccāt, inspissat. Dioscori, incidendi & colligendi modum docet hoc loco. Præfertur Thebaicum, Hispanicum opium usurpatur lib. 7. comp. ph. particul. Opium calidis dispositionibus medetur, ut alterum et similia; medicamentis additur ad sedandum dolorem, somnū conciliandum, siccandū.



Opium etiā stomachicis miscetur ad sensum stomachi hebetandū, & somnum conciliandū. Vebemēti autem refrigeratio ex opio, corrigitur castoreo, pipere, et similib. Opij drachmas duas arteriaca 144 miscet Andromachus. Cū multi sunt ὀπώδεις, id est, liquores, solus papaueris ὀπώδης, neutro genere ὀπώδης à medicis propriè nominari solet. Opū omnium quæ sensum stupefaciunt, & somnū torpidū inducunt, uelētissimū est, lib. cod. Μῆνκον ὀπώδης, succus ex folijs & calyce papaueris tussis exprossus, pro Opio à multis supponitur, alia eius adulterina hoc loco Dioscorides, Μῆνκον ὀπώδης, & Μῆνκον diuersa facit Asclepiades apud Galenum lib. 2. antid.

## Corniculatum papauer.

## Cap. LVI.



Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, uerbasco similia, in ambitu syluestris papaueris more serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo foenigraeci, in corniculorū modum inflexo, unde nomen mutuatur. semine papaueris, pusillo, nigroq; radice per summa cespitū nigra, crassa, nascitur in maritimis & asperis. Radici ea uis inest, ut in aqua decocta ad dimidias coxēdi cū et iecinoris affectus potu sanat, prodest his qui crassa quēdam, aspera, aut arenosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semē, acetabulo in aqua mulsa potu. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq; argema ac nubes iumentorum peruncias abstergūt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris genere facitari existimarunt, falsi quādam foliorum cognatione.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Μῆνκον κεραιτῆς. Latine Papauer corniculatum.

Officinis Papauer cornutum.

Germanis Gel magtsamen / gel smagen / oder moen.

Herbarij quidam haud propriè memitham uocant, quidam glaucion, alij paralion, sed perperam.

Papauer corniculatū nominatū quidē est à fructu leuem inuersionē habente, ueluti et foenum graecū ut bouis cornu simile esse uideatur, habet uim incidendi & abstergendi. Dioscorides in maritimis, & asperis locis prouenire ait. In Germania pasim in hortis seritur, cum tamen etiam citra culturam in monte prope oppidum Oppenheim uocato, ad Rhenū sito, Germanis Der rot berg, copiose proueniat. Vidimus etiam papauer cornutum praeferre flores rubros aut puniceos.

## Spumeum papauer.

## Cap. LVII.

Aliud papaueris genus aphrodes, id est, spumeum uocatur, ab alijs heracleū, caule dodrantali. folijs admodum paruis, radicle similib. fructu inter eacandido. Nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur estate semen, cū integrè adoleuit, decidiitq; exiccātū. Datū acetabuli mensura in aqua mulsa, uomitione expurgat, priuatim huiusodi purgatio comitialibus pdest. Hæc herba hodie incognita est.

Hypocoum.



## Hypecoum.

## Cap. LVIII.

**H**ypecoon, aliqui hypopheon uocant, nascitur in segetibus aruisq; folijs ru-  
ta, exilibus ramis. Natura eadem quæ papaueris succo,  
Et hoc quod sciam, hodie nemini cognitum.

## Appollinaris, siue hyoscyamus.

## Cap. LIX.



**H**uoscyamus, frutex est caules emittens cras-  
sos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta,  
flores è latere caulis ordine prodeunt, tan-  
quam puniceorum cytini, scutulis septi seminum  
plenis, ut papaueris. Tres eius differentie: una se-  
mine nigro, floribus penè purpureis, similis fo-  
lijs, cytini præduris & spinosis. alterius semē sub  
flauum, ut irionis. flores lutei, folia & siliquæ sim-  
pliciores, ambo insaniam gignunt & soporem, i-  
deo in communi usu damnantur. tertium genus,  
ut quod mitissimū esset, medici recepere, pingue,  
lanuginosum, molle, candidi floris seminisq; in ma-  
ritimis rudibusq; nascens. cuius occasio si nō ad-  
sit, rusum usurpari oportet. niger, ut deterrimus,  
improbatur. Recenti semine, caulibus folijsq; tu-  
sis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore,

usus ad annum usq; prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur et-  
iam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum au-  
tem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, ad-  
dita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamētum primum,  
et quod à sicco semine exemptum est, collyrijs quæ doloris sensum auferunt, com-  
modissimè inseri solent. contra acutas calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque  
uulue mala, profunt, cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, cætera-  
rumq; partium inflammationes placant. Semen eadem præbet, tussi, destillatio-  
nibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficax, contra mensium abundantiam, &  
erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaueris semine, & aqua  
mulla, bibitur. podagris subuenit, testibus inflatis, mammisq; tumentibus à par-  
tu, tritum ex uino illinitur. alijs quoq; cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præ-  
stant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem se dātibus, per sese,  
& ex polenta, utilissimè imponuntur, recentia ad mitigandos omne genus dolo-  
res oblinuntur, cum uino terna, quaternaue pota, sanant algidas febres, quas epia-  
los uocant, cocta olerum modò folia, si acetabulī mensura manduntur, medio-  
crem insaniam gignunt, idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur.  
Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ὕοσκαμος. Latine Hyoscyamus Apollinaris, Plinius Altercum uocari testatur.

Officina corrupte Iusquiamum. Germanicè Wilsen, & Wilsentaut.

Gallicè de la Hanebane appellatur.

Ceterum quod ad nominis Apollinaris rationem attinet, sciendum hoc nomine insignitam esse hanc  
herbam, ab Apolline Medicinæ deo facta nomenclatura, idq; ob eam causam, quod dolorib. mitigandis  
quasi diuino beneficio & ab Apolline concessam uim habeat: quæ causa etiam fuit ut à quibusdam Py-  
thionon à Pythio Apolline, & ὕοσκαμος, id est, ὕος καμος, hoc est, iouis saba, appellata sit. Hy-  
scyamus uero, id est, saba porcina dicta est ut Helianus refert, quod passu eius cōuellatur sues præsentī  
mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Symphoniaca quoq; dictione Græ-  
ca Latinis tamen usitata quibusdam appellatur, ceu Dioscoridis interpres Marcellus Vergilius suffi-  
catur & credit, quod quemadmodum ad Musicen, quæ symphonia cōstat, & symphonia etiam dicitur  
in hydraulicis organis, quæ à Vitruvio, lib. 10. architecturae descripta sunt, regulae duæ scalarī forma



creta cymbalia, quædam deinceps disposita sustinebant, quibus deinde spiritus & aqua impetu pulsus  
modulatio fiebat: sic in caulibus herba huius extur illi dispositi deinceps symphoniaci instrumenti il-  
lius imaginem aliquam ostenderent. Hyoscyamus Dioscoridi & Galeno triplex, primus flore purpus  
rascens, semine nigro, uenenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius  
flore & semine candido, ad sanationes aptissimus, frigidus ordine tertio, siccus primo.

## Psyllium.

## Cap. LX.



**P**syllion folijs coronopo nō  
dissimilibus, hirsutis, longi-  
orib. sarmentosa scæni modo, in  
totum herbula: ramis dodran-  
talibus, coma à medio caule exo-  
ritur, duobus tribusue conuolu-  
tis in cacumine capitulis: in his  
semine duro, nigro, pulicum si-  
mili: unde & nomen. in aruis  
& incultis nascitur. Vis ei ad  
refrigerandum, inspissandum,  
& molliendum conueniens, ar-  
ticulorum morbis, parotidib.  
tuberculis, tumoribus, uulsi-  
illitum auxiliatur. imponitur  
in dolore capitis, cum rosaceo,  
aqua, aut aceto. enterocelis in-  
fantium, & prominenti umbi-  
lico, illitum ex aceto medetur.  
teritur acetabuli mensura, & in  
aquæ sextario madefactum, ubi  
concreuit aqua, illinitur si-  
quidem uehementer refrige-  
rat, & in feruentem aquam de-  
iectum calorem reprimat, con-  
tra ignes sacros efficax est. Fa-  
ma est, si uiuens domum impor-  
tetur, nō sinere in ea pulices ge-  
gni, cum adipe tustum, sordida  
ulcera, & quæ cacoëthe uocan-  
tur, expurgat. Succus uermicu-  
loso auribus, aut fluxione la-  
borantibus, ex melle prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Ψύλλιον*. Latine Psyllium. Officinis nomen retinuit.  
Germanis *Welscher flöhe saamen*. Gallis *L herbe à pulce*.

Psyllium dictum, ut Dioscorides tradit, quod semē habeat effigie pulicis, humido sicco temperatum,  
frigidum ordine secundo: ne putes cum Arabibus corticem frigidum gradu quarto, medullam gradu  
quarto calidam.

Hæc herba olim Germaniæ peregrina, hodie in hortis sæta passim copiose prouenit.

Hortense



## Hortense solanum;

## Cap. LXI.



Morion Theophrasti.



Halicacabus.



**H**ortense sola-  
num, frutex  
cibis idoneus, exi-  
lis, pusillus, mul-  
tis concavus alis:  
folio nigro, maio-  
re quam ocini, et  
latiore, fructu ro-  
tundo, viridi, qui  
post maturi. atem  
nigricat, aut fulue-  
scit. herba innoce-  
tis gustus. Natu-  
ra ei refrigeradi,  
quare folia ulceri-  
bus quæ serpunt,  
& ignibus sacris,  
conuenienter cū  
polline polente il-  
linuntur. ægilo-  
pia, capitisq; dolo-  
res, trita & imposi-  
ta per se sanant. æ-  
stuantī stomacho  
auxiliantur, paro-  
tidas, cum sale de-  
trita, illitu discuti-  
unt. Valet succus

eius aduersus ignem sacrum atq; ulcera quæ ser-  
punt. cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad  
ægilopas. cum pane, infantium adustioni, quam  
syriālin uocant, cum rosaceo perfusus proficit.  
in collyrijs, aque uel oui uicem exhibet, contra  
acutas fluxiones illitus. auris dolori instillatus  
prodest. Mensium abundantiam sistit, in uelle  
re subditus. succus fuluo gallinarum corallium  
fimo subactus, & linteo appositus, ægilopis præ-  
sentaneo est remedio. Est & aliud solanū, quod  
peculiari nomine halicacabon, id est, uescariam,  
aut physalida uocant, folijs antedicto latioribus.  
cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona  
terram spectant folliculis orbiculatis, fuluo in-  
tus acino, uesiculis simili, rotundo, laui, quo co-  
ronarij utuntur, & corallas faciunt. Vim u-  
sumq; hortensis solani habet, uerum cibis ne-  
quaquam expetitur, regium morbum purgat,  
semine poro, & urinam pellit. Ex utraq; herba  
succus extrahitur, qui siccatus in umbra, recon-  
ditur, ad eadem ualens.

NOMINA



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Solanum hortense, siue satium & urbanum, Græcè Στόνχον & κινάβιον. Officinis corruptè solatrum. Germanis *Wils chschad*. Gallis *morella* dicitur.

Aliud solanum quod peculiari nomine Græcis Στόνχον & λινάβιον, Latinis *Vesicariū*, seu *Vesicaria*, Officinis *Mauritanos* sequitur *Alcaqueng* dicitur, corrupto nimirum Græco uocabulo, Germanis *Juden Firssen* / *Juden welle* / *Schlotten* / & *Boberellen* / Gallis *Concret* dicitur.

Hortense solanum uulgo cognatum in hortis & satis omnibus prouenit, acinis racematim coeuntibus, rotundis, primum uiridibus, à maturitate nigris aut rubris. A multis nationibus estur in holere. Sullatitius eius liquor, hodie nullam non incandescens ardoribus inflammationem restinguit. Aliqui uesicariam dici putant, quòd folliculi speciem uesicarum imitentur, uel quòd uesicæ calculi medentur. Calculosi enim eum uuis maturis acinos miscent, ut uinum habeant acinatium. Germanis eum *Rappits oder beerwein*, contra renem & uesicæ mala. Hoc propinatum magnam aremularum uim deturbat.

## Solanum somniferum.

## Cap. LXII.

Solanum somniferum, aliqui etiam *halicacabon* appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum cotoneæq; mali similitum plenis; flore grandi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita, nascitur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex, in uino drachmæ pondere potus, somnificam uim habet, opio mitiorem. Semen uehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur, si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa multa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis quæ doloris leuamentum præbent, decoctus in uino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. radicis succus cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Στόνχον & ὕπνωτικός, id est, Solanum soporiferum, id dormitorium uel marinum cognominant Germani *Schlaffoderlin* uocant, ea non est quam *Fuchs*ius falso hoc nomine depinxit, folio iuglandis, caule scipionis crassitudine, procero, grandioribus ramis brachiato, flore inferius herbaceo, labris sue per nê purpureis, bacca primum uiridi, loculosa, per maturitatem nigra, quæ dehiscens, uel sponte dissiliens ostendit actinosum semen, uix modo acervatim collectum, quibus myrri foliolis, stellatim decussatis, baccam fulcimentibus, huius genuinam nomenclationem & picturam quare cap. de mandragora.

## Manicum solanum.

## Cap. LXIII.

Solanum manicum, aliqui per sion, alij thryon appellauere. huic folium erucæ simile, maius aliquanto, satis acantho, quem pederota uocant, accedens. caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, ulnæ altitudine adulescentes: caput in cacumine oliuæ figura, sed ut platani pilulæ, hirsutius, uerum maius, latiusq; florem nigrum, postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, densis aut duodenis actinis constans, similibus hæderæ corymbis, ut uuæ mollibus, radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali, gignitur in montibus, uento perflatis, & platanetis. Radix drachmæ unius pondere pota ex uino, facit species uanas, imaginesq; non iniucundas obuersari, sed duplicatus hic modus, ad tres usque dies mentis alienationem affert, quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua multa copiosius pota, & uomitione reiecta.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Manicon & Manice uocatum est quasi furiosum siue furiale, eo quòd furem excitet & insaniam facit; paruo etiam succo: quanquam & Græci authores in iocum uertere, ut scribit *Plinius*, Drachmæ enim pondere lusu pudoris gigni dixerunt, species uanas imaginesq; conspicuas obseruari demonstrantes. Duplicatum hunc modum legitimum insaniam facere. Quicquid uero adijciatur ponderi, representari mortem. Et hoc de radice testantur *Dioscorides* & *Theophrastus*.

## Dorycnium.

## Cap. LXIII.

Dorycnion *Cratæus* *halicacabon*, aut *caleam* uocat. frutex oleæ nuper prodeuntis similis, nascitur in petris, non procul à mari, ramis cubito minoribus, folijs



folijs oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flo-  
re can lido, filiquis in cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinis intus aut se-  
nis seminibus, exiguius magnitudine, leuibus, firmis, uersiculis, radix ad  
digiti crassitudinem & cubiti longitudinem adolefcit, id somniferum esse constat.  
Copiosius haustu in mortem adfert. Nec defuere qui dicerent, semen in amato-  
ria expecti.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Halicacabus peregrinus.

Stramonium.



Dorycnion appella-  
ta est hæc herba ab in-  
fectione, quæ Græcis  
Κυτος dicitur, et à fir-  
ratu lancearum cuspi-  
dibus, quas iidem dora-  
ta uocant, eo quod suc-  
co ipsius etiã cuspides  
in prælijs tingrentur,  
& inficrentur, non  
minus quàm alterius,  
quod furiosum pro-  
priè dicitur, & insani-  
am facit, solanum: de  
quo sic scribit Plinius:  
Hoc est uenenum quod  
innocentissimi auctores  
simpliciter dorycnion  
appellauere, ab eo quod  
cuspides in prælijs tin-  
geretur illo passim nas-  
cente &c.

Cæterum plantatur hodie in Germaniæ hortis a-  
liæ duæ herbæ ex Italia allatæ, quarum nemo antiquo-  
rum scriptorum, quod e quidem sciam, mentionem fecit.  
primam Itali Stramoniam, & pomum spinosum appella-

lant, & inter Solani species numerant, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odo-  
rem referre uideantur. alterum planta est pergulis operiendis aptissima, latius enim suis clauiculis sese  
diffundit, folia habet oblonga, & lacinata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo similes, in quibus se-  
men includitur pisitis aut ciceribus simile, in cuius medio effigies ueluti cordis insculpta & incisa ma-  
net: nos discriminis gratia Halicacabum peregrinum appellauimus, Welsch schlutten Germ.

Hoc loco harum picturam inferre libuit, ut alijs occasione daremus cogitandi de his plantis, ui-  
dentur enim uiribus parum à solani generibus distare.

Mandragoras.

Cap. LXV.



Mandragoram aliqui antimalum, alij circæam  
uocant, quoniam uideatur radix ad amatoria  
conducere. duo eius genera: niger, quæ fœmina exi-  
stimatur, thridacias appellatur, angustioribus folijs,  
ac minoribus quàm lactuca, graueolentibus, in ter-  
ra sparsis, mala gerit forbis similia, pallida, odora-  
ta, in quibus semen ueluti pyrotum, radicibus inhæ-  
ret bene magnis, binis, ternisue, inter se conuolutis,  
nigris foris, intus albis, crasso cortice uestitis, ue-  
rùm is mandragoras caule uiduus est.

Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion  
uocitatus, huius folia magna, alba, lata, læuia ut be-  
ta; mala quàm alterius duplo maiora, colore in  
crocum

\*Quorum li-  
celis.



Dolffraut / Schlaffkraut.



gmata sine exulceratione delent, si quibus senisue diebus sensim perfricentur. folia seruantur in murijs eodemo ad usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur. strumas atq; tubercula, cum aqua dissipat. articulorum cruciatus, cum polenta sedat. Fit citra coctionem uinum e cortice radicis, ad hunc modum: Ternæ minæ in uini dulcis metretam coniiciuntur. Dantur ex eo ternicyathi, ijs qui secari aut amburi debent, ut antè dictum est: si quidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed ueterno quodam pressu, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur. item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum uulvas purgat: appositumq; cum sulphure ignem non experto, rubra foeminarum profusa uia sistit. Scarificata punctisq; multifariam\* aperta radice, erumpens lachryma caue, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane,\* ossa obsonioue, drachmæ pondere deuorata, usum rationis interciperet. Obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quæternisue, ex quo data est, horis. Hac medici utuntur, cum scindendi, urendiq; necessitas adest. Antidotum esse uolunt radicem, cum maniculo solano potam.

NOMINA

\*In testudinis morem.

\*Polenta.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *μανδραγόρας*. Latine Mandragoras.

Officinis mandragora. Germanis Allraun.

Gallis de la mandegloyre appellatur.

Duo Dioscoridi & Plinio, Mandragore sunt genera. Mas candida est. *μῶριον* Græci uocāt, huius biceffigiem damus, fœmina nigra, Græcis *ἑπίδ' αἰτίας*, à similitudine foliorum appellata. Theophrastus autem lib. 6. de historia plantarum capite secundo, tertium quoddam genus Mandragore constituit, cuius fructus sit *μῆλας*, *μῆλας* d'ns, *ἔστιν ὁνός τις τῶ χυμῶ*, hoc est niger, ancinosus, & succo uinosus, huius picturam quoq; damus, Germani Dollkraut, & Schlaffber appellant.

Mandragore maris ceu præstantioris, cortex crassus, limo trahitur ad usum suspenditur, refrigerandi ualensissima, ut ordine tertio, & siccandi primo. Gal. lib. 7. simp.

Mala insana.

Nec sunt hoc loco prætereunda silentio, mala insana uulgo uocitata, quæ Hermolaus Barbarus in suo Collario, Mandragore speciem quæ Morion uocāt, attribuantur &c. Quam tamen sententiam cur non probem facit, præcipue quod Morij fructus letalis sit, mala uerò insana minime de his pomis tam nihil ueteribus fuisse scriptum de sino mirari, quod multa huiusmodi reperio, sicut permulta quondā fuisse, quæ hodie uel ignorantur, uel certe non habentur. Galli amorum poma, Germani Melanzan nomināt. Mala ergo insana è frutice uulgari dependent, qui Perforacem frondibus & caule prorsus æmularur, is passim nascitur folijs propè ficulneis, flore oblongo, specioso, candido, fructu pomi magnitudine, in orbem absolutū circinato, colore uel puniceo, uel niueo in quibus cartilago gravis intercepsa, cucumeraceis coninetur quæ edendo fit. Estur uulgo pomum ex oleo, sale, pipere, fungorū modo coctum. Alij ubi paulum inferbuit igni in orbiculos uel taleolas digerunt, & in acetarijs ex oleo, uel pipere & aceti momento mandunt. Salsamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & uerori non ingrato, sed tamē quæ egrius concoquitur.

## Aconitum Caput LXVI.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoron, alij thelyphonon, alij myofitonon, alij theriophonon uocant. folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta. caulem palmo altum, radix scorpij caudam æmularur, & alabastrimodo splendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones ad mota radice, stupentq; qui rursum hellebori contactu exci-  
ratur. oculorū medicamentis leuādi doloris gratia adiicit enecat pātheras, sues, lupos & feras omnes in carnibus obiectū. Est & alterū aconitū, quod aliqui cynoctonon alij lycoctonon appellāt. \*Huius genera sunt tria: unū quo utitur uenatores, alia duo in usum suum montibus Iustinis exilit, à priore distans, quocum nominatur, plurimū in Italia, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora: caulem filicis, leuem stylum, cubitali altitudine, aut ampliorem. semen in filia, quis oblongis recondit radices in modum squillæ marinæ cirrorum nigrescunt, quibus ad uenationem luporum utuntur. insertæ siquidem crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *παρδαλιανχὲς ἀκονίτον*.

Ec



## DIOSCORIDIS

Lycostonon, Pardalianches.

Vua uersa, uulpina.



Latine pardalianches, quod Pardi eo necentur, & Scorpiū, quod radicē Scorpioni simile habeat. Officina uua uersam, & uulpinam. Germani Wolfsber/ & Dollwurz.

Galli de ta lora appellant. Alterum lycostonon Græcis dicitur, quoniam deuoratū lupos confestim interficit. Officina lupariam. Germani Wulffswurz. Galli pate louine appellāt: hæc in Germania hortis duplex conspicitur, una flore luteo, folijs latioribus, altera floribus cæruleis folijs subnigris: hæc à florū similitudine, qui galorum representare uidentur Eysenhüttle/ & Mündschappen appellant. Erosione & putrefactione enecant, Aconita ideo toto genere letalia sunt.

Cicuta.

Caput LXVII.

Cicuta caulem ædit geniculatum, ut fœniculi, grandem, in cacumine ramo sum: folia ferula, angustiora, graui odoratu. rami, mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoq; albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicuta letale uenenum est, suaq; ui refrigeratoria necat. Remedio est uini meraculi potus. Succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina & comæ siccescant: qui sole densatur in pastillos. multus ad medi rationem usus est aridi. commodè miscetur collyrijs quæ leuandi doloris gratia temperantur. ignes sacros, & ulcera quæ serpunt, illitu restinguit. Herba cum coma trita, & resibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compefcit: sed genitale resoluit. lac puerperarū māmīs apposita extinguit, in uirginitate māmās coërecto & increto



Cicutā



& increscere non patitur. pueris præstat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi, mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti.

NOMINA ET  
Explicatio.Græcè *Κύκωτο*.

Latine Cicutā.

Officina &amp; herbarij Latini nomen seruant.

Germani Syger Franci / Schierling, Wütrich.

Galli Cigue, cue, segue appellant.

Dioscorides, Theophrastus, & Plinius uno cicutæ sistit, quo sunt contenti. Recentiores faciunt duo genera, aquatica frigoris naturæ, terrestris calidæ: uerum quoniam nullum idoneum præferunt autorem, uereor ne, ut ferè solent, hallucinentur. Cicutæ uis est, si Celso credimus excedendi corpora, ut forsitan seminibus & folijs frigida sit potestas, cauli feruida,

ceterum semini, & folijs refrigeratoria uis. Cicutā uenenum est, publica Atheniensium poena iussa, ad multa tamen usus non omittendus.

Taxus.

## Caput LXVIII.



S Milax à Græcis, taxus à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina nascent. Auiculæ quæ Italicæ taxi baccas deuorant, denigantur: & qui ederint easdem homines, alui pro fluuiio corripiuntur. Narbone tam præsentis est ueneni, ut si qui dormiant sub ea, aut in eius umbra subsideant, lædantur, & sæpè numero moriantur. quare de taxo hæc traduntur, ut ab ea caueamus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Σκιάδαξ*, & *ἄξ*.

Latine Taxus arbor.

Officinis inusitata.

Germanis Eybenbaum dicitur.

Gallis arbre qu'on appelle yf.

Taxus ad Herciniam syluam satis frequens perpetua fronde, abietis aspectu, sed humilior, aliisque frequentioribus sinuosa, folio pinguiore sed molliore, baccis rufis, rotundis, mollibus, gustu non inusitati, radice breui, gracili per summā cespitem. In medicina nullum usum inuenio, præterquam ut suffitu

Ec 2



mures enecet. Sunt tamen qui tradant eius baccis aluum resolui, & altiles & corhortales gallinas sag-  
nari. Arcus apud nos elegantes, & pulchros puniceo ferè colore fabricant qui vulgo Xben bogen die-  
cuntur: inde & ea arbor, cuius picturam damus, passim in Germania, Taxi nomen sibi usurpat falsò,  
quòd ex hac quoq; tales fabricentur arcus.

## Apocynum.

## Caput LXIX.

\*longis.

**A** Pocynon, siue cynocrambe, brassica canina, frutex est paruis \*uiticulis cò-  
stans, malè olentibus, lentis, uutiliumq; modo obsequiosis, fractu ferè inui-  
ctis: folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, lento, graui odo-  
re: id luteo succo turget Siliquæ, ccu fabarum, folliculari specie, digiti longitu-  
dine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cum adipè in panes co-  
acta, canes, lupos, uulpes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum  
coxendices resoluunt.

## EXPLICATIO.

Galeno quoq; Cynocrambe dicitur, Canes & omnes quadrupedes necat, si uestiatur, hodie incogni-  
tum: aliquibus Hippomanes dicitur, hanc, ut Hesiodus scribit, si ederint equi, in furorè aguntur &c.

## Nerium, seu rhododendrum.

## Caput LXX.

\*Crassiori-  
bus.

**N** Erion aliqui rhododaphnen, alij rho-  
dodendron uocant, frutex est vulga-  
ris notitiæ, longioribus quàm amygdala fo-  
lijs, asperioribus\*: flore in rosam còforma-  
to: fructu nuci Græcæ simili, corniculato,  
qui patefactus quandam lanosam naturam  
ostendit, spinarum pappos representantè:  
radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa.  
nascitur in amcenis, maritimis, & secus am-  
nes. Flores & folia mulis, canibus, asinis, &  
quadrupedum plurimis uenena sunt: homi-  
nibus uerò contra serpentium morsus præ-  
sidia, è uino pota: eò magis ruta addita, im-  
becillæ etiam animantes, ut pecus & capræ,  
si aquam bibant in qua folia ea maduerint,  
moriuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Νύκτιον.

Latine nerium, rhododendrum, et ut Plinio placet  
rhododaphne.

Officinis &amp; Barbaris Oleander.

Germanis Olander.

Gallis rosagine appellatur.

Nerium apud nos in hortis ex Italia aduectum plan-  
tatur, folijs lauri nunquàm decidētibus, amaris, rosæ flo-  
re leuiter in puniceum uergente, sed modico, fructum  
amygdala similem, ueluti cornu, qui debiscens lanca  
natura semine plenus est, radice longa, gustu salsa. Si  
Luciano, & Apuleio credimus Huius & flores & fo-  
lia cunctis quadrupedibus perniciofa sunt. Emoriuntur  
autem ueluti comitali morbo correpti, quod & Alex-  
xandro res in India gereme constitit. Mirum tamen fo-


lia eius quadrupedum uenenū esse, homini uerò contra serpentes præsidium, ruta addita & uino pota.

## Fungi.

## Caput LXXI.

**F** Ungorum differentia duplex: aut enim māduntur, aut perniciales sunt. Muls-  
tis de causis uenenofo gignuntur, ubi uidelicet clauus ferreus, in quo sit rubi-  
go, aut





suauem in iuribus gratiam habent. largius tamen sumpti nocent, & acrius concocti strangulant, aut cholera morbi citat. Remedio est nitri potus, aut lixiuium cum acida muria, aut feruefacta satireia, aut origani iusculum. debellatur etiam gallina cci fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum mulle multo. Corpus alunt, sed ægrè dissoluuntur, cum magna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reijciuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *μυκός*. Latine *fungus*. officinæ Latinum nomen seruauit. Germanis *Schwem*, *Pfifferling*, *reysken*. Gallis *ung champignon*, ou *potiron* dicitur. Aquitanis *ung Mousseron*. Fungus frigidi, pituitosi & mali succi sunt, si Paulo Aeg. credimus ex his boleti, innoceniores sunt, & manifeste qualitatibus expertes, probè ad summum elixi. Qui uerò amanitæ dicuntur, secundum post boletos bonitatis locum obtinent. A cæteris abstinere conuenit. Plures enim eorum mortiferi, ut qui uulgo *Stiegen* *Schwem* appellamur, ac ipsi quoque boleti, nisi percocti edantur, præsens periculi sepe minantur. Ceterum Prætenses ante omnes laudati, quod procul ab arboribus nati meliore ex terra succo, quam ex arborum pituita gignantur. Superius candidi, inferius nigricantes. De his Horatius in Sermonibus sic decernit: Præteritis optima fungus Natura est: alijs malè creditur. Et hi boleti intelliguntur, qui inter fungorum genera præcipui habentur, & de quibus lib. 20. cap. numeri eiusdem Plinius tradit. Solum gulæ satis faciebant olim (quamquã hodie esculenti sunt) ob quam quanti olim æstimati fuerint indicat, uel illud Martialis:

Argentum atque aurum facile est, lenamque togamque

Mittere boletos, mittere difficile est.

Plinius pediculos uocat, quibus corpus & caput insidet, & qui terere inhaerentes, boletum sustinent, alij coliculos & thyrso.

Colchicum.

Caput LXXII.

**C**olchicon, aliqui ephemeron, sunt qui agrestibus bulbis uocant, autumnu exitu florem addit croci, candidam cantem: ab eo tempore folia bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen: radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, candida & mollis spectatur, lacteo succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur. bulbis eius mediam habet rimam, fissuramque, qua flos erumpit plurimum in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comestis, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur: mirum enim in modum saporis uoluptate imperitos allicit Remedio sunt eadem quæ fungis. bubulum etiam lac potum auxiliatur. itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Serapio hermodactili nomine principio. Dioscoridis Colchicum repræsentat, deinde etiam Ephemeron. Colchicum Græci *Κολχικόν*. Officina

Ec 3



*boleti fungorum  
species*



perperam Hermodactylum, Germani Deytloß / Herbsblumen / Zunds hoden / Wild saßton  
Blüm. Galli Canineca appellant. De omni hoc genere plura in annotationibus, in caput proximè se-  
quens, & Musa in examine, & Tagaultius suis in Mesue simplicia annotationibus doctis pariter ac  
luculentis plura.

## Ephemerum.

## Caput LXXIII.

**E**phemerum, aliqui sylvestrem irin appellant, folia habet lilij, sed tenuiora:  
caulem parem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem nram, digi-  
tali crassitudine, longam, astringentem, odoratam. nascitur in sylvis & opacis.  
Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. folia in uino cocta, discu-  
tiunt tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hermodactyli duo fastigia facit Mesues, unum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse  
uidetur Dioscoridis, Galeni, & Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratâ, iris agrestis ap-  
pellatâ, repellendi, & digrendi facultate præditâ. Alterâ radice rotundâ, & ea foris uel nigra (quod  
Colchicum est ephemerum, & deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per au-  
tumnum erumpente, de quo in capite proximè præcedente) uel rubente, uel alba, ut intus, quam eligit sola,

## Hermodactylus officinarum.



Helxine.

si crassa sit, ac modicè dura, & ex loco edito lecta:  
calida sicca initio secundi gradus, stomacho aduerso  
sissima est. Pituitam crassam à iuncturis præsertim  
extrahit, ob id podagræ, et ipsi arthritidi prodest,  
per se, uel decocto sumpta, aut etiam admota cū sari-  
na hordei, uitelis ouorum, mica parvis. Hec omni-  
no est quam Hermodactylum uocat, & ab utroque

Ephemerum eparat, ueteribus indicata radix, uti quæ rubens Mesue dicitur.  
An uerò quæ in officinis ostenditur.

Horum sit Hermodactylus, uel Colchicum, discernere nō est difficile his  
qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur.  
Canis tamen largam eius copiam depastus innoxie, & multorum tutò hæc radix  
ce purgatorum experientia quotidiana facit, ut credam uel Hermodactylum  
hunc esse Mesue, & neotericorum, ueteribus indicatum, uel saltem non esse  
Colchicum.

Actuarium miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cū 100  
ties eius meminerit in compositis medicamentis ἐπεὶ οὐδὲν ἀντὶ τοῦ λευκοῦ  
ἀλίου alicubi appellans, Serapio Hermodactyli nomine principio Dioscori-  
dis Colchicum representat, ut supra monuimus &c.

## Halxine, id est, muralis herba, Cap. LXXIII.

**H**elxine nascitur in parietinis, sepibus & macerij, fo-  
lia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subruben-  
tes, & circa eos ueluti semina aspera, adhærentia uestibus.  
folia refrigerandi spissandiq; naturam habent, quæ ex causa  
anant illitu sacrosignes, adusta, condylomata, panos inci-  
pientes, tumores, inflammationesq; Succus eius cum ceru-  
sta, ignibus sacris, & ulceribus quæ serpunt, commodè illinitur,  
tur, imponiturq; podagris cum hircino adipe aut cerato cy-  
prino. ueterem tussim emendat instar cyathi haustus. tonhil-  
lis inflammationem sentientibus utiliter & gargarizatur, &  
oblinitur. aurium dolorem cum rosaceo instillatus leuat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἑλξίνη, ἢ περὶ τοῦ τοῦ. Latine helxine, urceolaris, perdicia.

Officinis parietaria.

Germanis S. Peterskraut, Tag vnd nacht, quāuis & alia herba, hoc  
nomine appellatur.

Gallis parietoire dicitur.



Osall



Qualis herba sit helxine satis ab hoc descriptum est. Helxine uero dicta est à uerbo Græco ἑλκω, quod est traho, eo quod asperitate sua tenaci nexu uestes quibus adhaerit ad se trahat: habet enim et caules et lappas in quibus semen continetur et folia aspera. Vrecolaria et uiriaria autem est nuncupata, quoniam urceolos et uitra ceteraque uasa pulchre mundat et purificat. Et Germani ob hanc causam à uetris ipsam Glass Traut uocant. Perdiciam autem uocant à notissima aue perdice, eo quod illa semine eius præcipue uestatur, et herbam eruens in illa uoluitur. Muraris et parietaria Officinis et uulgo dicta à natalibus, eo quod in muris et parietibus nascitur frequens. Monendi sunt hoc loco Medici ut rectum Helxines usum discant nam plerique eam non recte frigidis morbis aut affectibus pro fomento usurparunt, cum refrigerandi constringendique facultate prædita sit. Ceterum cum abstergendi quoque illi facultas insit, potest etiam calculosis et ijs qui difficulter urinam reddant exhiberi potius, si aliquid consimilem facultatem obtinens ei admisceatur.

## Alfine.

## Cap. LXXV.



**A**lfinen, aliqui anthyllion, nonnulli myos ora uocant, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis opacisque gaudet, unde alfine dicta est. Hæc erat eadem quæ helxine, nisi humilior esset, & folijs longioribus, nec hirsuta. cum teritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi adstringendique obtinet. oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. quia & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Eam esse hodie omnes uerè Eruditi esse arbitrantur, quam uernaculo sermone, Germani Röhren darm / Vogels Traut / Röhrenserb. Galli mouronen quasi murærem, uel potius muris aurem appellant. Itali pærinam, quod anseribus gratum pabulum subministrat. Auiculas caucis inclusas, cum fastidiunt escæ, aucupes solent hoc cibo recreare, quando quidæ helxine similis est, minoribus tantum folijs minusque hirsutis. In hortis quoque prorepat, et maceris opacisque latatur. Vita semestri contenta. Herba cucumis cum teritur odorem remittit, sed non illam peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris uirus subolet, quanquam id quod de odore memorant, multis exemplaribus Dioscoridis non legitur.

## Lens palustris.

## Cap. LXXVI.



**L**ens palustris inuenitur in aqua non fluente, muscus lenticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, ignisacro, & podagris illinitur per se, & polenta. glutinat & procidentia puerorum interanea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φακός ὡς τὸ πρὸς τὴν φακίδα.

Latine Lens uel lenticula palustris.

Officinis Lens aquatica.

Germanis Wasser linsen / Wers linsen.

Gallis lentille de mer.

Itali Zen appellant.

Lens palustris siue radice conspicitur, sine folijs, etiam si id quod in ea fructificat, sit simile folio, minus habili humore quam ut in eo folium conflare possit. Quidam aliud genus, non in aqua, sed uliginosis dilutisque nascens, maius eo tradunt, carens folio, agryam phacam, hoc est syluaticam lentem uocantes.



## Semperuium, seu sedum.

Cap. LXXVII.

Maius.



Minus.



Medium.



**S**emperuium magnum ideo nominatur, quoniam perpetuò folia uireant. cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, uirentes, characiæ tithymali modo infecti: folia pinguis, carnosæ, longitudine pollicari, in cacumine linguæ similia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis. supra domicilia etiam feritur. Eius uis refrigerare, & astringere medentur igni sacro, nomis, ulceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur. datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia. teretes tinea potus in uino excutit. subditus in uellere, mulierum abundantiam sistit. succus oculorum lippitudinibus, sanguinis uitio conceptis, inungitur. Semperuium paruum in petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs, rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam herbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore uiribus prædita sunt. Tertium uidetur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephion uocauerunt, Romani illecebram, pusillis, crassibusq; folijs, hirsutis, portulacæ proximis. nascitur in saxis. Vis ei exalfactoria, acris, ex ulcerans. illita cum exungia strumas discutit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Sedum maius* Græcè ἀνταρρύκειον. Latine Semperuium. ἀνταρρύκειον enim semper ῥοποιουμ signifi-  
cat. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Haufs wurz. Gallis ioubarbe.

Dioscorides huius tria genera statuit primū cuius nomenclaturam indicauimus. Nascitur in montanis & scilicet. A quibusdam autem in tectis domorum feritur. Alterum, in muris & petris, & sepibus, oppidorumq; fossis nascitur situ umbroso, cauliculis pluribus ab una radice, folio denso, minuto, pingui, longo, mucronato, in medio caulis altus palmo, umbellam & florem herbaceum sustinet tenuemq;. Huius folijs eadem quæ sedo maiori natura est. Germani uocant Klein haufs wurz.

Tertium



Tertium genus capite de Telephio descripsimus, capite ultimo libri tertij.

Vmbilicus Veneris.

Cap. LXXVIII.

Cymbalaria.



**C**Otyledon, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, in euidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum uino circumlitus, instillatusue, coniecta genitalia nudat. inflammatio

nibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur. stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt. urinam cient. hydropicis ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. Est & alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui uocant, pinguibus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem medium oculi ambitum describentibus, ut in maiore semper uiuo, adstringentis gustus: cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem quæ semperuium.

Vrtica.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè κοτυλιδόν.

Latinis Cotyledon. Romanis umbilicus Veneris.

Officinis Vmbilicus Veneris & Cymbalaria.

Germanis Tadelkraut.

Gallis cymbalaris herba.

Folio tenui est, anguloso, hæderaceo flore paruo, purpureo, in multis terris nascens, omnino eandem esse puto eam cuius picturâ damus cum & similitudo constat, & folium hæderæ habuerit, nam ei tribuitur orbiculatum, in euidenter concauum, quod non longe abest ab hæderaceo: reliqua paria ferè comperiuntur, nec radix oliuæ modo rotunda, nec natales dissentiunt. Alterum genus eiusdem Fuscius falsò Telephium purpurascens facit. hoc Germani uocant Wundt Kraut weiblefolijs sordidis, latioribus, densis, densioribusque circa radicem uelut oculi cingentes, gustus asperi, in eo flos & semen hyperici à multis genus aizoï reputatur. Huius usu Hippocrates in cibo seminum sexum concipi, sicut priore masculinum prodidit.

Vrtica.

Cap. LXXIX.

**D**uo urticæ genera: syluestris, asperior, latioribus, nigrioribusque folijs: semine limi, sed minore. altera non æquè aspera, minuto semine. Folia utriusque illita, canis moribus, addito sale, medentur. gangrænas, carceri nomata, sordida ulcera, & quæ cacoethe uocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesque sanant





Gallis de l' ortie griesche, ou picquante.

Dioscorides Vrticæ duo genera facit. Vnam asperam, quam hodie Officinæ & Herbarij Romanâ.

Germani Römisch oder Welsch nessel appellant. Huius quidem semine in officinis utendum, non alterius quæ passim in sepibus ac dumetis nascitur. Alterû genus maius est minuto semine, sed ut Dioscorides tradit, nõ æquæ aspera, hæc nisi ea fuerit cuius picturâ damus, quâ Germani Brennend nessel & heyter nessel uocant, caule uidelicet glabro. aliam in Germania propius delineationi accedentem me uidisse nõ memini, præter hæc duo genera alia plura inueniuntur, uiribus tamen haud multû à Romana discrepantia, cû haud secus atq; hæc pungere uideantur. Vrticæ fructus, id est, semen, et folia præcipuè utilia sunt, nã uehementer calfaciunt, tenuium sunt partium, digerunt, phymata & parotidas, erasis & lentis humoribus pulmones purgant.

### Galiopsis.

### Cap. LXXX.

**G**aliopsis frutex in totum caulem & folia habet urticæ, leuiora, & quæ grauiorem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui nascitur circa sepes, & difficiliorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusque, duritias & carcinomata dissipant: strumas, panos, & parotidas discutiunt. oportet bis die tepidum ex aceto caraplasma imponere, & eius decocto fouere, ad putrescentiam, gangranas, & nomas, cum sale effica ceter illinuntur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè γαλιόψις. Latine Galeopsis urtica labeo, Lamium, anonium.

Officinis urtica alba, & mortua: archangelica.

Germanis taub nessel / weis nessel / Bynsaug.

Gallis Orties mortes appellantur.

Vrticæ quæ iners et mortua uulgo dicitur, herba cognita est, folijs nõ mordentibus folijs mordacis minoribus

fanant. lienosis cû cerato imponuntur. faciunt ad profusum uenarum, cum succo trita, & naribus indita. menses ciunt, eadem detrита cum myrrha, & imposita. procidentes uulvas, recentia contactu resiliare cogunt. Semen potum ex passo, uenerem stimulat. uulua ora patefacit. cum melle delinctum. orthopnœæ, lateribus & pulmonum inflammationibus prodest. thoracem expurgat. erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum cochis folia, aluum emolliunt. urinas mouent. inflationes discutiunt. decocta cum prisa, uitia pectoris extrahunt. mulierum menses euocant, cum myrrhæ modico pota. Inflammatione turgentem uuam, gargarizatus succus exprimit.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè νρίδγ, ακαλφγ.

Latine urtica ab urendo dicta.

Officinis Latinum nomē seruauit.

Germanis Nessel.



**Urtica mortua.****Senecio.**

minoribus, candidioribus, tactu innocentibus, flore albo, luteo, aut purpureo, cauliculos coronante. A multis Galeopsis esse ea herba putatur quae officinis Scrophularia maior, Ficaria, Millemorbia & Castrangula.

Germanis Saw wurtz / Däuse wurtz / Braun wurtz / grofs feigwurtz gen frant dicitur. Gallis uero agri palma. namq; frutex est thyrso ac fronde urtica leuioribus quae detrit a grauem fundant odorem, flore pureo, cacumine caulis aspero. nascitur propter uias in sepibus & rudera ratis. Huic recentiores quoq; facultatem tribuunt sanandi ulcera putrescentia, & mariscas. Succum eius mederi deformitati faciei iam ferè ele-

Galion.



phantica tradit. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficacius adiungit, id quod ab eius amaritudine non abhorret. Non carent ea matrone in Gallia, uulue uitio opportune, namque suo graui odore reuocat, & uelut exanimis recolligit. an haec sit eadem cum Galeopsi peritioribus iudicandum relinquo.

Galion. Cap. LXXXI.

**G**alion nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli uicem impleat. ramulum foliumq; habet aparinae simillimum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustus ilinitur, sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolutum usquedum albescat. lassitudines reficit, radix uenerem concitat. Nascitur in palustribus.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Graece γάλλιον.

Latine Gallium uel galium, alijs galerion, alijs galation.

Officinis neglecta & incognita.

Germanis Unser frauen bettstro / Mejer frant / Wälsstro uocant. Nomen inuenit à lacte, cui additum pro coagulo est.

Galli petit muguet, hoc est, muschetum minus appellant, quod flos incundo placeat odore. Namque ramulum foliumque profert aparinae simillimum, rectum, florem in cacumine luteum, exilem, densum, frequentem, odore gratum. in aruis & humidis prouenit.

Senecio.

Cap. LXXXII.

**S**enecio caulicolo est cubitali, sub rubro, folijs continuis, diuisurae crucis, sed minoribus multo luteis floribus, qui celeriter dissecti uanescunt in pappos. nomen uero sibi uendicauit, quoniam flores capillorum ritu, uere canescant. radice super-



superuacua. nascitur maximè in maceris, & circum oppida. Folia cum floribus refrigerant. quare illita cum uini modico, uel per fese, tertium & sedis inflammationes sanant. quin & ex manna thuris medentur cum reliquis uulneribus, tum his quæ nerui acceperunt. Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant: uerum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos perfanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *ἡγρέζωρ*. Latine Senecio. Officinis scutam cœli.  
Germanis Creuz wurz, quamuis & alia herba hoc nomine appellatur.  
Gallis du senecon appellatur.

## Thalietrum.



Marinus muscus.

Nomen Græcum inuenit, quòd uere canescat. Callimachus acanthi da appellat, alij pappum: nascitur in tegulis & muris. Nec desicere, qui alterum genus facerent, nec quale esset demonstrarent, dantes contra serpentes bibendū. Sunt qui Senecionem intellexisse Nicanderum putant cum geraon pogenā dixit: quasi hirci barbam: cum uerissimilius sit herbam hirci barbule similem notari quæ uulgo boetis bart dicitur, de qua alio loco diximus.

## Thalietrum Cap. LXXXIII.

**T**halietron folia coriandri habet, pinguiora paulò: caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Θάλιτρον*. Latine Thalietrum.  
Officinis cotula foetida.  
Germanis Krotten dyll / Stinckend Camillen.  
Gallis l' herbe appellee, argentine dicitur.  
Itali Brisaculo, à sædo odore cognominant.

Nascitur ubique, præsertim in campestribus. Dioscorides rutæ caulem ei tribuit non papaueris, librarijs similitudine uocabulorum deceptis, in quos Plinius incidat. Medentur ulceribus folia cum melle.

## Marinus muscus. Cap. LXXXIII.

**M**arinus muscus nascitur in scopulis, testa eisque haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. præcipua ei spissandi uis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Βένωσλαλάσιον*. Hodie uulgo Græci *Σχολεβοτάνιον*. Latine Muscus marinus.

Officinis corallina: quia ut Corallus in aqua nascitur, & eodem cum corallis loco, unde forsitan aliqui falsi, & corallorum folia esse rati, nomen hoc indiderunt. Germani Meer mōss uocant. Galli Coralline. plura uide in annotationibus nostris in Cap. XX. lib. primi.

## Fucus marinus. Cap. LXXXV.

**F**uci marini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. tertium candidum, nascens in Creta, floridum ualde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia uim habent refrigeratorem, non podagreg modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatis efficaciter utilem. uerum his uti humidis cōuenit, priusquā exarescāt.

Nicander.





Nicæder puniceum aduersus serpentes de-  
dit. Hoc fuco quidam purant mulieres suū  
colorem mentiri, cum tamen sit radiculā  
eiusdem nominis, qua sese fucant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φῦκος δαλκόςου.

Latine fucus marinus.


Officinis incognitum.

Germanis Meergras.

Gallis feullet de mer, appellatur.

Multa complectitur genera refrigerandi uim ha-  
bet, ut Dioscoridi placet uiribusq; haud multum diffe-  
runt à nostra palustri lenticula.

## Potamogeton.



## Cap. LXXXVI.

**P**otamogeton, folium be-  
tæ simile, hirsutum, paulu-  
lum supereminens extra  
aquam. Refrigerat & inspissat  
pruriginibus utile, et contra ue-  
terum ulcerū nomas. Nomen  
ex eo inditum est, quod palustri-  
bus & aquosis enascatur.

## NOMINA ET EX-

## PLICATIO.

Græcè ποταμόγετον ἢ σταχύτης

Latine potamogeton & Fontalis.

Officinis incognita.

Germanis Seehaldeu / Sam

Frut dicitur.

Potamogeton aut quasi fluminibus  
vicina dicta est: siquidem aquosis & pa-  
lustribus locis nasci amat. Stachytis  
uero quasi spicata, ob caulem quem ex  
se mittit floribus & semine spicatum.  
Astringit & refrigerat similiter Po-  
lygono, sed essentia eius crassior quam  
polygoni est.

## Stratiotes. Ca. LXXXVII.

**S**tratiotes in aquis nascens,  
hisdem supernatat, & sine  
radice uiuit: unde cognomen-  
tū traxit. Herba semper uiuo si-  
milis, ni maiora haberet folia,  
quæ refrigerat. sanguinem qui  
defluit à renibus, pota sistunt.  
uulnera quæ inflammationem  
minantur, intumescere non si-  
nūt. ignib; sacris & tumoribus  
ex aceto illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICAT.

A Græcis celebratur stratiotes. Et ea ut Plinius auctor est, in Aegypto tantum et inundatione Nilī  
nascitur, atzoo similis, ni maiora haberet folia, hodie planè ignota herba est.

## Stratiotes millefolium.

## Cap. LXXXVIII.

**S**tratiotes millefolium exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit.

Rf



Millefolium.

Digitalis.

Primula veris.



uaticum, alij anethum sylvestre, alij asininum daucum uocant, sed falsū  
si uiro doctiss. Eueritio Cordo credimus qui Stratiote Chiliophyllum non  
firū esse millefoliū in suo Botanologico clare demonstrat, recētiore quoque  
ad eodē usū, ad quos ueteres. suum Chiliophyllum, adhibent, ad sanandā nimirum omnis generis  
uulnera, dissoluendū sanguinem concretum, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefo-  
lio non esse diuersum omnibus perspicuum sit.

#### Verbascum.

**V**erbascum differētiā summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo  
mas & fœmina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora  
multo, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis aut amplior, subhirsutus: flores  
albi, aut ex luteo pallescentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitu-  
dine digiti, nascitur in cæpestribus. Verbascum, qui mas appellatur, oblongius,  
albis folijs, & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile effert,  
nisi nigriore latiorēq; constaret folio. Sylvestre folia fert saluiaz, altas uirgas &  
lignotas, & circa eas ramulos quales marrubium; flores luteos, auri amulos.  
Sunt

folijs auicularum pennas imitā-  
tibus, breui admodū dissectoq;  
foliorū exortu. folia sylvestre  
cuminum simulant, præsertim  
breuitate atq; scabritia, breuior  
ra paulò, densiore umbella, &  
pleniore. Surculos in cacumine  
gerit exiguos, & capitula in mo-  
dū anethi: flores paruos, candi-  
dos. Nascitur in asperis agris,  
præcipuè circa fœmitas. Eximi  
us ad ulcera uetera, recētiq;  
profluētē sanguinē, & fistulas.  
NOMINA ET EXPLICAT.

Græcè Στρατιώτης χιλιόφυλλος.

Latine Stratiotes chiliophyllos.

Officinis Millefolium.

Germanis Garben / Schaffryp /

Schaff garben, or Gerwel.

Galli millefeuille appellant.

Quibusdam tamen hodie cumini syl-



*Verbascum sylvestre.*

Sunt & phlomidēs duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, uel paulò pluribus, asperis, crassis, pinguibus, quæ apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum astringit: quare quod magnitudine ludi crum talum æquet, in alui profluuium conuenienter ex uino datur. decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit, & quæcunq; abijciatur blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata ulcera, ex uino & melle illinuntur. cum aceto quoque uulneribus medentur. contra scorpionum ictus sunt auxilio. Syluestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè φλόκος.

Latine Verbascū. Candelaria, Candela regis, Lanaria, Officinis Tapsus barbatus.

Germanis Moll Kraut / Bergen Kraut / Vnholden Fern.

Gallis de Bouillon.

Verbascum omnium ueterum testimonio duo habet summaria genera. Candidum enim folijs, alterum nigrum est. Candidum rursus in marem fœminam digeritur. Præter tria hæc, & sylvestre habetur, Wildt wullkraut Germani appellant. Galli de bouillon sauage. Sicut etiam uerbascula duo, quæ à nostris Herbarijs herba paralysidis, & uulgo arthetica, Officinis primula ueris uocantur. Germanicè Schlüssel blumen. Gallicè Bracha cuculi, & primueria. Horum unum est odoratum, alterum odoris expers. Est & tertium genus Verbasculum ueteribus, quod lychnitim alij, autem Thryallida appellant. Germani Weys & brunn frauen rosin / & Marten röslein uocant. Hijs uer-

basci generibus annumeramus nos ex Cordi sententia eas herbas quas Fuchsius tanquam sibi ignotas nomine digitalis pictas dedit, unam purpureis floribus, alteram luteis, prima digitalis purpurea. Germanicè Branner finger hat / altera digitalis lutea Gelber finger hat, à florum similitudine appellatur. Omnia Verbasci genera cum eiusdem sint effectus, Plinius ea distingui superuacuum putat. Priorum duorum radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest, folia digerendi uim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius quæ aureos flores obtinet. Verbasculo odorato (nam in odorū inutile) recentiores hos effectus assignant. tritum imponitur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uesticæ, renumq; obstructiones soluantur. Ius herbe propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata et tumentia. Præterea calidū & siccū esse constat. Lychnidis sup. mentionē fecimus.

## Aethiopsis.

**A**ethiopsis folia habet uerbasci similia, perquam hirsuta, densaque, in orbem circa radicem imam redacta: caulem quadrangulum, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concauum alis: semen erui magnitudine, geminum, in uno conceptaculo: radices ab eodem cespite numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq; ut cornua possint uideri. pluma nascitur in Ida monte Troadis, & in Messenia. Auxiliatur purulentis ex-

Ff 2



creationibus, ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabritijs, decocta radix & pota quin & cum melle. eclegmatis uicem præbet.

Herba est hodie Germanis incognita.

### Arction.

### Cap. XCI.

**A**rction, alij potius arction uocāt, similis est uerbasco folijs, nisi q̄ hirsutiora & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine cumini, paruo: radice tenera, alba, dulciq̄. Decocta cum semine radix in uino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum. ambusta pernionesq̄ fouentur eodem. bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam, è uino.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀρκτῖον. Latine Arction, prosopion maius uel arcturum. Officinis Lappa siue Bardana maior. Germanis Klein Fletten. Gallis petite Bardane & gleteron appellatur.

Arction ab urso nomen habet. Hallucinantur qui ungulam Caballinam, Officinis dictam Arction esse sentiant, cū ut supra demonstrauimus, bechion sitet in tu silago quā ungula uocant caballinā.

Personata, siue Lappa.

### Cap. XCII.

**P**ersonata folia habet cucurbitæ, maiora & hirsutiora & crassiora: caulem albicantem, quanquā & interdum uidua | caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ unius pōdere pota, cum pincis nucibus, purulenta & cruenta extusientibus auxiliatur, trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitu sedat. Folia utiliter antiquis ulceribus illinuntur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀρκτῖον, ἀρκτῖον, ἀρκτῖον.

Latine personata, uel personata, arction, prosopion, Dioscoridi arction.

Officinis Bardana maior, Lappa maior in diffinitionem precedentis quæ folijs est multo minoribus nec ita rotundis.

Germani Gros Fletten Fraut / Bächolter uocant.

Gallis Gloton, Bardane dicitur.

Herba cuius picturā damus folio constat omnium lapparum maximo, parte auersa herbido, aduerso cano, caule oblongo, interdum caule uidua, grandibus lappis quæ transeuntium uasibus adherescit, in quibus flos purpureus nascitur, non euidens, sed occultus intra se germinans, radice grandi, candida intus, foris atra. Digerit simul & desiccatur, sed & astringit nonnihil.

Petasites.

### Cap. XCIII.

**P**etasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrā de folium, galeri modo amplum, cui fun- gus dependet. Contra phagedenas, & ulcera quæ cacoethe uocant, effica ceter illinitur.

### NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πετασίτης. Latine petasites herba. Officinis inusitata. Germani Pestilenz wurst appellatur. Petasites à petaso, piliū significante dicta est, q̄ foliū eius pediculo superpositū, petasi modo ampli, ut fungus dependeat. Germanicum nomen ab effectu sortita est experimento. n. compro- batur.





*Detasites, pestilens wurzel.*



batū, ut uir doctiss. Hierony. Tragmafferit. radā  
cē hanc mirificē cōferre pestilentialibus febribus,  
quod sudorē uehementer moueat, si in puluerē rea  
lacta cū uino sumatur. Nec minori efficacia bia  
bitur à mulieribus quas uteri tormina & præsoca  
tiones exercent. Valet etiā unice ad euocandos lū  
bricos, Succurrit quoq; ijs qui spiritus difficultate  
laborāt. Ducit urinā et menses. Efficax est ad uul  
nera prahumi  
da, & ad relis  
quas cutis for  
ditatis, hæc ue  
rō posse docet  
eius amaritudo  
cuius quidem  
hæ sine facul  
tates.

*Fumaria.*



*Gale. lib. 4.  
simpl.*

*Lotus Syben gezezt.*

*Epipactis.*

*Cap. XCIII.*

**E**pipactis, ab alijs helleborine, parua herba, fruticosa, exiguis folijs. Iecinoris uitijis utilis, et contra uenena pota. Nulli hodie, quod sciam, herba hæc cognita.

*Capnos seu fumaria.*

*Cap. XCV.*

**F**umaria fruticosa herbula est, prætenuera, coriā dri si milis: folijs cādidioribus, undiq; numerosis, cinera. cei coloris: flore purpureo. huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemq; unde nomen traxit, illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Com manducata herba biliosam urinam trahit.

**NOMINA ET EXPLICAT.**

Græcē καπνός, Latine capnos. Fumaria. Officinis fumus terre.

Germanis Erdtrauch/ tauben Fropf. Gal. Fume terre appellatur.

Fumaria acris, amara, subacris, urinā biliosum & multā commā ducata aut pota prouocat, hepar obstructū purgat & roborat, scabiē et pruritū inde sanat: siccata uentriculū cū uino roborat, cū melicrat o alui subducit, succo suo oculorū claritatē, et delachrymationem fumi modo molitur, unde illi nomē officinis et uulgo, herba hodie usitatissima.

*Lotus urbana.*

*Cap. XCVI.*

**L**otum urbanā, alijs trifolium uocant, nascitur in hortis. extra & succus, addito melle, oculorum argemia, nubeculas, cæterasq; caligines discutit.



*Ef 3*



Lotus sylvestris. Stein Flee.

Cytisus.



NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λωτός ηυεσπεος. Latine Lotus urbana et satius. Officinis trifolium odoratum. Germanis Syben ge syt/woltriedender Flee. Gallis du treffle odorifrant. Vide annot. nostras sup. in cap. de trifolio.

Sylvestris lotus.

Cap. XCVII.

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Lybia gignitur, caule bicubitali, & saepe maiore, alis multis: folijs trifolij pratensis: semine fœnigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfaciendi & leniter adstringendi obtinet, uitia cutis in facie, maculasq; cum melle peruncta expurgat. trita per sese aut cum malua semine, in uino aut passo bibitur aptissime contra dolores qui uescicam malè habent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè λωτός αγγία. Latine Lotus Sylvestris. Officina falsò promelitoto utuntur. Germanis Stein Flee dicitur, et gulden Flee. Caulè fert bicubitalè et sepe maiorè, folia fœnigrecò similia, in quous pediculo tria: floribus pisi, multo tamen minoribus, luteis aut candidis, odoratis, deorsum nutantib; semine per ramulos diffuso fœnigreci, sed multo minore, gustu medicato, radice subcædida, q notè delineatid Sylvestris lotè ad amussim respòdent nulla penitus reclamàte, ut eandè esse nemo sane mètis deinceps dubitari possit. Huic Euchsus falsò nomen saxifragæ luteæ attribuit errore nescio quo seductus.

Cytisus.

Cap. XCVIII.

Cytisus, frutex est albus in totum, ut rhamnus, ramos spargens cubito longiores, in quibus folia fœnigræci, aut loti trifolij, minora, dorso medio prominente. ea digitis trita erucam olent, gustataq; cicer sapiunt. Folia refrigerant, tumores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur. decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quòd apes alliciat, prope aluearia serunt.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Multi eruditi uiri cū fruticè qui hodie passim in Germania hortis scriitur, nomine sene a crabu sed falsò, uulgo Verbeine Eshlin, ueterù esse Cytisum: siquidè foliū mittit fœnigræco nò absimile, ramis exilibus



exilibus, mēbrano folliculo, pellucēte, pretumido, & ueluti quodā spiritu distēdente, turgido, ita ut si digiti prematur, crepitās dissiliat, in quo semē pullū, durū, latū, lētis magnitudine, cicēris gustu, quā uolē omnes nō male cōueniunt, cū delineatione Cytisi: an idē sit, doctioribus iudicandū relinquo.

## Lotus Aegyptia.

## Caput XCIX.

**E**st & in Aegypto lotus, quā in campis flumine inundatis prouenit, caule fabae flore paruo, candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi, occludiq; ad ortum autē aperiri: adduntq; caput ipsum uespera aquis condidi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana ceu milij, quā Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hac habet mali cotonei similitudine, quā cruda costaq; manditur: decoctaq; lutei oui qualitatem exhibet.

## EXPLICATIO.

Loti nomē uagum est per herbas & arbores aliquot, quā uerō Aegyptia sit, apud Theophrastum, Athenicum, & Pausaniam, nam cum notis peregrina planta sit, non est cur frustra de hac plura uerba facere uelimus.

## Millefolium.

## Caput C.



**M**Yriophyllum, siue millefolium, caulis est tener, singularis, unica nixus radice: plurimis folijs, laeuius, sceniculo similibus: unde nomen accēpit. caulis flauescit uariis, ac ueluti ex industria delinatus. nascitur in palustribus. uulnera recētia ab inflammatione uindicat, si uel uiride, uel siccum ex aceto oblinatur. prācipitatis in potu cum aqua & sale datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Millefolium seu millefolia. Hetruria hoc nomine appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus cāpillamenti modo foliosam, eximij usus ad uulnera: boum neruos abscessos uomere solidari ea rursusq; iungē addita axungia affirmans. Aliacst millefolia. Græcis χηλόφυλλον inter sideritides, Achillea etiā dicta. Est & stratiotes chilitophyllos: de quibus ordine suo diximus.

## Myrrhis.

## Cap. CI.



**M**Yrrhis simillima est cicuta, caule folijsq; radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo nō insuauis. Quā pota in uino, phalangiorū moribus auxiliatur. circūmēstrua, & partus secundos, purgatq; à puerperio feminas. subuenit & phthificis cocta in sorbitione. Aiunt quoq; eandem bis die terue potam ex uino, in pestilentia salutarem esse, & nemorbi contagia sentiantur, obflare.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcē μύρρις. Latine Myrrhis. Officinis & herbarijs cicutaria. Germanis Wilderkerffel.

Gallis persil dāne dicitur. Herba cuius picturā damus, omnino cum delineationi Dioscoridis quā myrrhē depingit, nulla reclamante nota, respondet, ut eandē esse nemo deinceps dubitare possit, siquidem simillima est cicuta, caule & folijs, radice oblonga, molli, rotunda, cibo iucunda. Hanc Plinius myrrhē Zam, alij myrrham uocant. Falluntur qui cherephyllon, item qui Robertinam officinis dictam, Myrrhē esse rentur, cū & folijsimiles possint uideri, nō tamen caule ne floribus,



Myagrum

Caput CII.

**M**Yagron, aliqui melampyron uocant, herba est surculacea, folijs rubia, pallidis, tripedanea, semen oleosum, scenograeco simile. Quod cotusum igni torrent, perunctisq; uirgis ad lucernarum lumina utuntur. hoc pingui, scabritias corporis laugari, atq; expoliri constat.

Myagrum siue Melampyrum.

NOMINA ET EXPLICATIO.



*Μελάνυρον* uel *Myagros* officinis, & uulgo incognitum: Galli uocant *du ble frime*, & Carmeline: herba surculosa est, folijs rubea pallidis, tripedanea, semē oleosum, scenograeco simile, in utriculis conceptum. Hoc in arcis paulis, erura flagris decutiunt, et uanis in aurā uento filientē iactant, dū siliquarū recrementa uanescent, tū trifolibus molis subiiciūt, uersandoq; subinde oleū exprimunt, quo non ad lumina tantū lucernarū, sed et ciborū quoq; condimentū pauperes utantur: magno huius olei prouētū sunt qui eā esse uolunt, quā nos uulgo *Lindote* ter appellamus.

Onagra. Cap. CIII.

**O**Nagra, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio nō dissimili: floreroseo, magno: radice candida, longa: cū siccata est, uinū olente. nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data, feras mitigat, & cicures facit. ilu quoq; tetra ulcera mulcet.

Frutex est Germanis incognitus, *Oenochora* Theophrasto dictus.

Cirsium. Cap. CIII.

**C**IRSIUM, caulis est tener, duorum cubitorū, triangulo similis: ab imo foliola, rosæ speciem referētia: angulispinosi, per interualla molles: folia buglosso similia, maiora, subcādida.

modicè hirsuta, partibus extremis aculeata. cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ solūtur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores uari cum sedare Andreas scripsit.

NOMINA ET EXPLICATIO.

*Cirsium*, si *Ruellio* credimus, ea est cuius picturam damus, scilicet ea quam nunc uulgo *Buglossam* dicunt Germani *Wischensung*: alia ab ea, quæ *borago* uocatur, de qua postea agetur cap. 112. Est autem duplex *Buglossa*, unum Germanicum *Echij* species, alterum uerò Italicum in quo omnia sunt maiora, ea *Cirsium* est cum ei delimitationes totæ, paucis exceptis, subscribant, siquidem caulis ei tenet bicubitilis, folia buglosso similia, longiora tamē, subcādida, leniter hirsuta, in partibus extremis aculeata, cacumen caulis circinatum, hirsutum, in quo capitula purpurea, quæ fatiscunt in lanugines, quæ oculata fide in herba dicta nobis *buglossa* maior deprehenduntur. Dicta est autem *cirsium* à uaricibus, quos *Græci* *Cirsos* uocant, quoniam doloribus illorum medetur adalligata. Sunt autem uarices uenarum dilatationes, quæ ex atra bilis materia fiunt, aliquando in temporibus, aliquando sub umbilico,



Cirsium,



umbilico, nonnunquam circa testes, se-  
pius autem in cruribus, sum q; pluri-  
mum in his, qui diutius stare, aut iter fa-  
cere consueverunt. altera sylvestris  
& domestica buglossa, species sunt  
Ech. ij.

Aster Atticus, seu in-  
guinalis. Cap. CV.

**A**ster Atticus cauliculus  
lignosus, florem in cacu-  
mine habens purpureum, lu-  
teumue, & in ambitu diuisum,  
anthemidis modo, capitulum:  
sed ea quæ caulem ambiunt fo-  
lia, stellæ modo radiata, oblon-  
ga, hirsuta. Feruēt stomacho,  
oculorum inflammationibus,  
prociduæ sedi, ac inguinib. illi-  
tu auxiliatur. Tradunt purpu-  
reum florē, si ex aqua bibatur,  
anginis, & pueris comitale  
malum sentiētibus, opiulari.  
inguinum inflammatiōi recen-  
tem illinire cōuenit. Si aridus  
flos sinistra dolentis manu de-

Aster Atticus.



Isopy-

terpatur, & inguibus adligetur, dolore liberat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀστέρις. Βουβωνίον. Latine aster Atticus.  
Inguinalis. Officinis inusitata. Germanis Sternkraut.  
Elein meger Kraut. Gallis Aspergoutte menue dicitur.

Asteris nomen non à foliorum in caulibus, sed in floribus  
potius figura & situ, accepit, siquidem foliorum in huius her-  
be flore numerus & forma, stellam præseferūt, uelut Plinius  
ait: capitula per ambitum diuisa folijs pusillis, stellæ modo ra-  
diata sunt. Errant itaq; qui singula folia in caulibus stellæ for-  
mam representare putant. Bubonium & inguinalis quod in-  
guinum præsentaneum sit remedium dicta est. Germanis  
Dreck Kraut, qui ad herniam puerorū utuntur. flores fert,  
aut luteos aut purpureos. nascitur in collibus, montibus, &  
altis syluis. Augusto mense ut plurimum floret. Mixta est po-  
tentis, uti rosa: refrigerat enim, nō tamen uehementer, & di-  
gredit atq; exiccat, quod illi scilicet amara insit qualitas.



## Isopyrum.

## CVI.

**I**sopyron aliqui phasiolon ob similitudinem uocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pampinos torquetur. capitula sunt in summo caule tenuia, plena seminibus, melanthii gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris uitia, semen ex aqua malsa bibitur. hepaticis, & sanguinem excreantibus utile.

## EXPLICATIO.

Isopyrum Plinius quoque describit folijs anisi, capitulis in summo tenuibus, plena seminibus melanthii, quæ uero, aut quo nomine hodie appelletur, ignotum est.

## Viola purpurea.

## Caput CVII.



**V**iola purpurea folium habet hædera minus, tenuius ac nigrius, nec multò dissimile. cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus, suauiter olens, purpureus, opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; pro-cidenti.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Id, id est, viola omnis, & præcipuè nigra, seu purpurea, quamuis in eodem genere est alba, etiã uulgo martia dicitur, & quadragesimalis, quòd Martio mense, & quadragesima floreat. Germanis Mergen violen / Viole / Blaw / Weiße violen. Gallis uiolettes, & uioles de martz ou care, me dicuntur. Est etiã multifolium, ob id Dasipodium Græcis. Germanis Gessilte violen / distum, còcolor primæ, sed plenior: frigida est, & humida primo ordine. Symplicium ex multis floribus uiole nigre recentium, ut rosarum, flore Persici, infusionibus soluit aluui. Quin & semine uiole nigre album, rotundum, mihi bitu strigosior, magis serpens, flore purpureo, in album languescit, inodoro. hanc Germani Hundsviolen / wild violen, Galli uiolette sanuages uocant.

## Cacalia Italica.

lij æmulu aperte cholagogum est. Est quoque eius generis syluestrior toto habitu strigosior, magis serpens, flore purpureo, in album languescit, inodoro.

## Cacalia.

## Cap. CVIII.

\*musco.



**C**acalia, quæ leōtice uocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori\* aut oleæ similem. nascitur in montibus. Radix in uino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabritijs arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur trita, & cum cerato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

NOMINA ET  
Explicatio.

Græcè λεωντίζα.

Latine Cacalia.

Officinæ lilium conuallium.

Germanis Meyblümlein / Meye rößlin. Gallis du muguet, muschetum maius appellant.

Sua sponte nascitur in opacis & lucis, unde nomen lilij conuallensis caule multo, tenuiore, flore candido, suauiter olente, unde Galli muschetum appellant, gustu subamaro



subamaro, semine molli, radice singulari, longa, adstringente, interdum ceruleo flore cōspicitur. Plurimæ profectò quin potius oēs Cacalia, à Dioscoride descripta natæ, frè huic lilio conuallii respondere cognoscuntur, quæ propter à Dioscoride Cacalia appellari putandum est. Falsus enim Fuchsius est, qui hanc esse Ephemeron non letale arbitratur, radice apertissimè reclamante. nec huic uita adeò breuis, ut ephemerò, quod uno aut altero die commoritur, cū in tres septimanas etiam decerptum uitam humore refocillatum prorogare possit cacalia. Hanc Galenus Caucanon uocauit. Paulus cacaliā nō Caucanon, sed caucano similem esse tradit.

## Bunium.

## Caput CIX.



**B**unio caulem ædit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio simili, longe tenuiora, coriandrinis proxima: flores anethi: semē odoratum, hyoscyamo minus. Urinam ciet, exalfacit, secundas euocat, leni, uesicæ, renibus utile, tam humidi quàm sicci, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; usus inualuit ex aqua mulsa. Pseudobunio palmi altitudine fruticat in Creta, folia ramulosq; napi ferens, acrigustu. Tormina, arq; stranguriam, laterumq; dolores, sanant quaterni rami eius poti in aqua. illiti quoq; cum sale et uino, tepentes, strumas discutiunt.

Hedera terrestris.

NOMINA ET  
Explicatio.

Græcè Βούνιον. Latine Bunium. Officinis inusitata. Germanis S. Barbaren Kraut. Gallis Herbe au charpentier, dicitur.

Plura uide supra in annotationibus nostris in cap. 109. lib. 2.

## Chamæcissus. Caput CX.

**C**hamæcissos folio est hederæ, tenuiore longiusculo, ramulis à radice quinque senisue, dodrantalibus, foliosis. flore uiolæ albæ simili, candidiorè, ac tenuiore, gustu supra modum amaro. radice tenui, candida, inutili, nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisue diebus, eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè χαμαίσις. Latine Chamæcissus, hedera pluuiatica. Officinis hedera terrestris. Germ. Grundtreben.

Gallis Lierre terrestre dicitur. Dubium est apud multos an hæc herba, cuius picturam damus, uera Chamæcissos sit, cū aliquot notis delineationi omnino non respōdeat, quare aliqui clauum maluerunt appellare, ut supra monuimus.



Chama



## Chamaeleuce.

## Caput CXI.

**C**hamaeleuce lumborum doloribus propitia est, herba uirens, in curuis folijs, furculisq; flore rosaceo.

Vide annotationes nostras in caput 105. lib. 3.

## Buglossum, seu lingua bubula.

## Caput CXII.

\*Omnia haec  
quidam non  
habent.

**B**uglossum (\* nascitur in caestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. A-  
iunt eam quæ treis thyrsos emittit, cum semine & radice trita, potamq; co-  
tra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos. ea in uino de-  
coquitur. herbam abscessibus utilem esse uolunt.) Verba  
sco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum  
bubulas imitans linguas. Quod in uinum deiectum, ani-  
mi uoluptates auget.

Buglossum.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Buglossus, bubula lingua Catoni dicta, Graecis ἡ Βούγλωσος.  
Germanis Borvetsch, Gallis borache appellatur: Calida humida, ob id  
uinis inieci a letitiae ac hilaritatis causa esse creditur, unde euphrosi-  
num quoq; Graecis uocatur. Officinis Corago, corrupte Borago, unde  
mutata littera.

## Cynoglossum. Caput CXIII.

**C**ynoglosson folia latifoliae plantaginis habet, ar-  
ctiora, minora, lanuginosa: caule uacat, & humi ster-  
nitur: prouenit in sabuletis. Folia cum fuillo adipe uete-  
ri, medentur moribus canum, alopecij, & ambustis. co-  
mollit aluum, decoctum herbæ ex uino potum.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cynoglossum officinarum,

Cynoglossa uera.



Graeci Κυνόγλωσσον.  
Romani linguam caninam ap-  
pellant.

Officinae Graecum nomen serua-  
runt.

Germani Zundszung.

Galli Herbe au chien uocant.

Cynoglossam non esse eam ca-  
nis linguam quam officinae circumfe-  
runt, cuius picturam sub nomine Cy-  
noglossi officinarum damus, euiden-  
tius est, quam ut probari desideret,  
cum uidea caule proditur à Diosco-  
ride, humi strata, folio latifoliae plan-  
taginis. Nam officinarum canis lin-  
gua, nec plantaginis effigie, sed ana-  
gusta praelonga, subtus lanuginea  
gerit.



folia, nec uenosa, molliaq; caule cubitali, furculoso flore purpureo, semen in lappaceis umbilicis rufis, & exili. Altera, cuius picturā domus, nomine uerā Cynoglossa, inuenitur in sabuletis, folio molli, uenoso, latiusculo, lanugine molli, canescens, primo anno sine caule, hanc omnino uerā Dioscoridis Cynoglossam esse putauimus, uulgo etiam ob similitudinem caui & linguae, ac foetidum canis odorem hoc uerūne cognita.

## Phyteuma.

## Caput CXIII.

**P**hyteuma folia habet radiculā, minora: copiosum semen, perforatum: radicem paruum, tenuem, per summa terrae nitentem: quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Herba peregrina & incognita, quam Plinius describere superuacuum habuit, cum sit usus eius tantum ad amatoria.

## Leontopodium.

## Caput CXV.



**L**eontopodium duum digitorum herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum quaternumue digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanosiore floccosiora. \*  
canescunt, capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semen usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut si pe fallat, radice parua cohaeret, quam tradunt apensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

NOMINA ET  
Explicatio.

Laurus Alexandrina.

Que Ruellio uideatur esse leontopodium, paucis aperiam. Ea est, ni fallor, quae cruciata dicitur herbarijs, & officinis Germanis Blein vergiß mein nit / & Blacr augentrost. humi ferē serpit, digitali longitudine, folio angusto, longo ternos ferē digitos, hirsuto, ab radice lanoso, et canescente, in cauliculorum cacuminibus capitula tanquam pertusa, in quibus flosculi dehiscent, nigricantes, semen spissa occultitur lanugine, radice exili &c.

## Hippoglossum.

## Cap. CXVI.

**H**ippoglossum frutex est folia habens ruscinus figura, & spinosam comam, & in summo ceu linguas è folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagmatis radix succusq; admiscetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graeci ἵππογλωσσόν.

Latine Hippoglossum, Laurus Alexandrina.

Officinis uularia.

Germanis Zepstin Kraut.

Gallis lingua pagana.

Italīs bonifācia appellatur.

Vide plura in annotationibus nostris in cap. de lauro Alexandrina.





## Antirrhinum.

## Cap. CXVII.



**A**ntirrhinon, alij anarrhinon uocāt, herbā caule & folijs anagallidi similem: flore albæ uiolæ, purpureo: ideoq; syluestris anagallis nominata est: semine uituli narium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, uenustiores fieri: nec ullo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Ἄντιρρινον Latine Antirrhinum.

Officinis incognita. Germanis Orant/ Sterck Kraut/ Streichkraut.

Gallis Oculi catti, moron uiolat dicitur.

Galenus hæc & bucranon, hoc est, bubulum, uel uitulinum caput dici mēdit. Florem uiolæ albæ ei contribuit Dioscorides, Plinius hyacinthi: nescio an ianthina, hoc est, uiolaceo potius esset legendum nam ea quam rura nostra Orant uocant uiolacæū florem præ se fert herbula caule & folijs anagallidis, flore purpureo, paruo, semine uituli narium, nam fructus excusso flore uitularum, narium rudimenta quedam exprimit &c.

## Catranace.

## Cap. CXVIII.

**E**x eo genere una, folia coronopi habet, lōga, radicem iunci modo prætenuem: capitula sena, septenaue, in quibus ex ui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem unguium milui exanimati. Altera mali parua magnitudinem explet, radice exigua oliuæ magnitudine: folijs quoq; oliuæ colore, & figura, mollibus, diuuis, humi inclinatis: scamen, ut cicer, minutum in uirgulis dependet, puniceæ coloris, multis foraminibus pertusum. Vtramq; narrant in amatorum expeti. Thesalicæ mulieres his uti traduntur.

## EXPLICATIO.

Harum cognitio, ut herbarum paucius, ad amatoria & phyltra tantum expetitas planè desijt. Plinius quoq; qualis esset, à se describi superuacuum duxit. Illud non ab re est dixisse, ad detegendas magicas uanitates, electum ad humum coniectura, quoniam arescens, contraheret se ad speciem unguium milui exanimati.

## Tripolion.

## Caput CXIX.

**T**ripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit unda, recedensq; dimittit, neq; in mari, neq; in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, ut tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie purpurei, serò punicei conspiciuntur. radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachmis duabus in uino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit, in medicamenta digeritur, quæ uenena arcent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscoridis Tripolium, Serapionis Turbith est. Tripolij nomen retulit, quod flores eius (Dioscoride teste) ter die mutantur, candidi mane, purpurei meridie, punicei in occasu. Nascitur in maritimis, ubi allidit unda, iterumq; retro commeat. hoc Arabū aliquos Turbith cognominasse constat. Anuario tamen duo à tripolio diuersa turpeta esse apparet, alterum uocari alypiam turpet album exponit. Alibi uerò pitusa radicem (quæ officinis dicitur Esula) turpeton cognominat, quasi alerius coloris. hodie peregrinæ, & incognitæ radices sunt, nec temere pharmacis commiscendæ.

## Adiantum.

## Caput CXX.

**A**dianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa. cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenuēs, palmum altius radice superuacua, neq; caulem, neq; fructum, neq; florem profert. Decoctum herbæ potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & urinæ difficili. calculos frangit. aluum sistit. serpentium moribus auxiliatio est. Contra stomachi fluxiones in uino bibitur. Secundas ciet, & menstrua san-

guinia



Adiantum nigrum.

Adiantum album.



guinis reiectiones inhi-  
bet. Contra serpentium  
morsus cruda herba illi-  
nitur. alopecias desat.  
strumas discutit. fuffu-  
res, & manātia capitis  
ulcera, ex lixiuio emen-  
dat. defluentes capillos  
cōtinet, cum ladano &  
myrtino, & fusino, aut  
hyssopo, uinoq; Deco-  
ctum eius cum lixiuio,  
& uino infusum, idem  
præstat. coturnices &  
gallinaceos pugnacio-  
res facit, in cibos eorū  
additum. Seritur gra-  
tia utilitatis pecorum,  
circa ouilia. Vmbrosis,

& palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἀδίαντον. Latine adiantum, quidam polirychon, alijs callitrychon appellant, ab esse  
Au, tingit enim capillum Duo genera eius, candidius, & nigrum, breuiusq; Theophrastus assigna-  
uit. Triplex Dioscoridi esse uidetur. Primum speciatim polytrichon uocat. Adiantum album Theo-  
phrastus. Gaza cum uulgo, & officinis capillum Veneris, Germani Stein reut / Maur reut. Alte-  
rum trichomanes, nigrum Theophrastus, uulgo, & officinis adiantum nigrum, Germani Stawen  
har / frembder, & Welscher Stein reut. Tertium similitudine filicis, & folijs lenticula, uulgo, &  
officinis Polirychon, Germ. Rott Steynbrech &c. Quartū addi potest, quod Apuleij polytrichon  
officinis Polirychon, Germ. Rott Steynbrech &c. Quartū addi potest, quod Apuleij polytrichon  
appellabimus, ne quispiā Dioscoridis & aliorum Græcorum intelligeret, hoc Germanice à colore au-  
reo, quem habet, Galdiner widerthon, appellatur. Galenus adiantum non diuisit, forte quod o-  
mnium eadem sit facultas. Callitrichon à nonnullis trichomanes dicitur: tamen qui de herbis scri-  
pserunt, adiantum uocant, callitrichon potius quàm trichomanes: Polirychon autem, & callitrichon  
diuersa facit Gal. lib. 1. comp. phar. part. Recens melius, nisi cum sic candum, & astringendum ua-  
lentius. Adiantum seu polytrichon, calido, frigido temperatum,  
gustū acerbo, siccit, tenuat, digerit, ob id strumis confert, lapides  
frangit in nobis, crassa & lenta ex pulmone educit, capillos reddit,  
præsertim ustum.

Polirychon Apuleij.

## Fidicula, seu Trichomanes.

Caput CXXI.

Rott Steynbrech.



**T**richomanes nascit eisdē in locis quibus adian-  
ton, filicis simile, sed exilius: folijs lenticulæ, tenui

Gg 2



bus, in ordinē utrinq; digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbis, fusco colore splendidibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *πολυτρίχης*. Officinæ *polytrichum* uocant. Vide plura in annotationibus nostris in caput proxime præcedens.

*Xanthium*, siue *lappa*.

Caput CXXII.



**X** Anthium nascitur læto & pingui solo, & lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis folia triplicis habet, insecta, nasturtiū odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platanū pilula, spinosum, qui contactu uestibus adhærescit. Is antè collectus quàm perfectè siccescat, tunditur, & fictili uase reconditur. Flauos autem facit capillo, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfritum, illinatur. Alij in uino tundunt, & ita asservant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis *Ξάνδιον*. Latine *xanthiū*, nomen ab effectu inditū, quod rufet capillum. Officinis & herbarijs hodie *lappa minor*, & *lappa maior* uersa. Germanis *Bettlerß leus*, *Spitz Klee* ten. Gallis *Gloterō* dicitur. Cum discutiendi uires habeat, facile colligitur tēperamento esse calido & sicco præditū, id quod ex sapore etiā qui est amarus, & subacris, deprehendi potest.

*Aegilops*, siue *festuca*.

Cap. CXXIII.

**A** Egilops herbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternaue rubra, quibus aristæ quasi capillaceæ exeunt. Illita cum farina herba egilopijs medetur. duritias discutit. Succus farine admixtus siccat, & eorūdem gratia reponitur. \*Bromus herba egilopi similis, exiccatoriā uim habens, decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adiicitur: rursus incoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Linum eo humore imbutū, & naribus inditū, contra graueolentiam ulcerū efficax est. Aliqui tritā aloē addunt, & eo modo utuntur. Cum siccis rosīs cocta in uino grauem oris halitum emendat.

\*Hæc ad finem capitis usq; quidam non habent.

NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *αἰγίλος*, festuca, secundū genus auenæ, Gaze festucago, est autē auena sterilis, de quo plura in annotationib. nostris suprà lib. 2. in cap. de auena. hoc cap. uidetur in Diosc. omnino superflue.

*Glaux*.

CXXIII.

**G** laux cytiso & lenticulæ folijs similis, quæ supernè uirent, auersaq; candidiora spectantur. ramuli à terra exiliunt quini seniuē, tenues ab radice, drantem alti. flores ceu uiolæ albæ, purpurei exeunt. minores tamen. nascitur in xamare. Coquitur cum hordeacea farina, sale & oleo in forbitione, ad reuocandum extincti lactis ubertatem.

EXPLICATIO.

Glaux, ut Ruellio placet, frequens in Gallia iuxta specus aquosios, & in ueteribus foveis. sed adhuc nullum inuenit nomen.

*Polygala*



Klein bibenel.

## Polygala. Cap. CXXV.

**P**olygala palmi altitudinē petit: folijs lenticalæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantiam facit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολύγαλον, quod lactis abundantiam faciat.

Germanis Bibenel die Kleiner / uel ut alijs placet, mangel Kraut.

## Osyris. Cap. CXXVI.

**O**syris frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, quaterna, quina, senaue, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Osyris, ut Plinius scriptum reliquit, ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in ijs folia nigra ceu lini, semenq; in ramulis, nigrum initio, deinde colore mutato rubescens. Ea officinis hodie incognita, osyris nomine, namque à similitudine nouum cemen-

Smilax aspera.

dicarum nomen, linaria appellantes, quo nemini nō noscitur. Germani uocant Horn Kraut / Stachs Kraut / Lein-Kraut / Krottstachs / Wabell Stachs / Wabell Kraut / Scheiß Kraut, si similitudine esule decepti.

## Aspera smilax.

## Ca. CXXVII.

**S**milax aspera, folia habet periclymeni: sarmenta tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata, arborescunt ab imo ad summa perreptas, se conuoluens eis. fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. nascitur in palustribus & asperis: radice dura, crassaq;.



Osyris: Linaria.



lia & acini, & ante & post poti, uenenorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem æditis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum uenena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta quibus uenena arcentur.



## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Smilax aspera* hodie Germaniæ peregrina & incognita, nam ea cuius picturam damus, à Fuchſio sic appellata, delineationi non respondet. Germani inter genera uolubilis referunt, & *Stechen desien* Scharpfe wunden appellant.

Balsamine.

Læuis smilax.

Cap. CXXVIII.



**L**æuis smilacis folia hederæ similitudinem habent, molliora, læuiora, tenuiora. huius sarmenta nullis horrent spinis. cōuoluitur arboribus, ut prior. fructum parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace, quadam topiariorum arte, tentoria contra æstus molestiam facti tantur. folia per autumnū decidua. Semine cū dorycnio pote, ternis singulorum obolis, uaria & tumultuosa in somnis obuersari traduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Læuem smilacem, cuius hoc nomine picturam falsò Fuchſius exhibet Dioscoridis Cissampelum maiorem esse, suprà ostendimus suo loco, quæ autem uera smilax læuis fuerit, hodie nemini quod equidesciam cognitū, nisi forte casuerit, quam Padani Ligures Balsaminam, Hierosolymitanum pomum Hetruria, mirabile Gallia, vulgus garantiam, quoniam septi modo in hortis fenestrisq; per cancellos opere topiario digeritur, de qua ne uerbum quidem priuatim apud ueteres habitum inuenio. Ea

Ruscus.

enuibus prælongisq; flagellis ultro citroq; reptantibus euagatur, folijs hederæ, molliora, læuiora, tenuiora, articulationibus, exilibus pampinis, ex alarū sinu prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim uicinis implicant statuminibus, flore cucumeris, ex albo in luteū languescente, turbato utrimq; fructu, carnosæ cute, et per uersus uerrucosa, ac rigidioribus bulbis intumescente, cucumeris pusilli, uel citrij similitudine, malo uerius ac tubere quàm grandi bacca, aut folliculo: aureus maturo color, cartilago intus punicea, uel lutea, sanguineusq; succus. Pomum maturitate disilit, inanitasq; confictio patet, semina intus aliquot lenticule figuræ continens, ruberrima, ex quibus oleum exprimitur, ad uulnera præcipuum &c.

Ruscus. Caput CXXIX.

**S**yluestris myrtus, aliquibus oxymyrſine, aut myrtacanta, Latinis ruscum appellatur. folium fert myrti, latius in formam lanceæ mucronatum. bacce per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo. cubitales ramuli ab radice exeunt, uutilium modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerbæ, & subamara. Folia & bacce in uino potæ urinam cient. mensēs





Ruscus arborescens.



Laurus Alexandrina.



menes pellunt. uesicæ calculos frangunt. stillicidio urinæ medentur. dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Decoctum radices in uino potum, eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum uice, in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ῥύσκιον. Latine Ruscus. Officinis corruptè Bruscus. Germanis Brösch dicitur.

Bruscum hodie, addita litera, licet corruptè, uocant officina, humilis herba est, fruticosa, folijs acutis, & mucrone rigentibus, dependentibus à medio baccis quæ per maturitatem rubescunt, osseo intus nucleo, ramulis cubitalibus, uittilium modo lentis, foliosis, fructu contumaciibus, radice graminis acerba, subamara. Alterum genus nonnulli faciunt: quod proceritatem arborum æquat, folio lato, duro, & per angulos aculeato, immortali quoque uirore, baccis rubentibus & racematim collectis, hanc

Germani Stechend palmen, Galli housson uocant. Scio rusci fructu, cubebas Mauricæ uocatas credi. Sed ab ijs dissentio qui hoc adfirmant, in testimonium citans Actuarius, Aetium et Galenum. Nam cubebas, nec oxymyrsines seu myrti sylvestris fructus, nec cubas Galeni esse cum Serapione aperte harum descriptio ostendit, & conferenti patet.



Hæ enim sunt fructus tenues piper emulantes, sed minus acres et subamari. Galeni uero oxymyrsines quorum picturâ danus, sunt ænem (ita enim legendum censeo) & ænem. i. surculis cinamomi, similes odore uocati quod, sed ualentiore, & nonnihil aromatico, quem & gustatus deprehendit, facultate etiam pibis similia: sed quia sunt tenuiora, uiscerum obstructions potentius detergent, & urinam mouent, & renum calculos expurgant. Nō

adeo tamen sunt tenuium partium, ut Cinamomi loco usurpari possint, cum Quinto: cum multò sint deteriora optima cassia. In Side Pamphiliæ loco, quia luxuriat carpesium ibi est uilissimum.

Laurus Alexandrina.

Cap. CXXX.

**L**aurus Alexandrina folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra, dodrantales, interdum longiores: radice sylvestri myrtosimili, maiore, molliore, odorata inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in uino dulci. & stillicidio urinæ auxiliatur. sed sanguinem extrahit:



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæc omnino eandem esse puto quæ superius Hypoglossum appellauit, quod mihi non credens, eius historia cõferat cum ipsa herba cuius picturam damus intelliget singulis notis ad amissim respondere nulla pro sua reclamante. Siquidem frutex est folijs oxymyrsinæ cõcauis, quibus folium exit minutum, lingua formæ. Nec me fugit nulla in ea, quæ uis medicatur, familiaritatem inueniri, à qua tamen hoc ei nomen inditum, ut hinc etiam Germanicè *Hauck blatt* / *zapfen kraut*, id est, uulua folium dicatur, imò ne aliquem foliorum quidem usum. Fuisse tamen olim non paruum illud ex hypoglotti & hypoglossidij nomenclatura cõstat, quæ hinc proculdubio facta illi est, quod sub lingua teneri solita sunt folia, ut uel hodie, non tantum apud Insulæ, ut Vergilius Marcellus ait, aliasque alibi gentes, sed etiam in Germania nostra fit, quoties abundantem puerorum saluam et destillantem in fauces humiditatem, unde uel proluxa columella, id est, uulua, uel fauces balbucie lingue impedimentum oritur, cohibere: & siccare opus est.

## Daphnoides.

## Cap. CXXXI.

**D**aphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilib. obsequiosisque, multis, inde sursum uersus foliosis. cortex supra modum uiscosus ramos uertit. folia lauri, graciliora, & molliora, fractu cõtumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi; bacca, cum ematu eruit, nigra, radix inutilis, nascitur in montosis. Pituitas extrahit folium recens uel aridum in potu. menses ciet & uomitus caput inanit cõmanducatum. sternutamenta mouet. Bacca quindecim potæ aluum resoluunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officina hanc laureolam uocant, siquidem laureola frutex nascitur ramosus, cubitalis, molliori angustiori que laurus folio, tristi aspectu, flexilibus uirgis, supra modum uiscosis uersus eacum foliosis, flore, candido, bacca cum percoxit atrii coloris, fronde fractu contumaci, cuius gustatu mordetur os, incensumque guttur uellicatur, radice inutili &c.

Veratrum album.

## Chamædaphne. Cap. CXXXII.

**C**hamædaphne uirgas emittit cubitales, singulari ramulo cõtantes, rectas, tenues, leues: folia lauri similitudine, leuiora multo, ac uiridiora: semen rotundum, rubens, annexum folijs. Illinuntur capitis doloribus: trita folia, stomachi ardores mulcent ad sedanda tormina cum uino bibuntur. Potus cum uino succus, menses & urina ciet, idem facit pello appositus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hanc ut priorè Officina et Herbarij uocant *Laureolam*. namque unico ramulo & cubitali, erecto folio, laureo, tenui, multo leuiore, acini rubentes, rotundi, folijs annexi quibus agnoscantur.

## Varatrum album. Cap. CXXXIII.

**H**elleborum album, Latini ueratrum album uocant, fert folia plâtaginis aut betæ syluestris similia, sed breuiora, et nigriora, rubescentia: caulem cauum, quadratalem, tunicis cõuolutum cum arescere cœpit. radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus: ceptum modofibratis, nascitur in montibus et asperis radices messibus colligendæ. Optimè habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extensum, nec tamen funi modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuè habet medullam, gustu non admodum feruens.

neque saluam subinde ciens huiusmodi autem stragulat. Primatæ Cyrenaicæ tenet. Galaticum





Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodam obfita, celerius strangulationem mouent. Vomitione autem uarios extrahit humores, colligens admiscetur, quæ caliginem oculorum discutit. partus impositum necat. menses pellit, stertumenta excitat. mures interficit, cum melle & polenta subactum. absumit carnes, si coquatur unâ. datur per se ieiunis, & cum sesama, aut pitisanæ succo, aut haliçæ, aut lentis cremore, cum aqua multa, aut pulte, aut quauis alia forbitione. Cogitur cum pane, & ita inasatur. Præparatio corporum, ac uictus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius potione scripti xarunt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. quippe longum nimis esset, in hac præsertim ædificatione de materia, simul medicam curandæ ratione exponere. Dant nonnulli in pulvis forbitione, aut copioso haliçæ cremore: aut paucum antea cibum dari præcipientes. statim ueratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si ualētudo corpus infirmat. hoc enim modo defectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non in tempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdita ex eo balani, cum aceto.

NOMINA ET EXPLICATIO.

NOMINA ET EXPLICATIO.  
Græcè ἐλλεβορίς λευκός. Latine Elleborus albus. Officinis Latinum nomen servat.

Germanis Weissstiefs wurtz. Gallis du uiraire, uerarum dicitur.

Germanis Weiss nescitur. Gallis du vitrae, ueraturum dicitur.  
Elleborus olim terribilis fuit: postea tam promiscuus, ut pleriq; studiorū gratia impserint: albus  
autē multo terribior nigro. Radiculae graciles, breues, et uelut decurtate ex cepto uelut capite pro  
cedentes in usum solae ueniūt. Diosc. nec haetote, sed harū cortex deligendus, carnosus, speciosus, pro  
bosam intus partem, quae eximenda est habens tenuē, gustu acer et feruidus, asperis tumulis et locis siccis  
qualis Anticyra est, natus, in frangendo puluerem emittens Plin. Semen tamen a quibusdā purgatio  
nib. adhibetur: summa quoq; radix, quae uelut cepe sanibus acro nigro Gal. Albus eligendus gustu fruen  
s, alces legūtur Diosc. et Plin. Albus amarior est, et minus acro Gal. Albus eligendus gustu fruen  
s, non tamen uebecenter, sed saluā particulam, nō minus mouens, medioerit extensus, candidus, frage  
lis, carnosus, non acuminatus aut iuueus, nec dum frangitur, puluerulentus, medullam interiorē ha  
bens, exilis, qualis Cyrenaeicus, improbatior Galaeus, Cappadoticus, et alus, albi et magis puluerulēci  
Pauli tēpore mētibatur elleborismo per albū, et nunc quoq; si, n. bonus est, uenenosus nō fuerit. Quir  
ellebori nomine apud Hipp. et Gal. albus uenit, ut Aph. a. lib. 5. Apud Arabes contra Ellebori nigri  
eum alijs mistus non est diffinitis, sepe magno successe in melancholici morbo usū est. Syl. haec  
tempestate docti, medicus Sympo saporis, largo satis elleboro nigro incoctō, et ioh. Mazarus dno  
difficilem eius usum experiri est, et drachmā integrā solā potā parū proficisse. Paulus in fundit aqua  
Veratrum nigrum.

*Veratrum nigrum.*

dies quinq; unc. duas: ergo multus satis manne, uel mel-  
li, uel alij incoquatur. Si in radicē raphani immitatur  
albus elleborus, elleborismi modus simplicior est Paulo.



Veratrum nigrum. Cap. CXXXIII.

**H**elleborum nigrum appellatur melapodion, quoniam caprarum pastor, nomine Melampus, furientes in se Prætidæ, primus purgasse. & sanasse fertur. folia ei uiridia, platani similia, minora, folijs sphondylii proxima, subaspera, nigriora, plurib. diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi, racematum coherentes: semen enici, quod in Anticyra sesamoides uocant, quo deiectiones molliuntur. radicibus coheret nigris, tenuibus, à capitulo cepe simili confibratis, quarum est ulus. in colibus, asperis, et sitientibus locis enascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet compulen &



tum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acie gustu, feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Aetolianatum. attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat uentrem, detrahit bilem pituitasque, datum per se, aut cum scamonia, & tribus obolis, siue drachma salis, decoquitur cum lente & in sculis, quæ purgationis causa sumptantur. prodest morbis comitialibus, melancholicis, infanientibus, articularijs doloribus, & resolutis. menses inditum trahit. partus necat, purgat fistulas impositum, & tertia die detractum. item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. scabiem sanat, illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo. uiriliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto medetur. dentium dolorem collutione mitigat. crodentibus medicamentis commiscetur. hydropicorum uentri utilissimè imponitur factum ex eo, farina hordeacea, et uino, cataplasma cõstitutum proxime radices uinum purgandi facultate donat. Huius resparsum domos expiari arbitrantur: quare inter fodiendum stantes, Apollinem, Aesculapiumque precantur, ac uitant aquilæ uolatus: aduolare enim non sine periculo tradunt. nanque si uis effosionem hellebori conspexerit, moriturum qui succidit, augurium est. Celeriter efodiatur oportet, quoniam halitu caput aggrauat. quapropter, ad id arcendum, fossuri allium præsumere, & uinum bibere consueuerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedullatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè ἐλλέβορος ὀκράς. Latine Veratrum nigrum. Officinis elleborus niger Germanis Christwurtz. Hanc Euchsus falso Helleborum nigrum adulterum hortensem uocat, cum uerus Elleborus niger sit, nulla prorsus reclamante nota, ut conferenti patebit. Elleborus niger coquitur cum lenice, aut ture otiquo Diosc. albus autem datur per se, & cum sesamo, aut thapsie succo, aut alica, aut mulsâ, aut pulite, aut lenticula, aut sorbitione alia. Nigrum cum scamonio & sale dat idem. Album debilibus cum succo pituitæ, aut alicæ, aut alio simili. Paulus. Niger pituitam & bilem inferne purgat, Diosc. bilem maximè flauâ, Pau. Albus aut uomitum purgat res uarij coloris, Diosc. Rem uisu terribilem in uarijs colorib. uomitione, Plin. Elleborus bonus ad exanthemata, impetignes, lepras, herpetas, erysipelata, ischerum, Pau. Albus oculorum collirij contra calignes imponitur, Diosc. Oculorum caliginem fetu discutit, Plin. Nigrum aurium inditur, et post biduum aut triduum eximitur in difficili auditu. Nigri obolos tres, aut drachmâ unâ dat Diosc. adiecto etiam scamonio. Manardus quoque drachmâ unâ dedit, cum granis duob. scamonij in mulo cydonio asini, minusque leuius purgat quàm iusta dosis pilularum, quas aggregatiuas uocat. Albi Themison dabat drach. duas, sequentes quatuor, antiquorum uirtutem cognoscentes, qui ob metum parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Vetant tamè dari senibus, et pueris, et mollibus, ac foemineis corporib. Paulus dat à drach. una ad drach. duas, debilibus in succo alicæ, aut pituitæ, fortioribus in aqua calida aut melicrato: sectius tamen non in puluere tritum, ut ante monuimus. Albo non est usus Manardus. ex Italis tamen robustos ferre posse putat: non dandum tamen nisi in diuturnis et ualens morbis, per alia remedia non sanatis, ut hydropi, cachexia, elephanto, paralyti, epilepsia, podagra, morbo Gallico, qui pessimus et longissimus esse consueuit, et auxilia communia uel contemnere.

## Sesamoides magnum.

## Cap. CXXXV.

Sesamoides magnum, in Anticyra helleborum uocant, quoniam albo ueratro in purgationibus miscetur. simile est fenecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili: ignaua: semen gustu amaro, cætera sesame simile. Ventrem detrahit. datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito ueratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsâ. Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantales: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesame, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasque: semen ex aqua mulsâ potum di midio acetabulo. illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nascitur in aspis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sesamoides quidam elleborum nigrum ob similitudinem appellam huius speciei esse eam herbam cuius picuram damus, multi haud inuaditi uiri arbitrantur, quoniam eius delineationi ad omnino respondere uideatur, uiribus aut parum differat: nigro ueratro omnino similis planta est nisi quia caule obtinet crassiores, foliaque minora. Florem etiam si herbaceum habet, tamen è medio eius folliculi aut siliquæ duæ, aut tres, in



Sesamoides magnum.



Cucumer sylvestris.



tres, in quibus semen est, exeunt: floret uere & initio estatis, in montibus, asperis, lapidosis ac sublimibus nascens. Calidus atque siccus ordine tertio. quod pediculos enecat, Germani Leusii fructu uocant, purgat inferiorem uentrem uehementer, pituitam & flauam bilem ducens.

## Sylvestris cucumer. ca. CXXXVI.

Cum sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem longè minorem parit, oblongis glandibus non dissimilem. folia atque sarmenta fatui refert: radice candida, magna. nascitur in fabuletis, & ruderibus, frutice in totum amaro. Instillatus foliorum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polëta radix, ueterem omnem tumorem discutit. imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. ischiadicis infunditur. podagras discutit, decocta ex aceto, & illita. eius decocto dentes in dolore colluuntur. arida farina impetiginem, lepras & uirilignes absterget. nigris cicatricibus colorem reddit, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquioboli pondere, & item cortex, acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, præsertim in hydropicis. deiectiones autem citra stomachi iniuriam mouet. radicis se libra, in uini præsertim Libyci hemina conteritur, danturq; ex eo terni cyathi triduo, dum tumor abundè depri-mi cernatur. E fructu huiusce cucumeris, fit medicamentum quod Elaterium uocatur, ad hunc modum: Decerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una: postridie imposito supra craterem rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur: atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulque carnosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in uicinam peluim demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur. & denuò pressa abijciuntur. humor in pelui agitur, & lintheo opertus, soli exponitur, dumque fterit, tota supernatans aqua cum humore coëcreto, effunditur. hoc uero identidem fieri solet, donec existens aqua liqueat: qua stillatim exhausta, sedimentum

mortario



\* Alij colore  
medium.

mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cauant, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humilitate diffundunt, sic catumq; in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotionem mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non ponderosum, cum candore leniter humidum, gustu amarissimum, quodque luccernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumque, si turbidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum\* sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo amyli immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitentur. Ab imatu ad decennium deiectionibus utile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pueris, chaldi duo: siquidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam utrauis parte extrahit, optima suspiriosis est purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus unus aquae tepidae sorbeatur. ad citandas tamen uomitiones aqua diluens elaterium, subiectas linguae partes penitissimè pinna oblinito. quod si quisquam difficilius euomat, oleo aut unguento irino resoluito. somnum inhibeto. porro his qui eximiè uacuantur, continuè uinum & oleum dari conuenit, etenim uomendo restituntur. quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quae stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elateriū menses. partus enecat, in pello subditum. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissimè anginis illinitur, cū uetere oleo, melle, aut felle taurino.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Ζίνος ἄργεῖο. Latine cucumis sylvestris. Officinis asinus, anguinus, ceraticus.

Germanis Wild springende Furchslin / hundts Furchslin.

Gallis cocombre sauvage appellantur.

Germania peregrina herba, ex Italia ad nos translata, hodie passim in hortis seritur. Elaterij succus ex huius fructu quomodo trahatur, Dioscorid. docet amarus extreme Gal. Paulus dicit uacuare

ut scammonium tribus obolis, tritum cum lactis cotyla. A trimatu incipere, & nullum ex medicamentis longiore uo durare, & quo uetustius eo melius, scribit Plinius, & ducentis annis seruatum testatur Theophrastus.

Staphis agria. Cap. CXXXVII.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscae, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosq; fert florem glastii: & folliculos uirides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim\*, si trita in aqua mulsæ dentur, crassum humorem per uomitum purgant. sed qui hauserunt, ambulare debent. prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuò potui dare: quoniā pericula strangulationis inferunt, & fauces adurunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest: item prurigini & psoriasis. cit plurimā pituitā cōmanducata, cocta in aceto, dentiū dolori, colluto ore, subuenit. rheumatismum gingiuarum sistit. ulcera oris manantia, cum melle sanat. urentibus malagmatis imponitur.

NOMINA



\* Decem aut  
quindecim.




## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcis σταφίς αγρία. Latini Staphis agria. officinis corruptè staphis agria & pituitaria. Germanis Staphis ediner / Leus samen. Gallis de Lestaphis agrie, herbe aux paulx. Plinius staphin agriam, uel staphin uiam Tamini am ab aliquibus, ut Celso, uocari falsò existimat, suum enim genus habet cauliculis nigris rectis, folijs labruscæ, fert folliculos uerius quam acinos, uirides similes ciceri, in ijs nucleū triangulum. Maturescit cum uindemia, nigrescit q̃ cum Tamnicæ rubentes nouerit Plinium acinos: sciuerit illam in apricis nasci, hanc non nisi opacis. Staphis agria semine est uehementer acri & urente, quod mansum pituitam in os ex capite plurimam detrahbat. & illitū ex oleo capiti puerorū pediculos emecat unde pedicularis quoq; herba dicitur.

Thapsia.

Cap. CXXXVIII.



**T**hapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso eiusdem nominis insula, primum inuenta sit. tota uerò natura ferule similes est: graciliore caule: folijs fœniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis furculis erumpente: flore luteo. semen quale ferula, latum, sed aliquanto minus. radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassa

flore libro uestita. Lactis extrahendi ratio hæc est. Facto in ambitu scrobe, cortices inciduntur: aut radix in fornices speciem in se excauata cooperitur, quò merus succus confluat, oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quallum expressus fictili crasso insolatur. Aliqui folium unà terunt: sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem inter est, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humi dus permanet: è folijs autem ex tractus exsiccat, atq; teredinum iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uento: aut quotius, cum dies apricus est, & à flatu silet: quoniam ob habitus acrimoniâ facies uehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ: ob id prius liquido cerato & adstrigente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radices, quàm succus, purgandi uim habent, lacteus succus in aqua mulsa potus, uirique bilem extrahit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminibus anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis obolus unus, quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectio nibusq; datur in cibis aut obsonio, quibus difficile sit uomere. Tam radix quam succus omnium maximè, quæ pares cum eis uires adepta sunt, uim habent extrahendi ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas aliò transferenda est, unde succus illitione, aut radix recens affricu, alopetias explent. Radix succusq; cum æquis ceræ thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt, sed non plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vitiâ cutis in facie emendat, cum melle illitus succus, lepras tollit, tubercula discutit, perunctus cum sulphure. in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, artuculorumq; ualitudinibus utiliter illinitur. ealet ad intugendam colis glandem, ijs qui natura, non circumcisione, curti sunt. tumorem enim excitat, qui pinguium foris emollitus, præputij iacturam refarcit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Radix quam officina pro thapsia uendunt cuius picturam exhibemus thapsia esse ab effectu demonstratur, nam in puluerem redacta soluit, & præsertim corticis puluis ut Dioscorides inquit in Thapso eiusdem nominis insula primum inuenta est, nascitur & in Apennini Alpibus ubi uulgo Crasseguana dicitur.

Errant qui ex folijs succum seruant, quoniam, ut inquit Dioscorides, nullius momenti est.

nb



Genistella.



Spartium:

Genista.



ga profert, sine folijs, ualidas, difficulter fragiles, quibus uites ligantur, cuius hoc loco Dioscoridis meminit, uirgas longas in ijs semina leuis formam habentia, florem luteum ueluti Leucoium, semen & flores cum aqua mulsa si bibuntur pondo obolorum quinque, per superna purgant, ut Elleborus albus, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virga uero ischiadicis profunt: easdem uires Galenus quoque tribuit geniste, unde per spicuum omnibus sit, sparto & geniste, non obstante quod forma nonnihil discent, eandem blumen appellamus, astringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter simulque contra mordacitatem exiccantem.

## Silybum.

**S**ilybon lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Haec recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmae pondere potus, uomitiones ciens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silybon nisi ea spina fuerit quam supra Chamaleontem nigram appellauimus, Germanis Eberwurzel dicta, quod tamen uerisimile non uidetur, cum ut Plinius tradit, in medicina usum nullam habeat, hodie peregrina ac incognita est.

## Glans unguentaria.

**G**lans unguentaria, fructus est arboris myricae similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graecarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur, nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, recens, candida, quae facile delibretur. Ea drachmae pondere pota, lienem absuit, cum lolij farina & aqua mulsa, podagricis illinitur, psoras leprasque decocta in aceto, uulnigines & nigrae cicatrices cum nitro, emendat. & cum lorio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit, uomitiones mouet, aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur.

## Cap. CXXXIX.

**S**partium frutex est longius serens uirgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus uites uinciuntur: semen lentum, in folliculis phasiolorum modo nascens: florem, ut albae uiolae, luteum. Purgant per superna uehementer, hellebori uice, citra periculum flores & semina, quinque obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tussis, extractus succus, in ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, & infundere ischiadicis clystere. Strigmenta autem elicit cruenta.

## NOMINA ET EXPLICAT.

Graece Σπάρτιον. Latine Spartium uel spartos. Officinis Genista nomine saltem cognita. Ut Germanis et Gallis qui haec tria genera quorum picturam damus, confundunt, Pfefferminz, Ginster, oder Genist appellantes.

Spartium uero quo uites ligantur, cuius hoc loco Dioscoridis meminit, uirgas longas

## Cap. CXL.

**S**ilybon lata spina est, folia ferens chamaeleonis albi. Haec recens cum sale oleoque cocta estur. Radicis succus drachmae pondere potus, uomitiones ciens.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Silybon nisi ea spina fuerit quam supra Chamaleontem nigram appellauimus, Germanis Eberwurzel dicta, quod tamen uerisimile non uidetur, cum ut Plinius tradit, in medicina usum nullam habeat, hodie peregrina ac incognita est.

## Glans unguentaria.

**G**lans unguentaria, fructus est arboris myricae similis, magnitudine auellanae nucis, cuius nucleus graecarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur, nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, recens, candida, quae facile delibretur. Ea drachmae pondere pota, lienem absuit, cum lolij farina & aqua mulsa, podagricis illinitur, psoras leprasque decocta in aceto, uulnigines & nigrae cicatrices cum nitro, emendat. & cum lorio lentigines, uaros & papulas in facie, & cutis uitia tollit, uomitiones mouet, aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur.



aduerfatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit, uerum tufa & expreffa succus abftergentibus medicamentis adijcitur, quæ aduerfus pruriginēs & ſcabritias idonea ſunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Βαλανος* *μυρε* *λιν*, id eſt, glans unguentaria, Myrobalanus quoq; Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, ben Arabibus dicta, hodie frequens, ſtomacho aduerſatur, cum hydromelite pota carnis huius drachma una eſt uomitoria: cum oxycrato autē iecur & lienem purgat, cum aceto autem (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, pſoras, lenties, uirilignes, pruritum extergit, lienem & hepatis induratio illinitur cum farina aliqua ſiccante, ut erui ſoli, lienem etiam prodeſſe ſcribit Gal. in theriaca ad Piſonem. Carnis huius ſucco facultate calido utuntur aromatarij: id enim inodorum cum ſit, omnibus ſuſcipiendis odoribus eſt aptiſſimum, ut inſpīdum ſaporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninum Dioſcoridi dicitur, ut ſupra ſuo loco oſtendimus. Oleo expreſſo quod reliquū eſt magma terreum, & amarum, incidit, erget, contrahit, ſtipat, ad prædicta etiam efficaciſſima, ſed minus, id autem uidetur eſſe *μυροβαλάνου πις*, id eſt, expreſſum, quod cataplaſmatis miſcet Gale. li. 11. & lib. 13. Meth. & lib. 9. comp. ph. partic. ſpleneticis remedijs, & ad ſcirrhofos lienis effectus adhiberi ſcribit Gal. Quo in loco *μυροβαλάνου* tantum, aliquando *μυροβαλάνου σκενός*, aliquando *βαλάνου μυρε* *ψικνός* leges, aliquando *μυροβαλάνου αλευργός*, id eſt, farina & pulvis, & *μυροβαλάνου λεωόχανα*, id eſt, putamen & cortex, & *μυροβαλάνου λεπυρά κεκομμένα* & *σπις* *κομμένα*, id eſt, myrobalani teſte & cortices incīſi & tuſi cribratīq;.

Omnia hæc ad ſplenicos ſcribuntur, ut ſit credibile maxime de fructu eodem, ſcilicet Balano myreſtica, & eius partibus, omnia hæc intelligi.

Quam uero myrobalanum Arabicum intelligat Dioſcorides, cui ſimilem facit fructum palme Aegyptiæ, de qua nunc dicam, planè ignoro.

Nam Arabum recentiorum Myrobolani quinque generibus diſtingit ueteribus indiſte putantur, & prunorum generi potius, quàm Balanorum, id eſt, glandium, aſignandæ ſunt. Sunt uero hæc.

Citrini: Lutea.

Nigra &amp; Inda.



Empelítica, Emblici.

Kebuli.



Belectzica: Bellirica.



Lutea ſeu citrina refrigerant cholagoga.

Inda & nigra, melancholiam purgat & exhilarat.

Cepula phlegmagoga, niſum illuſtrat, coſtione mutuat, peſtum purgat, hydropicū conſert.

Empelítica (quæ Actuario *αμπελιζικα* & *εμπελι*, quoq; dici uidetur) etiam phlegmagoga, uentriculum purgat & roborat, appetentiam reuocat, uomitum ſiſtit.

Belectzica empyos inuat, hemorrhoides & capilli deſtutium. De his plura leges in Arabibus.

Hæc 2





**N**arcissum sunt qui ut liliū, liliū appellā-  
rūt. folia potro similia, tenuia, multo mi-  
nora, et angustiora: caulis uacuis, et sine folijs,  
sup̄ de dīā tē attollit, flos albus, intus croceus,  
in quibz dā purpureus: radix intus alba, rotū-  
da, bulbosa: semen uelut in tunica, nigrū, lon-  
gū, phatissimus nascitur in mōtib, suauis odo-  
re, ceteri: potro imitatur, atq; heib accū uirus o-  
lēr. Radix cōcta, siue est iur, siue bibitur, uomi-  
toria est, ambustis igni prodest, cū ex quo mel-  
le trita, præcisos nervos illitu glutinat. luxatis  
mallocolis, diuiniq; articulorū dolorib, tria-  
ex melle & imposita, subuenit, uiria cuius, in fa-  
cie, uiriliginē q; cū semine urticę & aceto ma-  
culat, cū erit et melle, ulcerū scides expurgat,  
abscessus rūpit cōcoctioni repugnātes. infixa  
corpori extrahit, illita cū lolij farina: & melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dioscorides hoc loco, ut Plin. li. 21. ca. 5. & 10. Narcissū  
duo genera facit, licet à Theophrasto & Apuleio non nisi  
unū genus cōstituatur: nisi ex floris diuersitate duplex eius  
genus facere uoluerint. Est autē Narcissus plāta congener  
aut salic̄ similis lilio, quare quidā ipsū nō minus q̄ liliū, li-  
rion uocāt, ut tradit Diosc. Sum qui hermodactylū esse ue-  
liūt Narcissum, quorū opinio in nos nō subscribimus, cū scia-  
mus uulgare hermodactylū esse hieronbulbū, qui et colebē  
cōdicitur de quo supra egimus.

Non



Non tamen omnino negamus ex hermodactylorum genere esse posse narcissum, cum & ipsorum plura genera hodie reperiuntur, ut supra depicta uides.

Ceterum dictus est Narcissus, autore Plinio, non à fabuloso puero, ut fingunt poëtae, sed à narce, quod torpor est, quoniam dolores & torpides capitis grauitates facit: idemq; testatur Sympolij lib. 3. cap. Plutarchus dicens: Et Narcissum appellauerunt quasi neruos hēbetantem, & torpides facientes grauitates, quapropter & Sophocles ipsum antiquum magnorum diuorum, id est, subterraneorum cononamentum uocauit.

## Hippophaës.

## Cap. CXLIII.

**H**ippophaës, quo fullōes uestes interpolāt, in fabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, undiq; denso & largo, folijs oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodā distantes, flores hæderæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamē, & molles, candidi, ex parte rubescentes, radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti, ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum ex ui farina subactus, siccat, & ad usum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, quasq; detrahit, oboli pondere: erui uero farina subactus, quatunt obolis, cum aquæ mulcæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depro-

mitur, uti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

## Ricinus.

Hippophaës, aut Hippophyes, Lappago, Græcis ἵπποφαῖς: qui dam Plinio asperuginem dictam putant. Theophrastus etiam ex thymallo hippophaës optimum apud Tegrane confici scribit. Debens accommodata esse eorum natura, neq; ex alijs causis nomen accepisse: quippe quædam animalium remedijs nascuntur locupletidi uinitate ad gerenda præsidia: quæ hodie sit ignoratur.

## Hippophæstum Cap. CXLIII.

**H**ippophæstum, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis quibus Hippophaës, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui uoles, tribus obolis, in aqua mullâ, aquam pituitasq; detrahit. priuatim comitialibus morbis, neruorum uitijs, & orthopnoæ conuenit huiuscemodi purgatio.

Et hæc hodie peregrina & exoleta.

## Ricinus.

## Cap. CXLV.

**R**ici, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit parua ficus altitudine, folio platani, maiore, laxiore, & nigriore: ramis, caudicibusq; cauis, in arundinis morem: semine in uuis asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal repræsentat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibus foedum, lucernis emplastrisq; utile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas, bilem, aquâ quæ per aluum extrahunt, uomitiones mouent, sed in iucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum uehementer subuertit. Tusa & imposita, uitia cutis in facie, uarosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt, rigentes mamas cohibent, eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Hb 3





Græcè Κρότον.

Latine Ricinus, Cici.

Officinis Kerua, manus Christi, palma Christi, Cataputia maior.

Germanis Wunderbaum, Kreuzbaum, Teckenbörner.

Gallis palma Christi appellatur.

Itali uocant, Mirasole, &amp; Girasole.

Ricinum à similitudine animalis fœdi (uulgo eis Teck,) cum semine fœtibus huius, appellam Ricinos.

Nusquam non feritur: apud nos in hortis ad arcendam effodiendum talparum, ut uolunt iniuriam, instar arboris parue profilit, folio platani maiore, uel uitium, ramis caudicibusq; cauis, & in aridinis modum fistulosis, semine in uitis asperis, quod corticibus exutum Ricinum animalis, effigiem repræsentat tam proxime ut si uita adesse, plane Ricinus uideretur. de Ricino oleo lib. primo egimus.

Tithymali.

Platophyllos.



Cap. CXLVI.

Dendroides.



Tithymali



Helioscopius.



Cyparissias.



Nux uonicā.



**T**ithymalli genera septem, quorum masculus characias appellatur, ab aliquib. a mygdaloides: alter, myrtites, qui foemina existimatur, eumq; myrsini tenaut caryitē uocant: tertius, paralius, quē tithymalida appellant: aliū, helioscopius: quintus, cyparissias: sextus, dendroi-

des: septimus, platyphyllos dicitur. Characie caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo atque acrima-

ramos, angustioribus, & longioribus, radice crassa, lignosa, pendet in cacuminibus caulium, coma iunci, sub qua caueola foliolis balnearum similes, in quibus semen cōtinetur. nascitur in asperis & montib. Succus aluū purgat, trahit pituitā bilem q; binis obolis in posca sumptis, et cū aqua mulsa, uomitiones mouet. Appetente uindemiārū tempore, succus congestis ramulis, mox dissectis, & uase cōclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinā erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinē impleāt. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillāt, ut cū his inarescāt: quas ad usum recōdunt. Per se etiā tufus in pila, & in pastillos coactus reponit. Porro cū extrahitur lac, neq; quo uētus aspiret, stare quenquā, neq; manus oculis ad mouere cōuenit: sed anteq; colligas, corpus, praesertim faciē, collum, scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cū uino perungere. Fauces aut exasperat, quapropter catapotia cera aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari, binas tamē ternasue ficos, purgationis gratia sumpsisse, satis est. Recēs lac ex oleo, perunctos in sole capillos euellit, renascētesq; flauos & exiles efficit. deniq; oēs perimit. Dētiū cauernis in lusu, leuat dolores, sed cera dētes oblinendi, ne suo delapsu, fauces & linguā uitiet: tollit illitu impetigines, formicantes uerrucas, pēfiles, & quę thymi florē representant. ualet aduersus prerygia, carbunculos, phagedenas ulcerū, gangrenas, fistulasq;. Legit semen autūno, & siccātū sole leuiter tunditur, feruet in aqua, loco mundo reponitur. Folia itē siccantur. Semen & folia lactei succi effectū prebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cū lacte lepidio, et caseo cōtuso. Radix drachmę pōdere in hydromelite pota, per inferna trahit, decocta cum aceto, dentiū dolori auxiliatur, colluto ore. Foemina, quam mirsyniten, aut caryiten uocant, similis suapte natura daphnoidi: folijs myrtis sed maiorib. firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes, fructū fert alternis annis, nuci similē, mordaci gustu. nascit in asperis. Succus, radix, semē, folia, consimilē antedicto sortiuntur facultatē, sed ad citādas uomitiōes inualidior hęc est. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quē tithymalida, aut mecona aliqui appellauere, nascitur in maritimis, ramis subrubetibus, palmum altis, quinis senisue à radice exeuntibus folijs lini, angustis, paruis



oblongis, in uersus quosdam digestis: capite in cacumine orbiculato, in quo semē uterum, uario colore emicat. Flos albus, frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad usus reconditur. Helioscopius dicitur, folijs portulacę, tenuioribus, rotundioribusq; tramulis prodeuntibus a radice, quatuor aut quinque, rubentibus, doctantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capite anethi semine uelut in capitulis incluso. Helioscopij nomen accepit, quoniam comas cum sole circumagat: circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus. Colligitur succus semineq; ut aliorum. Exdem quę superioribus uires, non tamen usque adeo ualida. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, uel maiorem, subrubrum: ex quo folia picę similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. & in totum nascentę picęam æmulatur, unde nomen traxit. candido succo madet, cui eadem uis quę superioribus. In petris nascens, dendroides cognominatur: ampliter opacat, in cacumine frondosam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus. folijs myrti tenuioris: fructu characię. Eiusdem effectus, cuius superiores, similisq; modo reconditur. Platyphyllos, uerbasci similis est. Radix, succus, & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tussus, & aquę insparfus. Reliqua tithymalorum genera quę supra scribuntur, idem efficiunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Septem statuuntur Dioscoride & alijs ueteribus testibus, Tithymalorum genera, prima Characię hoc est, uallaris. Sic dicta quod uallis & septis muniendis apta sit, a uallo, quod Gręcis χάραξ dicitur: quę sepium iungendarum idoneitas causa fuit, ut baltheum etiam, id est, cinctura sit dictum, fortę eam quam Germani uocant Beren milch. Secundus myrtites quasi myrtacea a foliorum myrti figura. Sicut a nucibus quibus similem fert fructum caryites & myrsites. Hunc fructum sunt qui nucem uomicam, Germanis Kroneugeln uocant esse putant. Tertius paralius, id est, maritimus dicitur, eo quod maritimis nascatur locis. Quartus Helioscopius, id est, solisequus appellatus est tithymallus, eo quod coma eius ad solis cursum circumagatur. hic Germanis quibusdam dicitur Sonnenwendende wolffsmilch. Quintus Cyparissias nuncupata est a foliorum cupressi similitudine. Germani imitatione latine Cypressene wolffsmilch appellant. Sexta dendritis siue dendroides, id est, arborefcens, a ramorum copia, & quod ferę arborefcant, Germanis Die grösst wolffsmilch dicitur. Septimus platophyllas, id est, laevis folius, a foliorum latitudine nominatur Breyt bletterte wolffsmilch.

Ex Tithymalorum generibus tria tantum depicta damus, proferent fortę alij longę plura, nam et si Dioscorides pluris species descripserit nobis incognitas, habemus tamen nos uicissim alias multas quę ipse non descripsisse uidetur.

Turbith officinarum.



Turbith Mesue quibusdam uidetur secunda species tithymalli. Laudant Arabes eius corticem albū, gummosum, uacuum, arundinaceum, recentem, fragilem: corrigunt zinzibere, & formatis ex eo trochiscis.

Genera tithymalorum habent acrem calidamq; facultatem, inest uerō & amaritas, ex quarto itaq; calfacientia sunt ordine, & ualenter desiccant.

## Pityusa. Cap. CXLVII.

Pityusam specie a cyparissia differre constat, & si tithymalorum generi assignetur. caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs picę, acutis, exilibus flore paruo, uelut purpureo: semine instar lentis, lato: radice crassa, candida, succo referta, quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsa, item seminis drachma. Succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur, modus foliorum drachmę tres.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

ΠΙΤΥΟΥΣΑ, hoc est pityusa hodie omnibus herbarijs officinisq; ac recentioribus medicis incognita, fruticosa est: caule supra cubiti altitudinem assurgente, geniculato, folijs picę acutis exilibusq; flore paruo:



paruo purpureo, semen latum forma lenticuli, radicem madidam succo, quam quidam r̄h̄zotomi circū  
latores pro albi bellebori radicibus diuendunt. Scaphoni Germa. appellant. A Quarius turpention no  
cauit simpliciter. Pituita bilem & pituitam per aluum detrahitis, radix decocti hemina, aut seminis  
ligula in balanis &c.

## Lathyris.

## Cap. CXLVIII.



**L**athyris, quam aliqui tithymalum appel-  
lant, eamq; tithymalorum numero adscri-  
bunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digi-  
tali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumi-  
ne alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis  
proxima, latiora, & læuiora. quæ autem in sum-  
mis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, a-  
ristolochiæ, aut oblongæ hædæ figura. In ca-  
cumine fructum summis furculis gerit. triplici  
loculamento insignem, rotundum, ceu cappa-  
rin, in quo grana\* intercurfantibus membranis  
in se distincta continentur, eruis maiora, ro-  
tunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida  
sunt, et gustu dulcia. Nullus radicis usus. totus  
frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Gra-  
na sex aut septem in catapodio, aut cum ficis aut  
palmulis deuorata, aluum purgant, sed aqua fri-  
gida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pi-  
tuitam, & aquas. Succus tithymali modo exce-  
ptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo  
aut oleribus folia decoquuntur ad eisdem ef-  
fectus.

\*Addetria  
purpurea.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Λαθυρίς. Latine Lathyris. Officinis Cataputia minor.

Germanis Springkorn/triebkorn

Gallis esurge dicitur.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali speciem esse, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod  
eodem modo purget, uniuersæque illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus uideatur dulce,  
quod sanè etiam maximam uim purgatoriam obtinet. Calidum in tertio, et in primo humidam statuit.

## Peplus.

## Cap. CXLIX.

**P**eplos frutex est lactei succi plenus, folijs paruis, ut rutæ, paulò latioribus  
rotunda coma, ferè dodrantali, humi resperfa: semine sub folijs rotundo, mi-  
nore quam candi di papaueris. pluribus scaturit auxilijs, unicam radicem habet, su-  
peruacuum, ex qua fruticat. nascitur inter uites, & in hortis. colligitur messibus.  
siccatur in umbra, & continuè uersatur. fructus tussus & feruefactus reconditur.  
Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio, obsonijs  
inspersa conturbat aluum, muria conditur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Peplum, Officinis Esulam rotundam

Germani Runde wolffsmilch.

Galli Vineale reuelium uocant.

Græcis Ρεωλος dicitur: inter uites et in hortis inuenitur frutex lactei plenus succi. folijs rutæ pau-  
lò latioribus, circinata coma, palmati, humi procumbente, fructu sub folijs rotundo, tribus loculis discre-  
to, in quibus semen nigrum, papaueris magnitudine continetur. Semine potio aluus soluitur, ac pituita  
detrahitur.

Peplis.



## Peplis.

## Cap. CL.

**P**eplis, quam aliqui sylvestrem portulacam uocant, Hippocrates peplion, in maritimis maximè nascitur, latè opaco frutice, candidi succi pleno: folijs sati uae portulacæ, rotundis, inferne rubentibus: semine sub folijs rotundo, uti in peplo, feruente gustu: radice singulari, superuacua, tenui: Colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Eisdem habet uires.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græci *πρωλις*. Latine Peplis herba maritima, quæ & peplion, & portulaca sylvestris, hodie planè incognita, nisi ea fuerit quam hodie officinæ omnes soldanellam appellant ut quidā arbitrantur.

## Chamæscice.

## Cap. CLI.

**C**hamæscicen aliqui sycen neminant. ramos emittit quaternum digitorum, teretes, succosos, in terram deiectos: folia lentis, parua, peplum planè refo rentia, tenuia, quæ à terra non atolluntur. semine sub folijs rotundo, ut in peplo neque caulem, neque florem promit. radice firmatur tenui, superuacua. Ra mi ex uiuo triti uulug dolores sedant, in pello appositi. tollunt tumores ac uerru cas omnium generum illiti, decoctorum cibo aluus resoluitur. Succus simili ef fectu prodest. illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. aduersus caligines oculo rum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosisque nascitur.

De hac hodie nihil certi constat.

## Scammonia.

## Cap. CLII.

**S**cammonia ramos ab una radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant. folijs helxinæ, aut hedei acis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudi nis speciem cultro excauatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis deo mum excipitur. Alij scrobes in terra cōcamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attē dere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod ad misto fit tithymalli lacte) sed longe magis antea narratis. item si non uehementer linguam exurat, id quod misti tithymalli argumentum est. natione autem Syriae cum & Iudaicum deterrima habentur, graui, densa, erui farina & tithymalo uitiata. Succus drachmæ unius aut quaternum obolorum pōdere haustus, ex aqua pu ra uel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. ad resoluēdam aluum binos obolos cum sesama, alioue semine, sumplisse satis est. dantur efficacioris purgatio nis causa, succi tres oboli, cum duobus ueratri nigri, & aloës drachma una. Fitt purgatorijs sales, drachmis uiginti succi scammonia, in senos salis cyathos adie ctis: Horum modus proportionē uirium: integer quidem, tria cohlearia, mediū duo, minimus unum. Radicis drachma una aut altera purgat, cum ijs quæ retulim us. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischiadicis utili. Partus enecat succus, uulua in lana subditus, tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. decocto in aceto perurget lepræ abiguntur. diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Scammonium quoniam ceteris præstat, quod in Colophon (quæ insula est Ioniæ. Apollinis oraculo nobilis) gignitur, ideo & Colophonium nominatur. Itaque eiusmodi succus, qui in quotidiano medici nae usu ad purgationes præstantem & maximam uim habet quatuor modis colligitur apud Mesuena duobus tantum Diose. Vis bimo nec antea nec postea Medicinas omnes exacuit, & stomacho (ut Gas lenus



tenuis scribitur inimicum est, atque eius dissolutionem facit. Recentior autem Græcia & officina nostræ, lachrymā hanc, quo minus stomachū offendat, in cotoneo malo decoquunt, atque tum illā Diacridion, quasi dicās, lachrymiā tam uocāt: hē uerō corrupto uocabulo diacridion appellant. Plinio præter Colopodium commendatur & Myrsium, Pricænnense, specie nitidum, & quāmsimillimum taurino glutini, fungosum, tenuissimis fistulis, citō liquefcens, uirius redolens, gummosum, linguae tactu lactescens, quāmsimissimum, cum diluitur albescent. Dosis ultima scammonij per se. Mesue sunt grana 12. Actio scrupuli duo, uel, ut inquit, pro uirtutis ratione maior aut minor. Galeno & Oribasio exhibetur pondere drachmæ unius, Dioscorides quoque integrā drachmam non ueretur offerre: sufficere tamen ad solūcū aliu dicit duos obolos. Quod si efficacius purgare, uel ut ipse inquit: quater ni oboli, cū duobus ueratri nigri, et Aloes drachma una, si ipsū Dioscoridē sequemur, dari possunt. Ego, inquit Manardus, licet nunquam sim ausus tantum dare, duodecim tamen grana transcendere non sum ueritus, scioque quosdam scrupulum integrum hausisse sine noxa.

## Chamelæa.

## Cap. CLIII.

**C**hamelæa surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. folia oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriā dextra densa. Detrahūt pituitam bilemque, folijs præsertim in catapotia deuoratis: namque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ una, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur: ea autem in uentre nō liquefcunt: siquidem quotquot fuerē deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis fordida ulcera & crustosa repurgantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis & recentioribus Herbarijs Leo terre, aut linum syluestre, item oliuella.

Germanis Sylandt Gallis boys Gentil appellatur.

Plura uide in annotationibus nostris in caput proxime sequens.

## Thymelæa.

## Cap. CLIIII.

**T**hymelæa est, qua granum gnidium, quod est semē ipsius, colligitur, hoc Syriæ apolinum uocant, quoniam satiuilis ni fructus suapte natura similitudinem referat: uirgas ædit perpulchras, multas, tenues, tripedaneas: folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, uiscosis, gummosisque si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia uiret, et tandem rubescit. inuolucrum fructus durum, foris nigrū, intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasque detrahit, si uiginti granorum pars interna bibatur: uerum fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in uiræ acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari, qui ægrē defudant, trito semine cum nitro & aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter cœcorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere conuenit, illitum acetabuli modo cum diluta uini portione, aquam extrahit, mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cō tritis oleribus. Thymelææ farina uiræ acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur, herba stomacho infesta. partus impolita necat. Nascitur in montibus & asperis. Hallucinantur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimant, decepti quædam foliorum similitudine.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Thymelæa cuius mentionem hoc loco Dioscorides facit, est Mezereon Mesue & officinarum, ut patet conferenti fructum, myrti bacca æmulum utriusque, quod Granum gnidium dicitur Dioscoridi, officinis Coccon gnidium. Germanis Kellers bals. Foliaque oleæ similia faciunt ambo sed angustiora. Diosc. maiora. Mesue. ramos Mesue bicubiales, Dioscoridi tripedaneos, Cum hi Chamelææ (quam





(quam nonnulli Mezereon putant) sicut dodrantales et palmo tantum alii: unicam autem thymelaeam facit Dioscorides: multas Mezerei species facit Mesues.

## Sambucus.

Ebulus. Xitich.

## Cap. CLV.

Sambucus. Zolder.



**S**ambuci duo genera. Vnum in arborem assurgit, surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros. folia iuglandis, terna quaternaque, ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus cauliculisque circinate umbellae, quae florem candidum pariunt, mox acinum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, racemosum, succo madentem, uinosumque. Alteri genus, chamaeciae uocatur, Romanis ebulum, longe humilior est, magisque herbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdalae, ex interuallo longioribus, geniculatum expansis, pinnatisque graueolentibus, in ambitu serratis: muscario sambuci, flore & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem utriusque uis, & usus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquantur, ad pituitam hilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in uino decocta, et in cibis data, hydropicos adiuvat, prodest uiperarum moribus, eodem pota modo, uulvas emollit insidentium decoctio: patefacit earum spiracula, & uitia corrigit. Acini in uiuo poti eodem funguntur munere, denigraunt capillos illos. Folia, si praeterea ac mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant, ambustis & canis moribus illitu profunt, ulcera quae dehiscunt in fistulam, agglutinant, ijs qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sambucus uel sabucus Graeci Αμβρά. Officinis Latinum nomen seruauit. Germanis Zolder, Zolder. Gallis Seu, suoisean dicitur. Ebulus Graeci χαμαίεχρον. Officinis genuinum seruauit nomen. Germanis Xitich, Gallis Hieble appellatur. Vtraque Sambucus, & arboreus & herbaceus, exiccandi, conglutinandi, modiceque digerendi facultatem obtinent. Paulus Aegineta haec adiecit. Potae & manducatae aquam per aluum educunt, propter quam causam quia purgatorium uim habent de ipsis hoc libro agit Dioscorides, cum alioquin recenseri debuissent inter arbores.

Picnocnemon.



## Picnocomum.

## Cap. CLVI.

**P**icnocomon constat erucæ folijs, acrioribus, scabris & crassis: caule quadrangulo: flora ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. Inuenitur in saxolis locis. Semē grauiā somnia & tumultuosa facit, drachmę instar potū. tumores discutit, illitū cum polenta, spicula, adactosq; corpori aculeos, extrahit. Folia illitu tubercula, panosq; discutiunt. Radix eius in aqua mullā, duū drachmarū pondere, aluū soluit & bilem extrahit.

*Picnocomon hodie planē neglectum & incognitum.*

## Apios.

## Cap. CLVII.



**A**pios iuncos duos siue tres spargit, rubros, tenues, qui à terra parum attoluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: semine paruo, radice hastulæ regię\* in formam pyri turbinata, \*spondilij. rotundiore tamen, succi fecunda, intus habet corpus candidum, extrā cortices nigros. Superior pars eius uomitione bilem pituitasq; extrahit: inferior per aluum, tota utrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tula radix in fictili mergitur, & agita-

ta aqua, quod supernatat pinna selectum, exiccatur. Purgatur utraq; parte is lucus, sequiobolo potus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Apion, cuius picturam damus, Euchsio falso Germ. Rosel Kern / erdtruss / sew brot / siue schwein brot appellatur, nominibus scilicet rebus alijs dictis, ut Ciclamini & ornithogali, radice similitudine quadam deceptus, quo igitur nomine Germanico siue Gallico hodie appelletur scire nondum potui.

## Colocynthis.

## Cap. CLVIII.



**C**olocynthis sarmenta foliaq; satui cucumeris emittit, per terram repētia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratū, uehementer amarum: quem lege re oportet, cū ceperit in pallidum colorē permutari. Medulla fructus purgatoriā uim habet, si quatuor oboli cum aqua mullā, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Arefactæ pilę teruntur, & infusæ clysteribus prosunt neuorū resolutioni, coxendicū doloribus, & coli uitij, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. fœtus admotæ enecant, dentium dolorē tollit, si una repurgetur, & luto oblita cū aceto & nitro inferuescat, hocq; iure decocti dentes colluā-

tur, si aqua mullā aut passum in eadem incoquatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta alui detrahet. stomacho supra modum aduersatur, subdita ex ea balano, alui excrementa eiiciuntur. Virentis succo utilissimè ischiadici perfricantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè Κολοκύνθις. Latine Colocynthis, cucurbita sylvestris. Officinis corrupte Colocymida. Germanis Coloquint. Gallis Corge sauuage, coloquinte.



Mesue duplex genus Colocynthis constituit. Nempe marem & feminam, Mas gravis, durus, asper, nigricans, & lanuginosus est. Femina eidem autori presertim mari, presertim magna, siue ut dicunt, grossa, lenis, laxa, candida, leuis, & perfecti matura: et cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa, leuis, hoc est, non aspera & insigniter alba est. Optima Venetijs emitur Colocynthis, & que ex orientalibus regionibus, utpote calidioribus, ad nos aduehitur. Que apud nos nascitur, inefficacior est, & egre aluum soluit. Caterum probatissima syluestris huius Cucurbita medulla, siue, ut loquuntur, pulpa, antequam in usum assumatur, primum incidenda est, deinde terenda diligenter, & sepius cribranda. At usus tempore rursus cum mulla mortario exquisitissime subigenda, id cum illi, inquit Aetius, peculiare est, ut trita antequam madescat, subtilissima appareat: sed post mulsæ in suspensionem intumescat, ut qui uideat, cribratam minime putet. Quoddam igitur frustulum eorum que intumescunt, sepe uentri aut stomacho inhaeret, sepius tamen intestinorum anfractibus implicatur. Cumq; sit naturaliter acris & mordax, ulcerat intestina, parit & contractiones. Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minutiam redigenda est. Sed mulsæ prius aut ruta decocto infunditur, tum excicata in puluerem redigitur. Paulus & Auicenna, quem est Mesue secutus, ipsam Colocynthida etiam plurimum teri uidetur. Serapion autem, sed male, contrarium asserit, eam uidelicet non multum esse terendam. Dosis pulpe colocynthidis ad summa est, decem ceratia, Mesue. Paulus drachmam integram dare non ueretur, que eiusdem sententia pendet ceratia decem et octo. Datur Actio Colocynthidis: medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mulsæ cyathis. Imbecillibus tamen inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumptu purgat hoc loco Dioscoridi, melle cocto, myrrha & nitro excepta, atq; in catapostium coacta.

Pituitam, bilem, & strigmenta Dioscor. purgat: bilem uero & mucos, non a sanguine, ut elleborus scammonium, sed a nervis & nervosis partibus, Paulo. Danda quibus caput est laesum, & meningis, aut pericranion, uertiginosis, hemicranicis epilepticis, apoplecticis, cymosis, asibmaticis, orthopneicis. Paulo.

Cum oleo spinæ affricatum lumborum & coxarum dolores sanat & alia multa potest Diosco. Plin. Galen. Paul.

## Epithymum.


## Cap. CLIX.



Epithymon, flos est ethymo duriore, satureia simili. capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam, bilemque atram, per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura, ad quatuor drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in Capadocia & Pamphylia gignitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Epithymum Græcorum est flos thymi satureia similis, calidus sicus gradu tertio, omnia potest que thymus, sed efficacius, ob id illius penuria hoc uti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithymum drach. 4. cum sero lactis uel mulsæ, ad educendum humorem melancholicum. Hoc loco si Arabum Epithymo, hoc est, cassuta thymo innata, ut satureia seu thymbræ Epithymbrum Actuarius dicitur, & hyssopo, & maiora epysopu: & orobo orobache, & lino lianche, uti libet, quia uires cum thymi flore easdem illi Plinius ueterum solus tribuit: dabitur uero mus, est duplex, hortes, & hoc calidior, siccior montanus.



## Alypum.

## Cap. CLX.

ALYPON surculosa herba est, subrua abra, gracilibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli, leui, & copioso: radice betæ, tenui, referta, acri succo: semine Epithymi: gignitur in maritimis, maximè Lybiæ, quam latagissima.



gissima: quanq̃ alibi quoq̃ plurima prouenit. Semen atram bilem deſcit, ſi meſu-  
ra epithymo pari cum ſale & aceto ſumatur: uerum interanea leuiter exulcerat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alypon uel pituſam Dioſcoridis eſſe Turbith uel Turpetum Actuarij quidam arbitrantur, quam  
etiā Turpet & barbaris uocari ſcribit Dioſc: nec forte uox ea cū Leoniceo & alijs quibuſdam expunge-  
da ex Dioſcoride fuerit, qui alijs pleraſq; appellationes barbaras interponat, Turbith autē Meſue, ut  
ſuprà monuimus, ab hoc diuerſum eſt, et quibuſdam uidetur ſecunda tithymali ſpecies. Alypion uel A-  
lypia alium ſoluit, in aqua mulſa, Plinio, addito ſale modico. Minima potio eſt duarum drachmarum:  
media quatuor: maxima ſex, ea purgatione, quibus datur ex gallinacco iure. Depellitur atra bilis ſemi-  
ne, Dioſc. ſi meſura Epithymo pari, cum ſale & aceto ſumatur. purgat autem maximè bilem atram,  
qua purgata animi triſtitia in melancholicis pellitur: à qua uſeu ſacultate potuit illi nomen fieri. Eſt  
epim Græcis Alypon, quod triſtitia doloreq; caret, aut liberat.

Empetrum ſeu calcifraga.

Cap. CLXI.

**E**mpetron aliqui phacoides uocant, naſcitur in montibus et maritimis, ſalſo  
gultu, ſed quo propius terreno fuerit, amarius ſentitur. Trahit bilem, pi. ui-  
tam, & aquam, ſi bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Quale fuerit huius herbe ſolum apud Dioſcoridem, animaduerti nullo modo potuit. quòd corroſi  
in hac parte Græci ſiue codices, ita ut in ipſo uerborum contextu ſpaciolum inane uacabat. ab alijs ue-  
rò deſcribitur herba ſesquipedalis, geniculatis cauliculis, ſucculenta, folio marini roris, niſi quòd mul-  
tò carnoſius & rarius, ſemine corymbis dependentibus, ſemini effigie, ſiue ſculo luteolo, ſingulari ra-  
dice, exili & breui, odore guſtuq; ſaliſis Gallie uulguſ quòd medicis erum-  
pat ſaxis, perce, pierre, hoc eſt perforipetram. Sanctones rumpe pierre, id  
eſt, rumpi petram, multi marinam criſtam, quòd montium iuga & ſco-  
pulum crepidines ea uſitæ criſtemur, aliā tamen omnino ab ea, quā  
cretam appellant marinam. Frequens eſt in Maſilienſi ora, neq; non in  
maritimo Sanctonum tractu. Germania uerò peregrina. Hallucinantur  
qui eam herbā officinæ ſaxifragam albā, Germani Weiß & hohen ſtein  
brech appellant, Empetrum eſſe contendunt, notis omnibus ſuprà dictis  
apertiſſ. reclamanibus, nempe caulem habet lanuginoſum, ſubrubicu-  
dum, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incifa, flores cāndidos, ra-  
dicem exilem, cui grānula Coriandri ſeminis quantitatem reſerentia ad-  
herent, partim albā, partim rubrā, quibus officinæ pro ſemine eius utun-  
tur. hæc urinam mouet, calculos frangit & conerit. Stranguriæ itaque  
conſert: abſtergit enim expurgatq; & que in ueris eſt craſſiciū, ſicut  
alia omnia, quæ amara ſunt, incidit. Menſes quoq; cit, craſſaq; ac glut-  
inoſa ex thorace eduiſit. hanc quidam arbitrantur pseudobuſion eſſe  
Dioſcoridis.



Vitis ſylueſtris.

Cap. CLXII

**V**itis ſylueſtris ſarmenta uitis modopraelongae mit-  
tit, aſpera, lignoſa, rimoso cortice: folijs horteniſis  
ſolani, longioribus ac latioribus: muſculoſo flore, & capilla-  
ceo: fructu exiguis uitis ſimili, poſt maturitatem rubente  
rotunda eſt acinorum facies. Ferueſcētra radix in aqua  
& in cyathis duobus uini aqua marina diluti pota, hūmo-  
rem alui ciēt. ideo hydropicis datur. Vuæ eius, uitia cu-  
tis in facie, & maculas omneis expurgant. Enaſcentes ui-  
ticulæ, cibi gratia, ſale condiuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO

Sylueſtris uitis quibuſdam ea uidetur cuius picturam exhibemus ut  
delicet quam ſuprà eleminat alteram ſecimus, uulgo Tieleu / Lencen /



Gallis bardea & uioria appellata, quam Fuchsius falsò pro uite nigra definxit  
quid aut hac controuersia statuendū Doctiores iudicent



& laterū doloribus lienē ternis obolis pota ex acetotriginta diebus, consumit, illi  
nitur ad eadē cū fico. ad muliebres infessus decoquit: siquidē uulvas purgat, sed

Bryonia.



### Vitis alba. Cap. CLXIII.

**V**item albam aliqui bryoniam uocant. Folijs uul  
ticulis, pampinisq̃, satiuā uitē imitatur, sed  
hirsutiora sunt oīa, ea quos ppe se nacta sit frutices,  
suis clauiculis cōplectitur. fructus rubēs in uua de  
pender, quo coria pilis spoliānt. Ex ea asparagi, qui  
primā germinatione exēit, decocti in cibo, alui &  
& urinā cient. Folia, fructus, radix, ac rē uim fortiū  
tur. itaq̃ ulcerū phagedenis, gāgrenis, chironijs, pu  
trentium tibiārū tēdio, efficaciter ex sale illinuntur.  
Radix corpus abstergit, & cutem erugat. uitia cutis  
in facie, uarosq̃, lentigines & cicatrices nigras emē  
dat, cū eruo, creta Chia, & fœnogræco, eodē effe  
ctu prodest decocta in oleo, usque dū liqueſcat. sugil  
lata tollit, reduuias cōmittit, inflāmationes discuti  
illita ex uino. suppurations rūpit. medicamento a  
ptē immisceſ, quod carnē exest, in fracta ossa extra  
hit, trita & imposita: datur comitialibus in potu dra  
chmę pondere, quotidie, anno toto, pdest attonitis,  
& uertigine laborantibus, cōsimiliter assumpta. cō  
tra uiperarū ictus pota drach. duabus, auxiliā. par  
tus necat, mentē interdū subtrahit. fœminarū lo  
cis apposita, ptus secundasq̃ morātes trahit. cit uri  
nā pota: eclegma ex ea fit cū melle, difficile spirantī  
bus, strāgulatu oppressis, tussitibus, uulsis, ruptis,

abortum facit. Succus ē radice uerē exprimitur, quitrabit  
pituitam, cum aqua mulsa potus. Ad psoras & lepras semen  
efficaciter ilinitur. lactis abundantiam facit succus eius, si  
cum tritico decocto forbeatur.

Γαλλίς ἀμπελὶς καὶ λευκὴ. Latine Vitis alba. Officinis Bryonia.

Germanis Schmetzwurtz. Saun ruben / wilder zitwar. Gallis Colu  
brine, coleure, dicitur, forte quod in hac colubri sepe stabulantur.

Calctū multū Bryonia baccis rubentibus, quibus depilat. Et ob id coria dē  
antib. est utilis, et quicquid attigerit, rubrificat ignis modo, unde Gallis quo  
que ignis ardens, eorū idiomate, du seu ardent, tota planta dicitur. Galens  
fructus eius maturitate ruber, racemosus, est Psilotrum ut planta ipsa. Nam  
ἀμπελον λευκὴν καὶ βρυονίαν καὶ ψιλοτρον καὶ λῶον. Gal. lib. simpl. tamen  
ἀμπελον λευκὴν καὶ βρυονίαν separat lib. 1. comp. ph. part. in pilos cor  
pentibus medicamentis.

### Vitis nigra. Cap. CLXIII.

**N**igra uitis, quam alij nigram bryoniam uocant, folia  
fert hederæ, sed maiora, smilaceis proxima: caules  
etiā cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula,  
comprehendit. fructus racematim coherent, qui inter princi  
pia uirent, & post maturitatem nigrescunt. radix foris nigra  
intus buxæ colore nitet, uiticulae quæ primo germinum  
partur erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellūt, urinas  
cient



cient, lienē absument, uertiginosis, comitialib, neruorū resolutione tentatis, pro sunt. Radix eadē, quē uitis alba prestat, sed inefficacius. Folia cū uino exulceratis tumentorum, ceruicibus commodissime illinuntur, luxatis itidem imponuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Falluntur Euchsus & alij, qui nigram uitem aliam esse plantam ab alba differentem arbitrantur, cum eadem sit colore, in radices quę huic nigra alterius alba, & fructu tantum differunt, quem alba uitis rubrum, nigra uerō nigrum præfert: alba uitis rubro fructu in agro Argentinensi, nigra uerō radice & fructu nigro in Norico copiosius, proueniunt, simul nascentes nusquam reperi.

Filix. Filix mas.

Filix foemina.

## Cap. CLXV.



**F**ilix folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex uno pediculo, cubitali longitudine, multifida, et lateribus pinnata, subgrauis odore, radice per summa celsitū nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu, nascitur in montibus & saxosis. Radix laticineas excutitur, sumpta drachmis quatuor ex aqua multa, melius si cum scammonio aut ueratris nigri totidem obolis detur, sed qui sumunt, alia pregestare debent, laborantes lienis in cetero recreat, radix & potu et illitu cū axungia uulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur: Peribit filix, quā per ambitū lata copiosior arūdo coronet, & contrā, euanescent abibit arundo, quā obsepies multa filix in orbē cinxerit. Filix foemina folijs est filicis, surculosis, altioribusq, & quę nō singulari, ut illa, pediculo fulciant: radicib, longis, pluribus, obliquis, quę ex nigro in luteū flauescūt; aliquę etiānum rubrę inueniunt.

Pellunt lata interaneorum animalia cum melle eclegmate sumpto, pota cum uino drachmis tribus, teretes tineas efficiunt, data foeminis, sterilitatem faciunt, & pregnantibus abortum, si supergrediātur. Farina humidis ulceribus et cicatrici repugnantibus inspargitur, tumentorū ceruicibus medetur, Folia recentia in oleribus cocta manduntur, ut uentrem emolliant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Filicis Plinio ut Dioscoridi duo genera nec florem habent, nec semen unum n̄ tēp Græcis, Latine filicem maiorem. Germani Hohesarn. Galli osmundā regalem uocant, cuius ex una radice complures exeunt filices, bina etiam cubita excedentes, non graues odore. Alterum genus Græcis bna n̄ tēp, Latine Filix foemina. Germani Widen sarn. Gallis fūgra, feuchiere, dicitur.

Nascuntur ubiq, maxime uerō frigido solo. Filicis radix maxime utilis, amara, subastringens, libris coslatis necat, partum mortuum eiecit, ulcera ualenter sed sine morsu siccat imposita, hepatis meatus probe terget sine manifesta calfactione aut refrigeratione.

Filicula, siue polypodium.

## Cap. CLXVI.

**F**ilicula nascitur in montosis petris, & uetustis arborum caudicibus, præsertim quercuum, palmarū altitudine, filici similis, subhirsuta, non tenui perinde diuisura, radix pilosa, in qua continentur cirri, seu polyporū, crassitudine digiti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquantū, & gustu subdulcis. Purgandi uim habet, coquuntur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluū soluendam.



## Polypodium.



## DIO SCORIDIS

arida farina aque mulsa insparfa, detrahit bilem & pituitam, trita laxatis efficaciter illinitur, & aduersus ri-  
mas quæ inter digitos fiunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè πολυπόδιον. Latine Polypodium.

Genuinum nomen officinis retinait.

Germanis Engelsfuss. Gallis Polypode dicitur.

Melius & efficacius est Polypodium quod in uetustis arboribus  
& maxime montanarum quercuum nascitur, quam quod in petris inue-  
nitur de quo hoc loco Diosc. agit. Hoc enim superfluum habet humidi-  
tatem, et (ut inquit Mesue) indigestam, quæ flatum, nauscam & stoma-  
chi subuersionem excitat. illi autem quercu polypodio, de quo in ca-  
pite mox sequenti, bonitatis notas octo Mesue attribuit, sed obscure  
multum, & non conformiter bonis auctoribus. Deligendum itaque cen-  
semus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, quas alij iam  
assignauimus. Dosis Polypodij est Mesus à drachmis duabus usque ad  
aureos quatuor. Actus expurgatæ radicis scrupulos sex, qui in aqua

mulsa præterbuerint, exhibet. Oribasius drach. duas coquit in pisane succo, datque bibendum succum.  
Sunt qui unciam integram dederunt sine noxa. Polypodij radix dulcis, & austera, multum sicca, sed  
sine morbo, purgandi uim habet Gal. bile, pituitamque trahit, Dioscorid. in quo non bilem sed Melancho-  
liam legit Serapio: sic & Mesues, & alij post eos plerique, Melancholie purgatricem uim tribuunt. Sic  
crassum, solidum, cirrosum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo, ut pistacum recens, quercu  
bus innatum potius quam saxi & muris: alijs contra uidetur, nisi astringendum sit.

Cnicus Carthamus.

Dryopteris.



## Cap. CLXVII.

Dryopteris nascit in  
ueteru roborem mu-  
sco, filici similis, multo mi-  
nore foliorum incisura, radi-  
cibus inuicem implexis, hirsu-  
tutis, gustu acerbis, in dula-  
cedine uergentibus. Psilothru-  
m est cum radicibus tri-  
ta: illinitur enim primum  
usquedum sudore euocet,  
mox sudor abluitur, & res-  
cens imponitur.

NOMINA ET  
EXPLICATIO.

Hec omnino ea uideretur quæ  
hodie officina & Herbarij Poly-  
podium quercinum, Germani cyclo-  
saren appellant, nisi uiribus eam  
ab hac seiunxisset. Psilothrum e-  
rum non est nostrum Polypodium.

Cnicus. Cap.

## CLXVIII.

CNICUS folijs con-  
stat oblongis, per am-  
bitum diuisis, asperis, spino-  
sis, caule sesquipedali: capi-  
tulo magnitudine grandis  
okiuæ: flore croci: semine  
candido,



candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs utuntur. Seminis tusi & expressi succus, cum aqua mulsa, uel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur, ex eo autem fiunt offusæ, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante coenam duas uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est: cnicus candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphonitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac cogit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *Κύνθρον*. Latine Cnecus uel Cnicus. Officinis Carthamus. Crocus hortensis.

Germanis wilder Safran / Veldsafran / Sfor. Gallis Safran bastart appellatur.

Semen Carthami ex semine a Mesue eligendum est: candidum, planum, hoc est, laue, gradusculum, & plenum, cuius medulla est unctiosa & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinque, medulle Carthami, cum Ptissana, & paucis salibus, ut educata quam. Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, ut cap. 5. li. 2. sim. docet Gal. & li. 5. sanitatis tuendæ: in diacrico compositione: nihil tamen aut minimum harum uirium in consueto nobis semine Cnici expertus, fortè quod à regionibus calidioribus non sit allatum, sed in nostro agro natum, Carthamus Gazæ cum uulgo appellatur.

Mercurialis. Fœmina.

Mas.

Cap. CLXIX.



**L**ynozostis, aliqui parthenion, alij hermu batonion appellant, folijs constat ocimi minoribus, helixinae cognatis: ramulis duplici geniculorum nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu fœming, copioso, quandam racemorum speciem præbente: mari, è foliorum sinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis testiculis una coherentibus, frutice dodranta li aut maiore. Virac in oleribus mandatur, ad aluum cierendam, cocta in aqua, esopotio iure, bilem a quamque detrahit. constat ut mares gignantur, hunc facere: ut fœminæ, illam: si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoueantur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Duo mercurialis gēra, masculus et fœmina, quæ efficacior, utriusque picturâ dāus: mas q Græcè *ἰσχυρὸν ὄσος* & *ἰσχυρὸν ὄσος* uocatur, huius, folio nigriore cōstat, foetu ppter genicula rariore, breui, cōtorio,



## Cynocrambe.

\* Caput hoc  
additum ui  
detur.



## DIOSCORIDIS

in binos ueluti testiculos coeunte, semina coma albat, fructu copioso, soluto & candido, quandam racemulorum imaginem praesentante, Graecis λυό λωσις βύλας dicitur. Vtraque officinis Latinum nomen seruauit. Germani Bingelkraut, Bengelkraut, & Scheyßkraut appellant. Mercuriali omnes duntaxat ad ueneris purgationes utuntur. Verum enim uero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè digrenis admodum facul tatis esse experietur.

## Cynocrambe.

## Cap. CLXX.

Cynia aut Cynocrambe, cauliculus binum dodran tum altitudine emittit, mollè, subalbidum. folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida, semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus, alium cient. oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilem aquamq; detrahât.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Officinis nostris nota syluestris atriplicis nomine, ea siquidem cauliculus habet duum palmorum, folia herbæ mercurialis, aut hederæ, sub candida ex interuallis, semen prope folia paruum rotundum. Germani uocant Wilde milten, & Scheyßmilten. Aliqui existimant syluestris esse bliti genus, cum more illius seminofum sit, ceterum crenatum huic foliū, ut Mercuriali, aut hederæ modo in angulos exit, quod nō in bliti syluestri reperitur.

## Heliotropium.

## Cap. CLXXI.

\* Nigriora.

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpiuro ei nomen. & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. folia oculi mi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora. ramuli à radice terni, quaterni, aut sepe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut subfuluus, incuruatur ut scorpionis cauda. radix tenuis est, & inutilis, nascitur in asperis. Decoquum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam bilemq; per aluum extrahit. contra scorpionum ictus ex uino potum & illitum prodest. ad alligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante accessiones feminis grana quatuor cum uino quartanas finire: tria uerò, tertianas. illitum semen formicantes uerrucas pensilesq; & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriacis uocant, podagris, luxatissq; utilissimè illinuntur. menses cient. partus trita & imposita pellunt. Heliotropion paruum nascitur in palustribus, iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus: semine, acrochordonum uerrucarum modo, pensili, rotundo. Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio, & aqua, latas tineas teretesq; excutit. Pensiles uerrucas, quæ acrochordones uocantur, cum sale illita tollit. Scorpionides herbula est, folijs paucis, semine caule scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Dicta est heliotropium similiter & heliostrophon à Sole, qui helios, & ipsorum ad hunc conuersione & reuolutione, quæ τροπή & στρόφη, eo quod ad solem se uertat, & ad motum ipsius circumagatur herba. Scorpiuri uero nomē habet ab effigie scorpionis caudæ, à Celso Solaris herba dicitur, à paucis hodie ne medicis quidem, pace semper eruditorum dixerim, cognoscitur, nouo ab herbarijs indito nomine, uocant enim herbam cancri, quod flores in caudæ cancri similitudinem in seclantur, namq; scorpionem nostri rarius uident, à re potius nota, cancro scilicet, potius quam Scorpione ignota, traxerunt appellationem. Namq; herba cancri, ut singulas prosequar notas, pingui solo cultaq; maxime nascitur. Florere incipit circa solstitium. Folia abortu in occasum solem sequuntur, ita ut quacumq; cæli parte sedem teneat sydus, in eam conuersa spectent, eoq; nubilo etiam cælo dirigantur, folia oculi mi similia, hirsutiora, maiuscula, candidiora, ramuli à radice terni aut quaterni sepius exiliunt, multis alis concavi. Flores in cacumine candidi aut fuluescentes instar caudæ scorpionis incuruamur. Radix tenuis & superuacua. Floret medio Augusto in exitum autumnii: quæ depicta nunc effigie nusquam non in agris per



Finis libri quarti.

teria Liber Quintus, Ioanne Ruellio Sueffionensi interprete, cum figura-  
rum debita appositione, & annotationibus in singula capita. Per  
Gualtherum, H. Ryff, Argentinum, Medicum, ex doctiffi-  
uorum lucubrationibus adiectis,

Vitis uinifera:

Cap. I.



**F**olia uitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mi  
tigant: & inflātionem stomachi ardoremq; cum  
polenta, folia etiam per se, ut quæ refrigerent & adstrin  
gant, imponi solent. Porus corū succus dysentericis, san  
guinem excreantib. stomachicis, et grauidarum malacis  
medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli &  
poti. Lachryma uitium, quæ ueluti gūmi in caudicib. con  
crescit, ex uino pota calculos pellit. illitalichenas & pfe  
ras lepraq; nitro prius perfrictas sanat: eadem cū oleo se  
pius pilis illitis, philothri effectum habet: maximeq; san  
nis, quæ accensa fermenta uitium uiridia exudantur, quæ &  
perunctæ uerrucarum in formationes extrahuntur. Ci  
nis sarmentorum & uinaceorum, detractis in sede condy  
lomatīs, et thymijs, illitus ex aceto medetur. prodest luxa  
tis & uiperarum morib. contra lienis inflātionem illi  
nitur, cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duoru ge  
nerum est, alterius uita non maturefcit, sed flore tenuis o  
nanthen nominatā perducit, altera ad frugem peruenit,  
paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clauī

clæ quibus repunt, uim habent cultæ uiti similem.

Græc. Αμπελος ἡμῶνος, οἶνον, οἶνον, οἶνοφόρος. Lat. Vitis urbana, vinifera. Germ. Weinre-  
ben, Weinstock, Weintrauben. Gallis uigne appellatur.

Innumera vitium reperimus genera, quæ lingula persequi superuacaneum esset. Si quis tamen illa disquirere desiderat, reuult scriptores, Pliniumq; libro 13. natural. historie, qui diligentissime de ijs scripsit, legat. Labrusca Græcis ἀμπελός αἰγία. Germanis wild vngespilant Reb. b. Gallis Vigne sauuage dicitur.

Vua. Cap. II.

Cap. II.



V<sup>er</sup> recentia alium turbant, & stomachum inflant, inno-  
centiores, quæ decerpit diu pendere, ideo quod in eis  
copia humoris exsiccat. utilesq; sunt stomacho. a griscis, atq;  
eibi audite mentem excitant, in uina eis & ollis seruata, ori & sto-  
macho grata sunt, alium sustinet, sed uescam & caput tentat,  
& sanguinem excreantibus conueniunt,

Similesq;

\*Plinius con-  
trà sentit li.  
23, 64, 1.



Similesq; quæ in musto fuere. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua cælesti conduntur, minus uinosa sunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi uinacei inflammationis mammarum, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur, decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluxione uulvæ laborantes iuuat infusa, ad delessiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi uim obtinent, stomacho utiles sunt, inspargitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & coeliacis, & solutis stomacho. Vua passa alba adstringentior est, prodest esitata caro earum tussi, faucibus, renibus, ac uesticæ. estur in dysenteria per se cum nucleis, & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, ualeat ad purgandum caput, eiusdem gratia cum pipere comanducatur. testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cumini farina, fauos, epinyctidas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat, podagræ conuenienter cum panacis succo illinuntur, mobiles ungues illita, celerius extrahit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *στεινυλῆ*. Latine Vua precipue in uite dicitur ab uuido, id est, liquore contenta.

Germanis *Weintrub* / *Weinbeer*. Gallis *Raisin* appellatur.

Vuarum genera omnia explicari hoc loco nihil opus fuerit, cum pleraq; ex uitium generibus à Plinio & re rustice scriptoribus enarratis facile possint cognosci. Omnium partium uitis temperamentum ex facultatum enarratione apud eosdem patecet. Vua tamen immatura & acerba frigida & sicca sunt, matura uero calida & humida in primo gradu, auctore Simeone Sethi.

Vua satiuæ uitis coquit, astringit, leuiter digerit: Vua passa, quam Germani *Wurtreubel* / & *Rosin*. Galli *raisins en cabatz* uocant, caro, tantum astringit, quam uim eget hepar affectum. Habet præterea facultatem coquendi crudos humores, & euertiendi malignos: egre corrumpitur, tota substantia familiaris est hepatis, & usu crebro consueta est: ob id felicissime miscetur medicamentis hepaticis. sicut quodas *νεκράξις* uivas, id est, exemptis uinaceis. Act.

## Oenanthe.

## Cap. III.

Oenanthe uocatur uitis syluestris fructus, cum floret. Recondi debet fictili non picato, collectaq; sublatro linteo, in umbra siccat. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phoenice. Vis ei adstrictoria, quare pota stomacho ac ciundæ uiri nax utilis, alium sistit, ac sanguinis excreationes, contra fastidia & acorem stomachi, sicca & illita efficax est, capitis doloribus tam uiridis quam sicca, ex aceto et rosaceo perfunditur, sanguinolenta uulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione uindicat, pessis miscetur, ad sistendum sanguinem, contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum polline polentæ & uino illinitur. Cinis crematæ in testa, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta, res duuias & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Græcè *οἰνάνθη*, αμωλόρ *αγρίος* *αὐλῆς*. Latine Oenanthe, labrusca, uitis sylvestris fructus cum floret. Ger. *Wild reben* / *Holztrauben blüet*. Gallis *Grappe de uigne sauvage* dicitur.

Labrusca alterum genus ut Dioscorides quoq; testatur, uuas ad maturitatem non perducit, sed ad florem tantum dictum Oenantham promouet. Altera perficit paruis acinis. Vis huius eadem quæ satiuæ, folio, capreolis & caulibus, sed nigra astringentioris est naturæ.

## Omphacium.

## Cap. IIII.

Omphacion succus est acerbæ uitæ, nondum maturescens, è Thasia uire aut Aminea. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, in solare, usquedum cogatur, semperq; quod cervici uasis concretum hæt, reliquo humori permiscere. noctu à subdialibus locis in lectum referri, quandoquidem nocturni rorës ipsum concrefcere non sinunt. Eligendum



gendum est fluxum, friabile, uehe-  
menter astringentes, et linguam mordens. Sunt  
qui coquendo melliginem cogant, et rodest contra tonsillas, uiam, ulcera oris, hu-  
mida gingiuarum uitia, purulentas aureis, cum melle aut passo. item ad fistulas,  
uetera ulcera, nomasq; ex aceto: dysentericis, & mulieribus fluxione uuluae labo-  
rantibus clystere infunditur. oculorum claritati, & scabritia, & erosionibus angu-  
lorum conuenit. bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte  
aliqua contingat: sed pauco, & a quatiore est utendum, ualde siquidem exurit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.


Græcè *ὀμφακίον*. Latine *Omphacium*. Officinis *agresta*. Germanis *Agrest*.

Gallis *ueriust* dicitur.

Omphacium sic à uino differt, ut oleum omphacinum à dulci: siccat interdum utimur, ut Heracli-  
des apud Gal. lib. 6. com. ph. parti. id quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

## Vini natura.

## Cap. V.



Vino uetere nerui laxantur & reliqui sensus, quod  
tamen gustu suauis est. quare cauendum ijs qui in  
testinae alicuius partis imbecillitatem sentient. a tamē  
in secunda ualitudine paucum, aqua dilutum, innoxie  
sumitur. Nouum inflat, ægrè coquitur, insomnia parit  
grauia. & urinam ciet. Aetate medium, utraq; uitia fu-  
git: quare ad uictus sanorum ægrotumq; usui patitur.  
Album, tenue, stomacho utile est, ac facile in membra  
distribuitur. Nigrum uerò, crassum est, & concoctū dif-  
ficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Giluum, utpote quod medium est, medias  
inter utrumq; uires habet. In secunda tamen & sinistra ualitudine, cum primis  
laudatur album. Quia & uina sapore distant, siquidem dulce crassius partibus cō-  
stat, & difficilior à corpore expirat. stomachum inflat, aluum & interanea, ut mu-  
stum, turbat: sed minus inebriat, renibus, & uesicæ aptissimum. Austerum, per u-  
rinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbū,  
ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum, aluum, & cæteras flu-  
xiones cohibet, minusq; urinam expellit. Nouum neruos minus tentat. Vinum  
aqua marina factum, stomacho aduersatur, sitim stimulat, neruos infestat, aluo a-  
ptum, à ualitudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uuis sole siccatis in a-  
rea, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut pramnion,  
aut protropon, & sapa, quæ fit multo igni decocto, Græci sirion aut hepsēma ap-  
pellant: nigra quidem, & quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & corpora mul-  
tum alunt: candidum, tenuius: & heluola inter hæc mediā, medias sortiuntur uires.  
Omnia tamen adstringunt, & pulsus reuocant. faciunt aduersus uenena quæ ex  
ulcerando necant, ex oleo pota, & uomitionib. reddita, contra cicutas, meconiū,  
pharicon, toxica, & concretum in grumos lac, item contra renum, ac uesicæ pru-  
ritus, rosiones, exulcerationesq; inflant tamen, & stomacho aduersantur. priua-  
tim prodest melapsinthium, si uenter rheumatissimum sentiat, album, magis cæte-  
ris emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac  
uesicæ aduersatur, contra uenena cæteris aptius. Picata, aut resinata, excalfaciūt,  
concoquunt, sanguinem excreantibus inimica. Quæ uerò aparachyta uocant, ut  
quæ admixtam sapam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, ægrius in  
halitum expirant, stomachum malè habent. Inter Italica uina Falernum principē  
locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur, pulsus exuscitat, al-  
uum adstringit, stomacho utile, sed uesicæ nocet, atq; ijs qui uisus hebetudinem  
sentiant: & ad potus crebros minime idoneum.

Albana crassioribus constant partibus, dulcia, stomachum inflant, uentrem emol-  
liunt: sed concoctionem non æque adiuuant, & neruosa minus infestant.

uerustate,



uetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est & Albano crassius, corpus & colorem alit: a grè tamen coquitur, Surrentinu m, ualde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet. & cum tenue sit, caput minus tentat, inueteratum suauius redditur, & stomacho uile. Adri-  
 anum & Mamertinum in Sicilia eque crassis partibus gignuntur, modicè adstrin-  
 gunt, & ocyssimè inueterantur, minusq; ob suam tenuitatem, neruos tentant. Pa-  
 ratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenuius est: quare li-  
 beraliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem & soporem adfert. Istricum Paræ-  
 typiano simile est, sed urinam uehementius pellit. Chium tamen antedictis mol-  
 lius, & aptum potui est, bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum  
 medicamentis utile, Lesbium facile membra subit, Chio leuius, & aluo idoneum.  
 Ephesium eandem uim habet, quod phygelites nominatur. uerum Asianum è  
 Tmolo môte, Mesogites appellatum, capitis dolores ciet, & neruos ledit. Coum  
 uerò & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam uendicant, facile cor-  
 rumpuntur, flatus mouent, aluum turbant, neruis officiunt. Vinum omne (ut re-  
 liqua in commune dicantur) merum ac syncerum, & sua natura austerum, ex cal-  
 facit, facile in membra distribuitur, stomachum adiuuat, appetentiam ciborum  
 inuitat, uires alit, ac robur auget, somnum conciliat, & commendat colorem. po-  
 tum liberalius auxilio est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixi-  
 am, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosue, contra serpentium mor-  
 sus, & omnium ictus quæ refrigerando necant, aut stomachum in uomitiones ef-  
 fundunt, facit ad longas inflationes, rosionesq; præcordiorum, ac distentiones,  
 stomachi resolutionem, & si uenter aut interanea rheumatismum sentiant, Con-  
 ueniunt sudatoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime al-  
 ba, uetera, & odorata. Quæ tamen uetustate dulcescunt, renibus ac uesicæ accom-  
 modatiora redduntur, uulneribus, inflammationibusq; in succida lana imponun-  
 tur, tetra ulcera & phagedænica, & fluxionibus obnoxia, commodè perfundun-  
 tur. Quæ marinam non receperunt, austera & alba, ad sanorum uictus usurpan-  
 tur. In his præstant Italica, Falernum, Surrentinu, Cecubum, Signinum, & per  
 multa Campaniæ, & Parætypianum ab Adriatico sinu, & Siculum quod Ma-  
 mertinu appellatur. Ex græcis Chium, Lesbium, & Phygelites ex Epheso. Craf-  
 sa uerò & nigra, stomacho negocium exhibent, inflationem pariunt, corpus au-  
 gent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vete-  
 ra ualde tenuia, & candida uehementius urinam ciunt, & dolores capitis mouet,  
 neruosq; largius pota tentant. In media ætate, ut à septimo anno, potui saluberr-  
 ma sunt. Modus autem pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate  
 uini definiatur. Non sitire, & modicè cibos prolui, optimum est præceptum. No-  
 cet ebrietas omnis, & maxime assidua, siquidem obfessos neruos quotidie remit-  
 tit: largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen uinolentia,  
 aliquot diebus, maxime post aquæ potus, utilis: namq; modo quodam ex alto  
 euocat, sensilesq; expurgat excretus, & per cæca corporis ducit spiracula. sed a-  
 quam post uinolentiam bibere oportet: siquidem ualetudinis alicuius gratia fa-  
 ctæ temulentiaæ remedium affert frigida. Omphacites nomine, peculiariter sit in  
 Lesbo, siccata sole acri uita, paulò ante maturitatem decerpta, triduo aut quatri-  
 duo, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; uinum cadis insolat.  
 Vim adstringendi habet, prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantib.  
 item prægnantium malaciæ, & crudis, in pestilentia quoq; sorptum auxiliari di-  
 citur. Huiusmodi uina non nisi post multos annos bibi possunt. Lora, quam  
 deuteriam, alij potimon appellant, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ,  
 in uinacea, quibus triginta uini metretæ extractæ fuerint: calcatis uinaceis,  
 expressoque decocto ad tertias parteis, additis in singulos congios modicius  
 quire.



qui remansit, binis salis sextarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra annum utendum: etenim celeriter exolescit. Conuenit egris quibus timemus noxam uini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare. item à longa ualitudine se recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocāt, lora uires habens, hoc modo: Pares aquæ & musti mensuræ coquantur molli igne, donec absumatur aqua, quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinæ & celestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri uua ni-<sup>\* Post.</sup> grum adstringit. prodest alui & stomachi fluxionibus, & cæteris quibus constrictione & contractione opus est.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Vinum protropum, id est, quod ab uuis desuit, antequam calcetur. Germanis Der vorschuss. Gal. li. 8. cõp. Gallis la mere goutte, medium inter calidum & frigidum, hepaticis saluberrimum, præsertim ph. part. lib. 8. simp. cum hepate lupi: qui proprietate substantiæ hæc nutriunt, nec calfaciunt nec refrigerant.

Vinum musteum calidum primo ordine, uetus tertio, medium secundo, calori proportionem respondet siccitas. Ex musto cocto fit & uua, id est, sapa. Germanis Gesotten most, lib. 7. comp. ph. part. Nescio quo modo neglectum est, quod à nostris Asia Græcis & uua dicitur, ab his qui Attico sermone magis utuntur, origop, id est, sapa: quamuis etiam origop dicitur, quod pinguis siccis in aqua coctis efficitur. Officinis mel passulatum dictum, quod magis digerit & terget. Mustum uero coctum magis est emplasticum, non rodens, libro 7. comp. ph. part. Ex sapa dissolutum castoreum cum opio, dolorem aurium inflammatarum magis sedat, quam uinum dulce, initio lib. 2. eiusdem. Facilitatum uini differentiæ sunt permultæ: à substantia tenui, crassa: colore albo, fuluo, rubro, nigro: odore imbecillo, ualenti, sapore uario, sumende: de quibus Galenus lib. de uinis: lib. 4. & magis quinto de sanitate tuenda. Aph. 17. 18. 21. lib. 2. lib. methodi. 7. maximè, 12. lib. 1. antidot. lib. 3. alim.

Vinum medicamentis stomachicis, cæticis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erysypelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiæ similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidam uel humidam, si qua adsit, tuto per sanat, libro. 8. compo. ph. part.

## Vinum melitites.

## Cap. VI.

Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt. namque aluum leuiter emollit. urinam ciet. stomachum expurgat. prodest articulo morbo, renum uitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstemijs. odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat à mulso quod fit è uino uetere, austero, & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque congios austeri musti, mellis cõgio, & salis cyatho, cortinis magnis, quod magis ad efferuescendum locus pateat, heri oportet, sensim asperso sale: cumque efferuere desierit, in alia uasa transfunditur.

Vinum hoc neglectum ac minimè in usu est.

## Mulsum.

## Cap. VII.



Mulsum è uetere uino austeroque, & bono melle factum, præfertur. minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum uenit. uetus corpus alit. media ætate, aluo prodest. urinam pellit. à summo cibo sumptum nocet. & inter initia potum, implet. dein appetendi aueritatem reuocat. Fit mulsum duabus uini metretis, admixta una mellis. Aliqui, quo celerius præberi possit, mel cum uino coquunt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti feruentis,

unum mellis adijciunt, & ubi ferbuerit, uase recondunt. dulce autem permanet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Oenomeli Gal. podagricis, arthriticis, nephriticis, & senibus, ex melle, & uino Sabino, aut simili, Gal. lib. 5. & petroselino componit, adiecta berthonice, & sarxiphago in nepliriticis. Qui uero curiosius committit. ponunt, etiam spicæ nardi aliquam misciunt: hodie uero eidem magnam aromatum miscellam immittunt. Olim fuit usu celebre ad cerberum, neruorum, & aliarum partium affectus frigidos, sed id medicamentum osius.

Kk



quale à ueteribus, Mesuæ præsertim, scribitur: nunc magno harum frigidarum regionum incômodo, in usu esse desijt, præter quàm quòd circa natalem Christianum in Bachanalibus uulgi regalibus, plebecula ad palati gratiam, non ad intemperaturæ frigida propulsiônem, etiam largius bibit, & Claretum uocat: magnates uerò præciosius,  $\delta\upsilon\omicron\sigma\alpha\chi\alpha\epsilon$ , parcior tamen mensura, quod ferè ex sacch. unc. quatuor, & Cinnamomi unc. dimidia in lib. uni singulas cõficitur, et Hippocraticum uinum appellant, tanquàm Hippocrate inuentore dignum, ob uirium & saporis excellentiam: cui etiam mellis parum addunt quidam, præsertim si uinû austerius ad saporis gratiâ, & coloris: clarius enim euadit colatû.

## Aqua mulsa.

## Cap. VIII.



**A**qua mulsa easdē quas mulsum uires possidet. Cruda utimur, cum molliri deiectionem, aut uomitionem incitare uolumus: ut ijs qui uenena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominib. elanguescētis pulsus, quos illi dixeremicrosphyctos, tussientibus, peripneumoniciis, & ijs q immodico sudore digeruntur. Iam paratum conditiuumq, quod aliqui hydromeli propriè uocant, media ætate adynamo uino, aut loræ in recreandis uiribus respondet, & similem uim adipiscitur. quare inflammationibus alicuius membri plus quàm lo-

ra prodest. inueterati tamen usus damnatur inflammatis, aut constrictis. sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusue conuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ ueteris ad unam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, & ad tertias parteis decoquunt, & ita recondunt. Nec defunt qui hydromeli appellent, quòd à melle elutis aqua fauis confici ac feruari soleat. sed meracius confieri\* conuenit. Aliqui id coquunt. ægrotantibus noxium est, quoniam plurimum ceraginis sibi uendicat.

\*Bibere.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Melixeratop recens,  $\epsilon\delta\sigma\omega\mu\epsilon\lambda\iota$  sepositum ut seruetur, Dioscoridi dicitur: alijs confunditur pro aqua mulsa, seu mellita, quam Germani Sonig wasser, hydromeli uerò Medt uocant. Cruda mulsa inflationes & tormina maxime excitat, quoniam in aqua tantum calfacta mel dissoluitur: qualem mulsam crudam Serapio uult dari dormituræ mulieri, quam concepisse suspicamur, nisi eius potuisset assueta. In arthritide calida, pro mulsa, aqua saccharata est præstantior. Quòd si uel à mulsa, uel saccharata aqua post usum septem dierum, aut uires nimis collabuntur, aut uentriculus male coquat, ad uinum redeundum, uel potius uinum mellis transeundum. Secundum hydromelit is genus à Dioscoride descriptum, infinitis partibus ualentiùs & generosiùs est, & idem quod uinum mellis uocat Plinius. Colore enim & calore, & saporis gratia uinum exoticum, quod Bastardum uocant, mentitur, hoc Germani uocant Medt, estq, efficacissimum in affectibus cerebri, & partium neruorum frigidis, paralyti, apoplexia, epilepsia, lethargo, colicis item, & nephriticis, & uentris inferioris intemperie frigida, seruaturq, & ualentiùs euadit tempore & loco calido. Vires eius miraberis, si parum antè coxeris, & despumaueris: deinde dies quadraginta aut circiter, extra pluuiam sole uerno exposue acerrimum abit. si solem non habuerit liberum, nec post seruicfationem & insolationem fuerit operculatum. Fermentum non miscendum, ut hodie solem, ut nec Plinius, id tamen accelerare feruorem, & augere acrimoniam certum est, quam a uerò mensura sit miscendum ex Mesuæ corruptis codicibus difficile est coniectare: hi enim unc. tres in lib. centum aquæ & mellis expetunt: alij in singulas libras aquæ, & mellis simul mustarû uncias tres fermenti miscunt: alij ad mellis lib. unâ, aquæ lib. octo fermenti unc. unâ. Meliceratû Hippocrati est noxiû biliosis, & quibus magna sunt uiscera. Gale. etiâ febribus colliquantibus: aquosius urinas, et sputa magis promouet, minus aquosum aluum magis subducit.

## Aqua.

## Cap. IX.

**D**E aquis in uniuersum decernere, propter locorû proprietates, & peculiaris naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps, & quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minimè computrescit. Aqua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur, aluum enim conturbat. pituitam expellit.





expellit si uero calida ad fotus adhibeatur, elicit & discutit. neruorum uitijis, & pernionibus, ante ulcera prodest. miscetur cataplasmatibus malagmatis. ad mouendas deiectiones tepelacta infunditur: ad tormina, calida. pforas, pruritus, impetigines, lendes, & mammas rigentes, foueri utile est. liuores fotu discutit. ad uenenatos ictus, qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maxime scorpionum, phalangiorum, aspidumq. Etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. & malo habitu confectis iamdiu corporibus, neruisque, balnea ex ea utiles: hydropicos, capitis dolores, aurium grauitates, feruentis uapor leuat. syncera, & sine potabilis aquae mitione reposita uirus deponit. Sunt qui etiam praecoquant, & ita recondant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca aut cum uino, aut melle. uerum post deiectionem, dant gallinae aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aquarum bonitatem Galenus a tribus sensibus primo aestimat, nempe gustu, uisu, & odoratu. Cuius puram dicit, si nullam offerat qualitatem, sed ad unguem expers maneat singularis alicuius gustus. Visu quum syncera fuerit, ac plane perlucida, sic nec odoratu ullam praeseferre qualitatem debet, ut sunt quaedam extremae prauitatis, quae aut acidum, aut acre, aut falsum aliquid uel putridum, uel aliud quod aliud uitium uix effatu singulari nomine praeseferunt. Si a loco unde erumpant aquarum bonitatem uelimus cognoscere, Galenus & Hippocrates uolunt aquam potabilem exurgere a loco ad orientem spectante, quaeq. per meatum mundos celeriter currat, per terramq. puram coletur, astate frigida, hyeme tepida: quaeq. eadem celeritate calefiat & refrigeretur. hanc omnibus aetatibus uolunt accommodare. De aquarum bonitate uide plura apud Palladium lib. 1. rei rusticae. C. Celsum lib. 2. cap. 17. Aeginetam lib. 1. cap. 50. Oribasium lib. 2. de sa. simpl. Hippo. de aere, aqua, & reg. Galen. lib. 7. de curand. morb. Aetna. li. 9. ca. 12. & Platonem lib. 5. de legibus. De marina aqua uide plura in annotationibus nostris in caput de muria.

## Thalassomeli.

Quod thalassomeli uocatur, uehementer purgare constat. Temperatur autem aequis portionibus, maris, mellis, & imbris ex alto, defaecatis, & picato uate per canis aestus insolatis. Alij ad binas marinae coctae singulas mellis adijciunt, & uase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Graece θαλασσομέλι, temperatur aequis portionibus, maris & mellis. Confectionem eius aliam lege apud Plin. lib. 31. cap. 5.

## Accum.



Aetum refrigerat, & adstringit stomacho utile. appetentiam excitat. erumpentem undecunque sanguinem, potu inessuue sifit. prodest alui fluxionibus coctum cum cibis. cruentis uulneribus inditur. inflammationes arcet, in succidis lanis aut spongia impositum. reprimat procidentia sedis, uuluaq. item abscedentes gingiuas, & sanguine manantes. ad nomas, & ignem sacrum, ulcera quae serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo conuenienti efficax est. phagedaenas ulcerum, nomasq. fotu continuo cohibet. podagricis calido fotu, cum sulfure auxiliatur. sugillationes rapit, cum melle illitum. contra capitis ardores cum rosaceo in succidis uelleribus, aut spongia imponitur ad aquam inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus, fibilosq. feruentis uapor proficit. instillatum quoque aurium uermes necat. panos coërcet tepidi foras, aut si imbuta aceto spongia admoueat. pruritus permulcet. contra uenenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum com-



modè fouetur: & frigidum, ijs quæ exurens uirus ei aculantur. calidum potum, atque uomitionibus redditum, aduersus omnia uenena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in uentre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cum sale, haustu uoratas hircines, si sorbeatur, eijcit, tuſſim ueterem mitigat, & recentem laceſſit. in orthopnea calidum commodè sorbetur. gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. anginis & uuæ procidenti conuenit. contra dentium dolorem, calidum collitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gal. l. i. simp.

Acetum crassis partibus, scilicet, seu ſci proportionē respondentibus calidum uidetur, non tamen causticum, tenuibus uerò partibus frigidum, idq; magis quàm calidum, aut fortè frigidum per se, calidum per accidens. Nam ſpongia aceto madida, plebeiocuidam adnota in principio & poſt horam unam, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde ſpongia, ſenſim naſcentis in parte caloris phantaſiam & opinionem habet, acrimonia mordentis ratione. In ædematis uerò calorem inducit: omnino autem ſiccatur. idem purum, idem aquæ non miſtum, & perlucidum maximè eſt partium tenuium, lib. 1. comp.

Gal. l. i. l. et 2.

ph. gen.

modicè calidum eſt, plurima parte frigidum, tenuium eſt partium, ſi eſt acre admodum, &amp; nihil uini

qualitatis repræſentans. Idem ſolum ob ſuæ uirtutis uehementiam capitis affectibus non adhibetur, ſed miſtum alteri: album magis eſt tenuium partium, lib. 6. comp. ph. part.

Acetum atræ: bilem parit, & in maſſam attollit, bilioſis ſalubre, Hipp. li. 3. rat. uict. acut. & ibi dem Gal. tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

## Acetum muſſum.

## Cap. XII.

**A**cetum muſſum, quod oxymel uocant, hoc modo temperatur: Aceti heminaſ quinque, ſalis marini pondus, mellis minas decem, aquæ ſextarios quinque; pariter coquito, decies efferueſcente cortina: atq; ubi refrigerit, diſſundito. Sumptum craſſos humores extrahere, & iſchiadicis, comitialibus, & articulorum morbo conflictatis prodeſſe creditur. contra morſum eius uiperæ, quam ſepa uouant, hauſtum meconium, ixiā, & auxilio eſt, anginis utiliter gargarizatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hipp. lib. 3.

rat. uict.

acut. morb.

Oxymeli Græci, nobis acetum muſſum, craſſa in uentriculo, & uenis tenuat, lentā incidit, ac ſtreuē terget, obſtructa liberat, ſine manifeſto calore: ob id nec febres accendit, ſputum euocat, ſtimulat, dat, aliq; permulta efficit. Hipp. li. 3. rat. uict. Si tamen immodice utatur, inteſtina rodit, neruoſa ledit, tuſſim exiccat, etiam in ſynochis tutò datur lib. 11. meth. Eius compoſitionem uide apud Galenum lib. 4. ſanit. tuend. & Paul. lib. 7. Si diutius uiſ ſeruare, coque perfectius, donec aceti & mellis qualitates planè fuerint unite, nec acetum adhuc erudum guſtari appareat. In ſyrupi ſubſtantiam cum Meſuæ coquunt ea ratione noſtri pharmacopœ, cum liquore diſſolucendum, ut potabile fiat. Quod autem cum Galeno, quadriſariam coquitur ad tertiam, uel etiam quartam partem, parum diu, ut dies octo, uel circiter, æſtate præſertim, etiam ſi loco frigido condatur, ſeruatur integrum. Nam corruptione abit in acetū acerrimum, quod hydromeliti quoque calido aëre accidit, tamen longè eſt omnibus medicis potionibus idem iucundius, ut id etiam uino ægri plariq; præferant, præſertim ſi paulò eſt aquoſius, quale æſtate & in febribus coquere ſoleo, aut aqua cocto miſta parare, ſerè autem aquæ meſuras ſex lib. ij mellis igni lento deſpumo, ut ſit clarius, poſt aceti quartaria tria in coquo cætera, ut in libro noſtro de componendis pharmacis in uſum officinarum Germanicarum conſcripto copioſius leges. Oxymeli aliter inquit Dioſco. & poſt eum Plinius. Oxymeliti & hydromeliti incoquere poteſ, quæ eius actionem intendunt, tenuantia, incidentia, tergentia, ut hyſſopum, thymum, ſatureiam, origanum, pulegium, calaminthem, & quæ ipſius uim ad partem affectam deducunt, ut aſplenium, tamaricem, in obſtructione lienis, eupatorium, cichorium, obſtrictio hepate. Vnde Paulo eſt oxymeli ſplenicum, & oxymeli calculoſis efficax. Quinetiam purgantia eidem incocta clementius & efficacius uacuant, ut minus, agaricus: pituitam, epithymus, polypodium, chamædryſ, chamæpitys, elleborus niger, melancholiam, rhabarbarum, ſcammonium: bilem ſlauant, cortex radicis ſambuci: colocynthiſ, aquas: ut id unum pro omnibus propè tum iulepiſ, tum ſyrupis eſſe poſſit, ſi quis cognouerit uti. Vnde & Meſuæ eſt oxymeli cholagogum, phlegmagogum duplex, & melancholiam uacuans. Id oxymeli quæ ratione ſit coquendum, lib. 4. ſanit. tuend. docetur, quæ uires habeat, ibidem, & locis alijs permultiſ, præſertim lib. 3. uict. ac.

Vi uerò muſſa multū cocta eſt calidior, magis incidens, tenuans, tergens, quia mel retinet largius aqua



aqua in uaporem magna parte solum: sic oxymeli, quod pharmacopola ad consistentiam syruporum coquunt, ut seruari possit, est potentius quam aquosum & minus coctum: sed hoc est gratius: & citius ob fluxibilem consistentiam penetrat, quam uim aceti tenuit, as non minus quam aqua fluxibilis subsistat iuuat, ut lib. 1. simp. Aquam uero, ut cetera humida iuuare distributionem, docet Hipp. aph. 1. lib. 2. & Gal. initio lib. 4. usus part. Illud autem uix potabile, nisi aqua, uel cruda, uel alia diluatur.

## Acida muria.

## Cap. XIII.

**A**cida muria, quam Graeci oxalmen uocant, contra nomas fotu, putrida ulcera, canum morsus, & uenenatos ictus auxiliatur. sanguinis fluxiones post excisos calculos si sit, si statim calida in uulnus iniiciatur. proci duam sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur. oportet autem ex lacte instillare. hirudines forbitione aut gargarizatu necat, furfures & manantia capitis ulcera ex terget.

Oxalme olim fiebat ex aceto & muria mixtis, hodie exoletum ac plane mutatum.

## Thymoxalme.

## Cap. XIII.

**T**hymoxalme ueteres utebantur, dabantque laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quater uero cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. crassos humores, atrosque trahit. Hoc modo facit: Thymi triti acetabulum, salis idem modus, rutae, pulegii, polentae, singulorum exiguas portiones in uas coniunguntur, aqua terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

Res peregrina & exoleta.

## Scillinum acetum.

## Cap. XV.

**S**cillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quae candida fuerit, expurgata conciditur, traiectaque lino segmenta modicis interuallis, ne se contingant, sic cantur in umbra quadraginta diebus. mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & quae diligenter operto septenis diebus in sole madescit. post eum numerum dierum scilla eximitur, & expressa abijcitur. defaecatum acetum transfunditur & reponitur. Aliqui scillae minam, quinque aceti sextariis miscunt. Alii citra exiccationem repurgantes, parem mensuram adijciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multo magis humorum lentitias digerit, gingiuas humore praegnantibus collutione stringit, firmatque, & motos dentes ita stabilis. putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces forbitione, & callosas facit. uocem expedit, & lymphidam canoramque reddit. datur stomachicis, aegre cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, uertiginosis, mente captis: item uuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisque. imbecillos admodum recreat. corpus sanum reddit, & bonum colorem praestat. oculorum aciem exacuit tarditatem quoque aurium infusione purgat. in summa, ad omnia effica. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum uitijis. Datur quotidie ieiunis forbendum, inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum usque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Acetum scillites ueteribus frequens usus, hodie rarum per se, ob amaritudinem, & acrimoniam mordacem: idque multi cum melle, & fit oxymeli scillitici: alij cum saccharo in syrupi formam percoquant. Id acetum incidit, tenuat, terget humores crassos, lentos, putres, quales pituitosi & melancholici in omnibus partibus corporis: ob id affectibus ab eorum copia excitatis, & diutinis conducit, epilepsiae, uertigini, auditui obtuso, asthma, raucitati, familiaribus. senectuti uitijis, & ceteris, ob haec a morbis praecauet, & sanitatem tuetur, si per se sumatur: melius autem cum melle in syrupum, datur a drachma una ad drach. octo. mane cum aquis aut decoctis aptis: in affectibus autem thoracis paulatim lambatur.

Si tamen aestas est, aut febris hectica, uel alia adest, absque huius usu ob scillae caliditatem, aqua ex aceto scillitico desillata est gratior, & efficacior. Vomitu etiam ualenter purgat humores in uentriculo crassos, lentos, putres, datum ad sefenciā cum mellis aut sacchari rub. uncijis tribus, aqua horaei cyathis tribus.

Eodem prope modo quo ueteribus acetum scillites fiebat, hodie nobis sunt ex floribus seccatis rosarum.



saluæ, sambuci, lauendule, rorismarini &c. acetum rosatum, saluiatum sambucatum, lauendulatum, rorismarinatum dictum, & præter hæc uinum, ex uuis passis.

## Scillinum.

## Cap. XVI.

**S**cillinum uinum fit hoc modo: Dissectam, uti dictum est, scillam, & sole siccam contundito, minam eius tenui cribro in cernito, & linteo raro alligatam, in uicenos sextarios musti recentis ac boni demergito, ubi trimestri spacio maderit, elutriatum uinum, obstructo diligenter uase, recondito. Licet quoque sic humida scilla uti: In orbiculos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & ualde inueterascere. Alia parandi ratio: Scillæ dissectæ & repurgatæ tres minas, in Italicam metretam musti demittito, & senos menses in uase obstructo macerari finito: post id tempus defæcatum & excolatum uinum recondito. Vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones, item ijs qui reuomunt cibum, & si pituita in uentre, aut stomacho coerit, prodest lie-nosis, malè habitis corporibus, aquæ inter cutem, regio morbo, difficili urinæ, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horroribus longis, uertiginosis, & uulsiis. menses pellit, minimè neruos infestat. Hoc uinum uetustate fit melius. Cauendus in febre usus, aut si interanea ulcus sentiant.

## Marina.

## Cap. XVII.

**M**arina uariè factitantur. Aliqui enim statim quum decerpæ sunt uinæ, aquam maris admiscunt. Alij in area uuas sole siccâr: quibus, calcatis, marinam adijciunt. Alij passas prius uuas in dolijs marina aqua macerant, mox calcas exprimunt, id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia ualent, si modo meliora non adsint, aluum subducunt, profunt purulenta extusisientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex Aminæis uuis fiunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatus creant. Verum quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneantur, non inutile existimamus uarias uinorum compositiones adferre, non quod frequens eorum aut necessarius existat usus, sed ne quid omisisse uideamur, quod ad eorum rationem attineret. Sunt autem quædam ex ijs factitia, minoris curæ ac impendij, quæ cadunt in usus: uti quæ ex cotton eis malis, pyris, siliquis, item myrti baccis componuntur.

## Cydonites.

## Cap. XVIII.



difficultati. Melomeli, quod & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea malia seminibus suis castrata, in quamplurimum mellis, quo penitus demersa contendantur, coniunguntur: id post annum mitescit, mulso non dissimile. Pregit eadem quæ superior compositio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hodie deserunt esse in usu eorum loco parant Officinæ Syrupum de cydonijs, qui dysenteria hepaticâ mite sanat, modicè per castiam aut mannâ uacuato corpore. Sed uelentior est ex succo cydoniorum paruum, quæ mascula uocamus, & quæ acerbiora sunt, quam ex succo strutorum seu prægrandium, quæ femine uulgo dicuntur. Hoc recentiores quidam Μυλοξούλαρον, & λευκόνιον χυλίσμα uocant.

Alijs



*Alijs miua cydoniorum simplex dicitur. Paulus etiam hunc hydromelum uocat.*

## Hydromelum.

## Caput XIX.

**F**lt hydromelon duabus mensuris aquæ coctæ, & sub caniculæ sydus insolatæ, additis ad unam melomelitis, facti ex cotoneis. Vis huius eadem est.

## Omphacomelites.

## Cap. XX.

**O**mphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerbæ uuæ adhuc immaturæ, & tribus diebus insolatæ exprimuntur, & ad ternas succi partes, mellis optimi despumati singulæ partes adijciuntur: & insolatur in uasa transfusum. Vim repri mediæ refrigerandi habet. stomachicis cœliacisq; conuenit. usus post annū est.

## Apjites.

## Caput XXI.

**F**lt & pyris, perinde atq; cotoneis, uinum, apjites nomine, sed ita ut pyra nō magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, forbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerbæ sunt, & adstringūt. stomacho utilia sunt, atq; intestinas fluxiones cohibent.

## Oenanthinum.

## Cap. XXII.

**F**lt è feraci uite syluestri, quod uocatur cœnāthinum: Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutātur, mox colatū uinū recōditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, cœliacos & dysentericos.

## Rhoites.

## Caput XXIII.

**F**lt è puniceis malis maturis quod rhoiten nominant, succo expresso ab aciniis eorū, quibus lignosus nucleus abest, apyrena uocant, ac decocto iad tertias. & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiio exortam. stomacho utile, adstringit aluum, & urinam mouet.

## Rhodites.

## Caput XXIII.

**R**hodites sic fit: Rosarū siccarū tusarumq; minā linteolo deligatā in sextarios octo musti demergito, & post tres menses, defacatū uinum transfundens recondito. Utile ijs qui febris carēt, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humidas aluos, & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarū, addito melle, quod rhodomeli uocant, quod arteriæ scabritijs conuenit.

## Myrtites.

## Caput XXV.

**M**yrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatem ex cesserint, tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole rorent, & quaternis sextarijs contularum, ternas aquæ heminas adijciunt, & uini ueteris parem modum postea exprimunt, & seruant. Magnopere astringit. stomacho utile. fluxionibus uentris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profluuiā, denigrat capillos.

## Myrsinites.

## Cap. XXVI.

**M**yrsinites sic temperatur: Rami nigræ myrti cum suis baccis & folijs tuis, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo super sint, aut certè dimidium. id uinum colatum ad usus reconditur. Contra furfures, ulcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est. sudores sistit.

## Lentiscinum &amp; terebinthinum.

## Cap. XXVII.

**L**entiscinum similiter ut myrsinites temperatur, nec secus terebinthinū. Namq; bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt uires, adstringunt. stomacho accommodantur, & defluxionibus intestinorum, uescicæ, & stomachi, & sanguinis profluuii, ulcera omnia fluxionibus obnoxia, soti ad cicatricem perducunt. fluxiones uulvæ ac sedis, in sessione cohibent.

## Palmeum.

## Caput XXVIII.

**P**almulas maturas, quas uocant chydaas, in urceolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittiro: lino foramen fit obturatum, & qua-



dragenis sextarijs ternos aquæ congios infundito. quod si ipsum ira dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est, post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito uinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud quidem, sed capiti noxium, contra fluxiones, propter adstrictoriam uim, efficax. stomachicis, cœliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoue faciunt, quod tandē acore uitiat.

## Catorchites.

## Caput XXIX.

**C**atorchites, aliquibus sycites uocatur, in Cypro fit, ita ut palmeum, sed hoc interest, quoniam pro aqua tantundem humoris adiungunt, in quo recenter pressa uinacea maduerint. Caricæ quæ chelidonæ aut phœnicæ appellantur, præsertim nigrae macerantur, uti diximus, & post decem dies humor excipitur, atq; iterum aut tertio, idem modus aquæ in qua uinacea maduerint infunditur. simili modo intercedente spacio, quarto aut quinto assumitur. demaceratarum liquor non secus a corem contrahit, & a ceti usum præbet. Id tenue est. flatu gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamen prodest, urinam cient, menses trahit, lactis ubertatem facit. uitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, ut potio quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adijciunt. Alij muria amphoræ, quod non facile uitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & fœniculum imo subiiciunt, & caricas superponunt: & ita uicissim, donec uas expleuerint. Fit & esycomoris eodem modo uinum, sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita præualet uis eorum, ut fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

## Resinatum.

## Cap. XXX.

**R**esinatum uinum populatim factitari solet, copiosum in Galatia: quoniam uinum illic coalescat, uua non maturescit, ob cœli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice tunditur, & amphoræ dimidiata hermina permiscetur. Aliqui ubi effebuit, excolant, separantes resina: alij relinquunt. Hæc uina uetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & uertigines faciunt, concoctionem tamen adiuuant, urinam cient, tussientibus, ac destillatione uexatis conueniunt, item cœliacis, dysentericis, & hydropicis, & fœminis fluxione uulua laborantibus, altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

## Strobilites.

## Cap. XXXI.

**S**trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; præbetq; resinati effectus. Si quis madefactas nuce pini musto decoquat, potum affatim conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur.

## Cedrinum.

## Cap. XXXII.

**C**edrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructu ædunt, aut soli, aut balneo, aut igni, ad mouere oportet, uti consudent, congioq; uini minam unam permiscere, & post duos menses transfundere, & antequam recodantur, insolare. Factitiorum uinorum uasa impleri debent: namq; non plenis uasis, uina in acorem corrumpuntur. Medicata autem uina, rectè ualentibus insalubria. Omnia ex calfaciunt, urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen uehementius ex calfacit. Fit quoq; ex fructu cedri maioris uinum, congio musti adiecta tusarum baccarum felibra diebus quadraginta insolari debet, & defœcatu in uasa transferri. Fit etiam uinum ex baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadē ualens. Cedrites hoc modo fit: Cedri dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus uini ex calfacit, extenuat, tussi antineorum ulceribus, purulentis excreationibus, mulieribus uulua causarijs, hydro picisq; facit aduersus uentris tineas & horrores. contra uenenatos ictus auxillatur. serpentes necat, aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum



Caput XXXIII.

tim in fuccida lana impositum.

Cap. XXXIII.

potum; & uomitionibus redditum, auxiliatur.

Cap. XXXV.

bus febrium circuitu repetentibus auxiliatur. mentes mouet.

Caput XXXVI.

tuum dilculatione, egris cocotionibus. Enaphis nymphaea drachmis



drachmis duabus tusi napi in sextarios duos musti additis, & ceteris eodem modo factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut longo equitatu fatigatis. Di-  
 etamni drachmas quatuor macerato quaternis musti sextarijs. Facit aduersus  
 stomachi fastidia, menses, & purgamentum à partu subducit. Marrubij adul-  
 ti folia tundito, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consi-  
 militer facito. Conuenit hoc uinum pectoris uitij, & omnibus quibus marru-  
 bium. Thymi tusi & cribrati uncias centum linteo colligatas, in amphoram  
 musti adijcito. Valet contra ægras coctiones, fastidia, dysenteriam, neruorū &  
 præcordiorum dolores, hybernos algores, & uenenata animalia, quorum mor-  
 sus frigus insequitur, aut putrescit locus. Simili modo è satureia uinū fit, quod  
 eadem quæ thymites præstat. Sic quoq; origanites ex heracleotico origano con-  
 ficitur similiter cum supradicto. Facit eadem quæ thymites. E calamintha, pu-  
 legio, & abrotono uina fiunt eodem quo thymites modo, profunt stomachicis, ci-  
 bum fastidientibus, & regio morbo, quod urinam moueant. Fit item è cony-  
 za uinum, contra uenenata ante alia efficax.

## Aromatites.

## Cap. XXXVII.

\*choenicem.

**A**romatites ita fit: Palma, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum qua-  
 tuor sextarios\* sumito. postquam cōtriueris, passo subigito: coactis ingen-  
 tibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato uase, qua-  
 draginta diebus quiescere finito: deinde ubi face expurgatum fuerit, recondito.  
 Alia eius ratio: Calami uncia, phu drachmæ septē, costi drachmæ duæ, nardi Sy-  
 riaci drachmæ sex, casia uncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque,  
 asari drachmæ quatuor: omnia simul trita & linteo colligata in cadum musti de-  
 merguntur, & postquam uinum deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, &  
 lateris, & pulmonis dolores, difficili urinæ, horroribus, retardatis mē-  
 sibus, atq; ijs qui per frigora iter faciunt, potū conuenit. pituitæ crassitiē extenuat, colorem  
 alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum & uesicæ uitij auxiliatur.

## Ex diuersis odoramentis facta. Caput XXXVIII.

**F**it & uinū ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor nisto-  
 macho coñt. myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma una, iridis dra-  
 chmæ sex, anisi drachmæ tres, omnia plenius tusa & linteolo moluta in sex uini  
 sextarios coniunguntur: uinum post triduum colatur, & in lagena reconditur. Da-  
 tur post deambulationem, meraculum, cyathi unius mensura. Fit quoq; nectari-  
 tes ex helenio herba radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata,  
 & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pe-  
 ctoris uitia, urinam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabathroq; uinū fa-  
 ctitur, hac ratione: Singulorum selibram in binos musti congios mittito, post  
 menses duos colato. datur cyathus unus cū tribus aquæ. Hoc uinum efficax est  
 contra uitia renum, hepaticos, regium morbum, & urinæ difficultatem. prodest  
 stomachicis, atq; ijs quos pallor decolorat. Alij unciam aut sextantem a cori, &  
 Celticæ nardi quadrantem, in musti amphoram adijciunt. Asari quadrantem  
 in senos musti sextarios itidē demittito: id uinigenus urinā ciet. hydropicis, &  
 regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisq; cōuenit. Radicis syluestris  
 nardi recentis & trita cribratēq; bessem in congiū musti coniungito, duos men-  
 ses quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili urinæ, inflationibus, stomachicis.

## Ex diuersis herbis facta.

## Caput XXXIX.

**R**adicis dauci contuse drachmas sex in musti amphoram imposito, & simi-  
 liter transfundito. Facit ad dolores thoracis, præcordiorum, & uulvæ. mē-  
 ses pellit, ructus ciet, & urinam. prodest tussi, ruptis, uulsisq;. Saluæ unciam in  
 musti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, ue-  
 sicæ, & laterum dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, uulsa, & suppressos  
 menses. Panacis unciam in musti cōgiū mittito, & transfundito. Prodest ru-  
 pris, uulsis, cōruiis, orthopnææ, lienis crassitiem extenuat: cōtra tormina, coxæ  
 dicum dolores, efficax est. tardas concoctiones accelerat, menses & partus extra-  
 hit. quæ





hit. aq. inter cutem. & serpentium ictibus auxiliatur. Vina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum uncias octo in senos congios mittere, tribus mensibus macerare, mox in uas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & urinam mouent. Seminibus apij recentis, maturi & cribrati uncia nouem in linteo colligata in musti amphoram demittantur. Appetitum excitat. stomachicis, & difficili urinæ auxiliatur. faciles spiritus facit. Ex sceniculo, anetho, & petroselinio, uina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia. Fit

& e flore salis uinum, multo ad purgandum efficacius, quam uinum aqua marina temperatum. Fauces, uescam, renes, & stomachum infestat: quare neq; in secunda, neq; aduersa ualitudine prodest. Fit etiam uinum quod phthorion uocant, quoniam partus necat, & abortus facit, ueratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices uitium sato: siquidem uites sibi illorum uires adsciscunt. Id uinum partus enecat. datur ieiunis mulieribus, quæ antè uomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelææ cum suis folijs & fructu triginta\* drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec cōgij duo super sint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absunt.

\*decem Hæmol.

Chamelæa dum floret, cum folijs tusa & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congiū additur. Post duos menses uinū in uas trāsfertur. aqua inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est. item mulieribus, quæ à partu ægrè purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conueniens. urinā quoq; ciet. Librā radicis mandragoræ concidito, segmenta lino traici to, quod selibram æquat in musti cadū demittito, ibiq; esse finito ad menses treis, deinde transfundito. Media potio, hemine dimidium bibitur, passo in duplū addito. Aiunt heminam uini congiō mistam, potu sapore adferre. cyathus unus cū sextario uini potus, enecat. mediocris usus eius, doloris sensum aufert. fluxiones in crassat. olfactu, potuq; & cū inditur, idem prestat. In congiū musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri ueratri triti in linteo mudo, mittito: dūq; efferbuerit, in marinæ aque congios quatuordecim aut quindecim, ubi pleniuscule fregeris, iniijcito, post aliquot dies colato, & utitor. Dato cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad aluum soluendam, ijs qui euomuerunt à cena. Alia ratio: Veratri drachmas uiginti, iunci odorati uncias duodecim, spice Syriacæ uncias tredecim, cribratas & linteo colligatas in septem uini Coi sextarios diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato. dabis in potu sesqui heminam. Aliter: Decocta marinæ aqua ex alto petita sextarios duodecim. ueratri candidi libras sex, in musti amphora quadagesimo die quāmadefeceris, colato, & utitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quaternas, in senis musti sextarijs, diebus quinisdenis macerato, mox colato: & semestri exacto, utitor. Id uini genus abortus facit, & partus necat. Aut uuas in sole siccatas imposito in musti metretam (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in uinum mittito pondo drachmarum uiginti, & biduo residere finito, coniijcito ueratri nigri drachmas triginta, iunci odorati, calami, singulorū drachmas triginta, baccarum iuniperi sextarios duos & trientem, myrrha & croci singulorum drachmam, in uoluens linteo diebus quadraginta appendito, postea colato, dabis heminas treis aut duas dilutas. Purgat à partu & abortu sceminas. fetus extrahit. contra strangulatus uulua efficax. Scammonites fit fit: Radicis scammonie per menses effosca, trita, & linteo colligata drachmas quinq; in musti congiū mittito, ad dies triginta. Aluum purgat. bilem & pituitam extrahit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Astuario quoque uinorum uariæ conditurae, ut absinthites, saluiatum, & cæte. Sed hæc longius prosequi superfluum uidetur, cum partim hodie negligantur, & de his omnibus diligensimè scripserit Arnoldus Nouicomensis, cuius libellus de uinis medicatis propediem à nobis sub incudem reuocatus, ac nouis scholijs illustratus repurgatusq; in lucem prodibit.

Metallica



## Metallica omnia, &amp; primum cadmia. Cap. XL.



EX cadmiæ generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinās, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatis uenarum discursibus onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est, crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra, sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine,

& onychitis, utiles reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur, ad eadem Cypria prodest, ex Macedonia uerò, Thracia & Hispania delatæ, improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infercire, ex crescentia in carne coërcere, crustas creare, & ulcera quæ cocoëthe uocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus, candente, fuligine egesta statu, & lateribus, camerisq; fornacum inhaerente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ a cestides, per summa fastigia cōnexæ & cōcameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineant, quæ cū spissius insidēt, in corpus concrescunt, & modo genus unū eius, modo duo, modo omnia perficiūt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte qui Solis in cūbit, cremato lapide cui pyrite cognomen est, in quo etiam mōre quædam quasi uenæ chalcitis, misyos, foreos, melanteriæ, cærulei, chryso collæ, atramenti, sutorij, diphyrgisq; inueniuntur. Nec defunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradant, falsi quædam lapidum cognatione, qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullam sui uim ostendens, si eo deprehenduntur, quod sunt cadmia leuiore, nullumq; alienum mandentibus saporem exhibent, commāducatus item lapis, dentes offendit, cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento. Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atq; in sole siccata, coit, quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, & fumū igni similem emittitur, cadmia uerò quieta manet, fuliginemq; luteo colore aut æreo splendorem expuit, uario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet, sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda ærariæ. Viritur cadmia superior car bonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercore modo bullet, mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur, sed quæ ad pforarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur, iterumq; trita ex uino, tertio urunt, donec prorsus in cinerē redigatur, nihil scabritiæ retinens, hac spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat, dein coacta in pastillos reponitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Metallica (ut Iano Cornario medico doctissimo placet) appellantur medicis, quæ in metallis, aut sponte nature, aut per formacem gignuntur. Itemq; ea quæ ex his ipsis ab hominibus per quencunq; modum fiunt, ut est cerusa, psoricon, sandix, fucus, autore Gal. lib. 9 de simpl. Videntur autem ipsa Metalla, ab inquirendo & perferutando, hoc est, ἀπὸ τοῦ μεταλλᾶς appellata esse. Eorū enim græcè in uiscera terræ imus, & in sede manium opes querimus, ut Plinius ait. Quanquā idem Plinius, non inde appellatametalla Græcis putare uideatur, uerum quod non solitariè, sed simul, & cum alijs co-



vena reperitur, dicta q; ob id μεταλλα quod cū alijs, hoc est, μεταλλω, uel μετα τὰ μέτα, id est, post alia reperiantur. Plinij uerba lib. 33. cap. 6. hæc sunt. Et ubicunq; una inuenta uena est, non procul inuenitur alia, hoc quidem & in omni ferè materia, unde Metalla, Græci uidentur dixisse: Quamquam uideo ita accipi posse, ut metalla, ab inueniendo dicta doceat, quod perserutando & effodiendo in aliorum uicinitate maximè coningit. Habent autem Metallica uim medicamentosam magna sui parte maximam, quædam etiam deleteriam, ut coniectura sit magna, ex his uapores caloris interni uelatos plantarum uarietatem non parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra à Deo Maximo conditam, & otiosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli chimistæ testantur, nec meo iudicio male sentiunt, quod oculus in multis aperit uidet: licet plumbo metallorum soli incrementum concedat Galenus.

Cadmia botrytis hodie dicitur Tutia, officinis. Germanis grauwe augstein. quidam corruptè Cadmiam Climiam, & Catimiam uocant.

Naturalem Cadmiam hodie uocant, Lapidem Calamitarem. Germani Salmei, quo æs tingunt, ex rubido in albidum (Zupfer in messing) ex quo lebetes fiunt. In præseni capite uidentur quædam deesse, quæ ex Serapione restitui possum.

## Pompholyx.

## Cap. XLI.

Pompholyx specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem spodos nigri cat, & plerunq; ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pauimentis & fornacibus eueritur. pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeo leuis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera: unum ad æris colorem uergens, sub pingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem natum. Candida sit pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri præstantiorem facere uolentes, detritam cadmi accumulati in sparserint: namq; tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygem coit. Cæterum pompholyx non ex æris modo materia & fabrilis industria fabricatur, sed est cadmia quoq; ad gignendam ipsam, eximie folibus profusa. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina contignatione operata fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat. domicilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis na rem ostium mediocre habeat pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra insur nubulum extructis, idem negotium obit infernè artificis minister, simulq; carbones adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur, itaque egesta fusa situ tenuis pars & leuis materiæ in summam domum euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodir, postea maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum simile redditur ponderosius autem in ima loca se recipit sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento cohæret: quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcitia in aceruatione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodium arbitrantur, de qua antedictum est. Optima creditur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore cœni horrido, & si fraudem non experta flagranti carbone inferuescit, æreum colorem contrahit. Antedictis autem notis diligenter attendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur taurino glutine, ouilo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. quod facile cognitu fuerit: quippè nihil in ijs probandis inuenietur eorum quæ antedicta sunt. Pompholygem in commune ita lauari oportet: Ligatam linteo munda modiceq; raro, aut hiccā, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrem contineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito: ita enim limosa pars eius ac utilis effluet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea residere sinens, aquam cum cinere colis in cernito, & nouam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat, demum à



*\* Quidā hac  
non habent.*

quam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem cōturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili uo ad usus recondunt. quod uerò refedit, sensim cribratum, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. rursus lapidosa fidere patiunt, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergūt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauiatos, pessum ire, pilos autem & paleas leuitate sua in sublimē attolli. cæterum cinerem medium separant, & in pilam coniectum, ut cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur uino Chio aqua marino diluto, modis quos supra diximus. & ita redditur adstringentior, quàm aquis elota. Vis pompholygis astringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquatū exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ leniter crustas obducunt. Quod si spodon torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nouos, subiectis leuibus prunis, orbiculos continuò uersabis, dum assiccati fuluescant. Neq; ignorandum, ex auro, argēto, plumboq; fieri spodion: uerum post Cypriū, plumbum maximè commendatur. Quoniam spodos sæpè numero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antispoda uocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaq; myrti, cū floribus & bacis immaturis, in fictile crudum coniecta, indito operculo cōtinua foramina habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquantur. iterū in fictile aliud crudum transferuntur: quod ubi perastatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem quoq; fit è termitè syluestris oliuæ, si habeatur: sin secus, fatiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis: item ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, cenanthe, aut mollibus rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocyparo cum flore. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodem modo parant. alij taurinum gluten. alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. quæ omnia in spodij uicem usurpantur.

#### NOMINA ET EXPLICATIO.

Quatenus Pompholyx à spodio seu spodo differat, hoc loco Dioscorides, Galenus & simp ph. docent: Vnius enim generis Dioscor. esse ait: specie tantum differre. Galenus autem neq; spodio neq; antispodio, quòd eandem uim habeat, sensum esse dicit, propterea quòd semper pompholyge abundat. Ocularij medici hodie uulgo Tutiam uocant, quanquam alij Cadmiam hac appellatione accipiant, ut supra diximus. Sed in pharmacopolijs Nihil appellatur, unde etiam dictum uulgatum: Nihil oculis cōmodissimum esse, quo ambigue cū pompholygem oculis utilem, tum oculos non multis medicamentis coningendos innuunt. Est q; nil album appellatum, uera pompholyx. Sicut gascum aut nigrum dictū. Verum spodium metallicum à Dioscoride & Galeno descriptum. Nam quod aliās hodie spodium ossicine uocant, antispodium est, uulgoq; ebur usum esse creditur. Auicēna radicū cannarū exustari cinerem spodium esse dicit. hic animaduertendum Dioscor. Spodium non ficticium, sed metallicum & fissile esse, nec intra corpus sumendum.

#### Aes ustum.

#### Cap. XLII.

**A**Es ustum probatur rubrum, & quod cōtritu colore cinnabarim imitetur. nigrum uerò plusquam deceat exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis: subsperso sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur. fuliginem tamen excutiunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. alij in ænea olla aceto resperfos urunt, & iterum ac tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in Memphide combustum: proximū in Cypro. Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, attrahit, ulcera purgat



purgat, & ad cicatricem perducit, uitia oculorum emendat, excreſcentia in carne conſumit, nomas cohibet, uomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delinctū, illitumue. Lauatur ut cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus fordes emergat\*. Aeris recremenrum, ſtercusue quam ſcoriam uocat, eodem modo lauatur, & eandem uim, ſed imbecilliorē habet. \*ſplendor e-  
luceat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aeriuſum Ruyſer ſtein / Gebrant artz / aſtringit, reprimi, acre eſt: ob id tenuat, ulcera purgat, ſiccāt, cicatricem inducit carni duræ, in molli lauandum &c.

## Flos.

## Cap. XLIII.

**F**los æris, quem nonnulli clauorum ueterū pſegma, quali reſegmē aut ſegmen-  
tum, nominarunt, optimus eſt friabilis, in attritu fulueſcens, milij effigie, &  
humero, breuis, ponderoſus, modicē ſplendens, atq; conſtringens, qui delimarā  
æris ſcobem non recepit, qua ſæpe adulteratur. Sed id facileprehenditur, cum  
dentium illiſu dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus fuſum, in rece-  
ptacula dilabitur, per cola fiſtularum ad ea pertinentiū. tū huic negotio additi  
miniſtri, ſordes expurgantes, aquā clariſſimā infundunt, refrigerandi propoſito.  
itaq; rep̄tino cōcretu, ac addenſatione, uelut expuitur & eripitante dictus flos.  
Adſtringit, & excreſcentia coërcet. oſuſam oculis caliginē emendat, ſed magno  
pere mordet, quaternū obolorum pondere datus, craſſum humorē extrahit car-  
noſanarium & ſedis uitia abſumit, eruptiones popularū cum uino cohibet. Can-  
didus contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fiſtulam ſtatu impelli-  
tur, uuam, tonſillasq; reprimi, farina eius cum melle admota.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Turpi errore quidam hodie arbitrantur æris ſtorem eſſe, noſtrum æs uiride, non animaduertentes  
æris ſtorem, ut hic Dioſcorides ſcribit, cum æs in fornace fuſum in receptacula delabitur per canales,  
miniſtris aquā clariſſimā, ut refrigeretur affundētibz, ſubito exilire, milij effigie breuis, grauis, ſplen-  
deſcens, cum noſtrum æs uiride potius æris rubigo ſit, ut infra audies, Galeno adulteratur æris ſqua-  
ma, aut limatura.

## Squamma æris.

## Cap. XLIII.

**S**quamma æris excuſſa ex Cyprijs officinarum clauis, craſſa quidem ipſa præ-  
ſtātor quæ helitis, id eſt clauaris, nominatur. ſed ex uili promiſcuoq; ære, aut  
candido, uitioſa intelligitur: quam, utpote tenuem & inualidam, damnamus, ma-  
ximē approbrantes craſſam, ruſam, præſertim ſi aceti reſperſu æruginem contra-  
hat. Vim habet adſtrictoriam, extenuantem, reprimentem, & erodentem. nomas  
coërcet, ulcera ad cicatricem perducit, pota ex aqua mulla, aquam trahit aliqui  
farina ſubactam, dant in catapotio. additur ad oculorum medicamenta. genarū  
ſcabritiam abſumit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo: Si cæ æris ſquam-  
mæ expurgatæ ſelibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbat-  
tur, quouſq; peſſum ierit. abiicitur quod ſubſidit\*, & effuſa aqua, hemina cœleſtis  
imbris adijcitur, & diſtenta manu, ſquamma, quaſi deſtringenda ſit, uehementer ſit.  
confricatur, dumq; lentorem emittere cœperit, aqua ſenſim ad ſex heminas uſq;  
ſuperinfunditur, terendo ualidē. ſquamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; ap-  
primitur. quo facto, expreſſus humor pyxide ex ære rubro facta, excipitur. hoc  
eſt enim uelut flos ſquammæ, ualens uiribus, & ad ocularia medicamenta cum  
primis efficax, inutile imbecillumq; quod ſuper eſt, lauatur donec nullam pror-  
uſus lentitiam excernat, & linteo apertum biduo conqueſcere ſinitur, effuſaq; ex-  
tante aqua, ubi ſiccatum erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, & re-  
ponunt. Squammæ ex acie aut mucronibus decuſſæ, quam uocant ſtomoma,  
eadem uiſ. Lauatur modo ſimili, & reconditur: ſed ad moliendam alui deiectione-  
nem, inefficacior eſt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Squama æris, Germ. Zainerſchlag / et Ruyſer ſchlag appellatur, differt ab æris flore, quod hæc, ui-  
te arte excutitur, aliter ſponte cadat affuſa aqua. Probatur craſſa, ruſſa, præſertim æruginofa.



## Aerugo rasilis.

## Caput XLV.

**A**erugo rafa fit in modis. In cadum, aut aliud consimile uas acetum quam acerrimum infunditur, superponitur inde inuersum aeneum uas, praesertim con-  
 cameratum: sin minus, planum, sitque obstructum, nullumque habeat spiramentum,  
 exempto, quo doliolum obturaueris operculo. decimum post diem insidens aeru-  
 go deraditur. Aut aeris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum at-  
 tingat, & totidem post dies raditur. Aut massula aeris, aut lamina una pluresue,  
 uinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo uersan-  
 tur. Quinetiam ex delimata aeris scobe aeruginem facere licet, necnon è laminis,  
 quibus bractea aurij conclusa malleo ducuntur, si quis eas aceto respargat, & ter  
 aut quater uerset, donec aeruginem contrahant. Tradunt aeruginem in Cyprijs me-  
 tallis gigni, lapidibus quibuldam non nihil aeris habentibus, quibus aerugo efflo-  
 rescit: adduntque per caniculam astus è quodam specu manare: sed illam paucam &  
 optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitio-  
 sam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulteratur aliqui pumice  
 admixto, alij marmore, alij atramento futorio. Sed deprehendemus pumicem  
 aut marmor, dum pollice sinistrae manus madefacto, aeruginis portunculam alte-  
 ro atterimus: si quidem eam diffundi constat, marmoris autem pumicisque partes  
 coeunt non dissipatae, demumque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt,  
 quin & dentiam appressu: si quidem synchra cedit, lauis, & sine asperitate. Atrame-  
 ntum uero futorium igne coarguitur, namque si fictile, aut lamina adulterata aeru-  
 gine illinatur, & feruente cinere aut carbonibus in calefcat alterutrum, mutabitur,  
 rubescetque id quod atramentum futorium acceperit, quod idustum suapte naturae  
 lem sortitur colorem. Aeruginis quam uocant scoleciam, duo sunt genera, quae-  
 dam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprii aeris dimidia  
 heminam aceti albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec frigmenti crassitu-  
 dinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum salis fossilij, traslu-  
 centis, aut marini quam albissimi, solidique, aut certe cum nitri pari pondere terito in  
 sole, aestuosissimis diebus, sub sydis caniculae, donec colorem aeruginis contrahat,  
 & concretum strigmentosum fiat, ubi autem se in uermiculorum Rhodiaceis similitudine  
 speciem coegerit, recodito. Efficax & ualde boni coloris redditur, si duas partes  
 urinae ueteris cum una aceti adieceris, & alia quae dicta sunt pegeris. Sunt qui  
 aeruginem rasilis quam in apparatu non respondit, gummi misto digerant in for-  
 mas, & ita uendant, quod genus, ut uitiosum, improbat. Fit & quaedam aerugo  
 ab aurificibus, mortario & pistillo Cyprii aeris, cum urina pueri impubis, qua au-  
 rum ferunt, inant. Antedicta aeruginum genera, usto aeri omnino respondent, sed  
 magis effectum ualent. Sciendum fossilis scoleciam praestantissimam esse: de rasam  
 sequi, postremo loco factitiam, mordacissima tamen est haec, & magis adstringens.  
 aurificum autem aerugo rasilis respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant,  
 ex calfaciunt, oculorum cicatrices emendant, lachrymas cient, nomas sistunt, uul-  
 nera ab inflammatione tuentur, ulcera ex oleo ceraque ad cicatricem perducunt,  
 callos & sordida ulcera purgant, cum melle cocta, callum fistularum erodunt,  
 cum ammonia co, collyrij modo in eas adaptata, ad gingiuarum autem excrescen-  
 tias, & extuberationem utiles, magnopere extenuant, genarum crassitiam, cum  
 melle illita, uerum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est, re-  
 sinaterebinthina excepta, cum aere & nitro lepras abigunt. Vritur aerugo, quam-  
 cumque uelis, minutissime fracta comminutaque, in fictili patina, flagrantibus praer-  
 nis superposita: uersaturque, donec se mutet, & colorem cinereum concipiat, post  
 ea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est  
 sed non prorsus eundem colorem cremata reddit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Aerugo est aeris uelut rubigo in aereis uasis, laminis, squamis, scobibus, lapidibus concreta decem die-  
 bus aceti acerrimi uapores, aut crescentium uinaceorum contactu, pest decussa uel de rasam. Est aeris, mor-  
 det, attrahit, liquet carnem, etiam duram, digerit, uehementer siccant. Adulterandi & adulterata non  
 scindit rationem sciens omitto, quod larva eius synchra copia toti Galliae & Germania à mulieribus  
 Montpellier



Montpeffulanis suppeditatur. Germani Span grūn. Galli uerdegris appellant.

Aerugo usta & lota neruo uulnerato prodest, non usta autem iusto & mordacior. Ceterum aerugo uermiculata à similitudine ad uermiculorum speciem, dicta est, quomodo etiam Græci σκώληκος ἰδύ uocant, quem Plinius scoletiam dixit. Estq; duplex: altera naturalis, & fossilis, altera artificialis, uelut hoc loco Dioscor. & Plinius lib. 34. cap. 13. docent.

## Rubigo ferri.

## Caput XLVI.

**R**ubigo ferri restringit. sistit sceminarū profuua admota: potuq; præstat ne cōcipiant. illita ex aceto, ignibus sacris, & papularū eruptionibus medetur. perquā utilis ad scabritias genarū, reduuias, & pterygia. cōdylomatis prodest. gingiuas firmet. podagras illita lenit. alopecias replet. Vinū aquaue, in qua cādens ferrū sit restitūtū, potu cœliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliat. Stercus ferri, quā scoriam uocat, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. a conito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Rubigo ferri cysen rost. Gallis rulleure de fer dicitur. Scoria est omnium metallorū spurcitia, recte nuncumq; & uelut stercus, Germanis Schlacken dicitur: siccatur, sed omnium maxime scoria ferri leuis finem trita.

## Plumbum elotum.

## Cap. XLVII.

**L**otura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquā injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta redatur. linteolo deinde colato, aquā superinfundēs, quo facilius quicquid est resolutum in cerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit, priore aqua effusa, nouam adijciens, ut cadmiam lauato, donec nulla externigritia, postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbilima quæ sitam, mortario pistilloq; lapideis terūt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricāt, donec nigrescat. mox ubi id pessum ierit, effusa aqua, colligunt in pastillos: nam tritum uehementer, cerusæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adijciunt, affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere cava, sistere oculorum fluxiones, & ulcerum excrecentia, sanguinem suppressit. prodest contra sedis ulcera, condylomata, & hæmorrhoidas, ex rosaceo. itē, ad ea quæ cægrè ciatri cōducunt: & in totū spodiij effectus præbet, nisi quòd nō obducit crustas. Syn cerū plumbum affricū, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Germanis pley. Gallis plomb. Frigidum humidum, ob id liquor quiuis frigidus (ut oleum omphacē nū, rosacē, melinū, myrtinum, semperuiui, coryledonis, intybi, lactuca succus) in mortario plumbeo, pistillo plumbeo ductus dum crassescat, seipso frigidior euadit, optimumq; sit remedium phlegmonarū incipientium, & fluxionum aliarum, in inguina, pedes, articulos alios, & ulcerum rebellium, & canerorum. Lamina plumbi lumbis instrata ueneris insomnia sedat, ganglia diffecat illigata. Plumbum ustum & lotum ulcerarebellia, chirronia, canerosa, carne implet, accicatrice tegit.

## Plumbum ustum.

## Caput XLVIII.

**V**ritur plumbum sic: Super quātenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito, flagrante autem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; è plumbo non ustum hæserit: tum demū, obstructis naribus, eximito: alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam plumbi scobem in olla sulphure urito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponūt fornaci, aut foco, & circūlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure cerusam aut hordeum inspargūt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur\*, & rudicula ferrea cōtinuē \* Alij, imponentes aceto, uratur, contrahit spumæ argenti colorem. magis tamen nobis placet prima uen igne utuntur, di ratio. Plumbum ustum lauatur ut cadmia, & recōditur. Eosdem effectus habet.



quos plumbum elotum, sed multò acriores. Recrementum plumbi, quod scoriam uocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerusam planè repræsentans, nihil plumbofi habens, quod ad luteum colorem accedit, & uitri splendorem imitatur. Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ lutei colorem duxit: idq; sæpius, dum recrementum absumatur. dein ubi confed erit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. Molybdoites lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur.

## Stribium.

## Cap. XLIX.

**S**timmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitidularum emicat, con fractu crustosum, nihil terre aut sordidi habens, friabile, quod sibi appellarunt, alij platyophthalmon. Vis eius astringere, meatus obstruere, refrigerare, excrementa in carne cohibere, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ulcera oculorum expurgare. sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem. & ut in uniuersum dicatur, uis uisio plumbi similis est. priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerusa. Torretur pinfita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumq; restinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut uetere uino. Virtus etiam carbonibus succensis efflatum, quoad igni deflagret. si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur, ut cadmia & æs. Sunt qui ut plumbi recrementum eluant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Stimmi, id est, Stribium, seccat, astringit, oculorum collirijs liquidis & siccis miscetur, illotum ualenter astringit, lotum soluitur, & naturam assequitur propè rosionis expertem, fossilium melius. Quod enim ostendunt, igni coctum est, idq; purius, uel sæculentius & scoriosum. Oluma ex stibio præciosissimum. Mulieres oculis gratiam stibio conciliant, ipsum palpebris specillo inducentes quotidie, sic ne oculi membranam intus cõtingat. Stribium officinis Anthimonium. Germanis Spießglas dicitur, naturale, Bohemis Spießglas, artificiale siue factitium gelenter spießglas uocant.*

## Molybdæna, seu plumbago.

## Cap. L.

**M**olybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendens, cum teritur rufa. cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est, quæ aërem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, ad Sebastiam & Coricum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. uritur lauaturq; eodem modo. miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas uocant, atq; emplastris minimè mordentibus. carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit. glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Molybdæna substantiæ est crassioris, & frigidioris, quàm Lithargyros, non terget tamen, cetera usum habet propè eundem in emplastris, licet uarium colorem afferat. Ambo liquantur tardius cum hydroleo, celerimè oxaleo.*

*Molybdæna naturalis, German. Zwyttter dicitur: factura uero Ded.*

## Argenti recrementum.

## Cap. LI.

**R**ecrementum argenti, quod scoriam uocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna uim habet. quare emplastris quas phæas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, utpotè cum adstringat, extrahatq;.

## Spuma argenti.

## Caput LII.

**S**puma argenti quædam gignitur ex arena, quæ molybditin uocant, in fornacibus cõfata, donec perfectè igni incãdescat altera ex argëto, tertia ex plumbo. Probatissima est Attica, secunda Hispaniensis, has sequitur quæ fit Dicearchiæ, id est



id est Puteolis, Baïis, in Campania, & Sicilia: plurima enim hisce locis efflagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrystitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, ex crescentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandium, prunæ superpositis: ita accensa foliis, ut conflaret, abstergitur infidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter a ceto aut uino restinguentes, rursus urunt, & eadem prosequuti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Ut argyritidi nominata, aut si desideretur, alteri candor detur, ea in parteis magnitudine fabarum confracta, chœniscis atticæ mensura, fictili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici pari pondere, priuatimque pugillo hordei, linteo: lo puro, raro, anfulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat: deinde omnia in nouum craterem oris ampli transfunduntur. triticum abijciunt, spuma argenti uehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assicataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. excolata aqua, iterum tota die teritur, & uespere infusa calida aqua finitur. mane excolata aqua, iterum tota die teritur, atque ter die excolatur. id septem diebus fieri solet. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaque calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur: cumque in albuem, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus falsedinem respiciat. demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictili nouo conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat. mouetur quotidie mane & uespere, aquaque superfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus: namque nisi moueatur, crassescit, usque in duritiem testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaque in fictile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum falsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confractam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescens contabescat. exemptamque cum sale pari terunt, & ut supra dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam uis argenti spumam: ubi lana candida in uolueris, fictili nouo indita aqua cum pugillo fabarum recentium repurgatarum: que decoquito. Cumque fabæ disruptæ dehiscant, lanaque non denigretur, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adijciens. eadem tertio, quæ supra, facito, in funima, tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossilij libras, adijcito octogenas spumæ argenti drachmas Atticæ, & terito: intermittensque, nitri quam albisimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi confidere desierit, colato. tum nouam superadijciens aquam, manibus probè uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum trajicito. alternis eadem prosequere, dum pura aqua dulcisque effluat, & nullam falsedinem præ se ferat. postremo in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub caniculæ sydu exponito, & siccata utitor. Elotam autem conflat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollendas, ad rugosas facies, & cicatriciolas, laceratasque, & macularum plenas.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Lithargyros est purgatis se igni materis uitii, siue fruescētis spuma, ut scoria iā purgata fixa est, ex plūbo Molybditis seu molybdena, ex argēto ærupitris, ex auro xgvaris oim optima præcipue qd liata est. Lithargyros moderatiss. oim terreorū siccatur sine manifesto calore aut frigore, modicè affringit.

Locus ex Plinio restitutus



terget. Eius usus latissimè patet libris prope omnibus comp. phar. genere, maximè 2. et 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccat primo absecssu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestā gustatu exhibet: nec emplastica est, nec enphrastica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammata est infixum, nec ulcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supererescens absumit, parum tamen à medijs ad partium crassius recessit (licet sit tenuioris essentia quam molybdena) quae coctione diuturna deponit fusa uigilis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quae tota liquefunt, ut resina, cera, sed non mox ubi ignem attigerit: quae uero multis imponit, etiam non fundi putantibus. Cum oxaleo autem cocta citius liquefct, & cum arugine quam cum hydreleo uel oxaleo, & quo plus liquoris ad coquendum habuit, eo glutinarius fit medicamentum. Melius enim fit ex Lithargyro medicamentum, quo magis coctum erit, quod ex liquidorum, quae miscentur, copia contingit. Expers tamen pulchrarum harum uirium lithargyros, medicamentis miscetur, ut phoenicino, diachalciteos uiribus eius nec commodans, nec incommodans, sed materiae ad emplastri pharmaci compositionem idoneae rationem obtinet. Cruda etiam per se seniorum ex itinere attritus iuuat parum fucando. Lithargyros absolutè, interdum tamen ut in melinis à colore cydonij emplastris Lithargyros xevovis dicitur. lib. 2. comp. ph. gene. Lithargyros Germanis Glett. Gallis litharge dicitur.

## Cerusa.

## Cap. LIII.

Cerusa fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quam acerrimo aceto, laminam plumbeā supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uel laminibus, ne halitum expiret acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatumcolato, crassamentumque transfundito. debet quoque ficcari in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. postea qd superest duri, in tenues partes redigendū cribrandūq; uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quae primò cribrata est, & medicamentis oculorum assumenda, secundum locum tenet sequens, & reliquae suo ordine, nec defunt qui ligneas rudes in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo eircumlinentes dimittunt. post dies decem, laxato obturamento uisunt. cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, aceto acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Acstate tamen supradictum opus obeundum est, ita enim candida atque efficax rediditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis: ascendens enim calor, idem quod sol praestat. Laudatissimam fieri putant Rhodi & Corinthi, aut Lacedaemone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fictili nouo, maximè Attico tritam cerusam imposito, & assidue uersato, cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachae fiat: extractaq; ad usum ministratur. quae uero ita parata est, sandyx à quibusdam dicitur. Lauatur cerusa cadmia modo, uis ei refrigerare, occludere, emollire, explorare, extenuareq; insuper ex crescentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. miscetur ceratis, & emplastris quae liparæ uocantur, pastillisq; est autem letalis eius potus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cerusa aceti acris uis ex plumbo soluta refrigerat, siccat, astringit, emplastica est, candefacit, hanc lota plumbo usto loto uiribus proxima: ista transit in Sandycā, fitq; tenuior, nondum calfaciens. Phycos cerussa frigiditate seruata tenuitatem assumpsit, quae uis eius adiuta in profundum corporis penetrat. Cerussa Rhodiaca, uel illi similis ex ciuitate Dicae archia olim dicta, nunc Puteolis, praefertur, si emplastrum uis eximie candidum fieri, quia albidior, leuior, tenuiorum partium his, quae alibinae scuntur. Sal ex cerussa ad multa efficacissimus, & oleū ex Cerussa. Germa. dicitur Bley weys. Gallis Ceruse.

## Chrysocolia.

## Cap. LIIII.

Chrysocolia laudatissima Armeniaca, colorem porri quamsumillimè reddens, secundum locum sibi uendicat Macedonica, & proximum Cypria, quo in genere praefertur pura, damnatur, quae terrā aut calculos collegerit. Ratio lauandi



lauandi hæc est: Tufam infusa aqua, mortario expaffa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quam confederit, colato. alteram infundens aquam, rursum trito. hæc uiciffim profequere, donec pura fynceraq; fpectetur. dein ficcato in sole, & ad ufus recondito. Quod fi utere uolueris, ex ea terens quod fatis effe uidebitur, patinis fupra carbones adponito, & alia facito quæ fuprà diximus. Dos chryfocollæ ad purgandas cicatrices. ex crescentem carnem coërcet. adstringit, purgat, ex calfacit, & modicè corpus mordendo exeft. inter medicamenta intelligitur, quæ uomitiones concitant, & necem inferre poffunt.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chryfocolla tam metallica q; factitia ualenter digerit, & fccat, carnē liquat fine ualenti morfu. Chryfocolla, Spodium, Pompholyx, Pforicum, metallica funt admodum tenuis effentia citra calorem. Naturalis & foßilis, Germanicè Schiffer grün dicitur, factitia uerò, quæ auri ferrumini fundenda celeritatem addit, Borsas appellatur.

## Lapis armenius.

## Cap. LV.

Armenius lapis præfertur læuis, colore cœruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chryfocolla præstat, fed inefficacius. Quinetiam ufum habet ad pilos in palpebris alendos.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Armenius lapis illotus fuprà & infra atram bilem uacuat, datus à drachma una ad fcrupulos quatuor. lotus etiā quinquages intior eß, ac tancum infra uacuat, à fcrupulis quinq; ad fcrup. sex. Alexander Trallianus in melancholia, & post eum Mefues in simplicibus.

## Cœruleus.

## Caput LVI.

Cœrulei origo ex ærarijs metallis in Cypro. copiofior ex arena littorali. fecundum quofdam fub cauatos fpecus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis. lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem. cruftas gignit, & exulcerat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Cyanus fice Cœruleus, catharteticus, id eß, detrahens, digerit potentius quā Cinnabaris, & fubaftringit. Vim purgantē melancholiā fuprà & infra, ac melancholicum fuccum ipfi illoto præbet Mefues communem cū lapide Armeno, ob id ambos ualere cenfet aduerfus omnes melancholicos affectus, mania, melancholiā, epilepfiam alterā, elephantiā, caneros, albos nigros, quartanas, hemorrhoidas. Sed & alias ei uires miras tribuit, uocatq; lapidem Lazuli & ftellatum, quodd uelut felle quædam aureæ in eius fracturis cernantur. Isurendo cœruleus magis euadit, fi uerus eß, malus uerum nigricat uftione. Tam hic quā Armenus Medicis in ufu, hodie funt rariffimo, Germani Lafaur fteim appellant.

## Indicum.

## Cap. LVII.

Indici duo genera, unum fua fponfe nafcitur, tanquam fpuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. alterum infeftoria dant officinæ: & eß fpuma purpurea innatans cortinis, quam detractam artifices ficcant. Optimum exiftimatur quod cœrulei fpeciem præbet, fuccum fuum forbet, & leue. Inter medicamenta eß quæ leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpunt. purgat & reprimat ulcera.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Indicum foßile aliquando & hodie in aurifodinis inuenitur, Germani Etn berg bloe appellant, factitium uerò ex fpuma ifatidis eß, ut fup. fuo loco diximus. Germani hoc Weßd bloe & Indich bloe. Galli de l' inde fine, au große appellant, hodie in medicina nullius ufus.

## Ochra.

## Cap. LVIII.

Ochram leuiffimam, & omnino luteam eligere oportet, faturatam, non lapidofam, friabilem, natione Atticam. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula diffipare. ex crescentia in carne reprimat, caua cum cerato explet, & articulorum tofos comminuit.

Germanicè Oger & Berg gel appellant.

Cinnabaris.



## Cinnabaris.

## Cap. LIX.

**H**allucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispanijs ex lapide quodam argenteæ arenæ permixto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumque colorem permutatur. in metallis uero strangulatam halitum eructat. itaque facies in colæ uescicis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aërem attrahant. eo pictores ad sumptuosa parietum ornamenta utuntur. Cinnabaris uero ex Africa deferitur, & magno constat. hactenus inuenitur, ut uix uersicoloribus pictorum lineis satisfaciatur intento colore nec diluto præditum: quare quidam sanguinem esse draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæmatiz lapillo eandem. conuenit ad oculorum medicamenta, uerum efficacius, magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. ambustis igni, & papularum eruptionibus. cerato excepta, medetur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sanguis draconis & Cinnabaris uera, hodie ignoratur ueterum si Iacobo Syluio medico doctus credimus. qui credit sanguinem draconis factitium esse, qui hodie ostenditur ex bolo Armeno. sanguine hirci & succo sorborum, uel alijs. Cui tamen ille sanguis draconis quo uitrarum utuntur atque aurifabri, ruberrimi coloris gratia uel sit naturalis & fossilis quæ igne liqueatur, omnino Dioscoridis delineationi respondens: quare hanc ueram esse ueterum Cinnabarim crediderim. Ceterum loco huius ubi eius copia desit, rectius utemur factitio quæ cinnabario neoterriori, ex sulphure uiuo, & argento uiuo simul conficitur.

## Argentum uiuum.

## Cap. LX.



**A**rgentum uiuum fit ex minio, quod abusuè cinnabaris dicitur. patinis fictilibus, imposita ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tectis, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnis, aut argenteis uasis: siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Potum uim perniciosam habet: suo enim pondere interna exest. Remedio est lac multum subinde potum, & uomitionibus reiectum, aut uinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen ormini, aut origanum, uel hyssopum cum uino, auri limati scobs, id est, ramentum quam tenuissimum eorum mirabili est auxilio.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Argentum à colore, uiuum à motu Latinis dicitur. Germanis Queck silber, à consistentia uero Græcis ὁ υἱὸς ἀργύρου. sed hanc arte factam Gal. lib. 9. simpl. illud minerale uult Hermolaus: cum tam factitium ex mineris, quæ minerale, seu argenti fodinarum tectis stillatim concretum, siue per sese in metallis inueniunt, Dioscorides hoc loco hydrargyron appellat. Cui congener ex aqua fontibus uocatus perpetua scaturit Plinio. Argentum uiuum est metallorum omnium cum sulphure materia à calore temperatissimo, sic per minima unitum, ut sic cum humido, et humidum sicco æqualiter in eo temperetur. Unde opinor, chymistis calore & frigore temperatum quoque dicitur, non quarto gradu cum quibusdam frigidum, cum alijs calidum. Neque contra chymistarum placitum pugnare uidetur quod scribit Dioscorides, potum uim habere perniciosam, suo enim pondere interna erodere addit, non qualitate aliqua caustica. Neque uerba Galeni lib. 4. simp. cap. 8. quod scilicet calore nostro calidum ad se reditum per erosionem interimit, & lib. 5. cap. 18. quod tota sua substantia nobis contrarium sit, & uenenum si sumatur: neuter enim id aut calore immodico aut frigore deleterium dicit: sed ille pondere, hic tota substantia, ut scilicet omnino nos ledat necessario, quam diuis paucum sit sumptum: cum deleteria calore aut frigore sine sola quantitate deleteria.

Ad hæc Galenus de sola hydrargyro factitia loquitur, cuius quod interminat sumpta uel ad motum, se periculum fecisse negat, lib. 9. simp. Hodie uero uel pueris maxime persicuum est, maximo mortaliū incommodo, quas uires sumptum uel ad motum, uel suffum in scabie Hispana, siue Gallico morbo, (ut uocant) & eius Symptomatis, & multorum artificum usu uario, habent argenti hoc seminum, & erudum, quouis modo paratum & mixtum. Quod uero in metallis perfectius coctum est magis imè, id longè omnium est efficacissimum, uti & præciosissimum, si quis secerneret secreta nouerit uti.

Geberus chymista præclarus.



Illud essentia esset omnium tenuissima, indicant apertissime celerrima eius in uaporem præterueniens abito, & in corpus quoduis etiam densissimum penetratio, ut etiã calculū iactile affricu non ita multo subeat, intusq; dealbet, & fragilem maximè reddat. Ob id non probo ipsum enulato unguento, & alijs quibusdā misceri. Argenti uiuum sublimatū calore ignis erodente iã præditū, fit eodem quoque deleterium, ut calx & uini sex uisita. Sublimandi autē (ut chymistæ loquuntur) modū docet Geberus, ex quo & alijs non contemnenda leges, quæ ad cognoscendam plenius argenti uiui naturam pertinet.

## Rubrica Sinopica.

## Cap. LXI.

**R**ubrica Sinopidis maximè probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem uergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur impendit fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; deferitur in Sinopem urbem, in qua uenditur: unde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, qua si inducendo obstruentem & adstrictoriam, quapropter uulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. alium sistit, in ouo sumpta aut clystere infusa, datur iecinorit uitio laborantibus.

## Rubrica fabrilis.

## Caput LXII.

**R**ubrica fabrilis, ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam Iberia quæ ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Hodie Germanis dicitur Röstelstein.

## Lemnia terra.

## Cap. LXIII.

**L**emnia terra, cuniculo in specu nata, è Lemno insula, palustris loco deferatur, inibi electa, & caprino sanguini permixta: quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant: unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ, appellauerunt. Vim antidoti habet contra perniciofa uenena singularem, pota cum uino, & præsumpta, cuoimi uenena cogit, contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale uirus ei aculantur, prodest antidotis familiaris, sunt qui hac ad sacrificia utantur, est & dysenteria utilis.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sigillum Lemnium efficacius sanguinis ex quauis parte eruptiones cohibet, quàm Samius Aster hic contra tenax & uiscosior, quàm Lemnia terra: ambo moderatè tergent. Lemnicæ etiam adstrictio quædam inest, uixitros dyuaculib. 9. comp. ph. part. in arteriace Andromachi 14. Ea hodie uera Constantinopoli affertur. Officinarum falsa est.

## Atramentum futorium.

## Cap. LXIII.

**A**tramentum futorium genere quidem unum & idem est, molle & concretum: sed in specie differentias treis habet, unum namq; humoribus stillatini in cuniculos quosdam colatis, concreuit: quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitiū appellatur. Petesius ipsum pinarion uocat, alijs stalactico, id est, stillatitium, alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excavatos serobes, concrementum capeffit, quod pecton, id est, concretitium, propriè nominatur, tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet: sed inutile ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum decoquant, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur, hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ race matim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum, proximum, concretitium, coctile uerò ad infectus & denigrationes, aptius cæteris esse compertum est, sed ad medicinæ usum inualidius esse, experimenta docent. Valer adstringere, calfacere, & crustas inducere, latas uentris tineas necat, drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum, uomitus ciet, aduersus hausta fungorum uenena, ex aqua potum auxiliatur, purgat caput, aqua dilutā, & in uellere narib. instillatū. Vritur ut paulò post in mentione chalcitis ostendemus.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Chalcanthum Romani atramentū futorium, Germani Vitriol et Zupfer wasser. Galli coperoze. Officina



Officina utriusque Romanum uocant, essentia est eiusdem & nature cum Chalciti: hac autem natura est & Genetel gât in argenti fodinis appellatur, illud ex hac fictitum & in hanc tandem per se rediens uehementissime astringit, & calfacit non instrenue, putridis ulceribus congruit, gargarismum etiam scirrhotum irritat. Adhuc quum medicamentum id est uehementissimum, ualidis uiribus astringendi & calfaciendi præditum, uitanda eius per se uehementia, sed mitioribus mistis obtundenda, vsum uero & lotum multo moderatius redditur.

## Chalcitis.

## Cap. LXV.

**C**halcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, inter cursantibus oblongis uenis, splendentibusque. Huic absterforia uis inest, ex calfaciens, & crustas ulceribus obducens. purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent, in genere leuiter exedentium est, ad ignem sacrum, & ulcera quæ serpunt, efficax est, sanguinem è uulua & naribus erumpentem, cum succo porri fistit, gingiuarum uitia, depascentia ulcera, tonsillasque, eius farina compescit, uista, & cum melle trita, oculorum medicamentis longè utilior redditur, callum genarum & scabritiam absumit, abstergetque, fistulas tollit, colliryi modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum quod pforicon uocant, duabus eius partibus cum una cadmia additis, & ex aceto tritis, oportet autem in fictili obruere fimo, diebus quadraginta, per caniculæ ardore: sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito, modus autem uisionis in humidioribus est, dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & persectè inauerit in reliquis uero, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguinem aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est: infidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda. Torretur etiamnum perflatis carbonibus usquedum luteo colore pallescat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret, & colorem mutet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sori, Chalcitis, Misy, acria, urendo escharas excitant, & nonnihil astringunt, essentia consistentia & situ differunt. Nam sori in fodina infimum ac crassissimum: & quia lapidosius ac uehementius compactum, in humore non liquefit, friando nigrius ceu melanteria apparet, ac scintillat ut Misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu uirus olet, suppingue est. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet, summum & tenuissimum, & à colore ingenito magis elaboratum, & siccius. Proinde ægrius liquefit, & corpori duris adnotum ob tenuitatem minus ea mordet, quàm Chalcitis, tamen si que calidum. Eadem ratione Chalcitis uista minus mordicat, & minus astringit, non minus tamen siccit, Chalcitis situ & essentia est media, æri similis, friabilis, non lapidosa, promptiss. liquefit, ea uista melior est quàm non uista: quia tenuiore est substantia, ut alia omnia uista, non tamen acriore, quod alijs multis uistis accidit. Uista autem omnia lauando mitiora & minus mordacia euadunt.

Soreos pars extrema & summa in chalcitim, & chalciteos partes extrema in Misy tandem transferunt in metallicam fodina, & quo loco seruantur, quomodo æri innascitur ærugo. Hæc Sori, Chalcitis, Misy ualenter tergent, Misy etiam modicè particeps est facultatis exedētis. Chalcitis cruda mordax est, uim autem eius urendo minuimus, idonea est Columnellæ inflata, quando uehementer inueterauit, & curatu contumax est. Chalcitis uista est eligenda, quæ urendo cineritia euaserit, non exposita uis, qualis uisione fit à multis. Chalcitis uista non minus efficax, sed minus mordax.

## Misy.

## Cap. LXVI.

**M**isy assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & uisionem cum chalcitide eandem, præterquam quod pforicum ex eo non conficitur, ex cessus defectusque ratione tantum differens. Aegyptium autem cæteris præstat, utpote quod efficacius habeatur, sed ad ocularia medicamenta multo supradictio inferius.

## Melanteria.

## Cap. LXVII.

**M**elanteria geminæ est originis. quædam in faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, talis modo concrescit, alia uero in summa facie supradictorum locorum



**Iocorum** colit, quæ terrena est. quinetiam inuenitur in Cilicia & alijs quibusdam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ sulphuris colorem trahit, leuis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy.

*Melanteria Atramentum citrinum, Germanis Gelber berg schwefel dicitur.*

**Sory.**

**Cap. LXVIII.**

**S**ory existimantur aliqui melanteriam esse, aberrantes. siquidem sui generis est sory, ei non ab simile. uerum fori uirus inest graue, & nauseam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto & alijs quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispania, & Cypro: Præfertur Aegyptium, quoque frianti nigrius apparet, in multa foramina dehiscens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuorationeque magnum uirus olens, ita ut stomachus in uomitiones effundatur. quod autem frantum scintillas misyos modo non emittit, & alterius generis esse, & inualidum censendum est. Vim & uisionem supradictis similem habet. dolori dentium, cæuernis inditum medetur, eosque labantes firmat. ischiadicis ex uino infusum auxiliatur. illitum cum aqua, uaros extinguit. medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem ferè omnia & alia quæ uisionem experta non sunt, perustis ualidiora esse existimantur, præter salem & uini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt\*. combusta enim, uiribus efficaciora redduntur.

*Sory Officinis Atramentum rubrum, Germanis Roter berg schwefel appellatur.*

**Diphryges.**

**Cap. LXIX.**

**D**iphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur. lutosum namque extrahitur, ex luto cuiusdam inibi specus: extractum, sole siccat, mox circumpositis sarmentis uritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à sarmentis uratur, arefeat, & ferè torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subsidens fex est. siquidem post frigida aque offusionem, ut supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornam cum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidem pyriten, ut calcem multos dies cremant in camino: cumque colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt hoc ex sola materia quæ lapidem æris gignit fieri: quando in dictis æreis assata & in scrobes translata peruritur: tunc enim ambientem scrobis locum comprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. præfertur, quod saporem æris reddit, æruginisque adstringens, & uehementer exiccans linguam. quod sibi exusta ochra non uendicat, quæ cremata, diphrygis uice uenit. Vis eius adstringere, perpurigare, extergere, siccare ex crescentia consumere, ulcera serpentia, & quæ cacoethe uocant, ad cicatricem perducere. suppurationes terebinthina aut cerato exceptum discutit.

**NOMINA ET EXPLICATIO.**

Diphryges, quasi bis tostum, est perfecti æris uelut fex subsidens et coherens imæ fornacum parti, tamquam uistorum in foco lignorum cinis, ablato ære uisitur. Duobus alijs modis fit hoc loco Dioscoridi & Plinio: modice & asstringit, & ære est, ut æs uisum, uehementer siccat, ulcera rebellia sanat. ochra uisita adulteratur. Germani uocant Berg grün. unam diphrygis speciem.

**Auripigmentum.**

**Cap. LXX.**

**A**uripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materię permixtum, in squammas fissile: quale in Mysia Hellesponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. unum supradictum est: alterum (\* glandis effigie pallidum) & colore sandaracham imitans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua uiuis carbonibus subiectis, assiduoque uersatur, donec igne flagret. & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumque reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. crustas cum uehementi uredine, & uiolento morfu excitat. reprimatque excresecunt, & capillos euellit.

*Alit*

*\* Quidam hæc non habent.*



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Arrhenicon à uetustis Græcis, ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis auripigmentum: in eisdem metallis, ut auro, argento, quibus sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sæpe mista uimus: optimum existimatur crustosum,  $\chi\epsilon\upsilon\sigma\iota\kappa\omicron\upsilon\gamma$  (sic Galeno quoq; lib. 9. & 1. cōp. ph. part.) id est aureo colore micans, nulli materiæ commistum, in squammas tanquā bracteolas fissile: alterū globosum, pallidum, & colore sandarachō imitans. Vrendo multum sulphur exhalat, in argenti speciem fissum concreuit, sed intus rubet, causticum est nausæq; cū uementi uredine & uiolento morsu excitat, hyperfarcosin absorbit, astringit & rodit, depilat tam non usum quam uisum: quod tenuiorum est partium muscetur digerentibus & tergenibus.

## Sandaracha.

## Cap. LXXI.

**S**andaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia uacans, friabilis, Scinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & usio, quæ auripigmento. ex plerālopecias, resina excepta. scabros ungues cum pice eximit. contra phthiriasin ex oleo efficax est. Tubercula cum adipe discutit. prodest ad narium orisq; ulcera, & cæteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata datur ex mulso, purulenta extusissentibus, sufficit quoque cum resina, aduersus ueterem tussim, raptō per fistulam nidore. uocem expedit, cum melle delincta, suspiriosis cum resina in catapotio optimè datur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sandaracha Arsenico non solis natalibus, sed etiam tota natura affinis, ut cōctione sola natura uideatur hæc Arsenicum uincere: id enim uestione Sandaracha fit, ut Cerussa trita, mota, probè uesta, in sandaracham pictoriam abit Vitruuius lib. 7. Ad hæc Sandaracha licet rubra sit, aqua tamen soluta luteum colorem intensum facit: floridum autem colorem luteum reddit Arsenicum, Dioscoridi probatur rufa, saturatior, cinnabaris colore, sulphur uiuum redolens, friabilis, materia uacans. Auripigmentum rubrum dicitur Serapioni. Eadem chymistis Arsenicum rubrum dicitur, ut Arsenicum crocum est auripigmentum. Arsenicum autem absolute his est album naturale & fossitum. Risagalum siue Realgar (quod uocant) in genere est Arsenici in iisdem fodinis inuentum. Exedunt sandarache. Petreæ Asiæ flos. Arsenicum & sandaracha & chalcitis usua, emplastra reddunt flaua uel rufa. Sandaracha drach. semissem, & alumen scissile & rotundum miscet Andromachus stomachicis, li. 6. cōp. ph. part. & muscos Ciprij drach. 8. apud quosdam legi scribit, ibidem. Vide ne cum Arabibus Sandarache uoces gummi inuiperi, neue uires illius huic attribuas.

## Alumen.

## Cap. LXXII.

**O**Mne aluminis genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur, etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species. uerum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimū est scissile, præsertim recens, candidissimū, gustu perq; adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulosè aut assulosè compactum, sed figillatim in capillamenta quædam canescentia dehiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confectum est: sed ex figura deprehenditur. Assumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atque ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præferens, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidū probatio, ut sit lympidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atque quendam coloris igniculum expirans. Vim habent ex calfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorum offundunt, generum carnem, cæterasq; excrescentias extehuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debent. Putrescentia ulcera compescunt, sanguinis fluxiones inhibent, gingiuas humore prægnantes comprimunt, motus dentium cum aceto & melle firmant, profunt cum melle ulceribus oris, eruptio



eruptionibus papularum, & fluxionibus aurium, cum sanguinalis herbe succo. lepris conueniunt cum brassicæ folijs\* aut melle cocta. item pruritu, & ungui-<sup>\* Succo.</sup> am scabritijs, pterygijs, & perionibus, aspersa cum aqua. ualent cum aceti rece, & galla, paripondere cremata, ad phagedanas ulcerum, & cum salis duabus partibus, ad uitia quæ pascunt. furfures cum eruo & pice illita abstergunt. ad lendes, pediculos, ambusta cum aqua illita auxilio sunt. contra tumores, & graue alarum inguinumque uirus, illinuntur. ex Melo autem aduectum, mulieribus præstat ne Alij, accom- concipiant, ante coitum ori uulua inditum. partus quoq; extrahit. gingiuis, si modatur, & caro excreuit, uua ac tonsillis accommodantur. ori, auribus et uerendis cum illinitur. melle illinuntur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Alumen ab astrictione uehementissima Græcis συσπικε dicitur. Germanis Alun, crassum est partium, maxime liquidum, & placites & pleurithes dictum, à crustæ & lateris forma: minus stron gylon & astragalotes, id est, rotundum in astragali modum: minimum schistum, id est, scissile non in fila sed digitis friabile. Omne alumen in aqua soluitur, & igni liquefit, tardius scissile, quod sine bullis tandem mollescit, idem aqua innatat, lingue & cuti integræ est mordacissimum, adulteratur segementis lapidis amianthi: sed hæc acrimonia carent, & ex pingui aliquo ardent re diuino corpore, aqua merguntur, & integra manent, in filaq; dissiliunt. Alumen scissile colore candidum & præstan- tissimum, idem tenuius & utilius. lib. 6. comp. ph. part. Et quia rarum inuentu, carius: liquidum cono- tri, crassum, & uilissimi precij, quia in omibus regionibus inuentu est facilissimum, lib. eodem sexto.

## Sulphur.

## Cap. LXXIII.



Sulphur optimum existimatur uiuum, quod apyron uo-  
cant, nitedula modo splendidum, perlucens, minime la-  
pidosum. Probatur in genere sulphuris ignem experti, quod  
uirit, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara  
gignitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit, & celeriter  
concoquit. prodest tussibus, suspiriosis, purulenta extussien-  
tibus, in ouo sumptum, aut suffitum. præterea partus, usti ni-  
dore extrahit lepras, lichenas, scabros ungues cū resina terebinthina misti, au-  
fert. cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est. uutiligines tollit. scorpionis  
ictibus, addita resina, medetur. cum aceto uerò, draconis marini scorpionisq;  
plagas sanat. pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum, sedat. re-  
gium morbum emendat, in parsum fronti cochlearis mensura, aut in forbili ouo  
sumptum. facit ad grauedinem, & destillationes. sudores quoq; conspersum in-  
hibet. podagricis, cum aqua & nitro illitum, conducit. grauitatem auditus, suffi-  
ti nidore raptim per fistulam hausto, sanat. lethargicos suffitu excitat. erumpen-  
tem undecunq; sanguinem sistit. cōtussis auribus, cū uino aut melle\* illitū medet. <sup>\* Myrrha.</sup>

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sulphur omne calidum, tenuis essentie, trahit, terget: salina uel lotio, uel oleo ueteri, uel melle,  
uel terebinthina exceptum, uenenatis ictibus impositum sanat. Pforas, lepras, lichenas cum terebin-  
thina tergendō & dissipandō persanat nobilissimum est & wvop, id est, uiuum & ignem nondum ex-  
pertum, Germanis Lebendiger schwebel, ignem expertum quo uirentius, oleosius, pinguius eo me-  
lius. Ex sulphure oleū chymistis efficacissimū, trahitur, fumo eius ardētis in cāpanā uitreæ recepto, in  
oleū cōcreto, et catmū subiectū destillante: sed quia ex multo sulphure paucū ascēdit, præciosum est  
fit et aliter. Sulphur ijdem sublimādō (ut illi appellāt) purgatissimū & clementissimū efficiunt, etiā  
præciosum eadem de causā. Cuius usum non est quod uerere quorundam imperitorum exemplo:  
Cum Galenus uiuum sulphur impurissimū diamoro stomachico medicamento ad digerendum misceat  
bis lib. 6. comp. ph. part. Nocet sulphur achoribus: quia plus quā par est eos calfacit atq; digerit.

## Pumex.

## Caput LXXIII.

Pumicis probatio, ut magnopere leuis, spōgius, scissilis, nec arenosus, item  
teri facilis, & candidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus: &  
ubi canduerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq; in census extingui-  
tur: & tertia uestione exemptus & per se refrigeratus, ad usus conditur. Vis eius  
adstringere, gingiuas abstergere. purgat cum calfactione, quæ caliginem pu-




pillis offundunt. explet ulcera, & ad cicatricem perducit. excreſcentia cohibet. fit ex farina eius dentifricium. corpori cruſtam obducit. auellendis capillis ap-  
tus. Theopraſtus autor eſt, ſi quiſquam in bullientem urceum uini pumi cem inie-  
cerit, feruorem ſtatim ſedari.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Pumex* Germanis *Pymſen ſtein*, ſarcoticis miſcetur, dentes poli, facultate deterſiora, & aſperi-  
tate ut ſmiris, teſtæ, cornua animalium uſta: uſus tenuiorum ſit partium, & acrimoniam ſumit, quam  
lotione deponit. Nunc ſcriptoribus propè ſolus ad papyrum expoliendâ cum gummi luniperi eſt uſui.

Sal.

Cap. LXXV.



**S**al foſſilis efficacior eſt. comuniter, ſi eſt candi-  
dus, calculis uacans, & perſpicuus, denſus, equa-  
li compage. peculiariter ammoniacus natione laua-  
datur, ſi modo ſindi facile poſſit, & in recta ſegmen-  
ta diduci. In marino ſale eligendus eſt candidus, æ-  
qualis, denſus. Probatiffimus in Cypro fit, & Sala-  
mine Cypri, & Megaris. in Sicilia & Aphrica. Sed  
inter dicta ſalis genera lacuſtris præfertur: ſed mul-  
tò ualidiſſimus eſt Phrygius nomine tapeus, aut tri-

tæus, aut gantæus. Salis natura in commune perquam utilis eſt, adſtringit, abſter-  
get, expurgat, diſſipat, reſſumit, extenuat, & cruſtas inducit. ſed hoc intereſt,  
quòd alius alio ſit præſtantior. quin & à putredine uindicat. admiſcetur medica-  
mentis pſoras abſtergentibus, excreſcentia in oculis reſſumit, & pterygia con-  
ſumit, cæterasq; carnis extuberationes tollit. clyſteribus infunditur. diſcutit laſi-  
ſtitudines ex oleo illitus. contra hydropicorum tumores auxiliatur. dolores in ſac-  
cis fori mitigat. & pruritus ſedat, ex oleo & aceto inſtriſtus ad ignem, donec fu-  
dent. item lichenas, lepras, pſorasq; anginam ex melle, aceto, & oleo illitus le-  
uat. tonſillis uuſq; cum melle toſtus: ulceribus in ore manantibus, gingiuis quas  
humor uexat, & phagadænis ulcerum, cum polenta crematus illinitur. aduerſus  
ſcorpionum iſtus, cum lini ſemine: contra ſerpentium \* morſus, cum origano,  
melle, hyſſopo: aduerſus ceraſten, cum pice, aut cedria, aut melle auxiliatur: con-  
tra ſcolopendræ morſus, cum melle & aceto: aduerſus ueſparum iſtus, & tereſti-  
nes\*, albidasq; capitis puſtulas, thymos & tubercula, cum ſeuo uitulino: furuncu-  
los cum uua paſſa, aut ſuillo adipe, aut melle diſcutit. teſtium tumores cum origa-  
no & fermento maturius cõcoquit. crocodilorum morſibus auxiliatur, tritus, in  
linteolo, & intinctus aceto, ita ut uinculis loca conſtringantur. Prodeſt ad beſtia-  
rum morſus, ſugillationes in facie, ex melle. Contra hauſtum opium & fungos,  
cum aceto mulſo bibitur. luxatis imponitur cum farina & melle. ambuſtis igni  
cum oleo impoſitus, puſtulas erumpere non patitur. podagricis itidem imponi-  
tur, & aurium doloribus cum aceto ignes ſacros & ulcera quæ ſerpunt cum ace-  
prunis, uſquedum efferueſcat. Aliqui foſſilem ſubacto polline obliniunt, & cara-  
modo uri: Aqua ſemel abluitur, & ſiccatus in ollam coopertam mittitur, ſubdito  
igne, moueturq; donec iam non exiliat.

Spuma ſalis, ſpumofi maris lanugo ſiue ramentum eſt, in exilibus petris inuen-  
tum, cui uis eadem quæ ſali.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Sal tam foſſitius, uulgo ſal gemma, quàm marinus, terget, aſtringit modicè, ualide ſiccatur, digerit  
lib. 6. comp. ph. par. Per ſe & cum galla leui attactu gargareonem inflammatum non dureſcentem in  
ſcrrhum: non autem initio, neq; dū augeſcit, aut cū multo calore uiget: quod ſi corpus ſit plithoricū,  
aut ſaltem caput plenum, ſi initio adhibetur inflammato gargareoni, extrema laborant innoxia inferunt.  
Sed aſtringit quum terget: ſiccatur aut non minus quàm nitrū, aut nitrī ſpuma: ſed hæc nō aſtringunt,  
ob id ceratis mixta ulcerum ſordes tergem. Sal ob aſtriſtionem id nō præſtat. Sal Armeniacus terget,  
ſubacris eſt, leuiſſimè aſtringit, humores acres in ſupercilijs inſperſus conſumit, à quibus pili male tritū  
incidunt.



excidunt. Hāmoniacō salī similem forma schistum lapidem docet Dioscorides. Sal Hāmoniacū valen-  
ter digerit, lib. 6. comp. ph. part. noster tamen nigricans quā Officinā corruptē Sal armoniū. Ger-  
mani Salmiac, tam nigricans, quā albicans factitius est.

## Muria.

## Cap. LXXVI.

**M**uria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiam si no-  
me intestina corripit. & ischiadicis ueteribus. ad fotus, aqua marinæ u-  
sum præstat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Muria, quā Græci ἄλμη. Germani Salz brun uocant, est aqua salsa, quæ si recoquitur, iterum  
ad naturam suam consumptio liquore redit, & sal fit, uti ex Catone liquet libri sui de re Rust. cap. 88.  
ubi candidū salē facere docet. Est autē nihil aliud muria q̄ aqua salsa, uelut etiā ipsum mare salsum exo-  
istit, sed hoc ex natura, illa arte paratur, prout usus ex postulat plus aut minus salsum esse. Quare disa-  
fert etiā à falsugine uel falsilagine salinarū, quæ etiam ipsa natura salsa est, magis etiā q̄ marina, & ad  
hoc etiā liquida, quum muria citam durata fieri possit, certa quadā ratione prodita à Columella lib.  
12. cap. 6. quāquā non durā sed maturam legendum esse credere malim, nisi sepe & Columella, &  
Cornelius Celsus, & Scribonius, & Marcellus sic appellarent, ut uidelicet durā et maturā pro eadem  
accipiamus, cui cruda opponatur. Sic autē facere docet Columella. Quum salem per aliquot dies uide-  
bis in aqua tepefcere, ex eo intelliges nondum esse muriam maturā. itaq; subinde alium salem tam diū  
ingres, donec in sporta permaneat integer, nec minuat. quod cum animaduertieris, scias habere mu-  
riam maturitatem suā. & paulo post. Est aliud murie mature experimentum. Nam ubi dulcem ca-  
seum dimiseris in eam, si pressum ibit, scies esse adhuc crudam: si innabit, maturam. Huic autē murie  
mature parandæ modum etiā Gal 4. simpl. prodit, sed eam tamen cui ouum innatat, ἐν κρητῶν ἄλμην  
hoc est, temperatam & maturam ad salgama condienda appellat: eam uero quæ iniectum salem am-  
plius colliquefcere non permittit, uehementer salsum, hoc est στυφῶς ἄλμην uocat, quum Colomela  
la hoc utrūq; experimentū mature murie esse dicit, nisi quod dulcem caseum oui loco demittendū tra-  
dit. Dura porro appellatio ex eo indita uidetur, quod aqua in ipsum salem uim suā exercere amplius  
non potest, quod liquida uti aqua & non indurata faceret, salemq; colliquaret. Plinius sanē durā non  
appellat, sed certam mensuram satis exprimit in aquam mergendi, quo durā aut moderata reddatur.  
31. cap. 6. Vsum autē murie duræ præscribit Celsus lib. 4. 9. Edenda inquit sunt salsamenta, uel olea  
ex muria dura. & eiusdem libri cap. 15. Themison muria dura quā asperissima sic utendum memoria  
prodidit, & pluribus alijs locis Scribonius ca. 185. uulgatæ editionis ad coriandrū datū. Adiuuari au-  
tem debent qui biberunt, ex uino mero atq; plurimo. uel aqua marina. uel muria dura pota. Constanti-  
nus Casar li. 20. de agricultura ultimo, eā ipsam muria non durā, sed σαρτῶν, id est, stillatitiā & liqui-  
dā siue percolatam appellat. At uerō quā Galenus ἄλμην στυφῶς & ἄλμην ἁπλῆν dixit, eādem Archigines,  
citante Galeno lib. 1. cap. 7. comp. ph. part. ἀκρητῶν appellat. Quare tres in uniuersum muriarum  
species existunt, quorū uidelicet, quā Hippocrates ἰ. γυναικῶν γλυκερῶν appellasse uidetur  
ἐν κρητῶν & ἀκρητῶν, hoc est cruda, matura siue temperata, & dura siue meraca &c.

## Flos salis.

## Cap. LXXVII.

**F**los salis flumine Nilo defluit, lacubus tamen quibusdā innatat. Assumen-  
dus q̄ crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum lōgē magis uirus  
olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupu-  
losus, improbat. Preterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nō nul-  
la ex parte, etiā aqua, diluente factitiū colorem. ad ulcera quæ cacothe uocantur,  
& phagedænas, genitalium nomas, & purulentas aureis, efficax est. oculorū  
hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. emplastris unguentisq; coloris causa,  
ut rosa ceo, miscetur. sudorem cit. aluum. urbat, in uino aut aqua sumptus. stoma-  
chum malē habet. additur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia\* com-  
ponuntur. & in uniuersum acris est, & feruentis naturæ, ut sal.

## Nitrum.

## Cap. LXXVIII.

**P**ræfertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, per  
inde quasi spongiosum quiddā, quale ex Bunis affertur. Humores euocat, q̄  
in alto concreuerūt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, glebosa, friabi-  
lis, colore penē purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Ly-  
diæ defertur: secunda est Aegyptia. quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim &



ustione salis habet. tam nitrum quam spuma eius præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bibatur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus que inflationes discutere possunt, uti ruta, uel anetho. febrim. circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectam accessionem. miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutunt, extenuant, & lepras abstergunt. Cuius aqua aut calida, aut uino infusum, inflationes, purulentas aureis, & sonitus earundem sanat. sordes expurgat, cum aceto instillatum, canum moribus ex asinino adipe aut suillo medetur. resine terebinthinæ admistum furunculos aperit. aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem uisus, cum melle succurrit: & uenenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis morderit, ex aqua: ijs uero qui taurinum sanguinem biberint, ex laserpicio: hisque qui cibum non sentiunt, utiliter obducitur: opisthotonisque iam remissioribus, & luxatis, cum cerato. in resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa noua, donec incandescent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Nitrum, spuma nitri, aphronitrum, potenter tergent cuti affricata: fin autem nitrum ex tenuibus partibus constans lapidosum est, urendum ac diligenter leuigandum. ἀπὸς λιττοῦ, seu ὑπὸς, id est, spuma nitri ab Aphronitro differt, (sic χαλκός ἀπὸς χαλκῶδους, & ἀκὼς ἀπὸς λευκοῦ ἀπὸς λευκοῦ) & multa alia similiter) illa enim alba est farina triticea similis, eiusdem cum nitro facultatis & naturæ, sed essentie tenuioris: hoc aut in glebas coactum & congelatum, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras pruritum excitantes digerit. Nitrum præferim bernicum seu beronicum potius lib. 8. metho. siccatur, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lemos humores multo potius quam sal, amarum enim est, cap. 1. lib. 4. simp. usum uero tenuitatem substantiæ adeptum spuma nitri proximum est. Nitrum rubrum lib. 9. comp. ph. part. Aphronitrum magis quam hæc incidit, stomacho inimicum est, ob id non deuoratur, nisi grauis urgeat necessitas. Nitrum uero sumitur, & aluum subducit. Omnia hæc hodie desiderantur, quorum loco supponunt officinæ salem petreæ (quæ uulgo Salpeter & Salniter appellatur) purgatum, in panes coactum. Id mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ & aliorum nitrofororum.

## Fæx.

## Cap. LXXIX.

**E**Ligenda fæx maximè à uino uetere, Italico: fin minus, ab alio consimili Fæx aceri uiribus longè acrior est. crematur ut alcyonium, antè diligenter siccata. Sunt qui noua testa igni largo urant, usquedum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ ustionis, ut aërio nitore in albescat, linguamque tactu urere uideatur. Eadem urendæ fæcis aceri ratio. Vis ei supra modum urens, & abstergens. ulcera ad cicatricem perducit. uehementer exest, siccatur. Sed recenti utendum est, quoniam celeriter exanimatur. proinde non nisi in reconditorio, & uase aliquo reponi debet. Lauatur, ut pompholyx. Quæ ustionem experra non est, tumores & per sese, & cum myrto cohibet. uentris stomachique fluxiones illa sistit. multo liebre profluuium, imo uentri aut genitalibus imposita, mitigat. panos discutit. non dum exulceratos, et tubercula. rigentes mammas, siueque lactis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cremata uero, unguis scabros cum refina aufert. addito lentiscino oleo, illita nocte tota, rufat capillum. Elota oculorum medicamentis, ut spodos, adijcitur. cicatrices eorum & caligines eadem abstergit.

## Calx uiua.

## Cap. LXXX.

**C**Alx uiua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usquedum uehementer in albuerint. dein ubi in aquam frigidam immersæ fuerint, in fictile nouum conijcito, & exactè pannis operiens, noctem unam conquiescere finito, mane eam extrahens. ubi pfecto omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & è littoralibus calculis igne crematis, nec non è uili & fusaneo marmore, quæ cæteris præfertur. Vis omni calce in commune ignea, mordens, adurens, & crustas inducens, quibusdam alijs immista, ut adipi, oleo, cōcoquendi uim assumit, mollit & dissipat. ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior existimatur recens, nec aspersa aquis.

## NOM



## NOMINA ET EXPLICATIO.

Calx uiua Germanis Vngelstreyt Falcē / uehem: mer urit, adeo ut crustas efficiat, & mox ubi est extincta, iam diu, non est caustica amplius, sed calida sicca: carnem tamen liquat: lota ter quater si ne morsu strenue siccatur.

## Gypsum.

## Caput LXXXI.

**G**ypsum uim habet adstringēdi, obstruendi, sanguinis eruptiones sudoresq; cohibet, sed potum, strangulationis modo iugulat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Gypsum, Germanis Gyps, siccatur ut cetera terrea, emplasticum est: cogitur enim, & lapide scit li quore aliquo, ut albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporū uel similiter mollibus exceptum: ustum minus est emplasticum, tenuium partium. siccus est, ex oxycrato repellit. Nostrium uero Gypsum, uti calx, urendo emplasticum magis euadit.

## Sarmentitius cinis.

## Cap. LXXXII.

**S**armentorum cinis urendi uim habet, cum axungia autem uel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisioibus, & neruorum nodis prodest. cū nitro & aceto, ex crescentias carnis in scroto reprimat. serpentium canumq; moribus illitus ex aceto medetur. crustas obducentibus medicamentis admiscetur. fit ex eo lixiuium contra præcipitationes, & fungorum uenena, cum aceto, sale & melle.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Latini cinerē Græci τρεπφρα. Germani Aschen. Galli cendre appellāt. quicquid exustis corporibus relinquitur, siue hæc sint lapidum, siue arborū, siue animalium partes. Quare omne lixiuiū eius cineris cuius lotura est, naturā adipiscitur. Vnde sanē cū non unum temperamentū omnis cinis habeat, neq; etiam lixiuiū habeat, ut merito ē Galeno reprehensus Dioscor. uideatur, qui omni lixiuiū adstringentem naturam tribuit, cū non omnis cinis hanc naturā habeat, ut Gal. lib. 8. simpl. docet.

## Alcyonium.

## Caput LXXXIII.



**A**lcyonij quinque esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbi laporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. alterum pinnulæ oculorū aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Millefium quidam uocāt. quartum succidis uelleribus nō dissimile, multis inanitatibus hians, leue, quantum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pumicosum, foris læue, acre, quod plurimum in Propontide iuxta insulam Belbicon appellatam gignitur, patrio nomine halos achæen uocant. Duo priora in feminarum smegmata assumuntur. contra lentigines, lichenas, lepras, utiligines, nigritias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili urina uexantur, aut arenulas in uesica colligunt, idoneum est. item renibus affectis, aquæ inter cutem, lienis, uustum autem, & ex uino illitum alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est. in alia smegmata, psilothraq; assumitur, cū sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lauatur ut cadmia.



Officina spumam maris. Germani Meer Schwamm apppellant.

## Adarces.

## Cap. LXXXIII.

**F**it in Cappadocia\* quod adarces appellatur. \*Galatia. Est autem tanquam concreta salis lago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, &



arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, ut uideri possit la cufre alcyoniū. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & uitia cutis in facie, & similia, ac commodatur. & in summa, uis ei a cris. humorem euocat qui in alto concreuit, & ischiadicis prodest.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Plinius adarce meminit lib. 16. cap. 27. inter harūdines his uerbis Adarcā numerans: Est & in Italia nascēs adarca nomine palustris & lib. uerō 32. cap. 6. quasi antelatorū oblitus, inquit, inter aquatilia dici debet. Culameochus Latine adarcha appellata, nascitur circa arūdines tenues. spuma aque dulces, & marinae, ubi se miscene. his uerbis penitus Plinius adarches uidetur historiam confundere. Satisq; incuriosē de hac differuisse &c.

## Spongia.

## Cap. LXXXV.

**E** Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas: quarū duriores tragos nominarūt. fœminas autē, quæ cōtrarias dotes habēt. Vruntur ea ut alcyoniū. Recētes sine pinguitudine, uulnerariae sunt, & tumores reprimūt. recētia uulnera ex aqua poscaue cōglutinant. ueteres sinus ex decocto melle iungunt. Vtustae autē inutiles. Aridae ligatae lino, si penicilli modo adigantur, oclusa ulcera, callosq; laxāt. siccae recētes & uacuae senilia ulcera, quæ fluxione laborant, aut cunicularim excedunt, impositu siccant. sanguinis profluuiū sistant. Crematarū cinis ex aceto, aridae lippitudini auxiliatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius, in oculorū medicamētis lauare cinerē. Omniū cinis cū pice crematarū, profluente sanguinē sistit. Candidae cura fiunt, ē mollissimis recentes, per ætus tinctae salis spuma, quæ petris cohæret: insolantur in uersae, hoc est, parte caua sursum spectāte, & qua abscissae fuerūt, deorsum. si uerō æstiuā serenitate ad lunā sternantur, perfusae salis spuma, aut maris aqua, maximū candorem referent.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Spongia Germanis eyn Badschwam. Gallis une espōge appellatur. Lapilli in his reperi, triti, ex uino poti lapides renumerum pun, non autem uesticæ, quia tenuioris sunt essentia, sine insigni calore, uesticæ tamen calculos rumpere hoc loco scribit Dioscor. si ex uino bibantur.

## Corallium.

## Caput LXXXVI.



**C**oralliū, quod aliqui lithodendron appellarūt, marinū esse fruticē constat, qui alto extractus, durat statim atq; emergit, tanquā offuso aëre protinus cōcrescat. Plurimū inuenit ad Syracusas, in promōtorio cui Pachyno nomē est. Laudatissimū, rubens, colore antherici aut sandycis saturatq; nec scus terētī facile cedens, & quabili usque quaq; cōcremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quāramosissimū, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autem in lapidis duritiā coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter. ex crescentia cōcēret. oculorum cicatrices abstergit. ulcerum caua, & cicatrices explet. cōtra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. urinæ difficultati auxiliatur; quin & potum ex aqua lienem absumit. Quod antipates uocāt, corallium esse arbigis. Vires supradicti habet.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Corallus lapis Actuarius dicitur, Λιθόδενδρον pop aliqui nocarūt, fruticis forma, cinnamomi æmulus cre scit ad promōtoria in mari, astringit & refrigerat, cōtrā sanguinis reiectiones magnopere efficax. Ru brū & nigrū tantū facit Dios. hoc loco. albisimū tamē hodie etiā uisitur naturalis, et citra uisionem.

## Phrygius lapis.

## Caput LXXXVII.



**P**hrygius lapis, quo infectiores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadacia. Optimus habetur pallidus, modicē grauis, nō solida corporis cōpage, inter cētibis albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo perfusus, uiuisq; carbonib. obrutus: perflāt assidue folliis, donec murato colore



colore rufefcat. rursus extractus eodem uino restinguitur. hoc iterum & trinis uicibus faciendum. attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Vis crudo ustoq; adstrictoria, expurgans. ulceribus crustas quadam tenuis inducit. ambustis cum cerato medetur. Lauatur ut cadmia.

## EXPLICATIO.

*Phrygius lapis gleba pumicosa est, in medicina ut Plinius tradit nullius usus.*

Assius lapis.

Cap. LXXXVIII.

**A**sius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos, falsugo subflaua est, summo lapide infidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uergente. ad motus linguæ aliquantum mordet. Vim habet uterq; adstrictoriam, & modicè erodentem. admixtus liquida pici, aut teretibinthinæ, tubercula discutit. Longè ualidior flos existimatur. De cætero siccatus flos, uetera ulcera & cicatrici repugnantia sanat, ex crescētia cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cum melle expurgat. ulcerū caua explet, & expurgat cū melle: depascētiaq; cū cerato sistit. fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento: & lienosis, ex aceto & uiua calce. prodest flos ex melle phthysicis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excauato inditis. Funt quoq; pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantē carnem, & corporū crassitiem absumūt, cum uice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

*Ex hoc lapide olim fiebant sarcophagi.*

Pyrites.

Caput LXXXIX.



**P**Yrites lapidis genus est, à quo æs cōstat. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. Vritur hic: Melle irrigatus molli pruna continuo flatur follibus, donec rufefcat. Alij in multis carbonibus igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter assiccatus, friabilis reddatur. siquidem sæpe facies summa solū uritur. ita crematus, siccatusq; recōdit. Si eloto opus sit, lauari debet ut cadmia. Tam crudi quàm usti uis est, ex calfacere, abstergere, offusam oculis caliginē expurgare, duritias cōcoquere, & cōcoctas discutere. resina exceptus ex crescētia in carne cohibet, sed calorē quendā & adstrictionē parit. Ita usti nōnulli diphryges appellant.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

*Pyrites lapis, de quo es pericitur, æris aspectu scintillæ leui percussu edens: crudus & coctus calafacit, terget, digerit. Valida autem est facultatis, Galenus libro 9. simplic. Marcasita æris quibusdam dicta uidetur, & æg. stoff.*

Hæmatites.

Cap. XC.



**H**æmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suo pte ingenio æqualis, nulla forde admixta, nulloq; zonarum discursu. Vim habet adstringentem, & ex calfactoriam aliquantum, extenuantemq; oculorum cicatrices & scabritiam cū melle purgat. cum lacte autē muliebri, lippitudini, fractis, & oculis cruore suffusis conuenit. bibitur contra difficultatem urinæ, & fluxiones mulierum in uino. & ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. sunt ex eo cocticulæ & collyria oculorum uitij apta. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. modus uestionis est, ut modicè leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Densam glebam rotundamq; schisti lapidis, cuius modi sunt quæ eius radices uocantur, in urceum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta morā eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorem reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iterum obruunt, & subinde conspicientes, periculum faciunt. siquidem in cinere diu dimissus, colore murato diffunditur. coarguitur male confectus, primū scissilibus uenis: quippe in rectos uenarū discursus refringitur. at hæmatites longè



longè secus se in colore habet: namq; hic floridum reddit, hæmatites uerò saturatior, atq; cinnabarin imitatem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnesæ lapide, uehementer ambusto. in Aegypto sponte nature cū metallis enascitur.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Hæmatites à sanguinis colore, Germanis Blättstein dictus, frigidus astringens, excrescentia reprimat, oculorū uulnera per sanat, sanguinis expuitioni ualet, siccat humores, sed minus quam Cadmia. Nā ex humida substantia nō terrestri constat, & super cotem medicā cū liquore tritus, in succū soluitur: per se uerò in corpus simile minuitur, ut schistus lapis, non in fragmenta terrestria, ut e admia.

## Schistus lapis.

## Caput XCI.

Schistos lapis in Iberia Hispaniæ gignitur. Probatur maximè qui croci colore rem æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremento & alterno coherentium uenarum discursu, pectinum modo, ammoniaci salis similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmior, quin & caua replet muliebri lacte perfusus. ad procidentia, rupta, item genarum crassitiem, & uuas oculorum, magno pere effica est.

Schistus lapis hæmatitæ uim habet per similem, sed infirmior.

## Gagates.

## Caput XCII.

In gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. niger est plerumq; & squalidus, crustosus, perquam leuis. Vis ei molliendi, & discutiendi. deprehendit fonticum morbum suffusus, re-creatq; uulnæ strangulationes. fugat serpentes nidore. podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Ciliicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. uocatur autem & locus & amnis Gagates, in cuius faucibus ij lapides inueniuntur.

Gagates lapis colore atro, Germanis Schwarzer augstein, uoce parum deprauata, dicitur. odore dum uritur bituminis, siccat, glutinat, digerit ad motus, in corollis præcarijs & salinis frequens.

## Alij plures lapides.

## Cap. XCIII.



Apis thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit. Magnes lapis optimus est, qui ferum facile trahit, colore ad cæruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsa, trium obolorū pondere, ut crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematū pro hæmatite uendant. Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. eius cinis dentifricio optimus. Galactites appellatur quod lacteum succum refudet. cinere tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorū fluxiōes & ulcera cōuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pyxide plumbea recondere, propter uim glutini, quod ei obhæret. Melitites omnia galactitæ similis. hoc tantū interest, quod dulciore succū remittit. Eiusdem ut galactites effectus. Morochthus lapis quem aliqui galaxiam, aut leucograpida uocauerunt, in Aegypto nascitur: quo, utpote molli, & facile liquefcente, lintea dealbandis uentibus utuntur. Spiracula corporis obstruere uidetur, cōueniens ijs qui sanguinem expuunt, cœliacis, & uesciæ doloribus, cu aqua potus. iridem fluxionibus uulnæ, & impositus uelleri. mollior oculorum collyrijs misceatur. explet enim caua, atq; de la chrymationes sistit. idem cerato exceptus, ulcera quæ fiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit. Alabastrites uoca-



no catus onyx, crematus, refina aut pice assumpta duritias discutit. stomachi dolores cū cerato leuat. gingiuas comprimit. Lapis nomine thyites, in Aethiopia gignitur, subuiridi colore iaspidem imitatus. cū diuiditur tamen lacteū fuscū reddit. Vehementer mordet. tenebras, quæ pupillis obuersatur, expurgat. Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glandis effigie, candidus, scita admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus quasi industria detornatis. solutus nullam qualitatem manifestā gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinae auxiliari, & calculos in uesica comminuere. Amiantus lapis in Cypro nascitur, scisso alumini similis: quo, utpote flexili, telas & uela tantū spectaculi gratia<sup>\*theatus Her mol.</sup> texunt, quæ ignibus inacta ardent quidem, sed flammis inuicta splendentiora exeunt. Sapphirus lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. contra intestinas exulcerationes bibitur. ex crescentia in oculis, uuasq; & pustulas inhibet, & ruptas mēbranas cogit. Memphites in Aegypto iuxta Mēphin inuenitur, calculorum magnitudine pinguis, uersicolor. Tradunt trito & illito, quæ urenda aut secanda sunt, sine periculo obstupefcere, ita ut non sentiant cruciatum. Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam non<sup>Ex Plinio rā situta.</sup> est inuenitur lunæ imaginem reddere, quæ cum ea quidem augetur & decrefcit. nascitur in Arabiā, candidus, translucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent, eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utuntur, arbores ad alligato eodem frugifera redduntur. Iaspidium quædam smaragdum imitatur, alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aëri, ob id uocatur aëria: alia ueluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento uocatur. quædā lineis albis & resplendentibus præcingitur, Assyrios appellata. alia terebinthine similis, quæ terebinthizusa dicitur. alia calore callida gemmā æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum scemoribus appellæ. Aëtites lapis est ueluti prægnans, cū quatitur, alio in utero sonante: Grauidis continet partus, cū lubrica sunt uulua & parum tenaces, sinistro brachio alligatus, sed parturientibus è brachio amoueat, & sceminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat, fur enim mansum deuorare nō poterit. quin etiam concoctus, furem coarguit: quippe decocta cū eo, deuorare non poterit. tritus, & cerato exceptus, cyprino, aut gleucino, aut ex calfaciente, comitiales magnificè iuuat. Ophitæ genera multa. quidam ponderosus & niger, alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. tertius lineis quibusdam candidis interinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. feruntur qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus auxiliari. Lapedes in spongijs inueniuntur, qui uesicæ calculos rumpunt, in uino poti. Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. confiat autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, in commodos oculis pilos replicare. Ostracites testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex uino, sistit. si quatuor diebus à purgatione bibitur sicili ci pondere, sceminis præstat ne concipiant. cum melle autem impositus, māmariū inflammatioes lenit, & nomas cohibet. Smyris lapis est quo annularij scalpro res lapides expurgant, ad erodendum & urendum utilis. gingiuas, quas humor uexat, prodest. dentifricio commendatur. Arena è littoribus sole feruefacta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruantur. torrerī solet ad aridos fetus, pro milio aut sale. Ecote Naxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit: uirginum mamas cohibet, nec in crescere patitur. potum ex aceto, lienem absumit. & comitialibus prodest. Geodes lapis adstringit, siccat, caligines oculorum discutit. illitus autem ex aqua, testium māmārumq; inflammationes sedat.

## NOMINA ET EXPLICATIO.

Magnes siccat hæmatitæ modo, & astringit, ad enterocelē utiliter sumitur, & ad mouetur. Magnæ est nā



est miraculum eo tanquam mundo aliquo polorum celi rationem inesse. Germanis Magnet & Segelstein appellatur. Plura de lapidibus & Gemmis, vide in annotationibus nostris in Theophrasti. lib. 1. de gemmis siue lapidibus.

## Terra.

## Cap. XCIII.

\*interdin.

\*oculorum.

\*paruos.

Omnis terra ad medendi usum recepta, summam & primam uim habet refrixerandi, meatusque obducendi, ocludendique: sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis. Eretriades due sunt, una uehementer alba est, altera cineritia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, per quam mollis, quæ si per æramenta tractim ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut cerusa, aut hunc in modum: Teritur seorsum\*, & cum aqua, & ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. siccata folibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat, antelucanis colo excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fistile perforatum coniunguntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter folibus perflantur. ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut æereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem leuiter, mollientem. caua explet, & sanguinolenta conglutinat. Samia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius. unam antè diximus, altera alter appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria, uimque consimilem habet. sanguinis reiectiones sistit, foeminis fluxione uulvæ laborantibus, cum flore syluestris punice datur. testium & mammarum\* inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat. sudores arcet. contra serpentium morsus & uenena, pota ex aqua auxiliatur. Samius lapis, in Samia terra inuenitur, quo aurifices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus. sensus hebetat. uerum ad fluxiones oculorum & ulcera, cum lacte efficax est. partus, ut tradunt, ad fluxiones accelerat, & conceptus foeminarum custodit. Chia eligi debet candida, uergens ad cinereum, Samiæ similis. est autem crustosa, albaque, sed fictitius formis differens. Vis eademque & Samiæ. extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit. colorem in facie & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget. Eadem præstat Selinusia, maximè laudatur, quæ uehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinē, tactuque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. ambusta igni, si statim cimolia oblinatur, pustulas non sentient. testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet. igni sacro imponitur. in summa, utraq; multum in medicina commendatur, si in corruptæ originis, nec spuria assumatur. Quæ pinguis dicitur, colore ferè eretrie similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admo-ueat, refrigerabit. tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut pensilis hæreat. cui effectus idem qui cimoliæ. paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretria de uendunt. Fornaceæ testæ uehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medentur. podagricis profunt. strumas discutiunt, cerato exceptæ. Fornacum terra quæ retorrda fuluescit, eiusdem cum testa effectus. Melia colore cineream eretriadem imitatur, aspera tactu. ea digitis friata, derastrumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur. modicè linguam siccatur, purum corpus reddit, & colorem commendat. pilos extenuat. uirilignes & lepras abstergit. pictoribus usum præbet ut colores diutius perennent. emplastris uiridibus, quæ chlore dicuntur, efficaciter inferitur. Ex omni Melia terra & omni alia in uniuersum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resoluatur. Ex amplitide terra, quæ pharmacitis nomine, in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis nigra, piceæ lōgos\* carbones referens, modicè assulosa, equa bili



bili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim liquefcit, Vitiosa cenfetur candida, & cinerea, quæ in liquore nō refoluitur. Vim diffipandi & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea, ufus eius ad illinēdas uites sub germinationis tempus, utpote cum innafcentes uermiculos enecet.

Fuligo pictoria.

Caput XCV.

**F**uligo qua pictores utuntur, ex vitrijs officinis colligi folet: fiquidem ei palma tribuitur. Vis eis ad adstringendū & erodendum efficax. fracta cum rofa cco cerato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. XCVI.

**A**tramentum quo fcribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. in fingulas libras gummis, ternæ fuliginis uncia adijciuntur. Fir etiam è refinarum & pictoria fuligine, de qua paulo antè diximus. Affumitur autè fuliginis mina, gummis fefquilibra, glutinis taurini, atramenti futorij, fingulorum fequencia. Additur conuenienter erodentibus medicamentis ambuftis, ex aqua commodè craffius illinitur: fed non antè foluatur, quàm cicatricem induxerit. fanatis fiquidem ulceribus, fua fponde decidit. Cæterum habes, amiciffime Areæ, ferè qua tradenda duximus pro operis modo, quem deftinaueramus, & materiæ auxiliiorū medicinalium copia.

LIBRI QVINTI FINIS.

## PEDANII DIOSCORI DIS ANAZARBEI DE VENENIS, QVO QVE MODO ARCEANTVR, VITENTVRq; Liber fextus.



**V**PERIORIBVS amiciffime Areæ libris, tradidimus de aromatis, oleis, unguētis, arboribus, & earundē fructibus, lachrymisq; item animalibus, melle, lacte, feuo, frumentis, oleribus, herbis, radicibus, liquamentis, uinis, metallisq; In hoc uerò totius operis ultimo, facultates medicamentorum recensebimus, quæ prodeffe nobis, aut officere poffunt. Vitata igitur orationis prolixitate, opus institutum profequamur. Huiusmodi autem tractatus, cum bifariâ distributus fit, in partem uenena præcauentem, ita ut ne fallant fumentes: aut fi quando per imprudentiâ dentur, utrum quoq; innoxia fiant, irritaq; & in rationem ijs fuccurrēdi qui iam noxiam sentiunt: primum differam de præcauendi modo, quem effe difficillimū pleriq; maiorum arbitrantur, quòd dantes clām uenena, ita infidias temperāt, ut peritiffimū quēq; decipiant. Siquidem uenena fua amaritudine, permiftis dulcibus, fpoliant, & graue odoris uirus mifcra odoramentorū eximunt. aut medicamenta immifcent, quæ tuendæ fanitatis gratia dari putant: & præfertim in ualitudine, ut abfinthium, tragoriganum, fatureiam, aut hyffopum, quinetiam thymum, irim, origanum, abrotonum, caftorium, aut fi quid medicamentis purgatorijs cognatam habere qualitatē uideatur. aut potionibus inferunt: ut uinis afperis, iuribus, paffo, mulfæ aquæ, mufto, fuccis, ut in cremore lentis, polentis. aut medicaminibus, aut alijs quæ affumuntur, edulij fpeciem referentibus. Quare qui in ea fufpicionē funt, conditos cibos uitare debent, omniq; intēfo fapore, dulciū, aut falforum, aut acidorum, abftinere: nec fitibundi affatim bibere, aut efuriētes uoraciter comefse, fēperq; ad faporē horum diligenter attendere, præfertimq; potu frigidā aquā præfumere. Satiatio enim appetitu, qualitates ægerimè poft ea concoquantur. In ægris quidem facile cauemus potionēs auxiliij prætextu dari folitas, quas offerunt improbi ueneficiorū artifices: itaq; ob id laborantes morbo non perinde audentium iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile incauti feductiq; homines capiantur dolis ueneficorum, ratio eft & facultas. Sed alia fupereft expeditior, ut fufpiciofi aliqua præfumāt, quæ uenenorum uires hebetent, & inefficaces irritasq; reddant: cuiusmodi caricæ funt cum iuglandium nucibus man

Nn



ducat, & quæ cedromela uocant, id est, citria, seminisq; napi drachma cū uino, item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum uino, aut rutæ folia & nucis iuglandis nucleum, aut caricas duas, & salis calum ieiuni sumât, & nullo ueneni genere lædentur. Antidota ex uino sumpta eundem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnū Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe uenenis obsistunt peculiare quidā corporum affectus certo quodā modo constitutorum cum quadā cibi potusq; qualitate, tum uini copia ita temperatorum, ut cum uenenis dissentiant. siquidem ingesti ueneni uires frangunt, atq; iam priore alimento factis præclusisq; meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimvero, quoniam fortunæ necessitas interdum similia discrimina peregrè agentibus affert, absque ullis insidijs hominum, nonnihil differendum mihi de hac re necessarium duco. Iam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosq; & porus in huiusmodi loco struere. si id fieri commodè nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda, frequenter enim à superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliuntur, ut phalangia, stelliones, & alia quædā reptilia. Porro uinaria uasa diligenter intueri oportet: namq; reptilia odore uini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium uirus eructant, interdum uerò delapsa immersaq; expirant, & exitij causas hauriunt. Sed hæc hæc tenus dicta sint, ne cauti & prouidi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumptum, auxiliari primo quoque tempore oportebit. siquidem dum comites singulorum uenenum notæ expectantur, immedicabile fit uenenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægredere. Quare si qui pro comperto se uirus sumpsisse intelligant, & fateantur, aut eorum qui aderat testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeunt, facile peculiari naturæq; constitutioni restituentur. Neq; enim insasentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi frustra adhiberi contendunt. Quoniam enim modo morbi, quorum causæ cæcæ latentesq; corporibus insident, medicamentis admittunt, & quæ forinsecus incurrunt uenena, medendi rationē aspernantur. Acq; uerò omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, proq; anteceditibus affectionibus, qualitatibusq; quibus sit opportunū corpus, uel medicabiles sunt, uel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsitan obmutescerent, aut temulenti, aut nolentes alioqui uenenum à se egeri, nullā nobis eius cognitionem præbeant, tū protinus accedendū ad ea quæ cōmuniter epotis quibusq; uenenis opitulari consueuerunt. Atqui nullū magis in omnia ualens auxiliū dari potest, quā ut proximo loco uirus foras exhauriatur, priusquam inualescat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, ut uomitare cogatur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrū cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut trago, urtica, scæno græco, aut halicæ decocto, uicē eius exhibebit. Hæc enim nō modo uomitionibus, exigent ui illa sua laxatrice, aut nauseam ciet, sed aluum quoq; subducent, & corporū inanitione ita aduersabuntur, ut a criminas uenenorū hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet: Esto ut quisquā uiua calce uel sæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationē nō accipiet. Atqui neq; uehementer adstringi corpus, neq; refrigerari poterit, si antea perungatur. Quinetiā uomitus non ob id modō quod uacuet, et noxiū humorem excernat, iuuamentū adfert, sed quod assumptum uirus nonnunquā odore coagularis grumis aut colore, prodatur: quippe cum odore et amaritudine, meconium: colore, cerusam, gypsūm uel: grumis lac aut sanguinem animalis recens iugulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ ueneficia deprehendit, ita ut nonnulla ab his remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Oleo etiā maluæ decoctū admiscet, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguium carniū iura, lixiuū lignorū cinere factum. Vbi uerò uomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in uentre coierit, quæ hæserunt intestinis



stinis reliquiæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum, & cum hydrome lite sumptum, uina uetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues pisces, uetustæ carnes pinguesq; & quæ adipe aut recenti butyro parantur: aluum nanq; subducunt, uti diximus. & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad uomitionem reddunt, & uenenorum acrimonias hebetantq; meatus obstruentia, celerem uirium penetrationem inhihent. Quinetiâ medicamenta dantur, quæ cõmuni dote prosunt: ut Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, castorium, ferulæ uiridis medulla, flos rhododædri, succus marrubij, laser aut laserpitium, sagapenû, peucedani succus, aut panacis, & radix quam magudarim appellant, aristolochia lōga, syluestris rutæ semen, & betonica, quæ cestron nominant. folia singula cū uino, drachmæ pondo sumi debent. effectum præbet polij decoctû, & feseli, & liquida pix linctâ. magnificè ferit opem antidota, quæ in calce scripta operis reliquimus. Cõmunis ratio præstandi auxilij ira se habet. Cæterû ab ijs quæ consueuerunt euenire, cõmunia remedia sumptuari possunt. Ferè enim uires uenenorum quàm plurimum, in affectus cõsimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisq; cõmunia conducunt auxilia uaria etenim sunt uenenorum genera, cõmunes tamen nec multi iisdem affectus oriuntur. Neq; fieri potest, ut omnes concurrentesq; casus quæ symptomata uocant, unum uenenum sequantur: alioquin superuacanea fuisset uenenorum singulorum traditio cum suis remedijs ab autoribus descripta. Neq; uerò in uno eodemq; promptum est inuenire, ut quis stomachi, alui, intestinorum, iecoris, renum, & uesicæ dolore uehementer crucietur, ut singuliat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, spiritus difficilis fiat, ueterno prematur, uertigo obuersetur, caligent sensus, stranguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre confluetur, ægrè loquatur reddat, torminibus uexetur, crebro uomitet, nausea prematur, rubescat, liuore fugilletur, palleseat, desipiat, stertat, uiribus deficiat, et pleraq; alia faciat, patiatuq; singula enim in generales affectus deducta, pauca numero & cõmunia ea demonstrant, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ suprà diximus non facile fuerit deuoratum uirus cognoscere. Nam oris & linguæ erosio, stomachi, uentris, uesicæ ac renum inflammatiō, uehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus lancinatio, & in plurimis partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò potis reperiuntur, sed in erucis quoq; pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro uon modò eos qui meconium hauserunt, ueterno aut sopore premi, stertere, liuore fugillari, torpere, refrigerari, stupescere. toto corpore pruritum sentire, sensu priuari cõstat, sed eos etiâ qui mundragoram aut cicutâ deuorauerunt. Delirium non hyoscyamus tantû infert, uerum etiâ quæ toxica appellântur. itidem aconitû, & mel quod in Heraclæa Pontica gignitur. Strangulatio nō minus in fungis, quàm in sanguine taurino, lacte, aconito, cerusa, gypso conspicitur. In summa, difficile unû uni ueneno propriû inuenire signû, quod haustum gustatumq; uirus prodere possit: maximè, quod hæc cæterorû etiam uirtorû, quæ in corpore exoriuntur, cõmunia sequi solent. Cæterû in his quæ celeriter enecant, noxam signis forsitan indicare possis, si ad ea respexeris quæ sumus dicturi. Sed in ijs qui ad longas ægrotudines spectant, nihil ad medendi rationem difficile, dūtaxat quod pertineat ad indicia noxæ: utpote cum uenena statim atq; præsentaneam uim illâ perdidert, transmutata in longos adfectus. cõmunia reliquorum uirtorû remedia, cõpositionesq; flagitent, cū uenefica proprietas non amplius insit. Si uerò lōga sit affectio, in aliquod diuturnorû morborum genus recidet, à quibus facillè fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ genera liter auxiliantur, hæctenus. Consequenter quæ priuatim singulis prosunt, scriptis mādabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficâ uim sortiuntur, ut medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad rationem salutis scripta inueniuntur, quòd nōnulla eorum quibus utuntur uenenis sunt cõmixta. Incuria enim magnas adfert noxas. & sæpe cōtinuo usu eorû, homo in perniciem agitur. Proinde animalia quæ exitiosam uim habent, hæc



sunt: cantharides, buprestis, salamandra, pinorum eruca, lepus marinus, rubeta & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt: hyoscyamus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Liquamenta: meconiū, opocarpasōn, thapsig succus, elaterium, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitum, thapsia, uera trum, ixia, agaricū nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum uocant, quod in Colchide nascitur. Herbae oleraq;: smilax, quam aliqui tithymalum appellat, Romanitaxum: solanū manicū, quod & dorycnium dicitur: sardinia herba, quæ rannunculi genus est: corniculatum papauer, pharicum, toxicū, ruta sylvestris, fungi ab animalibus. taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel Heracleæ in Ponto genitū, metalla, gypsum, cerusa, calx, auripigmentū, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentū uiuum dicitur. E liquoribus domesticis: uinū abunde post balneas potū, aut passum, & frigida aqua similiter.

In hunc sextum & ultimum libuit, Dioscoridis nihil annotare librum candide Lector, cum ea omnia quæ hic liber comprehendit fusius copiosiusq; testata sine à nobis in commentarijs nostris de uirtutibus animalium Latine et Germanice conscriptis, de uenenis porro atq; eorum Amidotis leges nostras annotationes in libellos de uenenis Arnoldi nouicomensis et Petri apponenis. quos in hac re amplius consulere potes.

### Cantharides.

### Caput I.

**Q**uibus datae sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad uesciam usq; cuncta erodi sentiuntur. picem aut simile quiddam cedri respiunt. dextra præcordia inflammantur. urinam egrè reddunt, & subinde cum lorio sanguinem emittunt. strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferunt. fastidia urgent, animo linquuntur, abortaq; uertigine concidunt. postremò mente abalienantur. Ergo antea quàm tale non nihil accadat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, uomere cogantur. mox ubi uomitione plurima reiecerunt, haliç aut orizæ, tragi aut pisanæ cremor, ad decoctū maluc, aut seminis lini, aut scenigregi, aut radicū althæe, quam latinus sermo ibiscum appellat, clystere infundatur. præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc aut in testinis adhærent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluū ex nitro aqua mulsa, uacuari debēt. detur deinde uinū aut passum, in quo pineoli nucleī, aut cucumeris femina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anterinus adeps in passo liquefactus. inflammata autē partes, hordei farina cum mulsa decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsū uirus ita remoratur, ut in principes se parteis infinuet. ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant & leniant. tum ubi corpus calfaciente oleo inunctum fuerit, in folium descendere oportet, ac lauare, ut per cutem summam quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. & deiectiones multarum moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capestat. Gallinaceis carnibus & hædinis, aut suillis catulis maximè pinguibus & tenerimis, ac cum lini semine coctis uesci debent: siquidem aluum cient, atq; uenenorum acrimonias hebetat. Vinum dulceliberalius exhibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cū passo\* sumantur. item pulegium ex aqua tritum, irinum aut rosaceum, cum rutæ decocto: recentes uitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulsa, drachmis quatuor pota.

\*Passi drachma.

### Pinorum erucæ.

### Caput II.

**I**s qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur. uehementis alui, linguæ ac stomachi inflammatio torquet. intestina dolor exerceat, ita ut pruriginem sentire uideatur. corpus totum exaestuat. fastidium urget. Quibus est succurrendum remedijs quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum, quod è cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Bupreo



## Buprestis:

## Cap. III.

**Q**ui buprestin biberunt, non dissimile nitro uirus sapiunt. stomachi uentrisque uehemens dolor insequitur. tam uenter quam stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem, diffusus inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur, urina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post uomitus & uacuationes quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt. item earum decoctum, ex uino. ubi uero iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. pyrorum etiam omne genus esse, & lac humanum bibere, cõuenit.

## Salamandra.

## Caput III.

**S**i Salamandram hauserunt, linguæ inflammatio consequitur. mens & sermo spræpeditur. tremor cum torpore aut horrore quodam ac exolutiõ accedit. partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; lugillantur: sæpèq; diutius immorante ueneno putrescentes defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ potis cantharidibus. Pecuiliaria uero remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle liquidum, & aiugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urtica quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. profunt etiam oua testudinis marinæ aut terræstris, coctat item ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

## Ephemerum.

## Caput V.

**S**umpto ephemero, quod aliqui Colchicon, aut syluestrem bulbum appellant, spriritus in toto corpore excitatur, nõ secus atq; ijs qui urtica aut scilla lacesuntur. interna rosionem sentiunt. stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. cæterum inualecente morbo, cruor strigmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus, ut ijs qui salamandram hauserunt, uomitione aut clysteribus auxiliari cõuenit. sed antea quàm uenenum inualecat, dandum est decoctum frondium querqus, aut glandiũ, aut mállicoriũ. lac bibere prodest, in quo serpyllum sit decoctum. item succum sanguinalis herbæ, aut ramorum uitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut myrti cũ uino: bacca autem myrti tulsæ tritaq; & aqua macerata, ut liquor inde sumatur, opem ferunt. media castanearum tunica, similem effectum præbet, si cruda in aliquo supra dictorũ succo sumptitetur. origanũ quoq; cum lixiuiopotum. eximie iuantur asinini lactis aut bubuli calidi potu, etiam si in ore contineant: ita ut quibus copia lactis huius adsit, non aliud desideretur.

## Dorycnium.

## Caput VI.

**D**orycnion, quod aliqui manicõ solanum appellant, epotum, lactis saporem in gustu refert. continentes singultus ciet, humor linguam uexat, sanguis confertim reijcitur. mucosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaq; antequàm aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, uomitus, clyster, & quæcunq; potum uenenum expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua mulsa, lac caprillum, aut asininum, dulce uinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amara, gallinacea pectora decocta. quinetiam conchyliã omnia, tam cruda quàm tosta esse salutare est. conueniunt & locustæ marinæ, & gammari, & pota eorundem iuscula.

## Aconitum.

## Cap. VII.

**A**conitum statim in lingua inter bibendum, cum astrictione quadam dulcescit: & subinde, potissimum cum exurgere conantur, uertigines offundit. lachrymas ciet. grauitatem pectori, & præcordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare uenenum uomitiõ abigi aut clystere per aluum egeri opus est. utimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, uel absinthij decocto, cum uino absinthite, uel semper uiuo, uel abrotono, uel chamelcæ, aut aiuga. prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, & quis ponderibus ex uino, coagulum hædi, leporis, aut hinnuli, cũ acetõ. ferri quoq; sterces, item uinum in quo aurum, ferrum, argentum candens restinguatur, potum, lixiuiq; cum gallina & uiuo decocta, aut carniũ bubularum præ-

Nn



iura, cum uino sumpta fertur & aiuga priuatim ipsis subuenire,

Mel Heracliae.

Cap. VIII.

**M**el in Heraclia Ponti, ubi aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt bibuntque, non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. lis eadem quae potio aconito conueniunt. adiuuantur in primis continuo uini mulsi potus, cui ruta folia sint adiecta.

Coriandrum.

Cap. IX.

**C**oriandrum ob odorem laterenō potest. epotum autem uocem exasperat, infaniam adfert à temulentis non abhorrentem. qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore, uenenum fatentur. Quibus post uomitionem irino oleo cōcitata, uti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum, auxiliatur. item oleum. nec secus oua in eodē exinanita, si liquefacta \* in muria sorbeantur. & epota muria, & ius falsum ex gallina & anse, passum quoque cum lixiua sumptum.

Plyllium.

Caput X.

**P**syllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & mero re quodam affert, ita ut animura despondeant. Cui omnia quae ex hausto coriano auxiliantur.

Cicuta.

Cap. XI.

**C**icuta pota uertiginem excitat, oculisque caliginē offundit, ita ut ne minimum cernatur, singulus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur, denique conuulsi, suppresso arteriae spiritu, strangulantur. Quare inter initia, uti in reliquis, cicutam uomitu excutiemus. postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, ex cernamus. tum demum in meracam potionem, quae maximo est auxilio, deueniemus. repetendum per interualla, in quibus proderit lacasinum, aut bubulum potui datū, aut absinthium cum pipere & uino, castorio, ruta, mentha cum uino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, \* aut piperis cum semine urticae & uino, aut lauri folia. item laser ex oleo & passo, & passum per sese largius potum proficit.

Taxus.

Caput XII.

**S**milax, à quibusdam tithymalum, à Latinis taxus appellatur: frigus uniuerso corpori, stragulat, & celerē interitū infert. Cui eadē quae cicute conueniunt.

Carpasi succus.

Caput XIII.

**E**potus carpasi succus soporem, citamque strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotae cicutae remedijs.

Sardonía herba.

Cap. XIII.

**S**ardonía ranunculi herbae generi assignatur, quae uescentibus mentem adfermit, & quadam neruorum distentione labia in rictum contrahit, ut risus speciem praebeant. à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagiū in uulgus infansito omine manauit. Post uomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberius epota, irrigatio, perunctioque à pinguibus medicamentis, totum corpus excalfacientibus. in calidam aquam oleumque descendant. sed tum multū perfricare & inungere expedit. & in summa, curam omnem, quae conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoscyamus.

Caput XV.

**H**ioscyamus potum aut comesum, similem ebrijs ab alienationem mouet, sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacque, praesertim asinum. si id desideratur, caprillū, uel bubulum, uel aridarū ficuum decoctum. faciunt ad id etiam nuclei pinei, aut cucumis semē ex passo sumptum. & uinum falsum cum adipe suilla recenti, passoque: itidem urticae semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, & nasturtium, radix, cepa, & allium.

& haec



& hæc singula cum uino sumantur: \* postea finendi quiescere, quemadmodum  
qui uinum biberunt, ut excoquant, \* Alij, post  
quiescant, uinum conco-  
quantur.

## Mandragora.

## Cap. XVI.

**M**andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac uehemens  
ueternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequam aliquid ex ijs ac-  
cidat, uomitus & aqua mulsa proderit. postea nitrum & absinthiū, ex uino dulci  
aut passo sumatur. caput rosaceo & aceto pfundatur, proficit excitatio, & motus  
corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorii, & rutæ, tritorū in ace-  
to: & liquidæ picis, & odor è lucernarum exustione & extinctu, quod si agrè ijs  
reuocentur, sternutamenta mouere, alijsq; communibus auxilijs ut conueniet.

## Meconium.

## Cap. XVII.

**E**po papaueris succo, quæ meconion uocant, consequitur ueternus cum per  
frictione & pruritu uehementi, ita ut sepe inualecente ueneno, tanta eripat  
prurigo, ut hominem excitet. corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo  
uomitionem, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut  
mel cum rosaceo calido, merum cum absinthio aut cinnamomo copiosum, aut  
calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo, &  
rutæ syluestris semen cum pipere, uino, & panace: piperq; cum castorio & ace-  
to mulso, uel cum saturiæ aut origani decocto cum uino. hi olfactilibus exci-  
tandi. ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. post laua-  
cium prodest iurium pinguium usus, cum uino aut passo. medulla etiam ex oleo  
pota.

## Corniculatum papauer.

## Cap. XVIII.

**Q**uod corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferrecō  
suevit, quæ papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

## Pharicum.

## Cap. XIX.

**Q**uod Pharicon uocāt, sapore syluestre nardum imitatur. Resolutionem  
neruorum potum affert, cum conuulsione & delirio. Oportet autem post  
uacuationes uinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut  
nardo gallico, quod serinen aliqui uocauerunt: aut spicæ nardi duas drachmas,  
& myrrhæ totidem obolos, cum passo, aut irim cum croco ex uino, derasumq;  
caput illinire hordeacea farina cum aceto, & trita ruta.

## Toxicum.

## Cap. XX.

**T**oxicum ex eo nominari uidetur, quod barbarorum sagittæ eo illineban-  
tur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflammatione torquentur. incoercibilis  
furor uarias ijs imagines obuersat: quare uix medicinæ locus est: raroq; qui  
hauserunt, euadent. Vinculis ergo cohibendi, ut uinum dulce cum rosaceo bibe-  
re, & reuomere cogantur. rapi semen bibendum cum uino. Priuatim ijs conenit,  
quinquefolij radix, & hircinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. ro-  
boris, fagi, aut ilicis cortex cum lacte tritus. malaq; trita esse, aut cum pulegio  
& aqua bibere, conueniet. amomum & balsami semen ex uino. Sed qui pericu-  
lis defuncti sunt, diu lecticis decumbunt, & ubi surrexere, stupidi reliquum  
tempus degunt.

## Ixia.

## Cap. XXI.

**I**xia, quæ ulophonon appellatur, inter potā dum aliquid ocimo simile gustu, &  
odore redolet. uehementem linguæ inflammationem excitat, mentem mouet.  
omnes excrementorum exitus suppressit. strepitum cum animi deliquio ciet. ijs  
intestina latrāt, nec egeritur quicquā. Post uomitionē aluiq; resolutā, auxilium  
præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex uino largiore, aut aceto mulso  
pota. rutæq; syluestris semen, aut laseris radix. itē tragorigani decoctum, cū  
aliqua supradictorū, aut lacte, aut resina terebinthina\*, aut nardo, aut castorio,  
aut laserpitio, quum singuli oboli conueniunt. quin & nuces iuglandes ex uino, \* Abirgna.



cū resina, castorio, & ruta trite, ita ut singula drachmę pōdus equent. itidem chamelę aut thapsię aut absinthij succi sicilicus cū aqua mulsā. & acetū calidū potū.

Cerusa.

Cap. XXII.

**C**erusa suo colore proditur. sumpta enim, mox palatum, gingiuę lingua, & commissurę dentium, candore quodam inficiuntur. singultus, tussim, ac lingua ariditatem ex citat. ijs extrema frigesunt; mens labat, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficuum aut maluę decoctum, aut lac calidum, aut sesamam ex uino tritam, uel lixiuiam ex sarmentis factam. amaracium oleum aut irinum. persicorum ossa cum hordei \* decocto. columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod ulmus plorauit, aut humor quem ulmea folia reddiderunt, cum tepida aqua. sed tum quoq; uomant. conuenit etiam thapsię succus, aut scammonia, cum aqua mulsā potus.

\* Lili.

Fungi.

Cap. XXIII.

**F**ungorum alij genere, alij copia lædunt. omnes tamen strangulationis suspensio similes cōcitant. Quibus confestim succurrendū. cōmuniter ex oleo uomere cogendi. mirificē iuuat lixiuia ex sarmentis aut pyrastri furculis, epota cū sale, posca & nitro. fructus, aut folia pyrastri cum fungis decocta, strangulantem illam uim auferunt, esitataque eisdem auxiliantur. aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma. item absinthium cum uino melleq; sumptum, & ex aqua potum. apiastrum ex nitro. panacis radix & semen in uino. fex uini cremata cum aqua. atramentum futorium ex aceto. radix, uel sinapis, aut nasturtium esu profunt.

Gypsum.

Cap. XXIII.

**L**apidescens gypsum strangulationem creat: quare eadem proferenda sunt, quę manis fungis, auxilia. ad hęc maluę decoctum, quod etiam olei uicem pensat: utpote cum pingue sit, euomendūq; lubricas uias & faciles reddit, deradi corpora non sinit. quod ubi duratur in lapidem, gypsum efficit. quin etiam prodest oleum ex aqua mulsā, aut ficorum decocta. lixiuia ē ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum uino copiosiore pota, origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo. hiq; decocto maluę proluendi.

Sanguis taurinus.

Cap. XXV.

\* Conuulsioe

**T**auri recens iugulati sanguis, epotus, spiradi difficultatem strangulationisq; concitat. faucium tonsillarumq; meatus cum neruorum distentione \* praecludit. lingua rubescit. dentes inficiuntur. quędam concreti sanguinis uestigia, inter eorum cōmissuras restant. quare uomitum uitabimus. sanguinis enim globi attractu illo in sublime relati, magis gulę inculcantur. Dari ergo opus est quę concretum sanguinem discutiunt, aluum subducunt. grossi lacteo succo turgent ex posca, & nitrum per sese, auxiliantur. necsecus coagulum omne cum aceto & laserpitij radice, aut lasere. itidem & brassicę semen, ē cinere ficulneo lixiuia. conyzę folia \* cum pipere, & rubi succus ex aceto. alius resoluenda. ijs q; feruantur, stercoreosa & fluida per sedem egeri consueuerunt. stomachum aluumq; hordeacea farina ex aqua mulsā perungere oportet.

\* Semina.

Lac coagulatum.

Cap. XXVI.

**E**os qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sæpius cogimus. damus & calaminthę folia arida, item succum. aut laserpitij radicem, aut laser cum posca. thymumq; ex uino \*, & cum luto suo lixiuiam. Sed nulla falsilago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neq; illos uomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gulę angustias insinuans, strangulat.

\* Aceto.

Argenti spuma.

Cap. XXVII.

**S**puma argenti pota, stomacho, uentri, & interaneis grauitatem cum magnis torminibus



torminibus adfert, & nonnunquam pondere suo intestina uulnerat. urinam super primit corpus intumet, plumbeamque deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum uomitionem, potu syluestris homini semen, myrrhe drachma octo, absinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex uino, aridum palumbis simum, cum nardo & uino.

## Argentum uiuum.

## Cap. XXVIII.

**A**rgentum uiuum potum eadem quæ spuma argenti infert, eisdemque utendum auxilijs. lac copiose potum auxiliari constat, sed postea euomant, qui hauserunt.

## Calx, sandaracha, auripigmentum.

## Cap. XXIX.

**C**alx, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum & intestina cum uehementi erosionem excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluunt, & facilem lubricamque aluum reddunt, cuiusmodi ibisci & malua succus est. natura enim utriusque perlubrica. dandum decoctum feminis lini, uel semen tragi herbae, uel orizæ, lacque cum aqua multa copiosum, iura pingua, & boni succi.

## Lepus marinus.

## Cap. XXX.

**Q**ui leporem marinum biberunt, piscium uirus olent: procedente tempore, aluus dolore afficitur. urina sistitur. etsi quando eam reddere contingat, purpureum colorem referet. omne piscis genus auersantur & odio habent. fetido ac graui sudore manant. biliosus uomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, uel passum continuè, aut radices malua foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum uino, aut ueratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua multa, punicique mali acinis. cedria contrita cum uino efficax est. anserinus sanguis, ut tepebit, potus, sed cum pisces omnes respuant, aspernenturque, solis fluuiatilibus caneris uesci possunt, bibuntque eos admissio uino adiutisque ab his percoquunt: cumque appetere & comesse pisces ceperint, suæ salutis indicium habent.

## Rubeta et palustris rana.

## Cap. XXXI.

**R**ubeta aut rana palustris assumpta tumores ciet. pallor corpus uehementer decolorat, ut planè buccum spectetur. spirandi difficultas torquet, & grauis halitus oris, singultusque. inuita interdum genitura profusio consequitur. Adipuantur secundum uomitionem multo meri potu, & arundinis radices binis drachmis, aut cyperi totidem. breuiter, cogendi sunt ut uehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem quo corripuntur, quinetiam quotidie lauandi sunt.

## Hirudo.

## Cap. XXXII.



**D**e uorata cum aqua hirudines, si ori uentriculi adherent, tractione partis nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, & Cyrenæicus succus, aut lasepici folia, aut betæ, cum aceto, aut pora niuis glebula, cum posca. nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hærent, in cætra lupinorum farina\*, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exiliunt. Prouidenda etiam ijs quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur, non minora tamen cæteris uenenis pericula sepius adferant. Qualia sunt albi ueratri, thapsia, elaterium, agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus concitant, aut immodicas

\* Alij. de fecen

Andu est m

solum cal

Aum.



modicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. nimios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coercemus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere uidentur, interim uerò uitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt syluestris ruta, (nouæ glacies\*), pappi recentes: flores autem sunt eius spinæ quæ cactos dicitur. Eos qui sumperint, sola uomitio recreat.

\*Addititia  
uerba.

Domestica nobis.

Cap. XXXIII.

**A**qua frigida abundè pota, aut meracum uinum liberalius epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut uehementi exercitatione, strangulatus & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & uacuatio, imminetia soluunt pericula. Sed de notis ueneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclarè auxiliantur, quibus utimur, quale Mithridatium est præsertim, & quod sanguine, & quod scinco temperatur: uerum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione superfedemus.

Venena.

Cap. XXXIII.

**D**E bestijs quæ uirus ei aculantur, & exitiilibus uenenis, ideo scribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicum perducatur. siquidem pars hæc non minus quàm cæteræ aliæ, necessaria est ijs qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum quæ inibi traduntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conueniat. Hæc autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatum est, distribuitur. Nam qui de feris uirus inspuentibus sermo disserit, theriacus dici solet: qui uerò de animalibus ueneficjs, alexipharmacus: quo prius tradito, simul quæ sequi signa consueuerunt, præmonstrabimus: tum quæ non nihil auxiliij ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere artificem oportet, propter urgentem sæpenumero necessitatem. siquidem pauca è uenenis & uirulentis animalibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita ut dilationem admittant: pleraque uerò præsentaneam perniciem afferunt. Hominum autem partim male alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficium ita temperant, ut spacium curati liberum non relinquunt: partim sceleris admissi conscientia, aut tristitia aliquo euentu oppressi, hausto sponte ueneno mortem sibi consciscere conantur, qui postea deprehenfi, aut resipientes, & uitæ cupidi, præsentaneam opem poscunt. Non desunt q; hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluentes, certam & ineuitabilem aduersarijs perniciem moliantur: in quibus ipsis etsi maleficium nõ subitò, sed aliquanto post grassari natura sua comparat est, tamen nisi primo quoq; tempore coerceretur, & remedijs subinde excipiat, frustra tandem succurritur, occupatis iam corporib. exitiali ui ueneni. Proinde non uulgari industria diligentiaq; in ea re utendum est, ut quod in alijs incommo dis ars consueuit, in his quoq; salutem mortalibus præbeat. Quin & apud præcos genus hoc unum existimabatur esse eius partis, quæ medicamentis pugnat: sed recentiores id ipsum discreuerunt, nominantes præcautionem, & modum præcautionem, salubris sanantisq; medium statuantes, parua & leui supra modum persuasione decepti. Siquidem treis in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. unam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra ualitudine corpora laborant: tertiam quæ medium inter utrasque locum sibi uendicat, in qua positi, sanitatem specie mentiuntur, facileq; in morbos & pericula concidunt, ob uim corrupticem, quæ corporibus nostris incumbit, quemadmodum in ijs uidere licet, quos excandescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoq; qui cantharidas hauserunt, sed nondum urina tormento cruciantur. Tripartito igitur artem digeri, tripliciq; corporis constitutioni merito respondere tradit. Salubre partem esse uoluit, quæ sanitatem tuetur præcauentem, eandemq; prohibentem, quæ obstat quæ minus in morbos incidunt: et sanantem, qua uitia discutitur. Quib. ita responderi potest, quod primò ex ista ratiocinatione nõ treis corporis tantum



tantum, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset, quippe ut aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maxime ob impendentem causam sunt obnoxii: ita sunt, qui iam priore morbo defuncti, nondum tamen secundae ualitudini restituti sunt: id quod in his qui à morbo proxime sese recolligunt, cerne-  
re licet, quod uirium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentaria pertinet, ita præcautionem eidem subijci par est. Ad arcendas. n. ualitudines uehementibus, utimur auxilijs, altiore sacrificatu, uisionibus, amputatione, derodontibus epithematis, potionibus, perniciem occurrentibus, & plerisque alijs. Verum enim uero sunt usque eò rudes nonnulli, ut ne remedia quidam appellent, quæ morbos arceant. Cuius sententiae inire rationem haud prom-  
ptum est: etenim cum uerbum ipsum, præcauere, tum agendi modus, omnino auxi-  
liarè remediariq; uim præseferunt. Mirum uero nisi etià sua illa distributiõe par-  
tium eos cõplectuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo nondum correpti sunt, pesti tamen, propter obuersantis aeris occasionem, opportuni, & in morbum pro-  
ni redduntur. Dicere forsitan quis posset, salubris institutionis præcepta non aliud esse, quàm arcendorum morborum rationem: quippe cum firma reddere corpora, & minus uitij obnoxia nitamur, ut inoffensa ualitudine degant, nec morbis confliscantur. Neq; id silentio prætereundum, quod maxime præcipuum, & tanquam caput rei est, non oportere medicinæ partium distributionem, toti-  
dem corporis constitutionibus, respondere, sed naturas singulorum suis notis seor-  
sum scrutari ac explorare, ut suis locis ostendimus. Cum his igitur non pluribus a-  
gendum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui à uirulentis animalibus ue-  
nenisq; contrahuntur, uocari cæcos, id est, quorum ratio minimè iniri potest. Quin  
& ea quæ eisdem auxiliantur, nulli pariter sunt addicta causæ: quapropter quæ-  
stionibus obseruatoriæ artis, & eius quæ ratione fulciatur, annumerari solent.  
Neq; prorsus uerum deprehenditur, affectus huiusmodi cæcos esse. Nā quod sem-  
per se protrahit, et nullum in quibusdā necessarijs usum exhibet, haud facili con-  
iectura colligi potest: etsi naturæ proprietate prorsus cæcos eos affectus con-  
cedimus, qui ab exitiabilibus uenenis, & animantibus quæ uirulento morfu sæuiunt,  
contrahuntur. Nā quod ad opus uonnullum usum præbet, datq; medendi occa-  
sionem, neq; imperceptibile, neq; cæcum, nulliue causæ obnoxium reputatur:  
sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de  
abditorum cognitione confirmare poterit. Nā etsi sepe minora sunt, quàm ut sen-  
sibus percipiatur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Dio-  
cles autem in eo cõmentario quem Plutarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad  
uerbum ita scribens: Nosse quod hoc potest cum in alijs non paucis, tum in uiperis  
& scorpionibus, & reliquis id genus, se cum animo reputans, ut quamuis exiguo  
sint corpore, uixq; conspectui subijciantur, magnos tamen discriminum ac do-  
lorum causas inferunt: quum nihil præter quandā corporis exiguitatem, uimq;  
præ cæteris animantibus datā illis, facile fuerit spectare. quanta. n. ea moles cor-  
poris est, quæ à scorpionis ictu, & aliorum id genus uenenatorum quæ nos morfu cõ-  
ficiunt, attingitur: quorum aliqua uehementes cruciatus excitant, alia erodunt,  
& putredines cient, nec defunt quæ præsentaneā perniciem moliantur. aut quan-  
tulum est quod à phalangij morfu ingeritur, & uniuersum corpus ex cruciatu neq;  
enim quod magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mo-  
le content. Ergo quod hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes, uerum  
quod exactè deprehensum sit, uim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ infi-  
nuata corporibus molestiarum quæ exoriantur nobis causa sit, in confesso est,  
& omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur usque adeo conten-  
tionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueret, quàm à materia  
mortifera partem corporis attingente. Porro id erat quod inter utilia artis ope-  
ra in omni opere dicere oportuit, quænam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus  
nos lædat, incomprehensa communis causæ quæ proprijs inest ratio: quando-  
quidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus em-  
piricorum pertinaciam graui cauatione incessens, cæcis affectibus causas  
assignauit.



assignauit, inficiatus his cōmunem & supremā morborū causam incomprehensibilem esse: & hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissimē prodidit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, ut in uenenis, serpentium ictibus, & ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. neq; satis facturam sibi obseruationem eam, quæ à causarum cōprehensione separata est. Primum. n. genere comprehendere faciliē possunt. Quod autem sit letifera uis, corporaq; permutans, ita ut perimat, ex ijs quæ per genus, non per speciem uagantur, curationem indicat, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cum uerò subiungit: Ad aquam dulcem & potui idoneam uenit quis, & ante obseruationem ad uomitum, ad uulneris dilatationem, ad demorsus partis suctum, eueurbitulas adfixit, partem incidit, urentia medicamenta, aut ea quæ uim eandem adipiscuntur admouit, postremo partem amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summam cutim ferre & applicari solita, immisere ad intima pernicipi repugnant. Hæc itaq; quæ disseruit Erasistratus, ueritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam uim corporibus illapsam, negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffidentur. uerū rudiūculū nomini attendunt. Nā apud ipsos palām immissa uis φθοροειδής, id est, mortifera, nominatur: φθοροειδής autem nullius officij alius esse potest, quā causæ. Aiunt hæc nomina, μάρσιππος, & ἀνακαλύψης, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum non pro uirtute, sed nuda enunciatione comprehenduntur. Enimuero quemadmodum in his uocibus μάρσιππος & ἀνακαλύψης, partes neq; certos neque principes retinent significatus: sic in hoc uerbo φθοροειδής partes productionis gratia, non pro uirtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantq; causarum aliquas euidenter esse, quæ dum aduersam ualitudinem creant, separantur. cuiusmodi sunt frigus, labor, estus, & similia: quasdam continentes, quæ permanent postquā morbum excitant, hoc est, quibus præsentibus, & effectibus eorum adsunt. in crescentibus, affectus augentur: decrescentibus minuuntur: & cum desinunt, idem finitur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoq; ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropœon subijci potest. Euidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit quemadmodū accidit ijs, q̄ à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neq; euidens à nulla causarum differentia phthoropœon deducere possumus, consequitur, ut neq; causam esse fateamur. Quod autem asserunt, uocabula quædam in se non habere partis rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione ficta esse, fateri necesse est. Verū non omnia, sed per pauca talem nancisci conditionem existimandum est. neq; enim ποσεις in hoc nomine φθοροειδής perinde atq; assumptitia profertur, sed longè principem obtinet significationem. Quemadmodum enim φθοράς, id est corruptionis, nomen mutationem in peius significat, sic hoc uerbum ποσεις sumi debet, ut nihil amplius ex eo qd hanc dictionem φθοράς secum habeat declaret. neq; prorsus id significat, quod omnes palām audiunt, & huic simile redditur, πᾶσι ἐχέει δόλος. Si dant à corruptione sanis, fieri morbum, concedunt utiq; uim in huiusmodi uerbo ποσεις subesse, siquidem aliquid est quod corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quæ corporibus subijciuntur, idq; tam in letalibus uenenis, q̄ in ijs quæ corporibus ingeruntur. Verū non nihil subiacere causarum differentijs produnt. Quinetiam aberrarunt, nō exactam diuisionem assumentes. Qui uerò se dogmaticos profitentur, causam esse partim præparantem, partim continentem asserunt: ut inguinum ulcus, & inguinariam febrem, & quæ effectui tum assistat, tum etiam separatur, ut à fractis precipitatio. In summa, q̄ries quippiam suapte natura causa fuerit, nec ulla diuisione comprehenditur, uitiosum est, neq; causæ adscribitur, eorum quæ idem genus fortiuntur. Sed quod phthoropœon, causa sit, nomen ipsum



ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpentibus ictum, quàm ex animante uim, & illapsum in corpora uirus? Neq; enim frigus, neq; æstus, neq; sectionem corporis, neq; crudelitatem, neq; aliud quicquàm simile causari possunt. Verùm quoniam causarum differentijs gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, utroq; istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continentem uerò, quod morbis præsentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæcenus. Statuendum itaq; mortiferam uim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, uarijs modis est certandum, donec uis tota corporibus excutiat. modò enim reuocari debet ea parte quæ pestis intrauerit, modò aliqua alia, præsertim principatum non obtinente, antè coercetur, quàm altius irrepens uiscera tagat, aut eius pernicies eluatur, retundaturq; cum iam membratim peruagatura est. Itaq; uenena si hausta sunt, crebris uomitionibus: si morfu impressa, i scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremæ partis, euocantur: retinentur uerò infusione, & impostu medicamentorum acrimia cohibentur. hæc simul utique arcere uirus & eluere possunt. Restinguuntur & euincuntur meracior potu, aut passo nulla aqua diluto, uel contrarij orum esu, quæ acrimonia sint prædicta. Postremo deiectione alui, euocatus sudor, & alia quædā in commune, quæ membratim demonstrabimus, auxiliantur. Verum enim uero non letiferam modò materiam, sed & magnitudinem, & tempus, pro scopo considerare oportet: etenim ab ijs remedia quæ plurimum discrimen capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex uenenis, & uirosis animalibus pericula minantur, alia putredines altas aut exteriores excitant: alia uehementissimos dolores aut cæcos cient: alia uix medicamenti cedunt, & magis minusue molestias excitant. Oportet autem ea quæ pericula ferunt, per uicacioribus auxilijs expugnari: & minus infesta, mitioribus. Quippe absurdum fuerit in grauioribus, seignioribus medicamenti homines in discrimen adducere: in minoribus uerò, uehementium auxiliorum iniuria corpus laessere. Finitio à temporibus in promptu est: hoc enim subito in pericula & præsentis molestias adducit, illud uerò sensim & dilatas in diem longam aut breuiorem producit. Itaq; in acutis quidem confestim multa simul auxilia representari oportet: reliquis, paulatim. Hæc quædam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim rem prosequamur.

Signa rabiosi canis, & demorsorum ab eo. Cap. XXXV.

**D**E rabiosi canis morfu sermonem alijs præposuimus, quod id animal domesticum ac frequens esse consuevit, & in rabiẽ sapius agitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile. inde periculū inuitabile hominem manet, nisi multis utatur auxilijs. Canis plerunq; flagrantissimis æstibus in rabiem efferatur: interdū quoties frigora incefferunt. Rabiosus autem potum & escam auersatur, largam spumantemq; pituitam naribus & ore proijcit, toruẽ & solito tristius intuetur. in omnes passim sine latratu irruit, equẽ feras hominesq; tã familiares quàm ignotos mordet, nec protinus infestum quidquam insigit, nisi, ut uulnus, dolorẽ. exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus graia est, uoce appellatus, contrahitur. Euenit autem cum distentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quodam aliqui auræ splendorem fugiunt, alij sine ulla doloris intercapedine uexantur. Sunt etiam qui canū more latratus edant, & obuiam factos morfu adoriuntur, ac mordendo simili uitio labefactant. Proinde ex ijs qui hoc uitium senserint, neminem seruatum uidimus, nisi forsitan ex historia unum aut alterum euasisse audiamus. siquidem Eudemus superasse quemdam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse & euasisse fatentur. Alij ipsum cum amico aquam expauescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia similem contraxisse affectum:



sed post post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaque genus morbi, à quo multos, antequam ipsam experirentur, uindicauimus, & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorsorum à cane rabioso Cap. XXXVI.

**R**atio medendi duplex. una cōmunis, qua utendum in omnes morsus, quos uirulentæ animantes impresserunt. alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit, alijs uerò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus, deinde cursim perstringemus quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles in sarmentis albæ uitis cremare oportet, & cinerem eorum quam minutissimè tritum habere reconditum. itidem gentianæ radicem tusam cribratamq; reponere. quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci uini, bina cineris cancrorum cochlearia, unumq; gentianæ conijciantur. hæc in polentæ dilutioris modum subacta, quatr duo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. atqui si ab illato morsu bini terniue dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Optimum hoc aduersus rabiosorum morsus auxilium, quod & plerisq; nnum satisfecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut alijs etiamnum auxilijs contra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satiùs autem multò fuerit etiam si in unum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiam in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali maiora uulnera uereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia quippe maiori uulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil uirulentis liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à maioribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia à cic scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut uulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis uacuatio arceat, ne uenenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id iuuamentum præstant, ut ueneni uis extrahatur. Contra uirulentos ictus, uisio expeditissimum est auxilium, utpote cum ignis cætera uiribus præstet, simul quod uirus domet, & ferri penitus non patiatur: simul quod pars ignem experta, postea non uulgare fundamentum curationi futuræ præbeat, manente diutius exulceratione. Adinaduertendum ex eo tempore cum crustæ decident, ne ulceris oræ coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multum, idq; præstitutum tempus, ulcerationes & sordidas adhuc & inflammationem minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs salsamentum optimè præstabit, & syluestre allium detritum, item cepe, succusq; præsertim Cyrenæicus, aut qui Medicus, aut Parathicus appellatur. tritici grana tam mansa quàm non mansa imponantur, siquidem subacta pistaue à perfusione uulnera dilatant. Sunt qui à mandentium ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur, quod suapte natura resistat. Verum id certum non est: cæterum tempestiuus eorum usus minimè est contemnendus. Si uerò, quod persæpe accidit, ante dies præfinitos cicatrices coirent, committerenturq; manum postulabunt: namq; eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterum inurere, expedit. Vbi uerò propositum tempus præterijt, ulcus addendus, nec multo post sinapismo utendum.

Ratio uictus in morsu rabiosi canis. Cap. XXXVII.

**Q**uæ ad partem ictam pertinent præsidia, ita se habent. Cæterum uictus rationem ex ijs quæ ueneno aduersantur, coniectura quadam colligere oportet, simul ut ueneni uires hebetet restinguatq; simul ut arceat, quo minus ad intima perniciēs illabatur. Etenim assumpta perniciosarum uirium penetrationi resistunt. Quorum utrunque præstare potest uini meracioris, palsei, & lactis potus, quippe q hæc omnia capiunt ad curā, nonnihil ueneno obijciunt, qd omnia



omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo aliorum, porrorum, ceparum<sup>a</sup> que cibus, quod ea difficulter conficiantur, uixq; aboleantur. nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permittuntur a mortifera ui, sed contrarijs illa uis expugnatur. Cui rei antidotorum usus accommodatur, & theriaces, Mitridati, & eius quod eupatorio temperatur, deniq; omnium quæ magnum aromatum partem sibi uendicant. quippe aromata omnia uiribus & substantijs ægre permittuntur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nosse conuenit, pauorem aquæ non statim definitoq; tempore exoriri, plurimum tamen ad quadragesimum usq; diem neglectis differri consuevit, post semestre etiam nonnullos inuadit, quendam post annum aquam horruisse constat, quæ nobis uisu comperta fuere. Narrant & aliquos post septennium aquæ metu fuisse tentatos. Inter principia demorsorum a carne rabioso curandi ratio talis est. Verumenimvero si ea quæ retulimus auxilia, primis diebus prætermissa fuerint, nec scalpro carnem circinare, nec ustionem experiri oportet præcipuum est. Non enim quod iam pertransijt, satis euocare possent. Nulla utiq; istius rei occasio aut utilitas, sed incassum corpora doloribus sternentur. Alter uero curationis modus accedat. deiectione magnum præbet iuuamentum, ut pote cum mouendo, corporis habitum transmutet. & quæ colocynthidem recipit hiera, item lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & uenenum domare possit. cibi cres, & meraculi potus, quibus uis ueneni uehementer rerunditur, quotidie sumi debent ceteri sudores ante cibos, & post etiam ciendi. dropacismi sinapismi q; alternatim per corpus totum adijciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia non semel atq; iterum, sed frequentius ante quadragesimam diem, uel post hoc tempus uti licet. Tantam enim uehementiam hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, fuerint seruati. Nā & iam uitio tentatos nemo unquā seruire potest. Itaq; primum curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ uenenatis morsibus seruire consueuerunt, transeundum. notas uno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. cursum deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Postremo subnectentur etiam uenenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Notæ eorum qui a uenenatis demorsi sunt. Cap. XXXVIII.

**D**emorsus a phalangijs locus quidem ipse, quasi ab impactu aculeo ruber, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed mediocriter humescit, <sup>\* Rubescit.</sup> ubi uero contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore toto tremor, distentiones popliti & inguinum, conuulsionibus non dissimiles. in lumbis collectio exoritur. perpetua urinæ libido la cessit, multa q; reddendis excrementis colluctatio. uniuersa cute frigidus sudor emanat. collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. Si scolopendra aut dicta ophiostene, morsum intulit, locus per ambitum liuore suggillatur, & computrescit: interdumq; licet raro, faculentus atq; ruber cernitur. a morsu ipso exulcerari locus incipit. ulcus id negotium exhibet, ferè remedijs inuictum, præterea toto corpore prurigo sentitur. Scorpio nis morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intentus rubet, uicissimq; dolore premitur. modò si quidem exaestuatur, modò frigore occupatur. labor repente fatigat. aliquando meliusculè habet, aliquando recrudescit. consequitur sudor, horrores sensus & tremor. extremæ corporis partes refrigescunt. inguina extolluntur. per sedem flatus exeunt. capilli eriguntur. pallor membra de colorat. dolor, tanquam ex pungente acu, per uniuersam cutem sentitur. Si marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidue conuulsionες, lassitudo, & imbecillitas. mens percussis labat. postea obmutescunt. oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum uicinis partibus denigratur, & ita obitupescit, ut tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies, crassa & malè



olens excernitur. Amure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens, exurgit. proximæ partes liuent. rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. intestinorum quoque tormina, difficultas urinæ, & frigide asperginis offusio consequuntur. Si uipera momordit, corpus intumet, uehementer arescit, subalbidumque colorem concipit. sanies à uulnere profunditur, primum subpinguis, mox cruenta. pustulæ adustis similes erumpunt: & antea depascens ulcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis, sed intima quoque corripit. gingiua ipsa cruore suffunduntur. inflammatio circa iecur erumpit. tormina & biliosi uomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinæ difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. Consimilia eueniunt ijs qui à cecilia nomine, aut amphibæna demorsi sunt, eademque ferè auxiliantur. quare hoc uenenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque uisum est dignum quod alio genere comprehendatur. A dryino morsu pustulæ molestique dolores incidunt, præsertim quæ dilutæ saniei emissarium subest. quinetiam erosio, torminaque consequuntur. Ab hæmorrhoo ictus uehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. ex plaga copiosus cruor effluit, & quacunque parte corporis cicatrix ulla fuerit, ea sanguine emanat. excrementa per aluum cruenta eiciuntur, profluensque sanguis in globo cohit, à pulmone sanguinem extussit, & in uomitiones effusus sine remedio commoriuntur. Quos dipsas percussit, solutus ac non confrictus tumor premit, sitisque usque eò pertinax, ut satiari non possint, ac sine ulla intercapedine excrucietur: & si potum pleno ore assatim trahant, illico in eandem sitim relabuntur. proinde toto habitu similes sunt ijs qui antea potus nihil hauserint. quare propter continuam sitim, & prester, & causer, aut dipsas appellatur. Ab natrice demorsu ulcus dilatur, & liuidum ac ingens euadit. sanies ex eo multa, & atra, & male olens, non secus atque ipsa quæ serpunt ulceribus, expuitur. Cenchri morsum, qui uiperino ictui similis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea, ut in aqua inter cutem, prætumidæ, defluunt. lethargo corripuntur, & ueterno pressi somnos captant. Erasistratus eos iecinore, intestino\*, coloque confictari autor est. Quippe dissectis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiuntur. A cerasse percussis locus attollitur, cum duritia pustulosus. è plaga sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed toto concretu uaricosus intumescit. genitale intenditur. mens labat, oculorum caligo exoritur, denique rigore distenti commoriuntur. Ab aspide ictus, uulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur. sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat. caligo uelox oculos obnubit. labor in totum corpus multiplex, omnino leuis & non sine uoluptate consequitur. ideo Nicander perpulchrè cecinit: At uir perit absque labore uirens atque discolor. mediocris stomachi dolor afficit. frons perpetuò reuellitur. genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno uacillant: hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Erasistratus in libro quem de medicamentis & uenenis condidit, de uocato basilisco scitè ita refert: Cum basiliscus morderit, uulnus ad auri colorem efflauescit. Itaque in plurimis quæ uirus eiaculantur, comites notæ ita se habent. Transeuntes utique ad medendi rationem, primum, ut fieri poterit, de communibus differemus.

\* Vesica:

**Communis curatio in omnes ictus uirulentos. Cap. XXXIX.**  
**A**duersus quidem omnem animalis ictum, quod uenenum uibrat, oris sumptio continet. fugentem uerò oportet ieiunum non esse, sed & cibum sumpsisse, & uino os abluisse. postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. locus ipse spongia fouendus, deinde scarificandus. sed ulcuscula altius imprimere expedit, quo uirosa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potèrius opitulantur. namque ab ijs duo peculiaria præsidia sunt. unum, quod uirus è loco tollitur: alterum quod eius ueneni pars quæ ad interiora grassatur, cum multo copiosoque sanguine excernitur. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitulæ cum largiori flamma adfigendæ sunt. Sed



Sed iam de uestione suprà in rabioforum morsu differuimus. Si uerò ista pars, utpote extrema, eam sectionem commodè non respuat, præsertim in omnibus serpentium ictibus, ut aspidis, cerastæ, similibusq; proculdubio amputanda est. Conuenientiora supradictis auxilia sunt, quæ epithemata uocant. Imponatur farmentitius cinis, aut ficulnus, cum lixiuio stillatitio subactus, garo, & acris salsamento. porri, cepæ, & alia modò minutissimè contrita illinuntur, modò cremata uulnibus injiciuntur. quinetiam dissecti gallinarum pulli, cum maximè tepent, percusso loco applicentur. Nec defunt qui hisce tanquam discordia quadam natura li pugnantibus utantur. uerum huius rationem inire facillimum fuerit. Gallinæ enim calida natura prædita sunt, argumēto, quod deuoratum insigne uirus conficiunt, & aridissima quæq; semina consumant. itē nonnunquā arenas lapillosq; ingluuie sua deuoratos, dissolunt. Itaq; animantis ad moti calore adiutus spiritus, ab ista parte impetum capeffens exiliensq; secum uenenum exigit. Nec me fugit quid in Aegypto fieri soleat. Cum spicas Aegyptij metunt, ollam picis paratam habent, & appensam fasciam: tunc enim maximè serpentium iniurias expauescunt, tum propter spicilegij tempus tum quod opacis simul abdita speluncis & cauernis, densiq; aruorum cespite delirefcunt. Molestissima enim animalia & uirus eructantia, Aegyptus in campis ferre consueuit. Vbi ergo aut in pedem, aut partem aliam, morsum intulerunt, qui adsunt, fasciam in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterum brachium aut crus paulum supra uulnus obligant, & arctissimè duo è præsentibus distringunt, locumq; secantes qua circumactus est laqueus, picem instillant, cumq; satis uulnus excepsisse uidetur, laqueum resoluūt, & cepis alijsq; suprà memoratis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit & cedria, & fimum caprarum ex uino decoctum. locū aceto calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam non defunt emplastra uehementissima, & calidissima, quæ uenenum elicere, expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale, aut nitro, sinapi, & cachrye cōponuntur, de quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incescit qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephanti fel, crocodili uē sanguinem ouaq; testudinis, & consimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse uidentur, planè in hæc sola incidentib. imposuerunt. Quæ talia deuotanda sunt, cum difficilè, nisi regia facultate, peruestigari possint: neq; quò nostra fides istis obstringatur, frequenti obseruatione, sufficiens experimentū præstiterint. Quæ autem ad cōmunem oīm usum pertinet, quæq; faciliè suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxiliis ferre queunt, subiungēda uidentur. In tubus itaq; & erica, & astragalus, cū aceto pota, cōtra omnes serpētū morsus auxiliātur. itē bitumen, & uirentes platani pilulæ in uino diluto coctæ, & paliuri decoctū, radix aristolochiæ, & eryngij. decoctæ etiam lauri baccæ, & deuorata, piperq; largius estatu, ruta, anethū, & cyclaminus. coma porrorū priuatim expauescit, aut alliū, aut cepe, salsamentaq; quæ acerrima, origani decoctū cū uino potū, fœniculi, pulegij, calamynthæ, porrorūq; succus, cū melle desorptus. hæc quidē à plantis conquiruntur. Ab animantibus uerò quædam utiliter peti solent. gallinaceorū cerebella in cibo, leporinum coagulū cum uino, itidem castorij sextans. testes marinæ testudinis sumpti multū prōdesse tradātur. mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamenta est. Cōmēdatur in primis exenterata, quæ sale siccescēs inueteratur: ex qua binas drachmas cū uino bibisse satis est. Sed de simplicib. quæ dari solēt hætenus. Percussis à serpēte prodest alui deiectio, diffuēs sudor, urina copiose reddita. Sunt & cōpositæ quædā potiones, quæ mira remedia polliceri tradūtur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis sicilicū. ea melle expiuntur, & instar Aegyptiæ fabæ dātur cū uino. itidē syluestris rutæ seminis, gith, cumini Aethiopici, aristolochiæ, galbani, singulorū pares portiones trite, & cū erucæ succo subactæ, digerūtur in pastillos. qui drachmæ pōdus æquēt, dātur ex istis terni cyathi cū uino. Hæc habui de cōmunib. auxilijs quæ dicerē. De peculiari



bus remedijs contra bestias quæ uenena uibrant, consequenter est dicendum.

Peculiaria remedia uirulentorum ictuum.

Caput XL.

**I**nter feriensium uenenatorum notas nihil de uespis & apibus articulatis digessimus, quod cōspiciat omnibus forent, & nihil excellēs aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earum meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus utrarumq; ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in uulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fotus. Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito & uino, imponere oportet, aut radicē syluestris puniceæ quam tenuissimè tritam, aut aristolochiā, cum hordei farina & aceto subactam. ulcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto. folio eiusdem illinenda. lauacris perpetim utendum, & propinadum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer syluestre, cuminum Aethiopicū, cedrides tritas, plantani corticem, & trifoliæ herbæ semen. priuatim autem, singulorum ex ijs binas drachmas dare cum uini hemina cōuenit. item myricæ fructus, & chamæpityos, & uiridium cupressi pilularum decoctum, admisto uino. Sunt qui fluuiatilis cancri expressi succum, cum lacte, \* assumpto apij semine, confestim molestijs liberare prodāt. Si scolopendra morsum infixit, sal quàm leuissimè tritus ex aceto uulnere inspargendus, aut ruta syluestris superponenda. locus acida muria fouendus, dāda in potu aristolochia cum uino, aut serpyllum, aut calamyntha, aut ruta syluestris. Percussus à scorpione, præsentī est auxilio ficulnum lac in uulnus instillatum. scorpis ipse qui ictum uibravit, tritus & percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob cæcam quandam naturarum (ut constat) discordiam, quæ antipathia appellatur. præterea tritus & impositus cū sale, lini semine & althæa, scorpis conuenit sulphur ignem non expertum, resinā terebinthina exceptū, & emplastrī modo adiectum auxiliatur, itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in uino parata, in decocto rutæ, semen trifoliæ herbæ tritum, & uulnere injectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus utendum. cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ uino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & baccae lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet. cupressus \* cum uino, et ruta, nec secus ficulneum lac, la serpitiū, si adsit: sin desideretur, peucedani succo utendū. efficax est potus trifoliij, & ocimi semen. horum autem omnium uicem pensat iugis laua crisus, euocatus sudor, & diluta uini portiones. Ei qui marina pastinaca ictus, omnia quæ de uiperarum morsu paulò post referemus, simili modo cōueniunt. peculiariter autem (ictus à marino scorpione, & dracone inferitur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed raro, nomas excitant, quibus) absinthij, saluie, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuisa & uulnere imposita, sui ictus medela est. Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium, per se uulnere exterius impositum, ut medicamenti modò aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. quineriam mus ipse qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui ueneficia luit. resistunt quoq; acini dulcis punici decocti, & illiti. item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fotus. sed hæc præterea serpillum, & galbanum, & eruca uino madefacta, recentes cupressi pilulæ cū aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrū cum uino, & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt qui literarum monumētis tradiderunt, tritū murem araneum contra suos ictus cōmodè bibi. Quam historiam apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus quæ annotaretur. Alij asseuerant de morsum non alias exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit, tum sanè auxiliari ferunt. Si uipera morsum impressit, simum caprinū cum uino, studiose impositū opitulatur: item laurus, & abrotonum, & galbanū splenij loco superiectum, organū uiride inditum

\* aqua aut lacte.

\* cyperis.  
\* paribico.

\* Hæc quidā habent.



Inditum, pulli gallinarum discepti, & confestim admoti. erui farina uino subacta. radices cortex usq; eod tufus, ut in puluerem solutus abeat, & scilla tosta, detritum chamæmelum, hordeaceæ farina cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Contra uiperinos ictus rubus cum uino prodest. aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. leporini coaguli in uino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastris succus, & syluestris ruta. hæc in uino potari debent. uinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ & porri recetes, salsamentum acerrima, & opipara. simplicia hæc sunt. Percussis à uipera præclare auxiliatur medicamentum, quod myrrhæ, piperis, castorei, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat. hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro q̄ *περί δυνάμεως*, id est de uiribus inscribitur, pleraq; alia tradidit, quæ ictis à uipera auxilium ferre possunt, \* inter quæ talia maxime laudantur: gallinacea cerebella cum uino pota, semen satiuæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum uino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam piceam intingere, deinde uinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra uiperæ ictus auxiliantur. De amphibia mentionem hoc loco fecimus, quoniā ferè remedijs ad uiperas scriptis, percussis ab ea adiuuari soleant. A dryino ictis conuenit aristolochia cum uino pota, trifolium herba, radix hastulæ regię similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere. usq; ilicis radices, & illis parti ictæ auxiliantur. Hæmorrhoidi diptadisq; morsus uelut immedicabiles à plerisq; maiorum deplorati relinquebantur. quare si peculiaribus cōtra diptaden remedijs egeamus, communia experiri operæ precium erit, protinus autem scarificatione uti, uisionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit: cōsequenter quā acerrima cataplasmata admoere, de quibus sæpenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maxime à salsamentis, utiles esse. meracæ potiones & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spacio assumenda sunt, priusquam morbi genus emerferit, quo semel irrumpente, opem ferre non potest ulla medici opera. In ictu hæmorrhoidi eadem profunt. insuper quæ in commune opitulatur, ut scarificationes, uisiones, acres cibis, meraci potus, & quæ nunc in diptade definiuimus. quinetiam decocta uiris folia, & cum melle trita. Si morsum natrix adegit, prodest origanum tritum, & aqua subactum, lixiuia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut querna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & melle colliquata. bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmę in potione poscę cyathis duobus, deinceps marubij succus, uel decoctum alterius cum uino. fauus recens datur in aceto. Morsus à cenchridio auxiliatur lactucæ fructus cum lini semine illitus, & satureia tri-  
ta, & syluestris ruta, & serpyllum cum duabus hastulæ regię \* drachmis, & tri-  
bus uini cyathis, aut aristolochiæ radix. item cardamomum \* & gentiana. Si ce-  
rastes percusserit, cita partis amputatio suffragatur. quare sine mora ictam par-  
tem amputare, aut scalpro confestim circūcidere, & ijs similia prosequi oportet.  
urentia insuper reliquijs admouenda, siquidem uirus hoc ueneno basilisci simile  
est. lis qui ab aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt auxilia dari debent. nam  
uenenum hoc, quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrimè in arte-  
rijs sanguine cogit. Ad basilisci morsum, ut Erasistratus autor est, auxiliatur ca-  
stori drachma in uino pota. item papaueris succus. Ictuum remedia ita se ha-  
bent.

F I N I S.







